

U  $\frac{279}{106}$

2.4









L35

$$\sqrt[3]{\frac{279}{106}} \cdot 118 = 2133.$$

$$\triangle \frac{56}{4}$$

$$15-2-52.$$





20.000 руб. 200

Книга имеет:

1000. 100

Печатных листов	Выпуск	В переплетн. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	К а р т	Иллюстр.	Служебн. №	№№ списка и порядковый
30		2.4					

и. Биб-ки им. Ленина. Зак. 73. Тир. 50.000.

1945





21.5-9-59 33 40

# МЕДИЦИНА

$\triangle \frac{56}{4}$   $4 \frac{279}{106}$  И

# ГИГИЕНА.

СОСТАВЛЕННАЯ

ПОСТАНОВЛЕННЫМЪ СТАТСКИМЪ

ДОКТОРОМЪ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГІИ СТАТСКИМЪ СОВѢТНИКОМЪ

*А. Чаруковскимъ.*

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,

ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННОЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ВЕЙМАРА.

1851.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 18 Сентября 1851 года.

Ценсоръ Н. Пейкеръ



59789-44

59789-44



2024382047



35-2-59.

1. БОЛЕЗНЬ И ЕЯ ЛЕЧЕНИЕ.

2. ВНУТРЕННЯЯ БОЛЕЗНЬ.



RECEIVED DE H. CHAPMAN. P.  
DECEMBER EIGHTEENTH .2

Корпія . . . . .	176
Компрессъ . . . . .	177
Пластырь . . . . .	179
Повязка . . . . .	180
Бинтъ . . . . .	181
Примочки . . . . .	185
Припарки . . . . .	186
Втирація . . . . .	188
Горчичникъ . . . . .	189
Мушка . . . . .	190
Прижиганіе . . . . .	192
Иглоукалываніе . . . . .	195
Фонтанель . . . . .	197
Прививаніе оспы . . . . .	198
Рожки . . . . .	202
Піавки . . . . .	204
Кровопусканіе . . . . .	207
Остановленіе кровотока . . . . .	220

*Наружныя болѣзни въ особенности.*

Болѣзни головы . . . . .	1
Кровяной волдырь . . . . .	2
Раны и ушибы головы . . . . .	3
Ушибы и переломы черепа . . . . .	4
Сотрясеніе мозга . . . . .	5
Прижатіе мозга . . . . .	8
Разныя наружныя болѣзни головы . . . . .	11
Болѣзни глазъ . . . . .	12
Воспаленіе вѣкъ . . . . .	—
— простое . . . . .	—
— рожистое . . . . .	14
— желѣзъ вѣкъ . . . . .	15
— глазъ . . . . .	18
Ячмень . . . . .	19
Опаденіе верхняго вѣка . . . . .	20
Судорога вѣкъ . . . . .	—
Заячій глазъ . . . . .	—
Заворотъ вѣкъ . . . . .	23
Загнутое рѣсницъ . . . . .	—
Выворотъ вѣкъ . . . . .	24
Сращеніе вѣкъ . . . . .	25
Разныя болѣзни вѣкъ . . . . .	—
Слезотеченіе . . . . .	26
Раны бровей и вѣкъ . . . . .	27
Воспаленіе глазнаго яблока . . . . .	—
— наружныхъ частей глаза . . . . .	28
— внутреннихъ — глаза . . . . .	29
— глазъ простое . . . . .	30



Воспаленіе ревматическое . . . . .	31
— ломотное . . . . .	33
— оспенное . . . . .	—
— корьное . . . . .	34
— чесоточное . . . . .	36
— золотушное . . . . .	36
Раны въ окружности глазъ и самого глаза . . . . .	37
Ожога въѣкъ . . . . .	40
Мутность и пятна на прозрачной оболочкѣ глаза . . . . .	40
Бѣльмо . . . . .	43
Зрачка разширеніе . . . . .	44
— сжатіе . . . . .	45
Темная вода . . . . .	46
Косоглазіе . . . . .	51
Близорукость . . . . .	52
Дальнозоркость . . . . .	54
Двойное зрѣніе . . . . .	55
Дневная слѣпота . . . . .	—
Ночная, куриная слѣпота . . . . .	56
Видѣніе мухъ . . . . .	57
Глазные лекарства . . . . .	58
Болѣзни ушей . . . . .	62
Зудъ въ ушахъ . . . . .	—
Воспаленіе уха . . . . .	63
Боль . . . . .	64
Нарывъ . . . . .	65
Гноетеченіе изъ уха . . . . .	—
Сухость въ ушахъ . . . . .	67
Ушная сѣра . . . . .	—
Постороннія тѣла, попавшія въ ухо . . . . .	—
Чувствительность слухового нерва . . . . .	68—69
Прокалываніе уха . . . . .	70
Слуховыя трубы . . . . .	71
Болѣзни лица и рта . . . . .	71
Насморкъ . . . . .	72
Язвы носа . . . . .	73
Извлеченіе изъ носа постороннихъ тѣлъ . . . . .	74
Раны губъ и щекъ . . . . .	76
Шаршавость и трещины на губахъ . . . . .	76
Сыпь на губахъ . . . . .	77
Разныя болѣзни губъ и щекъ . . . . .	77
Воспаленіе подъязычныхъ и подъязычныхъ желѣзъ . . . . .	78
Зубныя болѣзни . . . . .	79
Нарость на деснахъ . . . . .	80
Зубной свищъ . . . . .	81
Рыхлость десейъ . . . . .	—
Зубная нечистота . . . . .	82



Костоѣда зубовъ . . . . .	83
Зубная боль . . . . .	85
Вырываніе зубовъ . . . . .	87
Зубные инструменты . . . . .	88
Болѣзни рта . . . . .	91
Болѣзни шеи . . . . .	100
Раны гортани . . . . .	101
Раны глотки и пищевого канала . . . . .	102
Зобъ . . . . .	103
Тѣла, попавшія въ гортань и дыхательное горло . . . . .	106
Остановленіе постороннихъ тѣлъ въ глоткѣ, . . . . .	108
Болѣзни груди. . . . .	110
Ушибы. . . . .	111
Раны. . . . .	112
Аневризма въ груди. . . . .	114
Болѣзни на брюхѣ. . . . .	115
Ушибы. . . . .	—
Раны. . . . .	117
Грыжа, кила. . . . .	119
Разныя болѣзни мочевыхъ и дѣтородныхъ органовъ . . . . .	143
Болѣзни прямой кишки и задняго прохода . . . . .	180
Геморрой . . . . .	181
Выпаденіе прямой кишки . . . . .	184
Поставленіе клистировъ . . . . .	186
Болѣзни рукъ и ногъ . . . . .	190
Бедренная немочь . . . . .	192
Плечная } немочь . . . . .	194
Колѣнная } . . . . .	
Раны суставовъ . . . . .	195
Неподвижность суставовъ . . . . .	197
Сведеніе членовъ . . . . .	198
Подвижные хрящики въ суставахъ . . . . .	200
Шестой палецъ . . . . .	201
Сращеніе пальцевъ . . . . .	201
Разныя болѣзни ногтей . . . . .	202
Ногтоѣда . . . . .	203
Искривленіе стопы . . . . .	206
Лошадиная нога. . . . .	207
Призрѣніе больныхъ . . . . .	1—31
Больницы и лазареты . . . . .	2
Выборъ мѣста . . . . .	3
Устройство больницы наружное . . . . .	4 — 8
— — внутреннее. . . . .	8—16
Врачъ и прислуга больныхъ . . . . .	16—27
Продовольствіе больныхъ . . . . .	27—29
Поведеніе больныхъ . . . . .	29—31
Помѣщеніе больного въ частномъ домѣ . . . . .	31

Комната больного	31
Вещи	33—36
Хожатый	36
Воздухъ	39
Пища, питье	41
Движеніе, покой, сонъ.	45
Лекарства	50—61



## БОЛѢЗНЬ И ЕЯ ЛЕЧЕНІЕ ВООБЩЕ.

### І.

#### Свойство, натура болѣзней.

§ 1. Всякій изъ насъ понимаетъ разность между живымъ и мертвымъ человекомъ; но мы не можемъ постигнуть, въ чемъ собственно состоитъ наша жизнь, сама по себѣ, въ отдѣльности отъ ея явленій, какою напр. она представляется у человека, находящагося въ глубокомъ обморокѣ, гдѣ мы у него не замѣчаемъ ни дыханія, ни движенія, ни теплоты, ни кровообращенія (т. е. біенія сердца или артерій — пульса); такой человекъ походитъ на трупъ, не пришедшій только еще въ гніеніе: въ немъ не замѣчается и слѣдовъ жизни, и несмотря на то, она въ немъ находится, потому — что онъ въ слѣдствіи приходитъ въ чувство и оживаетъ, дышетъ, движется, чувствуетъ, мыслить и проч. Точно такимъ же образомъ мы легко различаемъ настоящаго больного отъ здороваго человека, хотя также не понимаемъ, въ чемъ собственно состоитъ болѣзнь, сама по себѣ, въ отдѣльности отъ ея припадковъ: мы знаемъ какими явленіями сопровождается напр. горячка, лихорадка, воспаленія и проч.; но не знаемъ, что эти болѣзни въ отдѣльности отъ ихъ явленій, то есть какая существенная, невидимая перемѣна происходитъ въ тѣлѣ горячечнаго, лихорадочнаго больного. Притомъ есть много болѣзней, которыя, въ своемъ началѣ, гнѣздятся у здоровыхъ,



повидимому, людей: какъ въ нравственномъ мірѣ радость сливается съ горестію; такъ въ физическомъ стекаются болѣзни съ здоровьемъ, жизнь со смертію.

Говорятъ, что здоровье есть гармонія—согласіе всѣхъ дѣйствій и правильность устройства нашего тѣла, а болѣзнь состоитъ въ разстройствѣ первыхъ или неправильности послѣдняго; но это опредѣленіе ни чуть не болѣе разъясняетъ понятіе о здоровьѣ и болѣзни, какъ и то, если бы мы сказали, что здоровье есть здоровье, а болѣзнь—болѣзнь; поэтому мы оставляемъ опредѣленіе болѣзни.

§ 2. Больнымъ можетъ быть только живое существо — растеніе, животное, человѣкъ. Живой человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла; душа, какъ божественный даръ, не подвергается болѣзни, а занемогаетъ одно тѣло, которое состоитъ изъ плотныхъ и жидкихъ частей, равно одаренныхъ жизнью и здоровьемъ, а потому и равно подверженныхъ болѣзнямъ, съ тѣмъ различіемъ, что въ однихъ болѣзняхъ поражаются болѣе и явственнѣе плотныя, а въ другихъ болѣе жидкія части нашего тѣла; но въ продолженіе болѣзни, какъ плотныя, такъ и жидкія части равно страдаютъ, потому что въ нашемъ тѣлѣ они находятся въ непрерывномъ соприкосновеніи и взаимномъ сношеніи, и безпрестанно переходятъ жидкія части въ плотный, а плотныя въ жидкій составъ; притомъ въ плотныхъ частяхъ много находится жидкости, а въ жидкихъ — плотнаго состава: вода въ мозгъ составляетъ  $\frac{1}{3}$  его вѣса, а въ жидкой крови много находится плотнаго состава—бѣлковины, волокнины, солей и проч.

§ 3. Все тѣло, равно какъ и разныя его части занемогаютъ различно, и потому болѣзней находится очень много; кромѣ того, одна и та же болѣзнь измѣняется по тѣлосложению, характеру, полу, возрасту, причинамъ и проч. Но такъ какъ предметъ, жилище болѣзни — наше живое тѣло — проявляется разными дѣйствіями и вещественнымъ составомъ — собственно тѣломъ, то всѣ болѣзни можно раздѣлять на два большіе класса: болѣзни дѣйствія, силы, и болѣзни тѣла, матеріи; первыя болѣзни называются еще духовными, динамическими или внутренними, потому



что онѣ поражаютъ дѣятельность, силу нашего тѣла, его внутреннюю жизнь, а послѣднія матеріальными, тѣлесными или органическими, наружными, потому — что гнѣздятся въ матеріи, составѣ тѣла, снаружи въ различныхъ органахъ. Впрочемъ, это раздѣленіе болѣзней, какъ и всѣ наши понятія, есть относительное, справедливое вообще, но подверженное исключенію въ частности: воспаленіе принадлежитъ къ динамическимъ, внутреннимъ болѣзнямъ, но оно можетъ находиться снаружи тѣла и выражаться одними матеріальными припадками; рана, нанесенная бѣшеннымъ животнымъ, есть наружная болѣзнь; но ядъ, вошедшій чрезъ нее въ тѣло, причиняетъ внутреннюю болѣзнь — водобоязнь.

§ 4. Внутреннія, духовныя болѣзни, — динамическія страданія дѣйствій нашего тѣла, его жизненной силы, состоятъ или въ излишней, непомерно возбужденной дѣятельности, въ умноженной силѣ и скорости его дѣйствій, или же, чапротивъ, въ ослабленіи, изнеможеніи силы и дѣйствій нашего тѣла. Перваго рода болѣзни происходятъ отъ раздраженія тѣла и его разныхъ органовъ, отъ остановленія нужнаго испражненія соковъ (задержанія мочи, желчи), отъ полнокровія, чистаго, сухаго, горнаго воздуха, отъ питательной, горящей пищи, спиртныхъ напитковъ, пряныхъ веществъ и проч. Эти болѣзни слишкомъ напрягаютъ, возбуждаютъ наше тѣло, которое оттого скоро истомляется, изнуруется, истощается, какъ напр. въ лихорадкахъ, воспаленияхъ. Втораго рода болѣзни, состоящія въ изнеможеніи, слабости силы и дѣйствій нашего тѣла, зависятъ отъ недостатка раздраженія, отъ предшедшаго непомернаго напряженія тѣлесной дѣятельности; онѣ бываютъ слѣдствіемъ или болѣзней перваго рода (гнилая горячка, помертвѣніе), или же сами по себѣ происходятъ отъ потери крови (послѣ кровотеченій), порчи соковъ (цынга, любострастная), отъ недостатка пищи (при голодѣ отъ неурожая), свѣта, теплоты, отъ холода, сырости, нечистаго воздуха, отъ продолжительнаго угнетенія духа горестію, несчастіемъ и проч. Разумѣется, что дѣйствіе тѣла или его частей, усиливаясь или ослабѣвая, вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется въ качествѣ, такъ напр. усиленное пи-



пищевареніе производитъ много и хорошо обработаннаго питательнаго сока, а ослабленное дѣйствіе желудка мало выдѣлываетъ питательнаго сока и худаго качества; первое можно замѣтить надъ людьми крѣпкими, полными, а второе надъ слабыми, худощавыми. Впрочемъ, надобно сознаться, что познанія врачей въ качественномъ измѣненіи болѣзнями дѣйствій нашего тѣла весьма ограничены.

§ 5. Матеріальныя, органическія, видимыя, наружныя болѣзни состоятъ или въ излишествѣ, или въ недостаткѣ органической матеріи, которая притомъ измѣняется и въ своемъ составѣ — качествѣ. Болѣзни перваго рода суть тѣ, при которыхъ происходитъ умноженное выработываніе густой крови, отдѣленіе въ излишествѣ соковъ, особенно жира, накопленіе въ полостяхъ тѣла сыворотки (водяная болѣзнь, опухоли, наросты). Болѣзни втораго рода суть тѣ, въ которыхъ нѣтъ надлежащаго выработыванія питательнаго сока и крови, измѣняющихся притомъ и въ своихъ качествахъ; таковы болѣзни суть: чахотка, сухотка, золотуха, англійская болѣзнь, дѣвичья немочь, исхуданіе разныхъ частей тѣла. Тѣ и другія болѣзни качественно измѣняютъ органическую матерію, дѣлаютъ соки тѣла (кровь и пасоку) густыми, клейкими или жидкими, скоро створаживающимися, или легко разлагающимися; отсюда происходятъ разные сыпи на кожѣ, нагноеніе, язвы, слабость и вялость тѣла, помертвѣніе, затвердѣніе, окостенѣніе и проч.

Слѣдственно всѣ дѣйствія нашего тѣла и его составы занеполагаютъ тѣмъ, что усиливаются, ослабѣваютъ или измѣняются въ своихъ качествахъ, и въ семъ отношеніи мы ихъ здѣсь рассмотримъ.

§ 6. Пищевареніе зависитъ отъ дѣйствія пищеварительныхъ органовъ и ихъ соковъ и отъ количества и качества пищи. Усиленное и скорое пищевареніе причиняетъ обжорливость, причемъ много вырабатывается питательнаго сока. Если при такомъ пищевареніи находятся усиленными и другія дѣйствія, занимающіяся выработываніемъ органической матеріи — всасываніе, кровотвореніе, питаніе, то ускоряется рашеніе тѣла, происходитъ многосочіе и полнокровіе



въ тѣлѣ, тучность. Когда уможено одно пищевареніе въ желудкѣ и кишкахъ, то въ нихъ накапливается много питательнаго сока, который однако не можетъ надлежаще превратиться въ кровь. Но если при сильномъ пищевареніи недостаетъ потребнаго количества пищи, то желудочный и кишечный соки, равно и желчь дѣлаются острыми, причиняютъ голодъ, боль въ желудкѣ, слабость въ тѣлѣ, обмороки. Усиленное пищевареніе зависитъ отъ ужноженной дѣятельности желудка, кишекъ, печени, отъ увеличеннаго отдѣленія ими соковъ.

Гораздо чаще встрѣчается медленное, слабое пищевареніе, которое доставляетъ мало питательнаго сока и притомъ худаго; оно зависитъ отъ слабаго дѣйствія желудка, его прижатія, воспаления, отвердѣнія, язвъ, чрезмѣрнаго наполненія желудка пищею, недостатка и порчи желудочнаго сока, трудноваримости пищи. При измѣненіи пищеваренія въ его качествѣ, кромѣ измѣненія самыхъ пищеварительныхъ соковъ, въ желудкѣ и кишкахъ накапливается много слизи, кислоты, вѣтровъ; вырабатываемый присемъ питательный сокъ бываетъ очень несовершенный, — густой, клейкій, вязкій, или жидкій, водянистый, острый, онъ слабо поддерживаетъ другія дѣйствія тѣла; такое пищевареніе замѣчается у слабыхъ дѣтей, при ипохондріи, истерикѣ, дѣвичьей немочи, золотухѣ, подагрѣ и проч.

§ 7. Подобно пищеваренію измѣняется и кровото-  
вореніе, и эти оба измѣненія по большей части находятся въ связи и согласіи: при сильномъ пищевареніи бываетъ и сильное кровото-  
вореніе. Кровото-  
вореніе измѣняется тѣмъ, что оно вырабатываетъ крови или много, или же мало, либо вырабатываетъ кровь не надлежащаго качества. Усиленное кровото-  
вореніе производитъ полнокровіе въ тѣлѣ, которое происходитъ отъ излишества питательной пищи, отъ усиленнаго дѣйствія легкихъ и большихъ кровяныхъ сосудовъ, отъ малаго израсходованія крови на движеніе, питаніе, отдѣленія, отъ задержанія нѣкоторыхъ привычныхъ испражнений крови. Полнокровіе растягиваетъ сердце и кровяные сосуды, препятствуетъ надлежащему ихъ дѣйствию, про-



изводитъ накопленіе крови въ легкихъ, сердцѣ, мозгѣ, печени; оно причиняетъ умноженію теплоту, полноту и красноту въ тѣлѣ, густоту крови, расположеніе къ тучности, воспаленіямъ, пострѣлу и проч.

Мало кровіе противоположно полнокровію; при мало-кровіи питаніе, отдѣленія и испражненія соковъ происходятъ скудно; оно зависитъ отъ недостатка пищи или ея худаго качества, отъ потери крови чрезъ кровотеченіе или отъ значительнаго ея израсходованія движеніемъ, черною, тяжелою работою. При малокровіи ослабѣваетъ пищевареніе, уменьшается полнота и краснота въ тѣлѣ, которое блѣднѣетъ, худѣетъ, спадается, происходитъ расположеніе къ болѣзнямъ изнурительнымъ, простудѣ, ревматизму и проч.

Кромѣ количественнаго измѣненія крови, она измѣняется еще качественио: дѣлается густою, жидкою, худосочною — острою. Густая какъ масло, цвѣтомъ темнокрасная и даже черная кровь, бываетъ при полнокровіи, воспаленіи; она содержитъ много кровяныхъ шариковъ и волокнистой части, и причиняетъ тѣ же припадки, что и полнокровіе; притомъ густая кровь скоро и явственно раздѣляется на свои составныя части: творогъ, сгустокъ и сыворотку; творогъ осѣдаетъ въ большомъ количествѣ бываетъ плотенъ, на поверхности покрывается особенною, желтобѣлою, жирною пленкою, а сыворотка отдѣляется въ маломъ количествѣ. Жидкая, водянистая, блѣдно-красная, клейкая, слизистая кровь бываетъ при малокровіи, также у флегматиковъ; въ ней находится мало кровяныхъ шариковъ и волокнистаго, а много бѣловатаго вещества и сыворотки; такая кровь медленно протекаетъ въ сосудахъ, слабо раздражаетъ и возбуждаетъ тѣло, отчего происходитъ упадокъ и ослабленіе всѣхъ дѣйствій. Кровь водянистая происходитъ отъ ея потери кровотеченіемъ, отъ изнурительныхъ испражненій (поноса, сахарнаго мочетеченія), растительной пищи, разстройства пищеваренія, а кровь клейкая, слизистая — отъ мучнистой пищи, спертаго, нечистаго воздуха, угнетающихъ страстей. Водянистая кровь скоро разлагается на составныя части, но изъ ней мало отдѣляется творогу, а много сыворотки,



клейкая же кровь медленно разлагается и подергивается тонкою, радужною пленкою. Кромѣ сего, кровь бываетъ полуразложившеюся, растворенною въ цынгѣ, гнилой горячкѣ, при помертвѣніи, и острою въ любострастной болѣзни, золотухѣ, ломотѣ, разныхъ сыпяхъ.

§ 8. Всѣ отдѣленія нашего тѣла измѣняются или по количеству или по качеству: умноженное отдѣленіе происходитъ при полнокровіи, хорошей, питательной пищѣ, при раздраженіи отдѣлительнаго органа, или же и при слабости послѣдняго, когда въ него, какъ бы въ яму, стекаютъ въ излишествѣ соки, какъ то бываетъ при изнуреніи тѣла. Умноженнымъ отдѣленіемъ или только уменьшается полнокровіе и восстанавливается равновѣсіе въ тѣлѣ, или выводятъ изъ тѣла вредные соки, острота крови, или же причиняется потеря и нужныхъ соковъ; посему умноженное отдѣленіе можетъ быть полезно, или вредно для всего тѣла.

Уменьшенное или и совсѣмъ остановленное отдѣленіе зависитъ отъ малокровія и вообще недостатка соковъ въ тѣлѣ, или отъ слабаго, либо воспаленнаго дѣйствія отдѣлительнаго органа, при судорогѣ въ немъ, его воспаленіи, отвердѣніи, разстройствѣ, также отъ механическаго препятствія. Послѣдствія уменьшеннаго или остановленнаго отдѣленія могутъ имѣть вліяніе на все тѣло, на кровообращеніе, на другія отдѣленія; такъ остановленное отдѣленіе мочи усиливаетъ испарину, разстроиваетъ пищевареніе, производитъ горячку.

Уменьшенное или остановленное одно отдѣленіе замѣняется умноженнымъ другимъ отдѣленіемъ; такъ при остановленной испаринѣ кожи отдѣляется въ излишествѣ моча, происходитъ водянистый поносъ; такъ при задержаніи мочи, желчи,гноя, ихъ составныя части накапливаются въ крови и проявляются въ кожѣ желтизною, въ дыханіи запахомъ мочи, въ поносѣ гноемъ. Иногда происходитъ новое болѣзненное отдѣленіе, какъ то изва, сыпи, водяная болѣзнь, въ которыхъ отдѣляются сыворотка, острая жидкость.

При умноженномъ, или уменьшенномъ отдѣленіи отдѣляемая жидкость измѣняется въ качествѣ, дѣлаясь гу-



стою, жидкою, ѣдкою, парообразная — капельною, и содержа въ себѣ въ излишествѣ или недостаткѣ свои составныя части: соли, слизь, бѣлокъ, кислоты, песокъ и проч. какъ то при слинотеченіи, отъ употребленія ртути, слина бываетъ густая, вязкая; моча въ горячкѣ или лихорадкахъ дѣлается то свѣтло-водяною, то красно-кирпичною съ осадкомъ; въ водяной болѣзни сывороточный паръ превращается въ капельную жидкость и проч.

Испражненіе, какъ окончаніе отдѣленія, измѣняется подобно послѣднему, то есть происходитъ въ большемъ или маломъ количествѣ и измѣняется въ качествѣ; это можно видѣть при слинотеченіи, изнурительномъ потѣ, чахоткѣ, поносѣ и проч.; явственнѣе всего измѣняется отдѣленіе и испражненіе мочи въ истощительномъ мочетеченіи, въ которомъ человекъ испражняетъ мочи вдвое, даже втрое болѣе, чѣмъ сколько онъ испиваетъ жидкости, да и самая моча мало содержитъ собственныхъ частей (солей) и много сахарнаго вещества.

§ 9. Питаніе, подобно отдѣленію, измѣняется въ количествѣ и качествѣ. При усиленномъ общемъ питаніи, тѣло растетъ скоро въ длину и въ толщу, или же болѣе въ одну длину и бываетъ высоко, тонко, слабо и хило, либо въ ширину и оказывается толстымъ, присадистымъ, крѣпкимъ; люди высокіе ростомъ, имѣютъ слабое, мягкое, пѣжное тѣло, бываютъ слабы, малокровны, расположены къ чахоткѣ, а низкіе ростомъ, — плотны, жилисты, крѣпкотѣлы, сильны, расположены къ пострѣлу, расширенію сердца, большихъ сосудовъ; у другихъ людей одна сторона бываетъ болѣе другой (наичаще лѣвой), которая отъ того чаще подвергается болѣзнямъ.

Неправильно-усиленное питаніе разныхъ частей тѣла производитъ въ нихъ окрѣпость, отвердѣніе, которыя зависятъ отъ излишества сгустившагося бѣлковаго, костнаго, волокнистаго вещества; такія отвердѣнія остаются послѣ воспаленія. Расположеніе къ ломотѣ, золотухѣ, англійской болѣзни также происходитъ отъ неправильнаго



питанія, отъ котораго зависягъ и разныя опухоли, желваки, наросты.

§ 10. Болѣзни движенія относятся къ силѣ, крѣпости или слабости. Болѣзни съ усиленнымъ движеніемъ зависягъ отъ какого-либо возбужденія или раздраженія, какъ напр. въ горячкахъ, воспаленіи мозга, въ помѣшательствѣ ума съ бѣшенствомъ, въ различныхъ судорогахъ. Слабое движеніе бываетъ послѣ сильнаго возбужденія, истощившаго силы, показывается у людей, выздоравливающихъ послѣ тяжкихъ болѣзней, послѣ непомѣрныхъ напряженій ума и тѣла. Всякое движеніе въ тѣлѣ посредствуется мышечнымъ сжатіемъ и растяженіемъ, которыхъ содержаніе между собою въ болѣзняхъ также измѣняется, и такъ происходятъ корчи (неподвижность) или судороги, конвульсіи, или, наконецъ, онѣмѣнія, бездѣйствіе въ членахъ.

§ 11. Болѣзни тѣлесныя, органическія относятся: 1, къ нарушенію цѣлости частей, какъ-то раны и язвы съ рубцами, переломы костей, проѣдины, разрывы сосудовъ, мышцъ; онѣ состоятъ въ поврежденіи, раздѣленіи цѣлыхъ частей; или 2) къ неправильному виду, величинѣ частей, каковы суть: разныя опухоли, наросты, бородавки, мозоли, суженія, сжатія, заращенія и расширенія сосудовъ, завалы внутренностей; или 3) къ неправильной связи, какъ-то: сращеніе и неподвижность суставовъ; или 4) къ неправильному положенію членовъ и органовъ, какъ-то вывихъ костей, грыжа или выпаденіе внутренностей, вхожденіе одной внутренности въ другую, переплетеніе кишковъ между собою или или завитокъ, уклоненіе кристаллика въ глазъ съ своего мѣста, склоненіе матки впередъ, и къзади или въ стороны, зачатіе младенца не въ своемъ мѣстѣ, положеніе сердца въ правой полости груди, печени въ брюшной полости и проч.

## II. Припадки болѣзней.

§ 12. Заботливая природа, вселивъ въ насъ чувство самозащиты, надѣлила насъ и способностію чувствовать при-



существованіе въ насъ болѣзни : каждый изъ насъ, занемогая обыкновенною болѣзнію, по большей части чувствуетъ зараженіе ея прежде, нежели она обнаружится явными припадками или признаками. Притомъ много встрѣчается такихъ больныхъ, которыхъ болѣзнь можно узнать только изъ чувства нездоровья или изъ разсказовъ самого больного ; таковы суть разныя боли, ревматизмъ, ломота, слабость, словомъ, всякая болѣзнь, поражающая особенно первы.

Посему очень легко узнать болѣзнь вообще — въ этомъ намъ пособляетъ самъ больной, его чувство нездоровья; опредѣлить родъ болѣзни, различить ее отъ множества другихъ болѣзней часто также легко, но часто и трудно, а иногда и совсѣмъ невозможно. Эта трудность въ распознаваніи болѣзней есть главная причина противорѣчій понятія врачей объ ихъ больныхъ и различнаго леченія одного и того же больного.

§ 13. Впрочемъ, и въ расположеніи болѣзней натура больного первая подаетъ намъ руку помощи. Болѣзни распознаются по припадкамъ или признакамъ, которые возникаютъ въ тѣлѣ больного и зависятъ отъ измѣненнаго, болѣзненнаго состоянія страждущей части. Припадокъ болѣзни есть тоже явленіе, дѣйствіе какого-либо органа, которое бываетъ и въ натуральномъ его положеніи, но только измѣненное, усиленное, ослабленное, такъ напр. пульсъ, бѣшеніе артерій, есть натуральное ея явленіе, но въ болѣзни онъ ударяетъ слабѣе, сильнѣе, скорѣе, медленнѣе натурального, и такъ показываетъ болѣзнь; дыханіе необходимо для каждого здороваго челоука, но у больного оно происходитъ то скорѣе, то медленнѣе, то затруднителнѣе, сопровождается кашлемъ, хрипѣніемъ, свистомъ и проч. Посему припадокъ есть измѣненіе страждущаго органа, который измѣняется болѣзнію въ своемъ составѣ, дѣйствіи, выказываетъ это измѣненіе и особенными явленіями — припадками.

Припадки, по ихъ значенію и отношенію къ болѣзнямъ, бываютъ различны : существенныя припадки проистекаютъ изъ самой болѣзни, съ нею начинаются, продолжаются и оканчиваются, напр. боль, жаръ, опухоль при воспаленіи. Случай-



ные припадки не всегда бывают при известной болѣзни, но зависятъ или отъ самого больного, его тѣлосложенія, возраста, или отъ постороннихъ причинъ, напр. при горячкѣ сухость во рту, жаръ, жажда, скорый пульсъ — суть существенные припадки, но у горячечнаго больного можетъ быть притомъ рвота, боль головы, поносъ — это случайные припадки.

Припадки бываютъ начальные и послѣдственные. Начальные припадки происходятъ прямо отъ самой болѣзни, напр. при простудѣ (катаррѣ), воспаленіи легкихъ кашель есть начальный припадокъ, но онъ можетъ возбудить рвоту, которая въ такомъ случаѣ будетъ уже послѣдственнымъ припадкомъ.

Многоразличные припадки болѣзней мы здѣсь кратко изложимъ въ томъ же порядкѣ, въ какомъ выше изложены и самыя болѣзни, относительно ихъ мѣстопробыванія.

§ 14. Припадки болѣзней пищеварительныхъ органовъ (рта, горла, пищевого канала, желудка, кишекъ, печени и проч.) состоятъ или въ болѣзненномъ чувствованіи, или въ измѣненіи движенія, либо самаго состава сихъ органовъ. Болѣзненное чувство относится къ дурному вкусу, жаждѣ, изгагъ, судорогамъ въ желудкѣ, боли въ кишкахъ, натугу при испраженіи низомъ. Припадки болѣзненнаго движенія состоятъ въ труднотѣ сосанія, жеванія и глотанія, въ отрыжкѣ, тошнотѣ, рвотѣ, поносѣ, рвотѣ съ поносомъ, запорѣ и раздутіи живота.

Дурной вкусъ зависитъ отъ разстройства пищеваренія, но иногда и безъ того онъ замѣчается у женщинъ беременныхъ, истеричекъ и похондриковъ.

Слабый позывъ на ѣду или потеря аппетита показываютъ слабость пищеваренія, которая, въ высшей степени, производитъ отвращеніе отъ пищи. Этотъ припадокъ происходитъ при воспаленіи желудка, послѣ пресыщенія (объяденія), отъ худой пищи, испорченнаго желудочнаго сока, непріятныхъ лекарствъ, отъ непріятныхъ впечатлѣній на обоняніе, вкусъ, воображеніе, наичаще замѣчается отвращеніе отъ мясной пищи, жирной, кислой, мучнистой.

Сильный позывъ на ѣду или голодъ есть то, когда



человѣкъ съѣдаетъ пищи болѣе, нежели сколько ему нужно для поддержанія своего тѣла; онъ зависитъ отъ скорого пищеваренія или преждевременнаго выходненія изъ желудка еще непереварившейся пищи, отъ остраго или кислаго желудочнаго сока, быстраго всасыванія или испражненія питательнаго сока, и замѣчается въ изнурительныхъ болѣзняхъ (золотухъ, англійской) при ипохондріи, истерикѣ, помѣшательствѣ ума. При сильномъ голодѣ иногда происходитъ обморокъ, или же пища тотчасъ извергается рвотою, либо непереваренная испражняется низомъ. Иногда при голодѣ больной ѣстъ одну какую-либо пищу, или неупотребляемая въ пищу вещи, какъ то землю, угли, мѣлъ. Въ болѣзняхъ чаще бываетъ недостатокъ аппетита, чѣмъ сильный голодъ; противное замѣчается о жаждѣ: больные рѣдко пьютъ мало, а чаще очень много. Недостатокъ жажды бываетъ при слабости пищеваренія, отъ накопленія слизи въ глоткѣ и желудкѣ, отъ большаго всасыванія кожею сырости изъ воздуха при туманной погодѣ, въ банѣ, отъ продолжительнаго пребыванія въ водѣ. Сильная жажда замѣчается въ лихорадкахъ, горячкахъ, при воспаленіяхъ, когда сильный жаръ въ тѣлѣ издерживаетъ много жидкой части крови; она происходитъ и при раздраженіи во рту, въ глоткѣ, послѣ обильнаго пота. Если, для удовлетворенія такой жажды, больные пьютъ разомъ много воды, то обременяютъ желудокъ, а если слишкомъ воздерживаются отъ питья, то усиливается жаръ, сухость, тоска, бредъ.

Изгага, изжога есть жгучее чувство, изъ желудка восходящее къ глоткѣ; она происходитъ отъ испорченной пищи въ желудкѣ, кислаго или ѣдкаго (щелочнаго) желудочнаго сока, острыхъ съѣденныхъ вещей, отъ поверхностнаго воспаленія слизистой оболочки зѣва, глотки.

Тошнота есть непріятное чувство въ желудкѣ; она происходитъ отъ обремененія желудка, отъ трудноваримой пищи или жирной и невкусной, отъ лекарства, сильной боли головы (при угарѣ), и часто оканчивается рвотою.

Боль въ желудкѣ чувствуется какъ давленіе, колотье, рѣзь, щемленіе, стѣсненіе и сжатіе; она происходитъ отъ вос-



паленія, чрезмѣрнаго обремененія желудка пищею, отъ отдѣленія въ желудкѣ вѣтровъ, отъ острой, твердой пищи, зашедшихъ въ желудокъ глисть, отъ ядовъ, остраго желудочнаго сока, отъ поврежденія желудка, кишекъ, печени язвами, опухолями и проч.

Боль въ кишкахъ оказывается такимъ же чувствомъ, какъ и боль въ желудкѣ, и происходитъ отъ подобныхъ же причинъ. Боль въ заднемъ проходѣ (натугъ, жиленіе), оказывающаяся безпрестаннымъ позывомъ къ испражненію низомъ, происходитъ отъ раздраженія въ заднемъ проходѣ воспаленіемъ прямой кишки, глистами, почечуемъ (шишками), острыми соками, при страданіи мочевого пузыря, матки. При безчувственности въ заднемъ проходѣ, задерживается испражненіе низомъ и происходитъ запоръ; но если бываетъ разслабленіе задняго прохода, то калъ испражняется непроизвольно.

§ 15. Припадки пищеваренія, возникающіе изъ болѣзненного движенія. Трудное сосаніе у новорожденнаго младенца можетъ зависѣть отъ раздѣленія верхней губы, молюшницы на губахъ и языкъ, отъ короткости подъязычной уздочки, доходящей до верхушки языка, который отъ того трудно движется и на кончикъ своемъ кажется раздвоеннымъ. Жеваніе бываетъ трудно или невозможно при слабости и бездѣйствіи, воспаленіи, корчѣ жевательныхъ мышцъ, при вывихѣ, переломѣ кости нижней челюсти, неподвижности въ сѣ суставъ. Торопливое сосаніе и глотаніе происходитъ отъ судорогъ сихъ мышцъ и предвѣщаетъ бредъ. Трудное глотаніе зависить отъ ранъ, язвъ, опухолей, наростовъ, отвердѣній, корчи, воспаленія, разслабленія языка, поднебесья, зѣва, глотки; если причина труднаго глотанія находится въ пищевомъ горлѣ (его суженіе), то пища, дошедши до суженнаго мѣста, возвращается назадъ.

§ 16. Червообразное движеніе, которымъ проводится пища и питье, начинается въ глоткѣ, продолжается чрезъ весь пищевой каналъ, желудокъ и кишки до задняго прохода; оно измѣняется въ силѣ, скорости и даже въ направленіи; отъ этого измѣненія происходятъ:



1) Отрыжка; она есть стремительное выхождение воздуха из желудка в ротъ, зависитъ отъ сжатія желудка, котораго червообразное движеніе направляется присемъ кверху, а не книзу, и поддерживается брюшными мышцами; иногда съ воздухомъ выгоняется изъ желудка пѣна, жидкость или пища.

2) Рвота различается отъ отрыжки только степенью, и извергаетъ изъ желудка пищу и питье въ большемъ количествѣ; она производится также противу-червообразнымъ движеніемъ желудка кверху и сильнымъ сжатіемъ его брюшными мышцами; она зависитъ отъ раздраженія, воспаленія и чувствительности желудка, возбуждаемыхъ пищею, питьемъ, воздухомъ, слишкомъ наполняющими и растягивающими желудокъ; также рвота происходитъ отъ испорченной, непріятной пищи, отъ скопленія въ желудкѣ слизи, гноя, крови, порчи желудочнаго сока, желчи, отъ язвъ, отвердѣнія желудка, отъ завала печени и прижатія ея и раздутыми кишками желудка, отъ ядовъ, попавшихъ въ желудокъ, отъ разныхъ лекарствъ; сочувственно тошнота и рвота возбуждаются непріятными впечатлѣніями на обоняніе, вкусъ, воображеніе, шекотаніемъ въ зѣвъ, страданіемъ мозга. Рвота можетъ быть полезна или вредна; она полезна тѣмъ, что извергаетъ изъ желудка все вредное, ядовитое, излишнее, сильно возбуждаетъ слизистыя оболочки, пасочные сосуды, вены, нервы, кожу, усиливаетъ отдѣленіе, всасываніе соковъ и кровообращеніе; сильная рвота вредна тѣмъ, что извергаетъ нужные соки, мѣшаетъ пищеваренію, ослабляетъ тѣло, причиняетъ грыжи, выпаденія прямой кишки и матки, выкидышъ въ беременности, кровотеченіе, расширение сосудовъ, воспаленіе и даже разрывъ желудка.

3) Поносъ есть частое испражненіе низомъ жидкаго кала и кишечныхъ соковъ; онъ производится стремительнымъ, червообразнымъ движеніемъ, которое, начавшись отъ желудка, продолжается чрезъ всѣ кишки до задняго прохода. Поносъ причиняется чрезмѣрнымъ раздраженіемъ желудка и особенно кишекъ, печени пищею, питьемъ, желчью, лекарствомъ, остановленною испариною кожи и, подобно рвотѣ,



можетъ быть полезенъ или вреденъ: умѣренный поносъ, очищая желудокъ и кишки, исправляетъ пищевареніе, предотвращаетъ другія болѣзни, освѣжаетъ голову; сильный поносъ мѣшаетъ пищеваренію, истощаетъ тѣло, ослабляетъ силы и оставляетъ послѣ себя запоръ на-низъ.

4) Рвота и поносъ (холера) происходятъ отъ сильнаго раздраженія желудка и кишекъ, причемъ червообразное движеніе въ первомъ направляется кверху, а въ кишкахъ — книзу. Рвота съ поносомъ происходятъ въ жаркомъ климатѣ и въ знойное время года, и замѣчаются лѣтомъ въ нашихъ странахъ мѣстно или повально въ народъ; сей припадокъ очень опасенъ и причиняетъ смерть или судорогами, или изнуреніемъ тѣла.

5) При слабомъ, червообразномъ движеніи въ кишкахъ медленно и несовершенно происходитъ пищевареніе, выдѣлываніе и всасываніе питательнаго сока; появляется часто урчаніе въ животъ, въ направленіи снизу и справа вверхъ и поперечно чрезъ животъ опять книзу и влѣво, при чувствѣ какъ-будто въ брюхѣ переливается жидкость; причемъ кишки или брюхо раздуваются вѣтрами, бываетъ отрыжка, недостатокъ аппетита, вязкій вкусъ и запоръ на-низъ.

§ 17. Разстроенное пищевареніе, съ его послѣдствіями — отдѣленіями и испражненіями, — само по себѣ скрытное, обнаруживается видомъ языка и рта, отрыжкою, рвотою, испражненіемъ на-низъ, состояніемъ брюха и его внутренностей. Слизъ бѣлая, желтая, темная, вязкая, тягучая, засохшая, различнаго вкуса и запаха, покрываетъ языкъ и полость рта; она означаетъ наичаще поврежденіе пищеваренія; нечистый языкъ есть, такъ сказать, вывѣска безпорядковъ, происходящихъ въ брюхѣ. Впрочемъ, сказанное состояніе языка и полости рта иногда зависитъ отъ недостаточнаго отдѣленія слюны, отъ болѣзней въ носу, зѣвъ, глоткѣ, дыхательномъ горлѣ и легкихъ.

Отрыжкою извергается изъ желудка въ ротъ воздухъ, газы, вѣтры, жидкость и пища; всѣ эти изверженія имѣютъ различный вкусъ и запахъ, по которымъ



можно судить о качествѣ извергаемаго отрыжкою; такъ, по горечи при отрыжкѣ, можно заключить о присутствіи въ желудкѣ желчи, по запаху гнилыхъ яицъ и промзглости — объ испорченной пищѣ, по кислотѣ — о кислотѣ желудочномъ сокѣ.

Извергаемая рвотою вещества распознаются по ихъ густотѣ, цвѣту, запаху и вкусу: безвкусная, водянистая жидкость показываетъ худое качество желудочнаго сока и слабость желудка; слизъ означаетъ и ея накопленіе въ желудкѣ, а желчь — ея захожденіе въ желудокъ; желчь желтая, зеленая указываетъ на болѣзненное отдѣленіе въ печени. Острый вкусъ, гнилой запахъ и темный цвѣтъ извергаемаго рвотою показываютъ большую неправильность пищеваренія, порчу самаго желудка, его язвы, отвердѣніе, ракъ. Извергаемая рвотою кровь, жидкая, ссѣвшаяся, чистая или смѣшенная съ пищею въ темную массу, происходитъ отъ кровотеченія въ желудкѣ, ближайшей къ нему кишкѣ, въ печени. Рвотою же извергается гной, сукровица, желчные камни, глисты.

Испражненіе низомъ показываетъ дѣйствіе на пищу печени и пищевареніе въ кишкахъ: твердый калъ означаетъ долгое пребываніе его въ кишкахъ, слабость ихъ червообразнаго движенія, или недостатокъ въ нихъ слизи, или же сильное всасываніе; твердый калъ, скопившись въ толстыхъ кишкахъ, ихъ растягиваетъ, прижимаетъ вены и препятствуетъ теченію въ нихъ крови, а отъ сего происходятъ почечуйныя опухоли (шишки), трудное испражненіе низомъ. Съ жидкимъ каломъ въ поносъ нерѣдко испражняется несварившаяся пища; темножелтый и бурый калъ показываетъ содержаніе въ немъ множества желчи, которой недостатокъ означаетъ блѣватымъ или сѣрымъ каломъ; зеленый калъ происходитъ отъ кислоты; слизистый калъ означаетъ накопленіе въ кишкахъ слизи, которая, сверхъ того, бываетъ гнойвидная, похожая на творогъ молока или перепонки и происходитъ при воспаленіи кишекъ. Кровь, испражняемая низомъ жидкая и чистая, выходитъ изъ сосудовъ прямой кишки при открытомъ почечуѣ, при кровавомъ поносѣ,



или при язвахъ въ кишкѣ; кровь густая, черная, отдѣляется изъ верхней части кишекъ. Смордныя, гнилыя, непроизвольныя испражненія низомъ бываютъ въ опасныхъ горячкахъ, при помертвѣніи кишекъ.

Состояніе брюшныхъ внутренностей можно отчасти узнать и чрезъ наружный осмотръ брюха: вялое, впалое брюхо показываетъ недостатокъ жира въ сальникъ и пустоту желудка и кишекъ; брюхо упругое, вздутое, при удареіи пальцемъ звонкое, какъ барабанъ, означаетъ накопленіе въ кишкахъ вѣтровъ, воздуха; иногда снаружи можно ощутить скопленіе въ кишкахъ твердаго кала, особенно въ правой и нижней части живота; также можно ощупать отвердѣлую, распухлую печень въ правой и верхней части брюха; растянутое брюхо, съ зыбленіемъ въ немъ, при удареіи въ бокъ, жидкости, бываетъ при водяной брюшной болѣзни, а полное, жесткое или тѣстоватое брюхо замѣчается при обширныхъ завалахъ печени, селезенки, брыжеечныхъ кишекъ.

§ 18. Припадки и признаки болѣзненнаго дыханія показываютъ не только страданіе дыхательнаго горла и легкихъ, сердца, но и печени, желудка, кишекъ, дыхательныхъ мышцъ; они относятся къ чувствованію и движенію, также къ перемѣнѣ воздуха съ кровію. При великой чувствительности въ дыхательномъ горлѣ и легкихъ, отъ малѣйшаго раздраженія происходитъ кашель и жгучая, колючая, давящая боль, тяжесть въ груди, тоска и боязнь задохнуться.

Болѣзненное дыханіе бываетъ малое, короткое, или большое, глубокое. Первое происходитъ отъ стѣсненія груди и легкихъ при вдыханіи, худымъ устройствомъ реберъ и хрящей, мышцъ грудныхъ и брюшныхъ, пополненіемъ грудной полости воздухомъ, водою, брюха пищею, жидкостію, приращеніемъ легкихъ къ подреберной плевѣ, наполненіемъ легкихъ излившеюся кровью, слизью, гноемъ, пасокою. Дыханіе глубокое замѣчается при кровяномъ ударѣ (пострѣлѣ), горячечномъ бредѣ, безчувствіи; дыханіе совсѣмъ

останавливается при великой слабости (въ обморокахъ), судорогахъ, воспаленіи и ранахъ легкихъ.

Дыханіе бываетъ боковое, верхнее или грудное, и нижнее или брюшное. Боковое дыханіе происходитъ только въ одной сторонѣ груди — въ здоровой, другая же сторона груди остается неподвижною; верхнее или грудное дыханіе производится верхними грудными, а нижнее или брюшное нижними грудными и брюшными мышцами. Верхнее дыханіе замѣчается при болѣзняхъ въ брюхѣ, а нижнее при грудныхъ болѣзняхъ. Всѣ сіи три вида дыханія очень опасны.

Дыханіе бываетъ скорое и медленное; при скоромъ дыханіи воздухъ входитъ и выходитъ чаще, нежели въ здоровомъ состояніи; оно замѣчается при горячкахъ и воспаленіяхъ, и зависитъ отъ быстраго прохожденія крови чрезъ легкія; противное происходитъ при медленномъ дыханіи, и, какъ послѣднее бываетъ вмѣстѣ и глубокимъ, такъ первое короткимъ.

Далѣе, дыханіе бываетъ трудное, происходящее съ напряженіемъ силъ; оно имѣетъ различныя степени; въ высшей его степени больной имѣетъ удушье, тоску, страхъ задушенія, дышетъ со свистомъ, храпѣніемъ, только въ прямомъ, сидячемъ положеніи, даже на-время совсѣмъ перестаетъ дышать; при немъ грудныя мышцы находятся въ явномъ усиленномъ напряженіи, а ребра какъ бы отдѣльно движутся. Причины труднаго дыханія бываютъ различны: горячіе пары, удушливые, ядовитые газы, нечистый, сырой, рѣдкій, гористый воздухъ, затрудняютъ дыханіе и у здоровыхъ людей. У больныхъ дыханіе затрудняется накопленіемъ слизи, опухолями и наростами въ полостяхъ рта, носа, въ дыхательномъ горлѣ, легкихъ, опухолями на шеѣ, въ груди, нарывахъ, изліяніемъ крови, гноя, сыворотки въ грудной полости, расширеніемъ главной артеріи и сердца, при завалахъ печени, брюшной водяной болѣзни, при воспаленіи грудныхъ и брюшныхъ органовъ, при худомъ устройствѣ груди и проч.

Кромѣ сказаннаго, признаки или измѣненія дыханія еще



суть : кашель, чиханіе, икота, смѣхъ, плачь, зѣвота и воздыханіе. Кашель есть судорожное, сильное выдыханіе, и зависитъ отъ раздраженія или воспаленія въ дыхательномъ горлѣ или легкихъ, которыхъ почти все болѣзни сопровождаются кашлемъ; онъ то же для легкихъ, что рвота для желудка. При кашлѣ легкія снизу и съ боковъ стѣсняются мышцами, сами сжимаются и такъ извергаютъ скопившуюся въ нихъ слизь, гной, излившуюся кровь, попавшую въ легкія пыль, вредные газы, испортившійся воздухъ. Кашель рѣдкій и небольшой ускоряетъ проходъ крови въ легкихъ и даже во всемъ тѣлѣ, но частый, сильный и продолжительный кашель ослабляетъ, даже разрываетъ дыхательные органы, мѣшаетъ правильному дыханію, кровотоку (не давая времени веназной крови въ легкихъ превратиться надлежаще въ артеріальную и скоро прогоняя ее къ сердцу), а отъ сего происходитъ накопленіе крови въ венахъ, давленіе на сердце, кровотеченіе; отъ напряженія грудобрюшной преграды и брюшныхъ мышцъ при кашлѣ, ускоряются въ брюхѣ разныя отдѣленія соковъ и кровообращеніе, происходитъ рвота, выпаденіе матки, прямой кишки, грыжи, выкидышъ, расширеніе сосудовъ.

Чиханіе производится также сильнымъ сжатіемъ легкихъ и вдыхательныхъ мышцъ, и съ шумомъ, стремительно выгоняетъ вдохнутый воздухъ; оно зависитъ отъ раздраженія въ носу и, подобно кашлю, можетъ быть полезно и вредно. Чиханіе въ острыхъ болѣзняхъ, особенно дыхательнаго горла и легкихъ, происходитъ подъ конецъ болѣзни и означаетъ ея рѣшеніе (переломъ) умноженнымъ отдѣленіемъ слизи.

Икота состоитъ въ судорожномъ вдыханіи чрезъ сжатую щель гортани; она зависитъ отъ раздраженія въ брюхѣ, и бываетъ при разстройствѣ пищеваренія, у ипохондриковъ, истеричекъ, при помертвѣніи брюшныхъ внутренностей; она происходитъ также послѣ испитія холодной воды, у маленькихъ дѣтей, когда они озябнутъ и проч.

Вздыханіе, вздохъ, есть глубокое, медленное вдыханіе, за которымъ слѣдуетъ подобное же выдыханіе, часто съ



шумомъ, то и другое при закрытомъ ртѣ; оно означаетъ медленное, затруднительное кровообращеніе въ легкихъ и происходитъ отъ печали, усталости и при разныхъ грудныхъ болѣзняхъ.

Болѣзненный смѣхъ производится судорожнымъ движеніемъ дыхательныхъ и личныхъ мышцъ, но безъ веселаго расположенія въ духѣ; онъ замѣчается въ истерикѣ, пляскѣ Св. Витта, умопомѣшательствахъ. Сильный и продолжительный смѣхъ вредитъ дыханію и кровообращенію.

Болѣзненный плачъ происходитъ отъ горестнаго состоянія духа и страданія тѣла, и замѣчается въ нервныхъ болѣзняхъ, особенно въ истерикѣ.

Зѣвота есть медленное, глубокое вдыханіе чрезъ открытый ротъ и такое же выдыханіе; у здоровыхъ она происходитъ отъ усталости, скуки, отъ взгляда на зѣвающихъ (ибо зѣвота, смѣхъ, плачъ, кашель и вздохъ сообщаются отъ одного лица другому); въ болѣзняхъ зѣвота появляется въ началѣ и въ концѣ лихорадокъ, судорогъ, и зависитъ отъ воспященнаго дѣйствія нервовъ, для возбужденія котораго усиливается дыханіе и кровообращеніе зѣвотою и потяготою; послѣдняя состоитъ въ напряженіи всѣхъ расправляющихъ мышцъ и въ вытяженіи всего тѣла.

Трудное, неправильное дыханіе сопровождается еще задышкою, пискомъ, хрипѣніемъ и храпѣніемъ. Задышка замѣчается при скоромъ дыханіи, когда выдыхаемый воздухъ съ трудомъ, съ пискомъ протискивается чрезъ узкую щель гортани или чрезъ сжатый носовой проходъ. Хрипѣніе зависитъ отъ скопленія жидкости въ дыхательномъ горлѣ или легкихъ, подвижной выдыхаемымъ воздухомъ; оно означаетъ высокую слабость и скорую смерть больного. Храпѣніе состоитъ въ глубокомъ вдыханіи и большомъ выдыханіи, причѣмъ ротъ бываетъ открытъ, а нѣбная занавѣска опущена; оно замѣчается въ болѣзненной сонливости, кровавомъ пострѣлѣ, падучей болѣзни.

Выдыхаемый воздухъ бываетъ или слишкомъ холоденъ или очень тепелъ. Холодный воздухъ означаетъ слабость легкихъ и самого больного, и есть худой, предсмерт-



ный признакъ, а горячій — показываетъ усиленное дѣйствіе легкихъ и замѣчается въ горячкахъ, лихорадкахъ и воспаленияхъ. Непріятный запахъ выдыхаемаго воздуха происходитъ отъ язвъ, нагноенія въ дыхательныхъ органахъ, отъ порчи пищеварительныхъ соковъ, отъ цынги въ тѣлѣ, испорченныхъ зубовъ.

При кашлѣ или харканіи извергается изъ легкихъ слизь, творожная, гноевидная матерія, гной, сукровица, кровь, камешки. Слизь, по различію въ ея количествѣ, густотѣ цвѣтѣ, запаху и вкусу — означаетъ различное, болѣзненное состояніе слизистой оболочки гортани, дыхательнаго горла и легкихъ; гной показываетъ въ нихъ же нарывъ, а сукровица — язву. Свѣтлоокрасная, жидкая, чистая и пѣнящаяся кровь, извергаемая кашлемъ, показываетъ, что она сейчасъ вытекла изъ кровяныхъ сосудовъ легкихъ, а густая, темная кровь, наичаще смѣшанная со слизью, означаетъ, что она, по вытеченіи изъ сосудовъ, оставалась еще долго въ легкихъ или горлѣ. При золотушномъ отвердѣніи легкихъ (въ бугорковатой чахоткѣ) и окостенѣніи легочныхъ или сердечныхъ сосудовъ, съ мокротою извергаются сырные комочки или каменные, костовидные кусочки.

Наконецъ, состояніе грудной полости, легкихъ и сердца можно узнать еще по звуку, при удареніи пальцами по ребрамъ снаружи: громкій, ясный, пустой звукъ показываетъ, что грудная полость, легкія и сердце здоровы; но звукъ тихій, неясный, глухой означаетъ, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ бываетъ слышенъ, грудная полость наполнена водою, легкія сжаты, засорены слизью.

§ 19. Голосъ и рѣчь измѣняются въ болѣзняхъ различно: слабый и тихій голосъ бываетъ въ опасныхъ горячкахъ, при трудномъ дыханіи, у выздоравливающихъ послѣ грудныхъ болѣзней. При раздраженіи, судорогъ и воспаленіи въ дыхательномъ горлѣ и гортани, когда мышцы, подъемающія гортань, дѣйствуютъ сильно, происходитъ голосъ высокой, а низкій — при тѣхъ же болѣзняхъ, но когда мышцы, оттягивающія гортань книзу и расширяющія гортанную щель, дѣйствуютъ сильнѣе другихъ. Хрипкій го-



лость происходитъ отъ припухлости, сухости и слабости гортанныхъ связокъ и перепонки гортани. При судорожномъ кашлѣ (коклюшѣ) перепончатой жабѣ, отъ стремительнаго вдыханія чрезъ сжатую судорогами гортанную щель, происходитъ особенный, визгливый, пискливый голосъ, похожій на лай щепка, крикъ пѣтуха. Гн усивый голосъ замѣчается при измѣненіи частей во рту и въ носу, отъ любо-страстной, золотушной болѣзни.

Измѣненіе рѣчи происходитъ почти отъ тѣхъ же причинъ, которыя измѣняютъ и голосъ: отъ общей слабости, судорогъ, воспаленія, бездѣйствія мышцъ, отъ поврежденія частей рта и носа опухольями, наростами, язвами.

Безгласіе и нѣмота зависятъ отъ опѣмнѣнія, судорогъ, поврежденія легкихъ, гортани, языка. Медленная, тихая рѣчь бываетъ при трудномъ дыханіи, воспященномъ движеніи органовъ рѣчи, при уныніи духа; но скорая, громкая, порывистая рѣчь — при судорогахъ органовъ рѣчи, при горячечномъ бредѣ, при помѣшательствѣ ума и проч.

§ 20. Болѣзненные припадки кровообращенія бываютъ весьма различны; они относятся къ общему кровообращенію во всемъ тѣлѣ, или въ нѣкоторыхъ только частяхъ, либо къ неправильному устройству хранилищъ крови. Общее неправильное кровообращеніе состоитъ въ волненіи крови, или въ остановленіи ея теченія. Волненіе крови состоитъ въ расширеніи массы крови и въ скорѣйшемъ ея теченіи, причемъ происходитъ большая теплота, жизненная полнота и краснота въ наружныхъ частяхъ тѣла. Волненіе крови производитъ: внѣшній жаръ, электрическое состояніе воздуха (лѣтомъ предъ грозю), спиртные напитки, сильно дѣйствующія страсти, особенно гнѣвъ, радость; оно проходитъ скоро; но когда продолжается долго, то переходитъ въ лихорадку или горячку.

Остановка кровообращенія бываетъ въ различной степени и оказывается обморокомъ и обмираніемъ. Въ легкомъ обморокѣ, то есть въ началѣ останавливающагося кровообращенія, замѣчается слабое дыханіе и такой же пульсъ, блѣдность кожи, особенно лица, слабая теплота въ



тѣлѣ, и даже охладѣніе рукъ и ногъ, круженіе головы, звонъ въ ушахъ, слабость въ движеніи. Въ настоящемъ обморокѣ, при большомъ остановленіи кровообращенія, дыханіе и пульсъ бываютъ едва примѣтны, все тѣло блѣднѣетъ и охладѣваетъ, дѣйствіе чувствъ и произвольное движеніе прекращаются. Въ обмираніи или мнимой смерти всѣ дѣйствія совершенно останавливаются и живое тѣло нельзя отличить отъ мертваго. Кровообращеніе останавливается отъ сильнаго наружнаго холода, потери крови, испорченнаго воздуха, удушливыхъ газовъ, ядовъ, отъ чрезмѣрнаго напряженія тѣла, отъ угнетающихъ страстей (испуга, страха), отъ воспященнаго дыханія, зажатіемъ рта и носа и давленіемъ дыхательнаго горла (см. Виды обмиранія).

Кровь, не останавливаясь въ своемъ теченіи, можетъ накопляться въ одномъ мѣстѣ и застаиваться. При накопленіи (приливѣ) крови въ какомъ-либо органѣ, его кровеносные сосуды наполняются и растягиваются излишнею кровью. Мѣстное накопленіе или приливъ крови къ какому-либо органу происходитъ или отъ раздраженія въ немъ, привлекающаго кровь въ большомъ количествѣ, или отъ слабости его сосудовъ, которые не могутъ достаточно сжаться и прогонять далѣе приливающуюся къ нимъ кровь; то и другое можетъ быть при общемъ волненіи крови, при обморокахъ и обмираніи.

Съ накопленіемъ крови увеличивается объѣмъ, полнота и краснота, питаніе и отдѣленіе въ мѣстѣ ея накопленія, а при сильномъ и быстромъ накопленіи — происходитъ воспаленіе, кровотеченіе. При медленномъ, но продолжительномъ накопленіи крови, органъ, въ которомъ происходитъ оно, затрудняется, замедляется и разстроивается въ своемъ дѣйствіи, дѣлается больше, тверже, измѣняется въ своемъ устройствѣ, кровь въ немъ застаивается, просачивается сквозь стѣнки сосудовъ въ кѣлѣчатку, и такъ происходитъ завалъ, отвердѣніе, которое наичаще замѣчается въ печени, потомъ въ селезенкѣ, легкихъ и проч., самое же накопленіе крови часто происходитъ въ сихъ же органахъ, а еще чаще въ мозгу.



§ 21. Припадки частнаго неправильнаго кровообращенія замѣчаются въ сердцѣ, артеріяхъ и венахъ. Сильное біеніе сердца примѣтно для самого больного и посторонняго человѣка; оно происходитъ отъ крови, приливающей къ сердцу въ большомъ количествѣ, слишкомъ разжиженной, раздражающей, отъ раздражительности сердца, отъ сильныхъ душевныхъ возмущеній, слабости всего тѣла, также отъ поврежденія самаго сердца, воспаленнаго прохода крови въ большихъ сосудахъ, въ легкихъ, брюшныхъ органахъ.

Неправильное кровообращеніе въ артеріяхъ оказывается пульсомъ или біеніемъ большихъ артерій. Пульсъ бываетъ различенъ по его силѣ, величинѣ, продолженію и отношенію одного удара къ другому. Для опредѣленія пульса избираются артеріи, съ одной стороны проходящія сейчасъ подъ кожею, а съ другой прилегающія къ кости; таковы артеріи суть: лучевая, на нижнемъ концѣ передняго плеча снаружи противъ большаго пальца, и височная, пролегающая поперечно чрезъ високъ отъ середины наружнаго уха ко лбу. Для опредѣленія пульса, на артерію накладывается конецъ указательнаго пальца, которымъ она слегка прижимается. Это изученіе пульса чрезъ прижатіе артерій пальцемъ требуетъ много упражненія, времени и навыка.

Относительно силы, пульсъ бываетъ крѣпкій и слабый, твердый и мягкій. Пульсъ крѣпкій означаетъ сильнымъ біеніемъ артерій и явственною ея упругостію при осязаніи; онъ происходитъ отъ чрезмѣрнаго сжатія сердца и сильнаго напора крови на стѣнки артерій. Слабый пульсъ, противоположный крѣпкому, происходитъ и отъ противныхъ причинъ; впрочемъ, слабый пульсъ бываетъ и при крѣпости сердца и артерій, которыхъ однако дѣятельность подавляется различными препятствіями, какъ то, напр. воспаленіемъ легкихъ и кишекъ. Твердый пульсъ есть тотъ, когда артерія, при расширеніи, осязается какъ крѣпко натянутая струна; онъ съ трудомъ сжимается пальцемъ и означаетъ густоту крови, а еще болѣе сильное сжиманіе и крѣпость оболочекъ артерій. Мягкій пульсъ есть тотъ, когда артерія



на осязаніе чувствуется какъ мягкая, упругая студень; онъ легко сжимается пальцемъ, означаетъ жидкую кровь и слабость артерій. Крѣпкій пульсъ бываетъ вмѣстѣ и твердымъ; оба означаютъ крѣпость силъ больного и показываютъ необходимость кровопусканія; а слабый часто бываетъ и мягкій, и также оба выражаютъ слабость больного и вредъ кровопусканія.

Пульсъ, относительно его объятности, бываетъ большой и малый, полный и пустой. Большой пульсъ означаетъ обширнымъ расширеніемъ и тѣснымъ сжатіемъ артерій; онъ происходитъ при полнокровіи и сильномъ дѣйствіи артерій; малый пульсъ противоположенъ большому, зависитъ отъ недостатка крови и слабости артерій. При полномъ пульсѣ бьющаяся артерія, сильно растянутая, чувствуется какъ полная, мягкая трубка, а при пустомъ пульсѣ, въ слабо расширенной артеріи, протекающая кровь едва чувствуется подъ пальцемъ. Полный пульсъ бываетъ вмѣстѣ твердый и крѣпкій, пустой — слабый и мягкій; первые три означаютъ силу, крѣпость, энергію, полнокровіе, воспаленіе и горячку вначалѣ; а три послѣдніе выражаютъ слабость, изнеможеніе, безсиліе, недостатокъ крови, воспаленіе и горячку въ ихъ срединѣ и окончаніи.

По продолженію, пульсъ бываетъ частый и рѣдкій, или скорый и медленный. Частый или скорый пульсъ есть тотъ, когда артерія въ извѣстное время (напр. въ минуту) ударяетъ гораздо болѣе разъ, чѣмъ въ натуральномъ состояніи, а рѣдкій или медленный, когда біеніе артерій бываетъ рѣже натурального. Скорый или частый пульсъ означаетъ раздраженіе въ самой крови, или ея сосудахъ и усиленное кровообращеніе, и замѣчается вообще въ острыхъ болѣзняхъ — горячкахъ, лихорадкахъ, воспаленіяхъ, сыпяхъ; а медленный или рѣдкій зависитъ отъ угнетенія или безсилія въ сердцахъ, кровяныхъ сосудахъ, и случается особенно въ кровяномъ пострѣльѣ, у выздоравливающихъ послѣ тяжкихъ болѣзней.

По сравненію однихъ удареній съ другими, пульсъ бываетъ ровный и неровный; въ ровномъ пульсѣ всѣ ударе-



нія бываютъ одинаковы по ихъ силѣ, скорости, продолженію, а въ неровномъ пульсѣ одни ударенія сильнѣе, больше и скорѣе, а другія — слабѣе, меньше и медленнѣе. Неровный пульсъ бываетъ перемежающійся, когда, послѣ нѣсколькихъ удареній, біеніе артерій останавливается на нѣкоторое время (на  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  секунды); этотъ пульсъ происходитъ когда сердце, послѣ нѣсколькихъ біеній, остается долѣе сжатымъ или расширеннымъ, и замѣчается при великой слабости сердца и кровяныхъ сосудовъ, какъ бы отдыхающихъ послѣ сжатія, при расширеніи, — при судорогахъ, расширеніи сердца и большихъ сосудовъ, окостенѣніи сосудовъ, накопленіи воды въ грудной полости и въ оболочкѣ сердца, въ кровяномъ пострѣлѣ. Неровный, двойной пульсъ есть, когда за двумя удареніями слѣдуетъ перемежка; онъ показываетъ сильную, но воспящаемую, несвободную дѣятельность сердца.

Въ венахъ кровь такъ же обращается неправильно, какъ и въ артеріяхъ; это оказывается въ шейныхъ венахъ біеніемъ, означающимъ трудный проходъ крови чрезъ сердце и легкія; подобное же біеніе происходитъ и въ верхней полости венъ и причиняетъ разные тягостные припадки. Кровь въ венахъ, особенно на ногахъ, иногда скопляется, застаивается и производитъ язвы, расширенія венъ.

§ 22. Припадки болѣзненнаго отдѣленія бываютъ весьма разнообразны. Слизь, отдѣляясь въ носу, легкихъ, кишкахъ и проч. въ большомъ или маломъ количествѣ, бываетъ густая, жидкая, соленая, острая, и причиняетъ зудъ, чиханіе, кашель, жженіе въ проходѣ, рѣзь при испражненіи мочи; густая слизь пристаётъ къ оболочкамъ, притупляетъ ихъ дѣйствіе. При измѣненіи слизи, измѣняются и слизистыя оболочки, дѣлаясь красными, блѣдными, слабкими, рыхлыми, плотными, покрываясь сыпью, наращеніями, масляными сосочками.

Жиръ, отдѣляясь въ большомъ количествѣ при хорошемъ питаніи, дѣлаетъ тѣло тучнымъ, препятствуетъ дѣйствию органовъ, располагаетъ къ водяной болѣзни. Недостатокъ жира зависить отъ худаго питанія, отъ потери крови, соковъ; а какъ жиръ защищаетъ тѣло отъ холода, жара, вѣтровъ, то



худой человекъ легче занемогаетъ простудою, ревматизмомъ и проч.

Сывороточный паръ, отдѣляясь въ большомъ количествѣ, сгущается въ капли и производитъ водяныя опухоли, водяную болѣзнь, отекъ; скопившаяся сыворотка въ свою очередь густѣетъ, расширяетъ кожу, полосты, портится, дѣлается острою и причиняетъ рожу, воспаленіе кожи, язвы и проч. Подобно же измѣняется сліна, желудочный сокъ.

Болѣзненное отдѣленіе желчи причиняетъ горькій вкусъ во рту, желтую слізъ на корнѣ языка, тоску, тошноту, желчную рвоту, боль и полноту подъ ложечкою, боль въ кишкахъ, желчный поносъ. Отдѣленіе желчи разстраивается наичаще лѣтомъ, когда жаркіе дни смѣняются сырыми и холодными ночами, отъ частаго употребленія мясной пищи, спиртныхъ напитковъ, также отъ поврежденій ушибовъ головы.

Блѣдный, сырой, бѣлый калъ означаетъ малую примѣсь къ нему желчи. Иногда желчь совсѣмъ не отдѣляется печенью, а составныя части разносятся по всему тѣлу, сообщаютъ ему желтый и даже темный цвѣтъ (желтуха). Желчь измѣняется въ своемъ качествѣ и дѣлается то жидководянистою, то густо-масляною, острою, бѣлою, темною, черною, травяною — зеленою; также желчь сгущается, превращается въ стеаринъ, осаждающійся въ желчные камни, которые причиняютъ разные опасные припадки.

§ 23. Припадки испарины состоятъ въ измѣненіи самой испарины и теплоты, цвѣта, поверхности кожи. Уменьшеніе или остановленіе испарины оказывается сухостию, морщиноватостию кожи; оно причиняетъ простуду, ревматизмъ, поносъ. Умноженная испарина производитъ потъ равномерный по всему тѣлу, теплый, пріятный, очень часто составляетъ переломъ болѣзни; но продолжительный и чрезмѣрный потъ лишаетъ тѣло жидкой сыворотки, уноситъ изъ тѣла теплоту и ослабляетъ; изнурительный потъ въ чихоткѣ, гнилой горячкѣ бываетъ клейкій, вонючій, красить бѣлье.

Умноженная теплота кожи бываетъ вначалѣ во всѣхъ горячкахъ, воспаленіяхъ, особенно въ красухѣ (скар-



латинь), оспѣ, кори; въ желчныхъ гнилыхъ горячкахъ теплота кожи врачу на ошупь кажется жгучею. Уменьшеніе теплоты и охлажденіе тѣла означаетъ его слабость и замѣчается при обморокѣ, при несчастномъ исходѣ болѣзней.

Цвѣтъ кожи различный и у здоровыхъ людей, по ихъ племенамъ, климату, роду жизни, устройству тѣла, еще болѣе измѣняется въ болѣзняхъ: красная кожа показываетъ наполненіе ея сосудовъ (артерій) красною кровью; голубоватая кожа показываетъ накопленіе крови въ венахъ и затруднительное теченіе крови къ сердцу; блѣдная кожа показываетъ недостатокъ въ ней вовсе крови; желтая или зеленоватая, темная кожа, есть припадокъ желтухи; нечистая, грязная, земляно-желтая кожа, особенно въ лицѣ, означаетъ разстройство пищеваренія, завалы внутренностей, испорченные соки (худосочіе).

Поверхность кожи въ ознобъ перемежающихся лихорадокъ бываетъ шершавая (гусиная кожа), въ сыпяхъ она покрывается пятнами простыми и кровавыми, прыщами, струпьями, пузырьками, тонкою шелухою. Упругая, плотная, сочная, теплая кожа показываетъ крѣпость, а дряблая, слабая кожа, въ которой сдѣланная впадина выполняется нескоро, означаетъ слабость больного.

Волосы измѣняются въ цвѣтъ, рашеніи и составѣ: при слабости кожи, волосы блѣднѣютъ и сѣдѣютъ, высыхаютъ въ корешкахъ и выпадаютъ; или же они вырастаютъ у женщинъ на бородѣ и грудяхъ. Въ польскомъ кошту цѣ волосы дѣлаются толсты, сочны, отдѣляютъ липкую матерію, которая ихъ сбиваетъ въ комки.

§ 24. Припадки испражненія мочи и явленія въ самой мочѣ бываютъ различны. Моча испражняется, но съ трудомъ, по причинѣ слабости мышечныхъ волоконъ или раздраженія мочевого пузыря, отъ судороги въ его шейкѣ, воспаленія, опухоли, мочевыхъ камней, нароста, суженія въ мочевомъ каналѣ, густоты мочи, смѣшанной со слизью, кровью, гноемъ, пескомъ. Моча совсѣмъ не испражняется, потому что она не отдѣлена въ почкахъ, или не протекаетъ



чрезъ мочеточники, не вытекаетъ изъ мочевого пузыря, не можетъ протекать чрезъ мочевой каналъ. Причины труднаго испражненія мочи и совсѣмъ задерживаютъ ее. При недержаніи мочи, мочевой пузырь или ее еще удерживаетъ, но только въ маломъ количествѣ, или же она непрерывно истекаетъ по каплямъ; оно происходитъ отъ стуженія и раздраженія мочевого пузыря, паралича, растяженія его шейки, отъ язвы, опухоли пузыря и проч.

Моча испражняется въ большемъ количествѣ, несоизмѣрномъ принятому питью; при уменьшенной или остановленной испаринѣ, при сырой атмосферѣ происходитъ умноженное отдѣленіе мочи, съ которою также испражняется накопившаяся жидкость при водяной болѣзни. Умноженное отдѣленіе и испражненіе мочи, соединенное съ разстройствомъ пищеваренія, называется мочеистощеніемъ, при которомъ испражняемая моча бываетъ мутная, густая, содержитъ много сахара, скоро приходитъ въ броженіе и гніеніе.

Моча отдѣляется и испражняется въ маломъ количествѣ при внутреннемъ жарѣ, въ горячкахъ, воспаленіяхъ, при обильномъ потѣ, при судорогахъ и разныхъ болѣзняхъ почекъ, мочевыхъ пузыря и канала.

Моча измѣняется качественно по ея составу, цвѣту, запаху, вкусу и осадку.

Жидкая, блѣдная, свѣтлая, водянистая моча происходитъ отъ употребленія въ большемъ количествѣ водяныхъ напитковъ, въ лихорадкѣ во время озноба отъ остановленной испарины, въ разныхъ судорогахъ; такая моча содержитъ много воды и солей, и мало собственныхъ мочевыхъ веществъ. Ярко-красная, непрозрачная, жгучая моча испражняется въ острыхъ болѣзняхъ, горячкахъ, воспаленіяхъ, кори, оспѣ и проч. Моча дѣлается густою, мутною, разноцвѣтною отъ множества въ ней собственныхъ составныхъ частей, или отъ примѣси крови, слизи, гноя, желчи. Мутная, густая какъ масло, темная моча, смѣшанная какъ бы съ мелкимъ порошкомъ и подобная мочѣ рогаатаго скота, бываетъ при изнуреніи тѣла, разстройствѣ пищеваренія, питанія.



Млечно-бѣлая, мутная моча бываетъ при разстройствѣ пищеваренія, при умноженномъ отдѣленіи слизи, при глистахъ, золотухѣ, водяной и каменной болѣзни, ломотѣ, почечуѣ. Мутная, желто-шафранная или темно-желтая моча содержитъ въ себѣ желчныя частицы и показываетъ воспященное отдѣленіе желчи. Моча, тѣсно смѣшанная съ кровью, выходитъ такою изъ почекъ, а кровь, прилившаяся къ мочѣ въ мочевомъ пузырьѣ или каналѣ, легко различается въ мочѣ и осѣдаетъ на дно сосуда. Весьма темная, даже черная моча бываетъ въ гнилой горячкѣ, въ высшей степени цынги, при помертвѣніи.

Особенный запахъ мочи происходитъ часто отъ пищи, питья, лекарствъ: спаржи, фіалки, скипидара, бальзама. Сильный, непріятный запахъ мочи въ болѣзняхъ происходитъ отъ содержанія въ ней въ большомъ количествѣ животныхъ веществъ; смрадная, вонючая моча зависитъ отъ гноя, или отъ гніенія, а сладко-приторный, молочный запахъ мочи показываетъ въ ней сахарное вещество.

Моча, выпущенная и охлажденная въ прозрачномъ сосудѣ, отдѣляетъ разныя вещества, показывающія различное свойство и періоды болѣзней: поверхность мочи покрывается особымъ отстоемъ, какъ молоко, и называется мочевыми сливками; окружность поверхности мочи обводится кружкомъ — мочевымъ вѣнцомъ; отстой мочи, плавающей между ея поверхностію и дномъ сосуда, называется облачкомъ; матерія, отдѣлившаяся изъ мочи и осѣвшаяся на днѣ сосуда, есть мочевоу осадокъ. Мочевыя сливки состоятъ изъ тонкой пленочки, играющей разными цвѣтами, или представляющей въ видѣ масляныхъ капель; пленка и капли показываются въ мочѣ при изнурительныхъ болѣзняхъ. Облачко въ мочѣ означаетъ, что болѣзнь еще не созрѣла къ перелому; въ началѣ болѣзни оно плаваетъ на поверхности мочи, но по мѣрѣ продолженія болѣзни, облачко опускается ниже ко дну сосуда и наконецъ садится на его дно, показывая близкое окончаніе болѣзни.

Осадокъ въ мочѣ имѣетъ различное значеніе: облачко состоитъ почти изъ слизи, а солей содержитъ очень мало;



но осадокъ показываетъ, что въ мочѣ находится много солей, которыя, при охлажденіи мочи, не могутъ въ ней растворяться и осѣдаютъ на дно. Легкій, бѣловатый желтоватый или красноватый осадокъ, въ довольномъ количествѣ и при свѣтлой мочѣ, въ лихорадкахъ и горячкахъ показываетъ ихъ хорошее окончаніе. Осадокъ кирпичнаго цвѣта, какъ бы кирпичный порошокъ, появляется по окончаніи пруступовъ въ перемежающихся лихорадкахъ (гдѣ онъ составляетъ отличительный признакъ для распознаванія скрытной, опасной лихорадки) и въ ревматизмѣ. Слизистый осадокъ въ мочѣ означаетъ несовершенное пищевареніе и питаніе, страданіе слизистыхъ оболочекъ, желудка, кишекъ, мочевого пузыря. Гноевидная моча означаетъ воспаленіе, нагноеніе, язвы въ мочевыхъ органахъ. Мужское сѣмя плаваетъ сначала на поверхности мочи въ видѣ клочковъ, а потомъ понемногу осѣдаетъ на дно сосуда; изъ темно-желтой и кровавой мочи отдѣляется и темно-желтый осадокъ и осаждается ссѣвшаяся кровь. Песчаный осадокъ въ мочѣ, кромѣ каменной болѣзни, бываетъ при почечуѣ, ломотѣ (подагрѣ), разстройствѣ пищеваренія.

Моча иногда содержитъ въ себѣ въ излишествѣ кислоты: щавельную, молочную, соляную, сѣрную, мочевую; такая моча, особенно содержащая много мочевой кислоты, при ломотѣ и каменной болѣзни, сильно раздражаетъ и понуждаетъ къ испусканію мочи и нерѣдко его затрудняетъ. Впрочемъ, кислая моча можетъ зависѣть отъ употребленія кислой пищи, питья. Въ другихъ случаяхъ моча изобилуетъ щелочами: амміакомъ, селитрою, известью, горькою землею; при гнилыхъ горячкахъ и помертвѣніи въ мочѣ находится много амміака, и такая моча издаетъ сильный запахъ нашатырнаго спирта и скоро приходитъ въ гнилость. Въ англійской болѣзни при мягкости костей, также въ золотухѣ и ломотѣ, въ мочѣ замѣчается большой осадокъ, состоящій изъ фосфоро-кислой извести. Въ водяной болѣзни моча такъ изобилуетъ бѣлкомъ, что послѣдній, при вскипяченіи мочи, створаживается.

Слизистый сахаръ въ мочѣ узнается по вкусу;



притомъ такая моча испражняется въ большомъ количествѣ противъ испитой жидкости, имѣетъ цвѣтъ соломенный, запахъ молочной сыворотки и сладкій вкусъ, а по испареніи мочи, въ ея осадкѣ находится сладкая матерія — слизистый сахаръ; такіе больные скоро чахнуть и умираютъ. О мочевыхъ камняхъ и пескѣ, равно о припадкахъ болѣзней мужескихъ и женскихъ дѣтородныхъ частей говорится при описаніи самыхъ болѣзней.

§ 25. Общее чувство нашего личнаго благосостоянія и здоровья самоощущеніе въ болѣзняхъ измѣняется различно; будучи стражемъ нашего здоровья, оно указываетъ на болѣзнь всего тѣла или нѣкоторыхъ его частей. Въ болѣзняхъ оно иногда утончается до того, что больной узнаетъ довольно точно мѣсто, степень, свойство своей болѣзни, чувствуетъ мѣру истощающейся въ немъ жизни и можетъ предсказать часъ своей смерти. Утонченное или раздраженное ощущеніе обнаруживается: болью, зудомъ, тоскою, безпокойствомъ, измѣненіемъ теплоты въ тѣлѣ и слабостію.

Боль есть тягостное, безпокойное, часто мучительное чувство, зависящее отъ раздраженія какихъ-либо нервовъ; по чувству, боль бываетъ жгучая, колючая, рѣжущая, бьющая, стрѣляющая, раздражающая, сверлящая, тяготѣющая, давящая, стягивающая, напрягающая, грызущая, кусающая и проч. Всѣ сіи виды боли, по ихъ послѣдствію, бываютъ полезны и вредны. Сильная боль, раздражая нервы, мышцы и сосуды, причиняетъ судороги, воспаленіе, безпокойство, бессонницу, тоску, отчаяніе, бредъ, обмороки, безпамятство, изнуреніе силъ, онѣмѣніе членовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, боль бываетъ спасительна тѣмъ, что возбуждаетъ въ тѣлѣ новую дѣятельность къ преодолѣнію болѣзни, дѣлаетъ больного осторожнымъ и принуждаетъ его завременно искать врачебной помощи. По прекращеніи жестокой боли, наслажденіе здоровьемъ бываетъ очень пріятно. Наичаще боль бываетъ припадкомъ воспаления и приливовъ крови.

Зудъ есть тягостное чувство, состоящее изъ легкой боли и щекотанія; онъ происходитъ отъ легкаго раздраженія нервовъ,



возбуждаетъ непроизвольное стремленіе чесать зудящее мѣсто, также чиханіе, кашель, позывъ на-пизъ, измѣненіе сѣмени. **Тоска** есть безпокойное чувство, зависящее отъ несвободнаго дыханія, кровообращенія, отдѣленія жидкостей, выхожденія сыпей. Въ высшей степени и продолжительная тоска причиняетъ бессонницу, уныніе, судороги, сумасшествіе, побужденіе къ безпрестанной перемѣнѣ положенія тѣла. Тоска часто происходитъ отъ излишней чувствительности и нетерпѣнія больного, но часто она означаетъ опасность болѣзни и скорую смерть.

**Ощущеніе измѣненной теплоты** зависитъ или отъ дѣйствительнаго ея умноженія (жара), или уменьшенія (холода) въ тѣлѣ, или же отъ измѣненія чувства, безъ перемѣны въ самой теплотѣ. Теплота уменьшается и чувство озноба происходитъ въ началѣ простуды, горячки, въ приступѣ перемежающейся лихорадки; теплота увеличивается и появляется чувство жара въ продолженіе сихъ же болѣзней. Чувство холода или жара, безъ дѣйствительнаго измѣненія теплоты въ тѣлѣ, замѣчается въ нервныхъ болѣзняхъ и истерикъ, ипохондріи.

**Чувство слабости** бываетъ или при дѣйствительномъ изнеможеніи силъ (въ продолженіе тяжкихъ болѣзней), или при несвободномъ ихъ дѣйствіи (въ началѣ горячекъ, воспаленій и проч.); иногда больной, номѣшанъ на слабости, и не будучи вовсе слабъ, не хочетъ поднять руки, ноги, встать съ постели, полагая, что онъ этого не въ силахъ сдѣлать, или, напротивъ, больной, точно слабый, чувствуетъ въ себѣ мнимую силу или крѣпость и почитаетъ себя здоровымъ.

**Безчувствіе и безболѣ** означаютъ бездѣйствіе, уменьшеніе общаго чувствованія; оба они очень опасны: показываютъ крайнюю слабость, большое препятствіе дѣйствію мозга и нервовъ; разстроенное воображеніе, и замѣчаются въ кровяномъ пострѣлѣ, параличѣ, умонемѣтельности, въ горячкахъ, оцѣневѣніи, глубокомъ обморокѣ.

**О припадкахъ другихъ чувствъ** (зрѣнія, слуха и проч.) мы не упоминаемъ, потому что эти припадки или незначитель-

ны, или же составляют цѣлыя болѣзни (слѣпота, глухота), о которыхъ говорится въ другомъ мѣстѣ.

§ 26. Припадки умственныхъ способностей — разума и воли, выражаются дѣйствіями и рѣчью больного. Воображеніе, слишкомъ возвышенное въ болѣзняхъ, бываетъ причиною, что такіе больные показываютъ необыкновенную силу памяти, понятія, сужденія: въ музыкѣ, словесности, живописи. Но если воображеніе возвышается до того, что произведенія его фантазіи больной почитаетъ дѣйствительными предметами, которые онъ видитъ, слышитъ, осязаетъ, то разумъ больного приходитъ въ помѣшательство, а воля его въ заблужденіе.

Возвышенное воображеніе происходитъ отъ глубокихъ, продолжительныхъ размышленій, сильныхъ душевныхъ возмущеній и страстей, прилива крови къ мозгу. Дѣти золотушныя, большыя чахотныя, страждущіе изнуреніемъ тѣла, также отличаются нерѣдко высокими способностями воображенія, памяти, сужденія.

При упадкѣ воображенія предметы и понятія представляются больному темно, неясно и медленно (безпамятство, слабоуміе). Воображеніе упадаетъ отъ продолжительныхъ напряженій духа, угнетающихъ страстей, также оно подавляется врожденною слабостію и разстройствомъ мозга, отъ болѣзней, слишкомъ тучнымъ тѣлосложеніемъ.

Разстройство ума оказывается глупостію, слабоуміемъ и безуміемъ, — а воли — меланхоліею и бѣшенствомъ. Глупость состоитъ въ ограниченности разума, оказывается неправильнымъ сужденіемъ и заключеніемъ, зависитъ отъ слабаго воображенія и недостаточнаго понятія — есть слѣдствіе недостаточнаго образованія и развитія самаго мозга, а потому и бываетъ врожденная.

Слабоуміе есть ограниченность и даже неспособность къ сужденію: глупецъ опрометчивъ, а слабоумецъ медленъ въ сужденіи, и даже вовсе не способенъ къ размышленію, а смотритъ на вещи и не понимаетъ ихъ. Слабоуміе происходитъ отъ врожденно-уродливаго устройства тѣла, недостатка нравственнаго образованія, слабости и болѣзни мозга, дави-



мага наростами и костяными опухолями, излившеюся кровію, сывороткою, отъ порчи самаго мозга и истомленія мозга сильнѣйшими страстями, напряженіями ума, предшедшимъ еѹмасшествіемъ, судорогами, жестокими болями, пьянствомъ, отъ пребыванія въ сырыхъ жилихъ, низменныхъ, болотистыхъ долинахъ, между горъ (кретины).

Безуміе есть заблужденіе разума, безъ значительнаго его разстройства, произведенное сильнымъ напряженіемъ воображенія; оно есть какъ бы сповидѣніе на-яву, греза при бдѣніи. Безумецъ произведенія своей фантазіи считаетъ дѣйствительными предметами, и потому судить и поступаетъ превратно.

Меланхолія есть помѣшательство разума съ тихимъ душевнымъ страданіемъ, произведенное сильнымъ впечатлѣніемъ на воображеніе. Меланхоликъ занятъ исключительно предметомъ своей печали, а на все прочее не обращаетъ вниманія. Манія, бѣшенство есть также помѣшательство разума, съ сильнымъ чувствованіемъ и превратною волею. Она происходитъ также отъ обманчивыхъ представлений и чувствованій, приводящихъ къ ложнымъ сужденіямъ и заключеніямъ, которыми возмущаясь, разумъ и воля дѣйствуютъ превратно и неистово. Припадки маніи показываютъ сильное напряженіе въ мозгу; пылкій, раздражительный темпераментъ (холерики), сильная чувствительность (сангвиники), сильный жаръ, солнечный зной, пьянство, одуряющіе яды (опій, бѣлена, дурманъ и проч.), водоболзнь, буйныя страсти, напряженное размышленіе, ночныя бдѣнія, бессонница, глисты, воспаленіе и вообще всякое раздраженіе мозга переносятъ на него подагры, ревматизма, почечуя, мѣсячныхъ кровей, молока — у женщинъ; причиняютъ манію или бѣшенство.

§ 27. Припадки сна бываютъ различны. Бессонница зависитъ отъ какого-либо раздраженія въ мозгу или во всемъ тѣлѣ; она очень тягостна и сама по себѣ, и увеличиваетъ опасность той болѣзни, въ которой она появляется какъ припадокъ. Снобдѣніе, хожденіе во снѣ происходитъ отъ того, что нѣкоторые чувства (зрѣніе, слухъ) спятъ, а другія



вмѣстѣ съ органами движенія бодрствуютъ; оно есть въ высшей степени сновидѣніе, въ которомъ спящій также судитъ и какъ будто дѣйствуетъ согласно представляющимся ему во снѣ грезамъ. Собственно сонъ измѣняется въ болѣзняхъ различно: то больной спитъ, но безпрестанно пробуждается отъ болей, судорогъ и проч. (дремота); то онъ спитъ глубокимъ сномъ, отъ котораго будучи пробужденъ, опять сейчасъ засыпаетъ; то больного вовсе нельзя пробудить отъ сна (смертный сонъ). Всѣ эти сны означаютъ слабость въ мозгу и происходятъ послѣ продолжительнаго бдѣнія и чрезмѣрнаго напряженія мозга умственными занятіями, отъ прилива крови къ головѣ, изліянія крови, гноя, жидкости въ черепъ.

§ 28. Всякая болѣзнь занимаетъ въ тѣлѣ извѣстное мѣсто и продолжается определенное время. Болѣзнь занимаетъ часть тѣла (мѣстная болѣзнь — рана, опухоль и проч.), или и все тѣло (общая болѣзнь — горячка); мѣстная болѣзнь можетъ сдѣлаться общою — ядовитая рана, язва можетъ причинить въ послѣдствіи общую злобострастную болѣзнь, злобоболѣзнь. Болѣзнь бываетъ первоначальная (горячки, воспаленіе), и послѣдственная (манія, меланхолія отъ страданія брюшныхъ внутренней, падучая болѣзнь отъ глѣзъ). Далѣе, болѣзнь поражаетъ одно лицо (частная болѣзнь), или разомъ многихъ людей (появляющаяся, общая болѣзнь). Частная болѣзнь происходитъ отъ частныхъ, особенныхъ причинъ (отъ простуды, ушиба, объяденія и проч.), подѣйствовавшихъ на одно заболѣвшее лицо; но общая болѣзнь зависитъ отъ причинъ, дѣйствующихъ разомъ на цѣлыя семейства, общества людей. Общія болѣзни бываютъ мѣстныя и появляющіяся; эндемическія и эпидемическія мѣстныя болѣзни зависятъ отъ мѣстности страны — сырой, болотистой, жаркой, холодной; такъ перемежающіяся лихорадки замѣчаются въ болотистыхъ, цынга — въ приморскихъ странахъ, коштувъ въ Польшѣ, желтая лихорадка въ Америкѣ и проч.; въ жаркихъ странахъ льютъ свирѣпствуютъ желчныя горячки, поносы, а въ холодныхъ и зимою — воспаленіе и простуда. Появляющіяся болѣзни поражаютъ



также многихъ людей, но зависятъ не отъ мѣстности страны, а отъ житейскихъ обстоятельствъ — неурожая, войны и отъ неизвѣстныхъ переменъ въ воздухѣ, и потому онѣ иногда обходятъ цѣлыя части свѣта (холера, гриппъ-простуда, заразительная горячка).

§ 29. Относительно времени, болѣзнь бываетъ наследственная, сообщаемая дѣтямъ родителями, первоначальная (рана, переломъ кости), послѣдственная, развивающаяся изъ первоначальной (костобѣда отъ язвы, нарывъ, помертвѣніе и язва послѣ воспаления). Всякая болѣзнь проходитъ извѣстное время, состоящее изъ двухъ разныхъ половинъ: въ первой половинѣ сего времени она усиливается, возрастаетъ, а во второй ослабѣваетъ, уменьшается. Первая половина болѣзни обозначается тремя періодами: предвѣстіемъ, приращеніемъ, высшею степенью болѣзни и ея переломомъ. Предвѣстіе болѣзни рѣдко обозначается явственно, а чаще болѣзнь начинается непримѣтно (завалы внутренностей, водяная), или безъ предвѣстія, происходитъ вдругъ (воспаленія, падучая и проч.). Приращеніе болѣзни означаетъ разнообразіемъ и силою ея припадковъ, которые, возрастая въ жестокости и обширности, достигаютъ наконецъ высшей степени своего развитія, и въ это время происходитъ рѣшеніе, переломъ болѣзни, которая послѣ сего начинаетъ уменьшаться, причемъ ея припадки ослабѣваютъ въ силѣ и умаляются въ обширности, а больное тѣло приходитъ въ свое натуральное положеніе — возвращаетъ здоровье. Жестокія болѣзни могутъ умертвить больного (пострѣлъ, воспаление мозга, горла); а легкія болѣзни могутъ быть прерваны искусствомъ и натурою прежде, нежели тѣ и другія достигнутъ высшей степени своего развитія (простуда, ревматизмъ, горячка).

Болѣзни имѣютъ непрерывное или прерывистое теченіе; въ непрерывномъ теченіи болѣзни, ея припадки продолжаются до конца, возрастая въ силѣ и обширности, до высшей степени, гдѣ они оканчиваются вдругъ смертію, или выздоравливаніемъ. Въ прерывистомъ теченіи, болѣзнь или совсѣмъ, или на-время прекращается, перемежается, или



она только послабляетъ, ослабѣваетъ въ припадкахъ (послабленіе), которое потомъ опять возвращается съ новою силою (ожесточеніе). При возрастаніи болѣзни, каждое ея послѣдующее ожесточеніе бываетъ сильнѣе предъидущаго, а при умаленіи — послабленіе бываетъ все продолжительнѣе; ожесточеніе болѣзни наичаше начинается ввечеру, а послабленіе — къ утру.

Въ перемежающейся болѣзни, ея припадки на известное время совсѣмъ прекращаются, а потомъ опять появляются въ томъ же видѣ; появленіе припадковъ здѣсь называется приступомъ, параксизмомъ, а ихъ прекращеніе — перемежкой. Приступъ и перемежка появляются правильно, въ определенное время, или же они наступаютъ въ неопределенное время — то раньше, то позже, и продолжаются то короче, то долѣе; самые приступы появляются ежедневно, чрезъ 1 — 2 — 3 — 4 дни, чрезъ недѣлю, мѣсяцъ, годъ, и потому и перемежающаяся болѣзнь называется ежедневною, трехдневною, семидневною и проч. Такія болѣзни бываютъ наичаше лихорадки, которыя изъ перемежающихся часто дѣлаются послабляющими, и это означаетъ усиленіе лихорадки; но если она изъ послабляющей дѣлается перемежающеюся, то это знакъ послабленія лихорадки.

Болѣзни продолжаются различное время, и потому ихъ раздѣляютъ на острые, скоротечныя и продолжительныя, медленныя, хроническія; первыя могутъ продолжаться отъ 3 до 40 дней, а послѣднія — цѣлые мѣсяцы и годы. Это различное продолженіе болѣзни зависитъ отъ ея натуры, степени, причины, мѣстопробыванія въ тѣлѣ, леченія, содержанія больнаго и проч. Вообще горячки, лихорадки, воспаления, судороги, острые сыпи, обмороки, пострѣлъ, помертвѣніе — проходятъ скоро; но завалы внутренностей, язва, водяная, любострастная, цыготная, золотушная, каменная и вообще всѣ болѣзни, зависящія отъ порчи соковъ и поврежденія плотныхъ частей, проходятъ очень медленно.

Болѣзнь оканчивается выздоравливаніемъ, новымъ возвращеніемъ, переходомъ въ другую болѣзнь, смертію. Измѣненіе болѣзни производится ея рѣ-



шеніемъ, переломомъ, который, по различію исхода болѣзни, бываетъ хорошій и худой. Явный, совершенный переломъ есть, когда болѣзнь рѣшается разомъ, или скрытый, несовершенный, когда переломъ болѣзни приходитъ послѣ многихъ усилій больного тѣла къ уничтоженію болѣзни. Рѣшеніе, переломъ болѣзни производится цѣлительною силою больного тѣла, при пособіи которой выздоравливаютъ, безъ помощи искусства, милліоны больныхъ людей и животныхъ.

Такъ-какъ всякая болѣзнь состоитъ въ измѣненіи различныхъ дѣйствій и частей тѣла, то предъ хорошимъ рѣшеніемъ болѣзни, дѣйствія тѣла возбуждаются, и болѣзнь какъ бы усиливается, но не надолго; послѣ такого мнимого ожесточенія болѣзни, больной скоро успокаивается и появляются разныя рѣшительныя, переломныя, критическія испражненія, съ которыми извергаются иногда причина и произведеніе болѣзни: кровь, слизь, вредная пища, желчь, глисты; но гораздо чаще эти испражненія выводятъ изъ тѣла разные соки, испортившіеся во время болѣзни.

Критическія испражненія суть: проливной, теплый потъ, обильный, вонючій поносъ, кровотеченіе изъ носа и низомъ, густая, мутная моча съ осадкомъ, густая харкотина, рвота, нарывы и сыпи на кожѣ. Настоящія критическія испражненія должны имѣть слѣдующія качества: 1) появленію ихъ предшествуетъ ожесточеніе болѣзни въ ея срединѣ, а самыя испражненія вообще оказываются подъ конецъ седьмого дня; 2) онѣ происходятъ въ достаточномъ количествѣ; испражняемые вещества имѣютъ болѣзненное качество (ненатуральный составъ, цвѣтъ, запахъ, количество); 3) болѣзнь послѣ испражнений ослабѣваетъ, и больной явно поправляется. Всѣ другія испражненія, появляющіяся въ теченіе болѣзни, называются припадочными.

Дни болѣзни 7-й, 14, 21, 28, въ которые наичаще оказываются критическія испражненія, называются критическими днями; дни средніе между ними, а именно 4, 11, 17, 24

называются показателями, потому что въ эти дни замѣчается измѣненіе хода болѣзни.

Съ уничтоженіемъ болѣзни, ея рѣшеніемъ, переломомъ, больной не вдругъ, но постепенно получаетъ прежнія свои силы и здоровье; этотъ періодъ болѣзни называется выздоровленіемъ.

Послѣ несовершеннаго, худаго рѣшенія, болѣзнь не прекращается, или же скоро опять возвращается, либо оставляетъ послѣ себя другую болѣзнь. Возвращеніе той же болѣзни наичаще зависитъ отъ неосторожности больного во время выздоровленія — простуды, обѣденія и проч., но переходъ одной, первоначальной болѣзни въ другую, послѣдственную, заключается въ натурѣ самой болѣзни или ея леченія: такъ воспаленіе переходитъ въ нагноеніе, желчная горячка въ гнилую, перемежная лихорадка — въ завалы брюшныя и водяную, и проч. Переносъ есть тотъ же переходъ одной болѣзни въ другую, которая притомъ перемѣняетъ свое мѣсто и форму; такъ иногда останавливается отдѣленіе молока въ груди, которое бросается на мозгъ и причиняетъ его воспаленіе, умопомѣшательство съ бѣшенствомъ, или же жидкость, подобная молоку, испражняется съ мочою, каломъ, извергается съ харкотиною; такъ скоро излеченныя: чесотки, лишай, бросаются на легкія и причиняютъ чахотку, водянку въ груди; скарлатина, подагра скрываются съ наружныхъ частей тѣла и производятъ, первая — пострѣлъ, а вторая — воспаленіе желудка. Переносъ болѣзни, смотря по слѣдствію, бываетъ хорошій и худой: хорошій переносъ есть тотъ, когда опасная болѣзнь и съ важной внутренности переносится на части наружныя, напр. воспаленіе мозга переходитъ на лице въ видъ рожи, завалы внутренностей, водянка проходятъ съ появленіемъ сыпей на тѣлѣ, язвъ на ногахъ, почечуйнаго кровотеченія изъ задняго прохода. Худой переносъ называется, когда неважная наружная болѣзнь переносится на внутренніе важные органы: подагра на желудокъ, личная рожа на мозгъ, почечуй на легкія и проч.

Болѣзнь оканчивается смертію отъ истощенія жизненныхъ силъ въ тѣлѣ, разрушенія тѣлеснаго состава, или отъ



воспаленнаго дѣйствія благороднаго органа — мозга, легкихъ, сердца. При смерти обыкновенно прежде умираютъ мозгъ и нервы, потомъ сердце, кровяные сосуды и легкія, и наконецъ желудокъ, кишки, клетчатая плева. Впрочемъ, случается, что кровяные сосуды уже перестали дѣйствовать, но дѣйствіе первовъ еще продолжается.

### III. Причины болѣзней.

§ 30. Тѣ же явленія, которыя суть необходимыя условія нашей жизни и здоровья нашего тѣла, при извѣстныхъ условіяхъ дѣлаются причинами его болѣзней. Причины болѣзней или заключаются въ самомъ нашемъ тѣлѣ, или же содержатся внѣ его — во внѣшнемъ мірѣ; перваго рода причины называются расположеніемъ къ болѣзнямъ, а послѣднія болѣзнетворными, вредоносными вліяніями.

§ 31. Человѣкъ, по особенноти устройства своего тѣла, составляющаго его личность, расположенъ къ болѣзнямъ (общее расположеніе); но сверхъ того, нѣкоторые люди имѣютъ особенное расположеніе къ болѣзнямъ, зависящее отъ собственнаго состоянія ихъ жизни и организаціи.

§ 32. Расположеніе къ болѣзнямъ, общее всемъ людямъ, зависитъ отъ нѣжности, совершенства и сложности нашего тѣла. Особенное расположеніе къ болѣзнямъ зависитъ отъ врожденнаго устройства тѣла каждаго человѣка, возраста, темперамента, тѣлосложенія, рода жизни, предшедшихъ болѣзней.

§ 33. Жизнь нашего тѣла, состоящая въ его развитіи, образованіи и въ увяданіи и разрушеніи, имѣетъ два большіе періода образованія и разрушенія, состоящіе изъ возрастовъ: дѣтскаго, отроческаго, юношескаго, мужескаго и старческаго.

Въ тѣлѣ новорожденнаго младенца происходятъ важныя перемѣны: начинается дыханіе въ легкихъ, питаніе чрезъ желудокъ и кишки, дѣйствія внѣшнихъ чувствъ (зрѣнія, слуха), измѣняется кровообращеніе, тѣло новорожденнаго по-



вергается вліянію свѣта, воздуха, различію теплоты. Отъ всѣхъ сихъ перемѣнъ новорожденные подвергаются множеству болѣзней, которыя въ первый годъ ихъ жизни причиняютъ самую значительную смертность.

Въ первые два года у младенцевъ находятся въ дѣйствіи мозгъ, желудокъ съ кишками и питаніе тѣла, и они-то наичае подвергаются болѣзнямъ: разстройству пищеваренія, кислотъ въ желудкѣ, накопленію слизи въ кишкахъ, поносу, рѣзи въ животѣ, молочной сыпи, сухоткѣ, мягкости костей, водянкѣ въ мозгу; далѣе, въ семъ возрастѣ появляются болѣзни слизистыхъ перепонокъ, желѣзъ, кожи, золотуха, перепончатая жаба, судорожный кашель, разныя сыпи. Въ первой половинѣ отроческаго возраста продолжаютъ дѣтскія, а во второй юнѣшескія болѣзни, которыя особенно гнѣздятся въ груди, въ дѣтородныхъ органахъ и въ мозгу, и суть: кашель, кровохарканіе, воспаленіе легкихъ, сильное біеніе сердца, помѣшательство ума, судороги. Мужескій возрастъ, въ которомъ тѣло достигаетъ высшаго своего развитія и крѣпости, наименѣе подверженъ болѣзнямъ, гнѣздящимся у мужчинъ въ брюхѣ — желтухѣ, заваламъ внутренностей, почечую, ломоть. Въ старческомъ возрастѣ, при упадкѣ душевныхъ и тѣлесныхъ силъ, появляются пострѣлъ, параличъ, удушье, затвердѣнія, водянка, окостенѣніе сосудовъ, помертвѣніе частей. О расположеніи къ болѣзнямъ, зависящимъ отъ пола, темперамента, тѣлосложенія, образа жизни, занятій, привычки и проч. сказано въ разныхъ мѣстахъ «Сохраненія здоровья».

§ 34. Болѣзнетворныя вліянія или внѣшнія, случайныя причины болѣзни суть тѣ же стихіи и вещества, которыя необходимы для нашей жизни: свѣтъ, воздухъ, теплота, пища, питье, климаты, времена года, разныя минеральныя, растительныя и животныя вещества и составы, и разныя дѣйствія нашего тѣла: страсти, движеніе, сонъ, бдѣніе, бездѣйствіе. Всѣ они дѣлаются причинами болѣзней своимъ излишествомъ, недостаткомъ или измѣненіемъ, внутреннею порчею (воздухъ, пища, вода); при-



чинная болѣзнь, они дѣйствуютъ тѣми же путями, которыми поддерживаютъ и здоровье нашего тѣла : чрезъ ротъ, желудокъ и кишки, а отсюда на соки и кровь (пища, питье, лекарства, яды и проч.), чрезъ гортань на легкія и кровь (воздухъ, разные газы, пыль); чрезъ кожу (воздухъ, вода, теплота, холодъ, яды); отверстіе мочевыхъ и дѣтородныхъ органовъ, чрезъ органы чувствъ : глаза (свѣтъ, разные видимые предметы), уши (звукъ, голосъ, рѣчь, сырость), носъ (разныя испаренія, летучія, пахучія вещества, сырость). Механическія причины могутъ дѣйствовать на всѣ части тѣла и причинять ушибы, раны, переломы, вывихи и проч.

§ 35. Солнечный свѣтъ есть настоящій источникъ жизни, которая отъ него зараждается, имъ сохраняется, и безъ него коснѣетъ, прекращается. Растенія и животныя возбуждаются и укрѣпляются свѣтомъ, безъ котораго первыя блѣднѣютъ, вянутъ, а послѣднія чахнутъ и умираютъ. Свѣтъ оживляетъ, возбуждаетъ, веселитъ и укрѣпляетъ человѣка, который, будучи долго лишенъ свѣта (невольники въ тюрьмахъ) дѣлается вялымъ, слабымъ, унылымъ, робкимъ, тупоумнымъ, спитъ, худѣетъ и чахнетъ. Яркій, продолжительно дѣйствующій свѣтъ слишкомъ возбуждаетъ зрѣніе, истомляетъ нервы, раздражаетъ мозгъ до воспаления (солнечный пострѣлъ). Объ электричествѣ, теплотѣ и холодѣ, въ ихъ разныхъ видахъ и степеняхъ, о разныхъ состояніяхъ воздуха и газахъ, временахъ года, мѣстности жительства, климатахъ, пищѣ, питьѣ, какъ условіяхъ здоровья и причинахъ болѣзни, было сказано въ отдѣлѣ «О сохраненіи здоровья», гдѣ также упомянуто о ядахъ и отравленіяхъ, о пользѣ и вредѣ разныхъ видовъ движенія, одежды, жилищъ, объ упражненіи наружныхъ и внутреннихъ чувствъ, умственныхъ способностей, страстей, бдѣніи, снѣ, злоупотребленіи похоти и проч.

Всѣ эти вліянія условно дѣлаются причинами болѣзни, т. е. когда они дѣйствуютъ на насъ въ большомъ количествѣ, съ особенною силою или продолжительно (свѣтъ, теплота, пища, питье и проч.), или когда мы въ нихъ терпимъ



ощутительный недостатокъ (теплота, голодъ, жажда, бездѣйствіе и проч.), или, наконецъ, когда они бываютъ испорчены, внутренно измѣнены (воздухъ, налитанный разными испареніями, газами, испорченная пища, гнилая вода и проч.). Но есть болѣзнетворныя причины, которыя всегда и вездѣ причиняютъ болѣзни, которыхъ, такъ сказать, самое назначеніе есть причинять намъ болѣзни, эти причины суть такъ называемыя повѣтрія и заразы.

Повѣтрія содержатся въ воздухѣ и развиваются, при извѣстной степени теплоты и вліяніи воздуха, изъ земли, воды, отъ гніенія разныхъ растений, животныхъ; такъ заставляя насъ думать то главное обстоятельство, что болѣзни, происходящія отъ повѣтрій, появляются весною и въ томъ, и въ началѣ осени, когда земля и вода, согреваемая солнечною теплотою, находятся въ полной силѣ ихъ дѣйствія, и когда изъ нихъ происходятъ разные испаренія, восходящія въ воздухъ; но болѣзни, причиняемыя повѣтріями, прекращаются въ концѣ осени и зимою, когда земля и вода, замерзшія отъ холода, покрываются ледяною корою и перестаютъ дѣйствовать. Такимъ образомъ въ теплое время отъ повѣтрій происходятъ разные перемежающіяся лихорадки, простые и кровавые поносы, холера, гриппъ (простуда, обнаруживающаяся насморкомъ и кашлемъ, influenza). Повѣтренныя болѣзни или постоянно свирѣпствуютъ въ теплыхъ странахъ, въ низменныхъ, болотистыхъ, черноземныхъ, глинистыхъ мѣстахъ, благопріятствующихъ развитію и отдѣленію изъ земли и воды въ воздухъ разныхъ испареній, обнаруживаются особенно часто ночью и къ утру, когда эти испаренія не разлагаются солнечнымъ свѣтомъ, не поднимаются кверху, а скопляются въ нижнихъ, приземныхъ слояхъ воздуха; или же они временно появляются, при стеченіи въ точности неизвѣстныхъ намъ условій, въ какомъ-либо мѣстѣ, и отсюда въ воздухъ распространяются далѣе, проходя обширныя пространства и поражая повально огромное число людей; такъ холера, возникшая въ Индіи, обошла почти всю землю, а гриппъ, начавшійся въ Сибири, постигъ всю Европу.



Зараза есть другой зародышъ, сѣмя болѣзней; она отличается отъ повѣтрія тѣмъ, что зараждается въ животномъ тѣлѣ, отъ котораго сообщается другому здоровому животному, производя въ немъ такую же болѣзнь, какая произвела ее самую; точно такъ, какъ сѣмя производитъ такое же растение и животное, изъ какого оно произошло само. Зараза производитъ собственную болѣзнь или чрезъ непосредственное прикосновеніе здороваго челоуѣка съ больнымъ, либо съ зараженными вещами или чрезъ воздухъ; по крайней мѣрѣ при свирѣпствованіи нѣкоторыхъ заразительныхъ болѣзней; послѣднія появляются у людей здоровыхъ, неимѣвшихъ никакого сообщенія съ больными (напр. оспа, скарлатина). Заразительная болѣзнь, происшедшая отъ заразы въ теченіи своемъ развиваетъ такую же заразу, которая, при стеченіи неизвѣстныхъ намъ условій, развивается и первоначально. Зараза, какъ произведеніе больнаго тѣла животного, состоитъ изъ животной матеріи — слизи, мокроты, испаринъ, сообщающейся другому здоровому животному. Многія заразы, повидимому, требуютъ извѣстнаго къ нимъ расположенія, зависящаго наиболѣе отъ возраста и происходящаго вмѣстѣ съ послѣднимъ; такъ оспа, корь, красуха, коклюшъ и проч. свойственны дѣтскому и юношескому возрасту, и посѣтивъ разъ больнаго, рѣдко къ нему возвращаются, кромѣ прививной оспы, послѣ которой иногда приходитъ ложная или вѣтряная оспа. Обнаженные отъ кожи (раны, язвы) мѣста, также тонкокожія мѣста (губы, вѣки, дѣтородныя части) легче воспринимаетъ заразу, чѣмъ покрытая толстою кожею (ладонь, подошвы, голова, спина); одни заразы, испаряясь въ воздухъ, переносятся чрезъ извѣстное разстояніе отъ больныхъ къ здоровымъ, и такія заразы называются летучими (оспенная, корьная, красушная, коклюшная зараза); другія заразы заключаются въ сгущенной животной матеріи (саинъ, слизи), пристають только къ твердымъ тѣламъ, и сообщаютъ болѣзнь только чрезъ непосредственное сообщеніе зараженнаго тѣла или вещи съ здоровымъ животнымъ; такія заразы называются постоянными и суть: чумная, любо-

страстная, чесоточная, водобоязненная зараза. Высокая степень теплоты, сильная стужа, продолжительное дѣйствіе воздуха, минеральныя кислоты, въ жидкомъ и газообразномъ видѣ, истребляютъ почти всѣ извѣстныя заразы.

Всѣ заразы входятъ въ наше тѣло чрезъ ротъ, носъ, мочевою каналъ, кожу, раны, легкія, проникаютъ въ соки и кровь, производятъ раздраженіе и возбуждаютъ горячку, которая или во все свое теченіе бываетъ воспалительная, или же только вначалѣ, а потомъ дѣлается нервною или гнилою; но зараза любострастная, чесоточная не возбуждаютъ никакой горячки. Почти каждая зараза избираетъ особенныя части и ткани: любострастная—дѣтородныя части, железы, горло, носъ и кости; скарлатина—горло, мозговую, грудную оболочки; корь—слизистую перепонку гортани и легкихъ; оспа—вообще кожу и клѣтчатую плеву; чумная—железы, клѣтчатую плеву; водобоязненная—шейные и брюшныя нервы; всѣ же онѣ, кромѣ последней, производятъ разнаго рода сыпи на тѣлѣ, а иногда и на внутренней слизистой перепонкѣ дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

Изъ вышесказаннаго явствуютъ виды заразы, которые суть: оспенная, корьная, скарлатинная, коклюшная, чумная, водобоязненная, любострастная, чесоточная; первыя четыре заразы, какъ летучія, дѣйствуютъ безъ прикосновенія чрезъ воздухъ, зависятъ отъ особеннаго повальнаго состоянія атмосферы, поражаютъ дѣтей, юношей и вообще людей, у которыхъ онѣ еще не были, и которыхъ, выдержавъ разъ такую заразительную болѣзнь, теряютъ уже воспримчивость къ ней и болѣе не заражаются. Эти заразы въ началѣ своего повальнаго появленія бываютъ слабы, какъ по числу больныхъ, такъ и по степени болѣзни, въ срединѣ эпидеміи усиливаются въ томъ и другомъ отношеніи, а подѣ конецъ опять ослабѣваютъ и наконецъ совсѣмъ прекращаются. Последнія четыре заразы сообщаются здоровымъ людямъ чрезъ прикосновеніе ихъ къ больнымъ людямъ или зараженнымъ вещамъ; человекъ, разъ ихъ перенесшій, не теряетъ



восприимчивости къ нимъ въ послѣдствіи и можетъ заражаться неоднократно.

### Распознаніе болѣзни.

§ 36. Приобрѣвъ понятіе о болѣзни, узнавъ ея припадки и причины, надобно узнать, опредѣлить и самую болѣзнь. Распознаніе болѣзни есть самая трудная часть медицины; всѣ ошибки въ леченіи, всѣ противорѣчающія мнѣнія врачей о свойствѣ болѣзней, которымъ, въ данныхъ случаяхъ, подвержены такіе-то люди, происходятъ отъ ошибочнаго распознаванія болѣзни, которое въ головѣ врача поражаетъ и ошибочное понятіе о свойствѣ болѣзни, а потому и леченіе, основанное на ошибочномъ понятіи, непременно должно быть также ошибочное. Безъ обстоятельнаго распознаванія, самое наблюденіе бываетъ не вѣрно какъ надъ болѣзнію, такъ и надъ ея леченіемъ, и потому ведетъ къ ложному заключенію на счетъ пользы или вреда употребленнаго лекарства.

Распознаніе бываетъ двоякое: общее, занимающееся опредѣленіемъ болѣзни вообще, не касаясь ея видовъ, и частное, имѣющее цѣлю узнать каждую болѣзнь въ особенности. Здѣсь мы будемъ говорить о распознаваніи болѣзни вообще, не касаясь распознаванія ея видовъ въ особенности. Успѣшное распознаваніе болѣзни вообще зависитъ: 1) отъ надлежащаго изслѣдованія и опредѣленія ея припадковъ, 2) отъ извѣстныхъ способностей распознавателя (врача) и больного, 3) отъ способа изслѣдованія и разспроса больного, 4) отъ препятствій, дѣлающихъ распознаваніе труднымъ и невѣрнымъ.

§ 37. Надлежащее изслѣдованіе и опредѣленіе болѣзни зависитъ отъ вѣрнаго обсужденія ея припадковъ и признаковъ. Способъ начатія болѣзни, если только она началась естественными припадками, ея ходъ или теченіе, и образъ, типъ сего теченія, степень, продолжительность, причины, дѣйствіе уже употребленныхъ противъ болѣзни лекарствъ, многого способствуютъ распознаванію болѣзни, напр. если болѣзнь

вдругъ началась ознобомъ, за которымъ вскоре появился жаръ, сухость во рту, жажда, боль головы въ известной степени, если всѣ сии припадки продолжались 3, 8, 12 часовъ, окончились общимъ теплымъ потомъ и мочею съ осадкомъ, послѣ чего исчезли всѣ припадки болѣзни, которая произошла притомъ послѣ явнаго вліянія на больного холода, сырости, тумана, дождя; если всѣ сии припадки опять возобновляются по прошествіи 1—2 дней, уменьшаются послѣ рвоты, употребленія больнымъ нашатыря, хины, хинной соли, то съ вѣроятностію можно заключить, что больной одержимъ лихорадкою и притомъ перемежающеюся. Если притомъ во время приступа появляются жестокая головная боль, колотье, рвота желчью, тоска, бредъ, безчувствіе, судороги, или сотрясательный ознобъ, палій жаръ, проливной потъ, то слѣдуетъ заключить, что перемежающаяся лихорадка очень жестока и опасна.

Долговременныя наблюденія надъ больными; познаніе дѣйствій нашего тѣла въ его здоровомъ и изученіе припадковъ въ болѣзненномъ состояніи, суть источники легкаго и вѣрнаго распознаванія болѣзни, которое для врачей еще облегчается повѣркою, — вскрытіемъ и изслѣдованіемъ труповъ умершихъ больныхъ.

Распознавательные признаки и припадки имѣютъ различную степень важности въ распознаваніи: одна изъ нихъ свойственны многимъ болѣзнямъ (жаръ, жажда, скорый пульсъ — всѣмъ лихорадкамъ, горячкамъ, воспаленіямъ) и называются общими; другіе появляются только въ известныхъ болѣзняхъ и притомъ въ то время, когда сами болѣзни достигнутъ известной степени; послѣдніе признаки называются отличительными, потому-что они явственно и вѣрно означаютъ болѣзнь, напр. отвращеніе отъ воды въ водобоязни, скрипѣніе и подвижность по срединѣ длинной кости при ея переломѣ, краснота и опухоль при воспаленіи и проч. Но самыя явственныя припадки, не всегда бываютъ и отличительныя: больной жалуется на жгучій жаръ, неустойчивую жажду, жестокою болью головы, чрезвычайную слабость, и не смотря на то, отличительный припадокъ его болѣзни можетъ



состоять въ едва примѣтной боли, чувствуемой имъ около реберъ, прижатіи брюха, въ сухомъ, непрерывномъ кашлѣ, кровавой харкотинѣ, какъ припадкахъ воспаленія въ груди, брюхѣ. По этому, кромѣ явныхъ припадковъ, непременно нужно обстоятельно разспросить всякаго больного и внимательно изслѣдовать весь его органы и ихъ дѣйствія и все обстоятельства болѣзни, и изъ сравненія ихъ между собою выводить заключеніе о родѣ, свойствѣ и степени болѣзни.

§ 38. Вѣрность распознаванія болѣзни много зависитъ отъ самого распознавателя (врача), который для сего, кромѣ знанія припадковъ болѣзни, долженъ пріобрѣсть и опытность частымъ, долговременнымъ наблюденіемъ надъ множествомъ больныхъ; онъ долженъ усвоить временемъ и стараніемъ навыкъ, привычку по взгляду на больного и чрезъ разспросы о его припадкахъ, распознавать и самую его болѣзнь. Что эту привычку, навыкъ, механизмъ можно пріобрѣсть у постели больныхъ, не бывъ настоящимъ врачомъ, а имѣя только здравый разумъ и нѣкоторую образованность, это можно видѣть надъ сидѣлками и хожатыми, которыя нерѣдко опредѣляютъ болѣзни не хуже врачей. Навыкъ—скоро и легко распознавать болѣзни, кромѣ продолжительнаго наблюденія надъ больными, много зависитъ отъ самой наблюдательной способности замѣчать, сличать и понимать явленія, отъ точности и вѣрности чувствъ, схватывающихъ весь малѣйшіе оттѣнки припадковъ болѣзни, отъ проникательности разсудка, который умѣетъ соединить сходныя, однородныя, и раздѣлить несходныя, разнородныя явленія, и соединяя въ своихъ предположеніяхъ смѣлость съ благоразуміемъ, по-видимому увлекается какъ бы вдохновеніемъ, быстро и скоро постигая главные припадки болѣзни.

§ 39. Неменьше и самъ больной облегчаетъ распознаваніе болѣзни. Прежде всего онъ долженъ понимать вопросы и отвѣчать на нихъ ясно: извѣстно, какъ трудно понять больного встревоженнаго, находящагося въ забывчивости, въ бреду, душевномъ разстройствѣ, малолѣтняго, говорящаго языкомъ непонятнымъ для насъ, больного, который, вмѣсто



простаго объясненія того, что онъ чувствуетъ, рассказываетъ только то, что онъ самъ признаетъ за причину своей болѣзни, или старается скрыть нѣкоторыя обстоятельства своей болѣзни (напр. любострастной), либо рассказываетъ о припадкахъ, которыхъ онъ вовсе не чувствуетъ, стараясь придать болѣе важности своей болѣзни; простолюдинъ, нѣмой, глухой, косноязычный также значительно затрудняютъ распознаваніе у нихъ болѣзней.

§ 40. Способъ, по которому надобно изслѣдовать и расспрашивать больного, весьма важенъ. Видя больного въ первый разъ, нужно окинуть его всего однимъ взглядомъ: если онъ на ногахъ, то его положеніе и походка прежде всего бросаются въ глаза распознавателя; но если больной находится въ постели, то нужно его раскрыть (буде это можно сдѣлать безъ нарушенія стыдливости и безъ вреда для больного), дабы точнѣе рассмотреть и обсудить снаружи его тѣло и крѣпость. Почти всегда съ перваго взгляда можно опредѣлить недавнею ли, или старою болѣзнію одержимъ больной, а иногда можно распознать, что къ старой, продолжительной, хронической болѣзни присоединилась новая, острая. Если, рассматривая больного днемъ, мы замѣчаемъ въ немъ красное лице, жаръ въ тѣлѣ, сухость во рту, жажду, скорый пульсъ, и сверхъ того разные припадки, свойственные острымъ болѣзнямъ, и притомъ находимъ похудѣніе, истощеніе тѣла, то можно заключить, что къ прежней хронической болѣзни присоединилась новая, острая.

Далѣе приступаемъ къ осмотру разныхъ частей тѣла; этотъ осмотръ можетъ доставить намъ много важныхъ знаковъ для распознаванія не только наружныхъ, но и внутреннихъ болѣзней, напр. цынги, различныхъ горячекъ, водяной, брюшныхъ заваловъ. Рубцы, пятна, опухоли, наросты, уродливое устройство или недостатокъ частей тѣла, въ сомнительныхъ случаяхъ также облегчаютъ распознаваніе болѣзни. Осматривая больного снаружи, распознаватель начинаетъ его расспрашивать: здѣсь нужно замѣтить, какъ надобно спрашивать больного, и въ какомъ порядкѣ предлагать ему вопросы.



Больного нужно спрашивать опредѣлительно и ясно, при сомнѣніи увѣриться, понялъ ли онъ смыслъ вопроса, изложить вопросъ другими, простыми словами, заставлять, чтобы самъ больной отвѣчалъ на весь вопросъ, который для него нужно составлять въ такомъ видѣ, чтобы отвѣтъ на него былъ коротокъ: да или нѣтъ. Больного нужно спрашивать въ извѣстномъ порядкѣ, иначе можно забыть спросить о нужномъ, и повторять то, о чемъ уже было спрошено; трудныхъ больныхъ нужно спрашивать только о томъ, на что они одни могутъ отвѣчать, т. е. припадки чувствъ зрѣнія, слуха, ощущенія, боль, холодъ и пр.; на другіе вопросы за больного могутъ отвѣчать его родные, знакомые.

Разспрашивать больного можно въ такомъ порядкѣ: сколько ему лѣтъ? чѣмъ занимается, гдѣ онъ живетъ? давно ли онъ заболѣлъ и какъ началась его болѣзнь? оставалась ли она безъ переменъ, или усиливалась и притомъ вдругъ или постепенно, тѣми ли же, что и нынѣ припадками она выражалась или другими, и притомъ какіе изъ прежнихъ припадковъ исчезли, и какіе вновь появились? непрерывно ли продолжалась болѣзнь, или иногда послабляла? когда были эти послабленія, въ какой степени, т. е. со всѣмъ ли припадками болѣзни прекращались и больной чувствовалъ себя нѣкоторое время здоровымъ, или же они только уменьшились въ силѣ и числѣ, но не оставляли совсѣмъ больного? отъ начала болѣзни сколько уже было такихъ послабленій или перемежекъ? во время ожесточенія болѣзни, больной долженъ ли былъ ложиться въ постель? сколько времени продолжалось ожесточеніе и послабленіе, приступъ и перемежка? Во многихъ случаяхъ порядокъ ожесточенія, приступа и послабленія перемежки вѣрнѣе опредѣляютъ болѣзнь, чѣмъ настоящіе ея припадки (перемежающаяся лихорадка, падучая болѣзнь, періодическій бредъ и проч).

Познакомившись разспрашиваніемъ больного съ его болѣзнію за прошедшее время, нужно обратить вниманіе на ея настоящіе припадки. Здѣсь прежде всего нужно узнать: не чувствуетъ ли больной боли? гдѣ именно? заставивъ его для того своего рукою показать, очертить мѣсто и



направленіе боли; какова эта боль: поверхностная, глубокая, постоянная, проходящая или періодическая? всегда ли она одинаково сильная, или же по временамъ послабляетъ, либо усиливается, и при какихъ условіяхъ? какъ чувствуется эта боль при давленіи ея мѣста рукою, усиливается, дѣлается нестерпимою (боль воспалительная), или же ослабѣваетъ, прекращается (боль нервная)? какъ она чувствуется — щемленіемъ, давленіемъ, рѣзью, стрѣльбою и проч., не сопровождается ли она притомъ чувствомъ жара, холода? ожесточаясь, не ослабляетъ ли она слишкомъ больного? стражающее мѣсто не измѣнилось ли въ цвѣтъ, видъ, объемъ? не сдѣлалось ли оно тверже, мягче, жарче обыкновеннаго? не замѣчается ли какого особеннаго біенія, шума, звона? все это можно узнать ошупываніемъ больного мѣста рукою, зрѣніемъ, слухомъ, разспросомъ.

Распознаваніе боли различается смотря потому, занимается ли она голову, грудь, брюхо. При боли въ головѣ, иногда нужно увѣриться въ цѣлости костей черепа, въ положеніи черепныхъ швовъ, головныхъ источниковъ, нѣтъ ли на головѣ опухолей, желваковъ, наростовъ, жара, красноты. Если болѣзнь находится въ груди, то нужно осмотрѣть форму груди, сравнить между собою обѣ ея стороны, ошупать ребра, лопатки, ключицы; если грудная болѣзнь застарѣлая (кашель, одышка, удушье, кровохарканіе), то, для распознаванія и совѣта, нужно пригласить врача, при недостаткѣ котораго состояніе грудной полости можно отчасти узнать тѣмъ, что, положивъ пальцы одной руки на грудь больного, если стучать по нимъ пальцами руки другой (ногтями) то, при здоровомъ, свободномъ состояніи грудной полости и ея внутренностей, звукъ бываетъ ясный, чистый, какъ отъ ударенія въ пустую бочку; но при накопленіи воды въ груди, при засореніи легкихъ, звукъ бываетъ глухой, тупой, какъ при удареніи въ полную бочку. Прикладывая пальцы къ разнымъ мѣстамъ груди и ударяя по онимъ пальцами другой руки, можно опредѣлить, какая именно часть легкихъ свободна, и какая непроходна для крови. Если одинъ конецъ деревянной или бумажной трубки поставить на грудь боль-



наго, а другой приложить къ своему уху, то можно замѣтить болѣзненное движеніе крови въ груди и жидкости, мокроты въ легкихъ. Впрочемъ, оба эти способа распознавать грудныя болѣзни требуютъ особеннаго навыка, ловкости приѣмовъ и вѣрности слуха.

Если боль чувствуется въ брюхѣ, то, для лучшаго изслѣдованія живота, больного нужно положить на спину, съ возвышенною головою, велѣть ему согнуть ноги въ коленныхъ, а бедра приблизить къ тазу и ослабить брюшныя мышцы (не нажиматься), и теперь осматривать брюхо — ошупывая его или же ударяя въ стѣны брюшныя всею ладонью. Ошупываніе брюха производится чрезъ тихое его прижатіе рукою, постепенно усиливаемое, или быстрое и мгновенное: если въ брюшной полости предполагается скопленіе жидкости, то, прижимая ладонью брюхо съ одной стороны, а по другой его сторонѣ ударяя плоско ладонью или пальцами, можно замѣтить въ брюхѣ зыбленіе жидкости, которая какъ бы волною ударяетъ въ ладонь другой руки. Удареніе по брюху производится ладонью, или концами одного или нѣсколькихъ пальцевъ; причемъ замѣчается также зыбленіе — при накопленіи воды въ брюхѣ, или ясный звукъ — при скопленіи вѣтровъ въ кишкахъ, газовъ въ брюхѣ. Ошупываніемъ брюха можно открыть, хотя и довольно трудно, въ его полости затвердѣлыя внутренности, опухоли, наросты, воду, твердый калъ.

Если боль находится во рту, въ зѣвѣ, въ носу, въ наружномъ слуховомъ проходѣ, въ заднемъ проходѣ, въ рукавѣ матки (предматочникѣ), то нужно сіи части изслѣдовать зрѣніемъ, осязаніемъ, при помощи разныхъ орудій — зеркальца, ложки, лопатки, зонда и проч., о чемъ подробнѣе говорится въ другихъ мѣстахъ; глазныя болѣзни распознаются также по ихъ припадкамъ разсматриваніемъ глазъ.

Изслѣдовавъ наружные припадки больного мѣста, нужно обратить вниманіе на его дѣйствіе и на дѣйствіе органовъ, находящихся съ нимъ въ связи, напр. если болѣзнь находится въ животѣ, подъ ложечкою, то, изслѣдовавъ это мѣсто и разспросивъ больного, не имѣлъ ли онъ



тошноты, рвоты, отрыжки, нужно обратить вниманіе : не болитъ ли голова, не покрыты ли глаза желтизною, а языкъ — бѣлою, желтою слизью; каковъ аппетитъ, вкусъ во рту, жажда; было ли испражненіе мочи, кала, когда, сколько разъ, въ какомъ количествѣ и какого качества относительно состава, осадка, цвѣта, запаха, какъ сказано въ отдѣлѣ о припадкахъ.

Если больной не замѣчаетъ нигдѣ у себя мѣстной постоянной боли, но чувствуетъ общую слабость всего тѣла, ознобъ попеременно съ жаромъ, стрѣльбу, ломъ въ рукахъ, въ ногахъ, кашель, тягость въ тѣлѣ и проч., словомъ, если болѣзнь не обозначается явными припадками, какъ это часто случается въ продолжительныхъ хроническихъ болѣзняхъ, то надобно разсмотрѣть всѣ части тѣла и ихъ дѣйствія, начиная съ головы — какъ то: нѣтъ ли боли, тяжести, круженія головы; каковы глаза : не красны ли? распухлы, чисты, свѣтлы или мутны, тусклы, сухи или слезоточивы, впалы или выпуклы, косы, подвижны, неподвижны; сжаты или расширены, подвижны или неподвижны ихъ зрачекъ, не боятся ли глаза свѣта; каково зрѣніе? нѣтъ ли шума, звона, стрѣльбы въ ушахъ? каковъ слухъ? каково лицо: блѣдное, красное, синее, желтое, впалое, распухшее? каковы позды и движеніе крыльевъ носа? имѣетъ ли больной обоняніе натуральное, или у него его вовсе нѣтъ, или же онъ чувствуетъ странные запахи, либо никакого запаха не можетъ терпѣть? каковы губы : красны, блѣдны, сухи, влажны, чисты или покрыты бѣлою, желтою, черною слизью, корою; дышетъ ли больной чрезъ открытый ротъ или чрезъ носъ? каковы десна, языкъ — чисты, красны, блѣдны, покрыты бѣлою, желтою, черною слизью, влажны или сухи, жестки, морщиноваты, языкъ потрескавшійся? нѣтъ ли запаха изо рта? каковъ вкусъ во рту : травяной, вязкій, кислый, горькій; каковъ выдыхаемый воздухъ, теплый, холодный? есть ли позывъ на бѣду и на что именно? или отвращеніе отъ пищи; есть ли жажда, и на какое питье: холодное, кислое, воду, вино и проч.; нѣтъ ли отрыжки и чѣмъ отрыгается — кислотою, горечью, гнилыми яйцами?



нѣтъ ли тошноты, рвоты? чѣмъ рветъ больного и притомъ легко или съ трудомъ? какъ онъ чувствуетъ себя послѣ рвоты; есть ли испражненіе низомъ? какъ оно часто? какого цвѣта, густоты, запаха калъ, съ трудомъ, болью или свободно онъ испражняется, облегчаетъ или ослабляетъ это испражненіе больного, часто или рѣдко, свободно или съ рѣзью испражняется моча, въ какомъ количествѣ, какого она цвѣта, запаха, даетъ ли она и какой именно осадокъ? въ какомъ состояніи дѣтородныя части относительно ихъ вида, объема, цвѣта, испражненія сѣмени у мужчинъ и мѣсячныхъ кровей у женщинъ? какова кожа: красна, блѣдна, желта, пухла, морщиниста, мягка, жестка, покрыта потомъ, или суха? нѣтъ ли кашля: какъ часто онъ появляется, какъ силенъ, сухъ или съ харкотиною, свободно или съ трудомъ извергается послѣдняя, какого она цвѣта, состава, запаха? нѣтъ ли въ ней крови, гноя, камешковъ? какъ происходитъ дыханіе: рѣдко или часто, глубоко или поверхностно, трудно или свободно, тихо или звучно; въ какомъ положеніи тѣла легче или труднѣе дышетъ больной, каково притомъ движеніе реберъ, лопатокъ, брюшныхъ стѣнъ, біеніе шейныхъ сосудовъ? какъ ударяетъ пульсъ: сильно, слабо, скоро, медленно, правильно или съ перемежкой, не дѣлается ли онъ полнѣе, больше и крѣпче, если заставить больного глубоко вдохнуть воздухъ (вѣрный признакъ несвободнаго прохода крови чрезъ легкія, замѣаемый при ихъ воспаленіи, показывающій необходимость кровопусканія), каково притомъ біеніе сердца? какъ происходятъ движенія: свободно, правильно, скоро, съ силою, или произвольно, судорожно, медленно, съ болью, особенно въ глазахъ, лицѣ, языкѣ, дыханіи, рукахъ и ногахъ? каковъ взглядъ: спокоенъ, кротокъ или дикій, суровый, бѣглый, непостоянный; спокойно ли движутся глаза? или дико вращаются въ своихъ впадинахъ, или же вовсе неподвижны? нѣтъ ли корчей въ ливныхъ мышцахъ, не дрожатъ ли губы и языкъ при подачѣ больному лекарства, питья? какъ происходитъ глотаніе, голосъ, рѣчь? каковъ больной во снѣ и наяву? не бредитъ ли? спитъ тихо и спокойно, или безпокой-



но, прерывисто, глубокимъ или легкимъ сномъ? если онъ часто грезить во снѣ, то какія это грезы? скученъ или веселъ на-яву, какъ проводить время, въ обществѣ или уединенно, дѣятельно или въ бездѣйствіи, и вообще обратить вниманіе на умственное и нравственное состояніе больного, его образъ жизни, занятія и пр.

§ 41. Открывъ разспросами больного и осмотромъ его самого все то, что въ немъ есть болѣзненнаго и что можетъ служить къ распознаванію болѣзни, нужно обратить вниманіе на причины, которыя также много способствуютъ распознаванію болѣзни; въ семъ отношеніи нужно узнать: наследственная ли или приобретенная болѣзнь, въ первый ли разъ она появляется у больного или уже была неоднократно, не имѣетъ ли она связи съ предшедшими страданіями больного, какія были эти страданія; не былъ ли больной подверженъ явному какому-либо вредному вліянію: простудѣ, холоду, жару, погрѣшности въ діетѣ, испугу, огорченію, непомѣрному напряженію тѣла или ума, наружному насилію и пр.; нѣтъ ли какого особеннаго расположенія къ болѣзни, зависящаго отъ тѣлосложенія, страны, жилища, состоянія воздуха, времени года, рода жизни, занятій, пищи, питья и проч.

Разумѣется, что большая часть всѣхъ сихъ розысканій бываетъ ненужна при болѣзняхъ явныхъ, видимыхъ; но зато во многихъ случаяхъ всѣ они, и вмѣстѣ взятые бываютъ недостаточны для распознаванія болѣзни: въ послѣднихъ случаяхъ ненужно спѣшить опредѣленіемъ болѣзни, а надобно обождать, не появятся ли отличительнѣйшіе, новые припадки. Такъ-какъ на распознаваніи болѣзни основывается ея леченіе, то сомнѣніе только замедлитъ леченіе, но ошибка въ распознаваніи можетъ быть очень опасна. Почти всѣ острые болѣзни, въ первые 2-3 дня своего появленія, а хроническія и въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, мѣсяцевъ и даже лѣтъ не обозначаются явственными припадками: въ такихъ случаяхъ ненужно спѣшить опредѣленіемъ болѣзни, а наблюдать больного въ теченіе нѣкотораго времени, расположивъ леченіе по общимъ



правиламъ, а между-тѣмъ пригласить врача, или свезти къ нему больного, если состояніе здоровья послѣдняго то позволяетъ.

§ 42. Кромѣ сего, есть еще много обстоятельствъ, затрудняющихъ распознаваніе болѣзни, какъ то: глубокое положеніе въ полости тѣла больного органа, сердца, селезенки, почекъ, матки и проч., неизвѣстное его натуральное дѣйствіе (селезенки). множество органовъ, лежащихъ вмѣстѣ въ одной полости и неправильное ихъ положеніе (сердце лежитъ иногда въ правой полости груди, яичко въ брюхѣ); сочувствіе многихъ органовъ между собою, отчего появляются припадки совѣстѣ не тѣ, какіе свойственны больному органу: сопряженіе или появленіе многихъ болѣзней у одного и того же больного, либо необыкновенная рѣдкость ихъ появленія и наконецъ самъ больной, который иногда утаиваетъ, скрываетъ припадки своей болѣзни, или же, напротивъ, рассказываетъ о такихъ признакахъ, которыхъ онъ вовсе не имѣетъ и не чувствуетъ; во всѣхъ подобныхъ случаяхъ пособіе врача необходимо, хотя нерѣдко и онъ ошибается въ распознаваніи такой болѣзни.

§ 43. Распознавъ болѣзнь, нужно потомъ опредѣлить ея вліяніе на жизнь и здоровье, т. е. выздоровѣетъ ли больной отъ настоящей болѣзни, и притомъ совершенно или же несовершенно, т. е. у него останется другая какая болѣзнь, либо тѣлесный недостатокъ, или же онъ умретъ; это опредѣленіе болѣзни называется предсказаніемъ. Въ сущности предсказаніе лично на больного не имѣетъ никакого вліянія: положеніе больного не измѣняется, если мы скажемъ, что онъ выздоровѣетъ, или умретъ; но ему важно узнать несчастный исходъ своей болѣзни для исполненія обряда религіи, для надлежащаго распоряженія въ житейскомъ быту духовнаго завѣщанія; оно важно для его родныхъ, пріятелей, дабы завременно принять надлежащія мѣры. Еще важнѣе предсказанія для самого предсказателя, который, предсказывая завременно разныя перемѣны болѣзни, опредѣляя ея ходъ и окончаніе, показываетъ



тѣмъ знаніе своего дѣла, пріобрѣтаетъ довѣренность больного и уваженіе постороннихъ; даже несчастный исходъ болѣзни менѣе вредитъ его славѣ, если предсказатель его предвидѣлъ и предсказалъ.

Для вѣрности предсказанія, нужно знать обстоятельно вообще болѣзни, и въ особенности въ какомъ состояніи она находится у настоящаго больного; а потому безошибочное предсказаніе есть даръ только немногихъ врачей, высокообразованныхъ и опытныхъ; но для врачей молодыхъ, мало свѣдущихъ, оно возможно только въ тѣхъ болѣзняхъ, которыя очень часто имѣютъ одинаковый исходъ: благопріятный (различныя простуды, лихорадки, легкія горячки, воспаления, сыпи и пр.), или же несчастный (чума, водобоязнь, водяная въ головѣ, груди, чахотка и проч.). Посему справедливое предсказаніе зависитъ отъ вѣрнаго распознаванія болѣзни и правильнаго опредѣленія ея припадковъ: легко опредѣлить, что такой-то страдаетъ горячкою, воспаленіемъ, что эти болѣзни вообще не опасны; но чтобы сказать, что онѣ не опасны и у вашихъ больныхъ, для того надобно знать силу и степень сихъ болѣзней у вашихъ больныхъ, надобно взять въ соображеніе личныя принадлежности больного и его внѣшнія отношенія: его здоровье до болѣзни, тѣлосложеніе, полъ, возрастъ, привычки, и постороннія обстоятельства: мѣсто пребыванія, жилище, житейскіе достатки, благонадежность прислуги и проч., все это можетъ измѣнить ходъ болѣзни, а потому и предсказаніе.

§ 44. Предсказаніе зависитъ отъ хода, продолженія и окончанія болѣзни, отъ личныхъ, общихъ и случайныхъ обстоятельствъ больного, отъ припадковъ самой болѣзни.

Относительно хода, нужно смотрѣть, непрерывно ли продолжается болѣзь (горячка), или же она послабляетъ, либо и совсѣмъ прекращается на нѣкоторое время дня; въ семъ отношеніи непрерывныя болѣзни опаснѣе послабляющихъ, а послабляющія перемежающихся, потому что при послабленіи и перемежкѣ больной имѣетъ время отдыха, въ которое силы его могутъ укрѣпиться для новаго сопротивленія болѣзни при ея ожесточеніи или



приступъ. Впрочемъ, это общее правило въ частности допускаетъ множество измѣненій. Безпрерывныя болѣзни опаснѣе тѣхъ, которыя вдругъ при самомъ началѣ достигаютъ высшей степени своей жестокости (воспаленія, горячки, судороги, пострѣлы и проч.), чѣмъ тѣхъ, кои постепенно усиливаются, чрезъ нѣсколько дней достигаютъ высшей точки своего развитія. Всѣ продолжительныя, хроническія, а многія и острыя болѣзни начинаются непримѣтно, и въ самомъ началѣ тѣхъ и другія распознаются очень трудно, обозначаясь общими припадками: слабостію, изнѣможемъ, разстройствомъ разныхъ дѣйствій тѣла; предсказаніе въ такомъ случаѣ всегда бываетъ невѣрное. Болѣзни, начинающіяся вдругъ, жестокими припадками, обмороками, безчувствіемъ, судорогами, очень опасны; очень часто онѣ скоро оканчиваются смертію. Но чѣмъ постепеннѣе болѣзнь усиливается, медленнѣе достигаетъ своего полного развитія, тѣмъ она менѣе опасна; такая болѣзнь бываетъ наипаснѣе въ то время, когда она находится на высшей степени своей жестокости. Болѣзнь, начавшаяся уменьшаться и ослабѣвать, съ тѣмъ вмѣстѣ дѣлается и не такъ опасною, впрочемъ, здѣсь бываетъ еще возможенъ возвратъ болѣзни, или переходъ ея въ другую болѣзнь; такъ скарлатина, ослабѣвая, можетъ бростись на мозгъ, на корь на легкія, и убить больного, чрезъ воспаленіе этихъ органовъ, водяную болѣзнь, переходя въ При переходѣ острой болѣзни въ хроническую, припадки понемногу утихаютъ, до известной степени. При переносѣ болѣзни или ея переходѣ съ одной части тѣла на другую, важность такой перемѣны бываетъ различна: если подагра, ревматизмъ, разныя сыпи, отъ ногъ, рукъ, кожи переходятъ на желудокъ, легкія, мозгъ, то такая перемѣна очень важна и опасна; но если при водяной болѣзни, завалѣ въ брюхѣ, появляются на кожѣ сыпи, открываются на ногахъ язвы, то эта перемѣна вообще благопріятна, ибо водянка, завалы часто такъ разрѣшаются, или же ослабѣваютъ. Появленіе признаковъ перелома въ болѣзни всегда благопріятно, но переломъ долженъ быть правильный, полный,

и за нимъ должно произойти улучшение въ положеніи больного. Перелому болѣзни чрезъ испраженіе низомъ предшествуютъ боли и припухлость, въ животѣ урчаніе, отдѣленіе вѣтровъ верхомъ или низомъ, боль въ мышцахъ и кожныхъ; самыя испраженія низомъ бываютъ однообразны, полужидки, воюючи, легко извергаются и за ними послѣдуетъ явное улучшение больного. Критическому кровотеченію изъ носа предшествуютъ: краснота лица и глазъ, тяжесть и круженіе головы, біеніе височныхъ артерій, шумъ и звонъ въ ушахъ, обморокъ. Появленіе перелома чрезъ мочу обозначается припухlostію въ подвздохахъ, тяжелою около почекъ, напряженіемъ въ нижней части брюха, зудомъ въ мочевоомъ каналѣ, сухостію кожи, запоромъ низъ, моча испражняется въ большомъ количествѣ, темноватая, съ осадкомъ. Критическому поту предшествуютъ: дрожь и непріятное чувство въ кожѣ, которая потомъ краснѣетъ, припухаетъ; потъ появляется прежде на головѣ, груди, а наконецъ и по всему тѣлу, бываетъ равномерный, теплый. Послѣ благопріятнаго перелома тѣло и всѣ его дѣйствія постепенно приходятъ въ натуральное положеніе: лице, хотя и блѣдное еще, получаетъ свое обыкновенное выраженіе, а глаза видъ и взглядъ, лобъ дѣлается гладкимъ, а губы легкокрасными, влажными, чувства приходятъ въ ихъ натуральное положеніе, глазъ не беспокоитъ свѣтъ, ушей звукъ, носа запахи, прекращается бредъ, появляется благотворный крѣпительный сонъ, въ тѣлѣ остается еще усталость, но шѣтъ болѣе, языкъ, зубы десна очищаются, появляется аппетитъ, уменьшается жажда, глотаніе свободно, животъ мягокъ и не болитъ, нѣтъ ни тошноты, ни рвоты, испраженіе низомъ, мочи натуральны, дыханіе легко и свободно, безъ кашля и безъ особенной жаркотинны, пульсъ слабъ и мягокъ, кожа умеренно тепла, мягка, но не мокра.

При опасномъ переходѣ всѣ припадки болѣзни ожесточаются: лице измѣняется — слишкомъ краснѣетъ или блѣднѣетъ, глаза дѣлаются тусклыми, мутными, нечистыми, красными, выражаютъ внутреннее страданіе, верхушка носа



заостряется, а крылья истончаются и слишком движутся, губы блѣднѣютъ, сохнутъ, трескаются, дрожатъ, зрѣніе, слухъ дѣлаются очень чувствительными или безчувственными, появляется новый или усиливается старый бредъ; языкъ сохнетъ, трескается, покрывается густою, темною, черною слизью, дрожитъ; глотаніе трудное, появляется вновь или усиливается отрыжка, тошнота, рвота, брюхо напрягается какъ барабанъ, вздувается, происходитъ поносъ, видимо ослабляющій больного, появляется непроизвольное испражненіе поночаго кала, мутной, смрадной мочи, усиливается кашель, останавливается харкотина, затрудняется дыханіе, возникаетъ икота, хрипѣніе, тревожное, неправильное біеніе сердца, пульсъ дѣлается очень частымъ, слабымъ, мягкимъ, неправильнымъ, кожа сухою, горячею, на-ошупъ жгучею, или холодною, покрытою потомъ, испещренною пятнами, руки и ноги холодными; всѣ эти припадки постепенно или быстро усиливаются и оканчиваются смертію.

Въ дѣтскомъ возрастѣ болѣзни острыя наичаще рѣшаются кровотеченіемъ изъ носа; въ юношескомъ — кровохарканіемъ, у мужчинъ — кровотеченіемъ почечуинымъ, у женщинъ — мѣсячнымъ очищеніемъ, въ зрѣломъ возрастѣ — потомъ, мочею. Кромѣ сего, тѣлосложеніе, особенное расположеніе, родъ и причина болѣзни, время года также имѣютъ большое вліяніе на рѣшеніе болѣзни потомъ, мочею и проч.

Всякаго рода погрѣшности со стороны больного, его прислуги, врача, также измѣняютъ переломъ болѣзни: холодный воздухъ останавливаетъ критическій потъ, невоздержанность въ пищу измѣняетъ переломъ поносомъ, мочею, излишнее кровопусканіе останавливаетъ критическую харкотину и проч.

§ 45. Личныя особенності больного имѣютъ большое вліяніе на предсказаніе; къ сожалѣнію, однако, по нимъ опредѣлять предсказаніе очень трудно. Эти личныя особенності суть: возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, привычки, родъ жизни и проч. Однѣ и тѣ же болѣзни измѣняютъ свою натуру и ходъ по личной особенності больного: у дѣтей всякая



болѣзнь легко устремляется на мозгъ, распознается трудно, врачъ прописываетъ лекарства на-угадъ, а дитя ихъ вовсе не принимаетъ, потому дѣтскія болѣзни очень опасны, это доказывается и большою смертностію въ дѣтскомъ возрастѣ; но такъ-какъ всѣ перемѣны въ дѣтскомъ тѣлѣ, особенно всасываніе, происходятъ очень быстро, то иногда, повидимому, отчаянныя больныя дѣти выздоравливаютъ скоро. Дѣтскія болѣзни, особенно крупъ, коклюшъ, скарлатина, натуральная оспа, корь, прорѣзываніе зубовъ, острая водяная болѣзнь въ мозгу — очень опасны. Болѣзни юности отличаются своею склонностію принимать воспалительное и нервное качество и быстрымъ ходомъ; у дѣвицъ появленіе мѣсячныхъ кровей бываетъ источникомъ множества болѣзней. Въ зрѣломъ возрастѣ выздоравливаетъ наибольшее число больныхъ; но у стариковъ, которыхъ тѣло уже само по себѣ находится въ болѣзненномъ состояніи, болѣзни часто принимаютъ медленный ходъ и несчастный исходъ. Мужчина, по крѣпкому его тѣлосложенію, легче переноситъ болѣзни, чѣмъ нѣжная, слабая женщина, у которой притомъ мѣсячныя крови, беременность, роды, кормленіе грудью, прекращеніе мѣсячныхъ кровей, дѣлаются источникомъ и причиною множества болѣзней; особы плотныя, крѣпкія, легче переносятъ болѣзни, чѣмъ слабыя, дряблыя, притомъ болѣзни первыхъ скорѣе оканчиваются счастливо или несчастно, а у послѣднихъ онѣ легко дѣлаются продолжительными. Особенное внутреннее расположеніе (моя натура, какъ говорятъ больные), желаніе или отвращеніе отъ чего-либо, здоровое, или и прежде болѣзненное состояніе тѣла, привычка, пища, питье, жилище, мѣстность страны также измѣняютъ ходъ, а потому и предсказаніе въ болѣзняхъ, напр. у человѣка съ узкою грудью, расположеннаго къ чахоткѣ, привыкшаго къ употребленію спиртныхъ напитковъ, терпящаго недостатокъ въ приличной пищѣ, у вспыльчиваго, сладострастнаго, живущаго въ низменномъ мѣстѣ, сырѣмъ, холодномъ домѣ, простое колотье, кашель можетъ превратиться въ чахотку. Холодный или жаркій климатъ, теплое, холодное, сухое, сырое время года, повальное состояніе воз-



духа, ремесла и занятія, имѣютъ большое вліяніе на свойство, ходъ, а слѣдственно и на предсказаніе въ болѣзняхъ.

Важное вліяніе на предсказаніе имѣетъ мѣсто болѣзни, которая бываетъ тѣмъ важнѣе, чѣмъ необходимѣе для жизни пораженный ею органъ : рожа на рукахъ или ногахъ не такъ опасна, какъ на туловищѣ, а рожа на туловищѣ не такъ важна, какъ на лицѣ и головѣ. Далѣе, болѣзнь тѣмъ важнѣе, чѣмъ глубже лежитъ больная часть: не опасно воспаленіе грудныхъ мышцъ, но опаснѣе воспаленіе подреберной плевры и еще опаснѣе воспаленіе легкихъ. Воспаленіе толстыхъ кишекъ не такъ опасно, какъ тонкихъ, еще опаснѣе воспаленіе желудка, а опаснѣе ихъ всѣхъ воспаленіе мозга, сердца. Воспаленіе легкихъ очень опасно, но оно излечивается часто, потому-что занимаетъ наичаще одно легкое, или даже только его часть, а другое легкое дѣйствуетъ свободно. Чѣмъ болшую часть органа занимаетъ болѣзнь, тѣмъ она опаснѣе — воспаленіе обоихъ легкихъ смертельно, ибо прекращаетъ дыханіе; еще опаснѣе болѣзнь, занимающая разомъ нѣсколько органовъ. Чѣмъ скорѣе и прямѣе мы можемъ дѣйствовать лекарствами на мѣсто болѣзни, чѣмъ дѣйствительнѣе наши средства, тѣмъ послѣдняя легче излечивается; такъ разныя наружныя болѣзни, воспаленія, не смотря на ихъ важность, излечиваются скоро и вѣрно. Чѣмъ сильнѣе и жесточе болѣзнь, чѣмъ неправильнѣе, необыкновеннѣе ея ходъ, чѣмъ жесточе и неодолимѣе ея причины, тѣмъ она опаснѣе : злокачественная скрытная перемежная лихорадка, обнаруживающаяся пострѣломъ, спячкою, обморокомъ, поражающая пришельца въ страну ея свирѣпствованія (жителя Россіи въ Крыму, Молдавіи и проч.) очень скоро убиваетъ больного. Такъ жестокіе виды пострѣла, сильныя душевныя разстройства бываютъ смертельны въ нѣсколько минутъ. Свѣжая, недавняя болѣзнь излечивается скорѣе и легче, чѣмъ застарѣлая.

§ 46. Предсказаніе по самымъ признакамъ и припадкамъ болѣзни, отчасти уже явствуетъ изъ вышесказаннаго; вообще оно основывается на слѣдующемъ правилѣ : чѣмъ болѣе припадокъ удаляется отъ натураль-



наго дѣйствія органа, тѣмъ онъ опаснѣе, и напротивъ; но чѣмъ потѣмъ онъ ближе подходитъ къ натуральному своему положенію, и притомъ не вдругъ, а постепенно, тѣмъ благопріятнѣе, напр. пульсъ скорый, слабый, по временамъ останавливающийся — опасенъ; но опасность уменьшается по мѣрѣ того, какъ пульсъ дѣлается медленнѣйшимъ, крѣпкимъ и правильнымъ; чѣмъ жесточе, сильнѣе и непрерывнѣе бредъ, тѣмъ опаснѣе; но опасность уменьшается по мѣрѣ того, какъ бредъ становится тише и больной хотя по временамъ начинаетъ приходить въ память; быстрый переходъ отъ бреда въ память смертеленъ.

Здѣсь мы покажемъ вліяніе на предсказаніе только главнѣйшихъ припадковъ, и, для избѣжанія повтореній, считаемъ нужнымъ замѣтить, что если такой-то припадокъ мы признаемъ опаснымъ, то противный ему надобно почитать благопріятнымъ, и обратно.

Недостатокъ аппетита въ началѣ всѣхъ острыхъ болѣзней, не опасенъ; но голодъ въ семъ случаѣ опасенъ, а въ хроническихъ нервныхъ болѣзняхъ — безопасенъ; при выздоровленіи отъ острыхъ болѣзней голодъ благопріятенъ; но недостатокъ аппетита — сомнителенъ. Противное разумѣется о жадѣ: жажда въ началѣ и продолженіи острыхъ болѣзней не опасна, но подъ конецъ ихъ и въ хроническихъ болѣзняхъ — она неблагопріятна, ибо означаетъ продолженіе или новое появленіе раздраженія въ тѣлѣ. Умѣренная жажда ничего не означаетъ, но сильная, неутолимая жажда вездѣ и всегда опасна; сильная жажда, съ отвращеніемъ отъ жидкостей, очень опасна, означая воспаленіе мозга, водобоязнь.

Въ острыхъ болѣзняхъ покрытіе зубовъ и десенъ мокротою, а еще болѣе скрежетаніе зубовъ при бредѣ — опасны; стучаніе зубами означаетъ жестокость лихорадочнаго озноба; бѣлая и блѣдная десна показываютъ сухотку тѣла. Распухшій языкъ угрожаетъ задушеніемъ, а слишкомъ сжавшійся — сухоткою; въ горячкахъ уменьшившійся въ объемъ, притомъ сухой, жесткій, красный, истрескавшійся, трудно высовываемый изъ рта, дрожащій языкъ — опасенъ.



Язвы на языкѣ и во рту (молошница) у дѣтей не опасны, но у взрослыхъ людей опасны: у послѣднихъ онѣ означаютъ важное разстройство внутренностей. Сухой, красный, гладкій, шероховатый языкъ, означая раздраженіе въ тѣлѣ, есть довольно важный припадокъ; но онъ совсѣмъ не опасенъ, если происходитъ отъ того, что больной спитъ съ открытымъ ртомъ. Чѣмъ толще и плотнѣе языкъ покрытъ вязкою слизью, тѣмъ онъ опаснѣе; желтая и зеленоватая слизь на языкѣ означаетъ страданіе брюшныхъ внутренностей; темная или черная слизь на языкѣ очень опасна. Скорое глотаніе въ острыхъ болѣзняхъ опасно. Глотаніе трудное, болезненное, завися отъ многихъ причинъ, имѣетъ различное значеніе: трудное глотаніе отъ воспаления глотки, горла, языка или парыва проходитъ вмѣстѣ съ сими болѣзнями; трудное глотаніе отъ суженія и онѣмѣнія пищевого горла очень опасно. Невозможность глотать, вдругъ происшедшая и зависящая отъ судорогъ, не опасна, но зависящая отъ общей слабости больного — смертельна. Слѣдственно опредѣленіе значенія труднаго глотанія зависитъ отъ распознаванія его причины — болѣзни. То же нужно разумѣть о рвотѣ: тошнота и рвота отъ обремененія желудка, скопленія въ немъ слизи, желчи, разстройства пищеваренія, отъ взгляда на отвратительныя вещи, отъ непріятнаго запаха, также рвота у истерическихъ, беременныхъ женщинъ, у ипохондриковъ, въ началѣ многихъ острыхъ болѣзней, при кашлѣ отъ простуды — не опасна. Рвота послѣ ушиба головы, при страданіи мозга, легкихъ, желудка, кишекъ, почекъ, особенно при ущемленіи грыжи, также всякая упорная рвота — весьма опасны. Рвота несварившеюся пищею, слизью, желтою желчью, непріятнымъ лекарствомъ — не опасна; но рвота кофейною, черною, вонючею, ѣдкою жидкостію, черною кровію, гноемъ, каломъ, перепонками — очень опасна.

Запоръ на-низъ, подобно рвотѣ, имѣетъ различное значеніе, смотря по болѣзни, которой онъ бываетъ припадкомъ. Запоръ при выздоравливаніи послѣ трудныхъ болѣзней, послѣ поноса или пріема слабительнаго лекарства, у пожилыхъ людей, подверженныхъ почечую, у истеричекъ, ипохондри-



ковъ, стѣмасшедшихъ, — не важенъ; но запоръ при воспаленіи кишекъ, ущемленной грыжѣ, зависящій отъ сжатія кишекъ опухолью, затворенія кишечнаго канала кускомъ пищи, завитія, переплетенія кишекъ, при кровавомъ пострѣлѣ — очень опасенъ.

Поносъ, относительно предсказанія, много сходствуетъ съ рвотою: поносъ отъ расстройства пищеваренія, у дѣтей при прорѣзываніи зубовъ, у роженицъ, которыя не намѣрены сами кормить грудью — не опасенъ и даже полезенъ; поносъ отъ слабости, изнурительный, гнойный, кровавый — опасенъ.

Боль въ животъ зависитъ отъ множества болѣзней, отъ которыхъ получаетъ и свое значеніе. Боль въ животъ отъ неумѣренности въ пищу, отъ трудноваримой пищи, отъ глистъ, слабительныхъ лекарствъ, вѣтровъ въ животъ, въ коликъ живописцевъ, при простомъ поносѣ — не опасна; но боль, какъ припадокъ воспаленія брюшныхъ внутренностей, тѣмъ опаснѣе, чѣмъ жесточе самое воспаление.

Вѣтры въ кишкахъ отъ несваренія пищи, или отъ самой пищи (капусты, гороха, разн. овощей, молока) — не опасны; но вѣтры въ продолженіе горячекъ, развившіяся не въ кишкахъ, а въ самомъ брюхѣ — опасны.

Трудное испражненіе кала низомъ при почечуѣ, любострастныхъ наростахъ въ заднемъ проходѣ, при нарывѣ и свищѣ въ прямой кишкѣ — не важно; но оно опасно при кровавомъ поносѣ, при онѣмѣніи, ракъ прямой кишки, при разстройствѣ мочевого пузыря, матки. Непроизвольное испражненіе низомъ всегда очень опасно: оно замѣчается въ смертельныхъ горячкахъ, помертвѣніи кишекъ, при пострѣлѣ, въ злокачественныхъ лихорадкахъ.

Самый калъ имѣетъ различное значеніе въ болѣзняхъ: калъ, подобный яичному бѣлку, означаетъ изнуреніе или важную болѣзнь кишекъ; калъ съ желчью означаетъ раздраженіе въ печени или кишкахъ; калъ съ неперевавшими кусками хлѣба, мяса — есть худой знакъ слабости пищеваренія; калъ, съ кровью тѣсно смѣшанный, означаетъ внутреннее сильное воспаленіе, кровотеченіе, порчу внутренностей;



кровь, отдельно выходящая изъ прохода прежде или послѣ кала, изливающаяся изъ почечуйныхъ сосудовъ, не опасна, но чѣмъ болѣе крови выходитъ съ каломъ, тѣмъ опаснѣе. Слишкомъ обильныя испражненія низомъ легко изнуряютъ больного. Бѣлый или сѣрый калъ показываетъ недостатокъ, желтый — избытокъ желчи, а красный — кровь, и есть худой признакъ; темный, черный, смрадный калъ опасенъ, если зависитъ отъ расстройства внутренностей: по испражненіи критическаго кала, припадки болѣзни уменьшаются.

§ 47. Если удареніе въ грудь причиняетъ глухой, какъ полная, а не ясный звукъ, какъ пустая бочка, то это означаетъ, что противъ того мѣста нѣтъ прохода воздуха чрезъ легкія; такой воздухъ всегда неблагопріятенъ и тѣмъ болѣе, чѣмъ онъ глуше и когда зависитъ отъ изліянія въ груди воды, крови, гноя. Припадки болѣзненнаго дыханія имѣютъ важное вліяніе на предсказаніе въ болѣзняхъ не только грудныхъ, но и другихъ органовъ. Малое, короткое дыханіе, означая стѣсненіе груди, всегда есть неблагопріятный припадокъ; большое, глубокое вдыханіе весьма опасно: оно показываетъ угнетеніе мозга, легочныхъ нервовъ; но еще опаснѣе прерывистое, остановочное дыханіе: оно предвѣстникъ смерти, также припадокъ опасныхъ обмороковъ и проч. Верхнее или грудное, и нижнее или брюшное дыханіе равно опасны; скорое дыханіе, какъ припадокъ жара, само по себѣ не опасно, равно медленное дыханіе, какъ припадокъ слабости послѣ обморока. Трудное дыханіе всегда опасно и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ оно труднѣе и чѣмъ опаснѣе болѣзнь, коей она составляетъ припадокъ. Кашель имѣетъ вліяніе на предсказаніе, смотря по роду болѣзни, которой онъ припадокъ — простуды, воспаленія легкихъ, чахотки; продолжительный, упорный кашель всегда опасенъ. Чиханіе, появляющееся въ срединѣ и концѣ горячекъ, есть благопріятный знакъ выздоровленія (отсюда происходитъ обыкновеніе говорить при чиханіи *vivat* — здравствуй). Икота, появляющаяся въ горячкахъ, воспаленіяхъ, очень опасна. Вдыханіе, какъ припадокъ грудной болѣзни и горячки, опасно. Болѣзненный плачь — не опасенъ. Звота и потягота,



какъ припадки приступа лихорадки, означаютъ жестокость лихорадочнаго приступа. Задышка, дыханіе съ пискомъ, означаетъ опасное страданіе гортани, дыхательнаго горла. Храпѣніе всегда опасно; то же разумѣется и о хрипѣніи. О холодномъ и тепломъ, равно вонючемъ выдыхаемомъ воздухѣ, сказано прежде. Выхаркиваемая слизъ тѣмъ опаснѣе, чѣмъ болѣе она измѣнена въ составѣ, цвѣтѣ, запахѣ, вкусѣ, чѣмъ важнѣе болѣзнь, которой она составляетъ припадокъ, и чѣмъ труднѣе отдѣляется мокрота; кровохарканіе у людей крѣпкихъ, широкогрудыхъ, при воспаленіи легкихъ, не такъ опасно, какъ у людей узкогрудыхъ, чахотныхъ.

Слабый, тихій голосъ опасенъ въ горячкахъ и безопасенъ при выздоровленіи; визгливый, пискливый голосъ опасенъ, но охриплый, осиплый голосъ безопасенъ. Безгласіе и нѣмота опасны, равно какъ тихая или очень скорая, бѣглая рѣчь; вообще однако измѣненіе голоса и рѣчи при болѣзняхъ рта, глотки, гортани, органовъ шеи и груди не такъ опасно, какъ при горячкахъ и болѣзняхъ другихъ частей тѣла (головы, брюха).

§ 48. Припадки кровообращенія имѣютъ весьма важное значеніе въ опредѣленіи опасности болѣзни. Волненіе крови вообще само по себѣ не опасно, но оно можетъ причинить пострѣлъ, воспаленіе, горячку. Легкій обморокъ отъ кровопусканія, у женщинъ отъ испуга, непріятнаго запаха — не опасенъ; но чѣмъ глубже и продолжительнѣе обморокъ, чѣмъ менѣе признаковъ жизни у обмершаго, тѣмъ опаснѣе: такіе люди люди рѣдко возвращаются къ жизни.

Большое накопленіе крови гдѣ-либо въ тѣлѣ всегда опасно: вездѣ оно легко переходитъ въ воспаленіе и нарывы, въ легкихъ, сверхъ того, причиняетъ задушеніе, а въ мозгу — пострѣлъ.

Твердый, крѣпкій, большой и полный пульсъ, кромѣ пострѣла, не опасенъ въ другихъ болѣзняхъ, въ которыхъ онъ замѣчается въ началѣ; въ расширеніи сердца и большихъ сосудовъ этотъ пульсъ показываетъ опасную степень болѣзни; пульсъ твердый, крѣпкій (рѣдко полный), въ срединѣ и



къ концу болѣзни неблагопріятенъ, означая ея ожесточеніе. Слабый, малый, мягкій и пустой пульсъ, послѣ перелома, кровопусканія или кровотеченія, благопріятенъ; но во всѣхъ другихъ случаяхъ опасенъ и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ пульсъ слабѣе и меньше. Пульсъ частый или скорый въ началѣ болѣзни не важенъ, но онъ опасенъ послѣ перелома, означая возвратъ или ожесточеніе болѣзни; пульсъ рѣдкій или медленный благопріятенъ у выздоравливающихъ послѣ трудныхъ болѣзней, послѣ кровопусканія въ воспаленіяхъ и опасенъ при болѣзняхъ груди, брюха и особенно головы—при пострѣлѣ. Пульсъ скорый, замѣчаемый у больного по утру, опаснѣе чѣмъ ввечеру, вообще же тѣмъ опаснѣе, чѣмъ, скорѣе; пульсъ, ударяющій у взрослыхъ 120 разъ въ минуту, очень опасенъ, а 150 разъ — смертеленъ. То же разумѣется и о рѣдкомъ пульсѣ, который также тѣмъ опаснѣе, чѣмъ рѣже. Ровный пульсъ всегда благопріятенъ; но пульсъ неровный опасенъ, и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ неровнѣе. Пульсъ едва примѣтный, слабый, неровный, прерывистый, означаетъ скорую смерть, исключая, впрочемъ, обморока и нервныя болѣзни (истерики, судорогъ), гдѣ онъ не такъ опасенъ.

Болѣзненное біеніе сердца, происшедшее медленно, постепенно, сильное, безпрерывное — очень опасно; но вдругъ происшедшее отъ какой-либо причины (радости, гнѣва, испуга, страха, танцевъ, жаркаго разговора и проч.) у людей молодыхъ, полнокровныхъ, чувствительныхъ — это біеніе сердца не опасно. Приостановленіе біенія сердца въ обморокъ, происшедшее вдругъ, не опасно; но когда оно постепенно ослабѣваетъ и потомъ прекращается совсѣмъ, то означаетъ близкую смерть.

Разныя кровавыя пятна въ кожѣ показываютъ состояніе крови вообще и ея теченіе въ волосныхъ сосудахъ: темно-синія пятна, какъ бы послѣ ушиба, очень опасны: они показываютъ порчу крови, и появляются въ срединѣ и подъ конецъ опасныхъ болѣзней, вмѣстѣ съ другими припадками. Пятна свѣтло-синія, свинцовыя, появляются также къ концу острыхъ болѣзней, равно и въ болѣзняхъ сердца, гдѣ они означаютъ опасность и неправильное кровообращеніе; но эти



же пятна, происходящія отъ холода, также въ лихорадочномъ ознобѣ — неважны. Свѣтло-синяя, свинцовая или блѣдая кожа, также опасна: она появляется послѣ сильныхъ кровотеченій. Красная кожа, замѣчаемая во время лихорадочнаго жара, въ красухѣ, кори, рожѣ и проч. бываетъ благопріятный и опасный знакъ, смотря по свойству другихъ припадковъ болѣзни; румяный, ограниченный цвѣтъ щекъ у чахотныхъ неблагопріятенъ. Синій цвѣтъ кожи, замѣчаемый при одышкѣ, біеніи сердца, водяной въ груди — есть смертельный припадокъ. Кровотеченіе изъ артерій опаснѣе чѣмъ изъ венъ; при первомъ ярко-красная кровь бьетъ стремительно, но прерывисто, а при второмъ черная кровь течетъ непрерывною, ровною струею. Истекшая кровь сейчасъ разлагается на двѣ части: творогъ и сыворотку. Чѣмъ гуще и обильнѣе творогъ, и плотнѣе покрывающая его пленка, тѣмъ крѣпче, значить, больнои, но за то тѣмъ и сильнѣе воспаленіе; съ повторительнымъ кровопусканіемъ творогъ и пленка уменьшаются. Чѣмъ больше сыворотки, слабѣе больнои, тѣмъ опаснѣе и кровотеченіе.

§ 49. Болѣзненнѣе жаръ бываетъ хорошимъ и худымъ признакомъ; вообще онъ означаетъ раздраженіе въ тѣлѣ. Сильный, упорный жаръ, неуменияющійся отъ прохладяющихъ лекарствъ и питья, при содержаніи больнаго въ прохладной комнатѣ, опасенъ, ибо означаетъ воспаленіе внутренняго органа; но жаръ умеренный благопріятенъ, показывая достаточную крѣпость больнаго; сильный жаръ въ пароксизмѣ лихорадки не опасенъ, равно и въ истерикѣ. Мѣстный жаръ опаснѣе общаго, ибо первый означаетъ внутреннее воспаленіе, напр. въ головѣ, брюхѣ. Въ хроническихъ болѣзняхъ, появившійся жаръ въ груди, брюхѣ, въ ладоняхъ, подошвахъ послѣ обвѣда, опасенъ, означая изнурительную лихорадку. Летучій жаръ, при воспаленіи въ мозгу, опасенъ, и ничего не значитъ въ истерикѣ, при появленіи и прекращеніи мѣсячныхъ кровей. Жгучій внутренній жаръ, при наружномъ холодѣ, опасенъ; жгучій жаръ, остающійся въ рукъ человека, прикоснувшася къ горячему больному, непріятное чувство жженія, также



опасенъ; онъ замѣчается въ гнилой горячкѣ, чумѣ. Жаръ, чередующійся попеременно съ ознобомъ, при воспаленіи внутреннихъ органовъ, опасенъ: онъ означаетъ, что воспаленіе внутреннихъ переходитъ въ нагноеніе. Жаръ пріятный, влажный, благонадеженъ; но сухой, безпрестанно умножающійся, острый, жгучій, опасенъ, ибо означаетъ сильное воспаленіе важнаго органа.

Ознобъ, какъ припадокъ острой болѣзни, тѣмъ опаснѣе, чѣмъ онъ сильнѣе. Охлажденіе всего тѣла съ холоднымъ потомъ, весьма опасно: оно начинается съ рукъ и ногъ и предшествуетъ смерти. Обманчивое чувство холода, когда тѣло тепло, опасно тѣмъ, что показываетъ болѣзненное состояніе мозга. О перемежающемся, мѣстномъ, летучемъ ознобѣ и холодѣ то же разумѣется, что сказано о подобномъ жарѣ. Умѣренный, общій, теплый, пріятный потъ, съ уменьшеніемъ жара и другихъ припадковъ болѣзни, благопріятенъ: такой потъ бываетъ критическій и ему предшествуетъ зазоръ на низъ, скудное испражненіе мочи, большой пульсъ, жаръ съ дрожью и мягкость кожи, а за нимъ послѣдуетъ успокоеніе больнаго и крѣпительный сонъ; припадочный потъ не производитъ никакой переменъ въ положеніи болѣзни, которой припадки и послѣ пота продолжаются въ томъ же видѣ; такой потъ опасенъ, бываетъ сильный, непріятный, изнурительный. Мѣстный потъ на лбу, лицѣ, шеѣ, груди, когда прочее тѣло сухо — опасенъ. Слишкомъ обильный, ослабляющій, холодный, клейкій, сирадный потъ, красящій бѣлье, также неблагопріятенъ.

§ 50. Умноженное отдѣленіе мочи вообще не опасно, если только моча сильно не измѣняется. Уменьшенное отдѣленіе мочи замѣчается сначала въ горячкахъ во время жара и тоже не опасно; но малое отдѣленіе мочи въ срединѣ горячекъ показываетъ, что болѣзнь еще нескоро окончится; а если моча и совсѣмъ не отдѣляется въ почкахъ, или не испражняется изъ пузыря, то это очень опасно. Свѣтлая, обильная моча, въ водяной болѣзни благопріятна, но въ горячкахъ означаетъ, что болѣзнь еще нескоро кончится; яркочерная и обильная моча показываетъ жестокость бо-



лѣзни. Желтая моча — всегда важный припадокъ; но у стариковъ она опасна, означая важное поврежденіе внутренностей; черная или кровавая моча очень опасна; млечно-бѣлая, непрозрачная, масляная, густая моча также опасна; смрадная моча во всякомъ случаѣ есть худой знакъ; горячая, жугчая моча не опасна, но холодная смертельна. Моча съ гноемъ, съ перепонками — неблагопріятна, равно какъ и содержащая песокъ и камешки. Мочевыя сливки, мочевоы вѣпчикъ, облачко, означаютъ, что болѣзнь еще нескоро разрѣшится. Осадокъ въ мочѣ показываетъ скорое окончаніе болѣзни; но тогда онъ долженъ быть обильный, густой, непрозрачный, стѣрый, бѣлый, красный, кирпичный и собираться на дно сосуда; осадокъ зеленый, синій, темный, черныи — опасенъ. Трудное испражненіе мочи можетъ быть опасно и ничего не значить, смотря по болѣзни, отъ которой оно зависитъ; произвольное испражненіе мочи очень опасно.

§ 51. Сверхъ всего этого, на предсказаніе имѣютъ вліяніе другіе признаки: опущеніе туловища больного къ ногамъ, по законамъ тяжести; пролежни на спинѣ въ разныхъ мѣстахъ; положеніе больного на спинѣ съ раздвинутыми въ стороны ногами и руками; усиліе больного обнажить руки, ноги, грудь уже холодныя; лежать на брюхѣ, безпрестанно перемѣнять положеніе, или же совершенная неподвижность — все это очень опасныя припадки.

Слишкомъ живыя черты лица предвѣщаютъ скорый бредъ; но лицо впалое, сморщившееся въ острыхъ болѣзняхъ показываетъ близкую смерть, а въ хроническихъ — большое изнуреніе тѣла. Что сказано вообще о цвѣтѣ кожи, то разумѣть должно и о цвѣтѣ лица. Судорожное движеніе глазъ кверху (подъ лобъ), книзу, въ стороны, глаза неподвижныя, и скосившіяся — очень опасны въ острыхъ болѣзняхъ и неважны въ истерикѣ, судорогахъ. Слишкомъ выдавшіяся изъ своихъ впадинъ глаза, или очень въ нихъ погружившіяся — неблагопріятны. Неподвижность зрачка — очень опасный знакъ; слишкомъ суженный или расширенный зрачекъ въ болѣзняхъ мозга также опасенъ; тягость въ вѣкахъ, ихъ сжатіе или спаденіе — опасно; чувство сжатія въ



вискахъ, біеніе височныхъ артерій — неблагопріятно. Ограниченный румянецъ щекъ при болѣзни легкихъ, и сильное движеніе ноздрей при дыханіи — опасны. Высыпаніе на губахъ прышковъ вообще бываетъ критическое; дрожаніе, судорожное движеніе вѣкъ, губъ, также синія, черныя, морщиноватая, потрескавшіяся губы — опасны. Но самый опасный знакъ на лицѣ, появляющійся въ срединѣ или къ концу острой болѣзни, есть опухоль околоушныхъ железъ. Напряженіе брюха неблагопріятно.

Мышечная крѣпость въ горячкахъ неблагопріятна; но въ съумасшествіи, судорогахъ не такъ опасна; безсиліе мышцъ, большая слабость въ движеніи больного въ острыхъ болѣзняхъ и въ началѣ — опасны. Онѣмѣніе, параличъ какъ всего тѣла, такъ и частей его — всегда опасно и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ важнѣе онѣмѣлая часть и совершеннѣе самое онѣмѣніе до потери всякаго чувства и движенія; онѣмѣніе, развивающееся тихо, медленно, опаснѣе того, которое вдругъ произошло. Судорожное подергиваніе въ рукахъ и ногахъ, ловленіе мухъ, ощупываніе въ постели, очень опасны; другія судороги въ острыхъ болѣзняхъ — смѣхъ, плачъ, также опасны; конвульсіи у дѣтей, при прорѣзываніи зубовъ, почти всегда смертельны; менѣе опасны онѣ при глистахъ. Безчувственность до того, что больной не чувствуетъ укола его иглою, дѣйствія приложенной мушки, льда, припущенныхъ пиявицъ — очень опасно. Жгучая, внутренняя боль также опасна: за нею слѣдуетъ помертвѣніе; боль постоянная опаснѣе летучей, перемежающейся, ибо первая означаетъ воспаленіе; боль періодическая по временамъ происходящая, безпокойна, но не опасна; вообще безчувственность гораздо опаснѣе излишней чувствительности.

Значеніе боли, кромѣ ея постоянства или перемѣнчивости, много зависитъ отъ ея степени и мѣста: жестокая боль всегда опасна, но не такъ у нѣжныхъ дѣтей и у женщинъ, какъ у мужчинъ; боль опаснѣе въ брюхѣ, головѣ, чѣмъ въ груди, рукахъ, ногахъ.

Головная боль въ горячкахъ опасна тѣмъ, что угрожаетъ воспаленіемъ мозга; постоянная, ограниченная боль въ



головѣ опасна, особенно если при ней есть онемѣніе на противной сторонѣ тѣла. Упорная, сильная боль въ ушахъ угрожаетъ глухотою и воспаленіемъ мозга, но простудная боль въ ушахъ не опасна; боль въ затылкѣ довольно важна, она чаще происходитъ при почечуѣ; упорная, глубокая боль въ лопаткахъ, подъ ложечкою, въ спинѣ, если она не ревматическая и не поверхностная, то означаетъ засореніе легкихъ (бугорчатую чахотку).

Разные пороки и совершенная потеря чувствъ — зрѣнія (слѣпота), слуха (глухота), обонянія, вкуса, осязанія, появляющіеся въ разныхъ общихъ болѣзняхъ, особенно мозга и въ горячкахъ, и независяшіе собственно отъ органовъ чувствъ (глаза, уха, носа) всегда опасны. Опасно, если больной не узнаетъ своихъ родныхъ, знакомыхъ, если слѣпый и пылкій больной дѣлается робкимъ и безстрастнымъ, теряетъ надежду на выздоровленіе; бодрость духа имѣетъ сильное вліяніе на выздоровленіе тѣла. Раздражительность, нетерпѣливость, вспыльчивость у людей тихихъ и кроткихъ — неблагоприятны. Усиленная дѣятельность ума въ болѣзняхъ часто предшествуетъ смерти; потеря памяти при болѣзняхъ мозга — опасна и даже смертельна, но въ обмираніи и обморокѣ она не такъ опасна; потеря памяти въ началѣ острыхъ болѣзней очень опасна. Бредъ во всякой болѣзни есть худой знакъ; но онъ не опасенъ во снѣ у людей нѣжныхъ, молодыхъ, чувствительныхъ, у дѣтей въ началѣ болѣзни. Бредъ глубокий, непрерывный, продолжительный, буйный, мрачный, опаснѣе легкаго, по временамъ прекращающагося, тихаго, веселаго. Быстрое прекращеніе бреда, послѣ коего больной вдругъ переходитъ въ разсудокъ, означаетъ скорую смерть. Появленію бреда предшествуютъ: удивленный видъ больного, взглядъ, постоянно обращенный на одинъ какой предметъ, судорожное движеніе крыльевъ носа и губъ, притомъ сжатыхъ, упорная бессонница, безпокойство, тоска, сильная боль, круженіе головы, обманы чувствъ, сильный жаръ, крѣпкій, частый пульсъ, неутолимая жажда, напряжение подъ ложечкою и подъ ребрами, позывъ на рвоту. Тихій, покойный сонъ въ болѣзняхъ — очень благоприятенъ; но сонъ глубокий непро-



будный, безпокойный, прерывистый или непрерывный — очень опасенъ; скрежетаніе зубами во снѣ у детей означаетъ глисты, а у взрослыхъ — страданіе мозга.

## Л Е Ч Е Н І Е.

§ 52. Приступая къ леченію больного, прежде всего нужно обратить вниманіе, на приличное его «призрѣніе», о чемъ подробно сказано въ своемъ мѣстѣ. Приличное помѣщеніе больного, относительно комнаты, постели, одѣянія, прислуги, пищи, питья, въ большей части случаетъ обыкновенныхъ болѣзней, уже одно способствуетъ скорѣйшему его выздоровленію столько же, или еще и болѣе, чѣмъ самое удачное леченіе внутренними и наружными средствами. Лошадь, запряженная въ грузную телегу, выведенная на открытую дорогу, при надлежащемъ присмотрѣ со стороны извозчика, если только грузъ телеги рѣшительно не превышаетъ ея силъ, довезетъ телегу съ грузомъ по назначенію : точно такъ и цѣлительная сила наша — внутренній нашъ врачъ, Богомъ данный каждому изъ насъ лейбъ-медикъ, при надлежащемъ присмотрѣ за больнымъ, вылечить болѣзнь, если только послѣдняя не превышаетъ цѣлительной силы больного, т. е. доступна къ излеченію. Притомъ въ распознаніи болѣзни, а слѣдственно и въ ея леченіи можно ошибаться и самому опытному врачу; но приличнымъ помѣщеніемъ больного, покойнымъ его содержаніемъ, доставленіемъ ему полезнаго и удаленіемъ вреднаго, мы много способствуемъ его выздоровленію безъ всякаго леченія даже и тогда, когда мы не знаемъ его болѣзни. Посему нужно поставить правиломъ : во всѣхъ случаяхъ, гдѣ мы затрудняемся въ распознаніи болѣзни, сомнѣваемся въ ея родѣ и свойствахъ, надобно ограничить леченіе больного только приличнымъ его помѣщеніемъ и надлежащимъ за нимъ присмотромъ до тѣхъ поръ, пока мы сами, или при помощи приглашеннаго врача, не узнаемъ въ точности болѣзни, и чрезъ то не будемъ въ состояніи назначить приличное леченіе.

Вообще первое пособіе недавно занемогшему больному, хотя мы не узнали бы его болѣзни, должно состоять въ слѣдующемъ: обмыть его въ теплой ваннѣ, и потомъ надѣть на него чистое бѣлье и приличное одѣяніе, положить въ умѣренно-теплой и свѣтлой комнатѣ, на покойной постели, напоить теплымъ чаемъ обыкновеннымъ, или изъ бузины, ромашки, липоваго цвѣту, малины, или даже изъ простой (ячной) соломы; для питья, особенно при жаждѣ, безъ поноса, назначить простую воду, или съ клюквеннымъ, лимоннымъ сокомъ, кремортартаромъ, какимъ-либо сиропомъ, медомъ, или, при поносѣ, сухарную воду, слабый отваръ риса, ячныхъ, овсяныхъ крупъ, и въ разсужденіи діеты, содержанія и обращенія съ нимъ поступать какъ сказано въ отдѣлѣ: «Призрѣніе.»

Доставивъ больному необходимый пріютъ и сдѣлавъ ему общее первое пособіе, мы приступаемъ къ точнѣйшему опредѣленію болѣзни и, сообразно тому, назначаемъ опредѣлительнѣйшій способъ ея леченія:

1) Если болѣзнь острая, произошла вдругъ, выражается общими припадками лихорадки или горячки, безъ особеннаго страданія головы, груди или живота, безъ мѣстныхъ болей и другихъ признаковъ воспаленія, то по большей части бываютъ достаточны: умѣренно-прохладное содержаніе больного въ полусвѣтлой комнатѣ, душевное и тѣлесное спокойствіе, слабая, тощая, почти голодная діета, достаточное питье, ежедневно свободное испражненіе мочи и кака, произведеніе умѣренного пота посредствомъ теплаго питья на ночь въ постели, и теплаго одѣянія больного. Но когда болѣзнь острая или хроническая обозначается явными опредѣлительными припадками, тогда приступаемъ къ леченію больного соответствующими его болѣзни средствами.

Такъ-какъ здѣсь мы вездѣ говорили о болѣзни вообще, относительно ея свойства, припадковъ, причинъ, распознанія и предсказанія, вовсе не обращая вниманія на виды болѣзней въ особенности и на способы ихъ обнаруженія у людей всѣхъ половъ и возрастовъ; точно въ такомъ же смыслѣ мы изложимъ теперь и леченіе болѣзни вообще, которое въ данномъ



случаѣ легко можетъ быть примѣняемо къ каждой болѣзни и ко всякому больному.

§ 53. Мы сказали выше, что болѣзнь, относительно ея обнаруженія у больного, состоитъ или въ излишнемъ возбужденіи, умноженіи, либо въ ослабленіи, изнеможеніи дѣятельности нашего тѣла, или же въ измѣненіи его плотныхъ и жидкихъ частей; посему и леченіе, въ его общемъ очертаніи, можетъ имѣть цѣлю ослабить, умѣрить, уменьшить, либо подкрѣпить, возбудить, умножить дѣятельность больного тѣла, или же исправить и привести въ натуральное состояніе его плотныя и жидкія части. Отсюда происходятъ способы леченія: ослабляющій и укрѣпляющій. Способъ исправить и привести въ натуральное положеніе плотныя и жидкія части нашего тѣла бываетъ весьма разнообразенъ и состоитъ въ соединеніи раздѣленныхъ (при рапахъ, язвахъ, переломахъ), въ смягченіи и разрѣшеніи отвердѣвшихъ и въ укрѣпленіи слабкихъ частей тѣла, въ испражненіи разныхъ жидкостей, скопившихся въ тѣлѣ, въ исправленіи сдѣлавшихся острыми соковъ, крови, въ разжиженіи густыхъ соковъ, въ размноженіи вязкой слизи и проч. При назначеніи каждаго способа леченія нужно обращать вниманіе на припадки болѣзни, которые требуютъ и указываютъ его употребленіе, или, наіпротивъ, запрещаютъ оное. Здѣсь мы опишемъ только главные способы леченія, о другихъ же будетъ сказано при леченіи болѣзней въ особенности.

§ 54. Ослабляющій способъ леченія имѣетъ цѣлю умѣрить, ослабить слишкомъ возбужденныя движенія больного тѣла; онъ называется также и противовоспалительнымъ, потому-что возбужденныя движенія обыкновенно бываютъ при воспаленіяхъ, горячкахъ и проч. Этотъ способъ есть самый употребительный и дѣйствительный, потому-что и болѣзни, въ которыхъ онъ употребляется, встрѣчаются наичаще и излечиваются, притомъ самый способъ прямо и скоро дѣйствуетъ на мѣстопробываніе болѣзни и на все больное тѣло.

Ослабляющее, противовоспалительное леченіе можно назначить, только въ разной степени, во всѣхъ тѣхъ слу-



чаяхъ, гдѣ замѣчаются у больныхъ: красное, полное, горячее лицо, блестящіе глаза, сухость во рту, жажда, скорое, горячее дыханіе, сухая, жесткая кожа, ознобъ, а потомъ жаръ во всемъ тѣлѣ, боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, усиленное біеніе сердца, скорый, твердый, полный пульсъ, красная горячая моча, испражняемая съ жженіемъ и въ маломъ количествѣ, трудное испражненіе низомъ жесткаго кала, сильное напряженіе мышцъ, бредъ, бѣшенство.

Случаи или болѣзни, гдѣ замѣчаются подобные припадки, суть: разные горячки, воспаленія, лихорадочные приступы, острая сыпь (оспа, корь, скарлатина), ушибы, раны, передомы, вывихи, сотрясенія внутренностей, особенно мозга, бѣшеное съумасшествіе, бѣлая горячка (бредъ отъ пьянства), жестокія судороги, кровотеченія, кровавый пострѣлъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ ослабляющее леченіе должно быть тѣмъ дѣятельнѣе, чѣмъ жесточе припадки болѣзни, крѣнче тѣлосложеніе больного, недавнѣе болѣзнь и проч.

Противовоспалительныя, ослабляющія средства, наиболѣе употребительныя, суть: 1) совершенное спокойствіе вообще всего тѣла и больной его части въ особенности; 2) прохладное содержаніе больного — прохладная ванна, холодныя обмыванія тѣла; 3) воздержаніе отъ пищи; 4) простое, разводящее питье, прохлаждающія соли: селитра, кремортартаръ, слабительная горькая, англійская соль, уксуснокислый поташъ; 5) теплыя ванны, смягчительныя припарки, примочки, втиранія, клистиры; 6) холодъ и 7) общее и мѣстное кровопусканіе.

Совершенное спокойствіе душевное и тѣлесное, помѣщеніе больного въ приличной комнатѣ, полупрохладной и полутемной, спокойное содержаніе больной части тѣла, воздержаніе отъ пищи, особенно мясной, плотной, кислое, слизистое прохладное питье, — все это при всякихъ воспалительныхъ болѣзняхъ указываетъ натура сама больному, у котораго рождается отвращеніе отъ всякаго движенія, яркаго свѣта, звука, излишняго жара, твердой, мясной пищи, и напротивъ того появляется неутомимая жажда къ холодному, кислому питью. О дѣйстви и пользѣ всѣхъ сихъ средствъ въ острыхъ



болѣзняхъ сказано въ отдѣлѣ «о призрѣніи больныхъ», гдѣ также говорится о теплыхъ ваннахъ, припаркахъ, масляныхъ растираніяхъ, смягчительныхъ клистирахъ; все эти средства вообще смягчаютъ жесткія больныя части, уменьшаютъ жаръ и жажду, умиротворяютъ бѣненіе сердца, артерій и скорость дыханія, уменьшаютъ боли, производятъ испарину, свободнѣйшее отдѣленіе харкотины, испражненіе мочи, кала, и такъ успокоиваютъ больного и доставляютъ ему глубокій, тихій сонъ.

Селитра, кремортартаръ самъ по себѣ и въ смѣшеніи съ поташемъ (*tartarus tartarisatus*), бурою (*tartarus boraxatus*), горькая вода, англійская, астраханская соль, уксусокислый поташъ — дѣйствуютъ также противовоспалительно: селитра на сердце и большіе кровяные сосуды и вообще на кровообращеніе, а прочія лекарства на желудокъ, кишки, печень, почки и мочевой пузырь, способствуя скорѣйшему испражненію кала и мочи. Способъ употребленія сихъ лекарствъ изложенъ въ другомъ мѣстѣ (см. «Лекарственникъ»).

Холодъ общій и мѣстный: прохладное содержаніе больныхъ такъ, чтобы въ комнатѣ было не болѣе 10—12° Р. полезно во всѣхъ воспалительныхъ болѣзняхъ, горячкахъ и лихорадочныхъ приступахъ во время жара. Мѣстный холодъ въ видѣ холодныхъ примочекъ и обмываній тѣла изъ воды съ уксусомъ, снѣгомъ, льдомъ, изъ раствора въ водѣ селитры съ нашатыремъ, употребляется при сильномъ жарѣ и боли въ головѣ, при ушибахъ и свѣжихъ, болящихъ, кровоточивыхъ ранахъ разныхъ частей тѣла, вообще при наружныхъ болѣзняхъ; о мѣстномъ употребленіи холода и его дѣйствиіи также подробнѣе сказано въ другомъ мѣстѣ.

Но самое сильное противовоспалительное средство есть кровопусканіе, общее — изъ большой вены на рукѣ, ногѣ или на вискѣ изъ артерій, и мѣстное посредствомъ пиявицъ или рожковъ. Общее кровопусканіе дѣйствительнѣе начато, можетъ быть, при неумѣстномъ его употребленіи, и вреднѣе мѣстнаго, а потому оно должно быть производимо, гдѣ можно, по совѣту врача.

Общее кровопусканіе назначается: при воспаленіяхъ важныхъ органовъ — головы, груди и брюха, при опасныхъ —



ушибахъ и сотрясеніяхъ тѣла послѣ упаденія съ высоты, обрушенія на человѣка значительной тяжести, ударовъ и раздавленій туловища, рукъ, ногъ, при расположеніи къ пострѣлу и въ самомъ пострѣлѣ, при внезапныхъ приливахъ крови къ груди и сильной одышкѣ, къ головѣ и жестокой головной боли, у людей, привыкшихъ къ кровопусканію, крѣпкихъ, полнокровныхъ, средневозрастныхъ и пожилыхъ, при разныхъ кровотеченіяхъ, особенно кровохарканіи. Мѣстное кровопусканіе бываетъ полезно въ тѣхъ же болѣзняхъ, что и общее; но когда послѣднее уже было употреблено, или же оно не нужно, потому-что болѣзнь появилась у дитяти, слабой женщины, слабосильнаго, изнуреннаго мужчины, когда она есть мѣстная, наружная, не возбуждаетъ горячки, или же припадки послѣдней умѣренны, напр. воспаленіе глазъ, ушей, горла, недавняя ломота, болящая опухоль ногъ, рукъ и проч. Пиявицы испражняютъ болѣе крови, чѣмъ рожки, или кровососныя банки, и потому первыя чаще употребляются при началѣ сказанныхъ болѣзней, напр. при ранѣ съ ушибомъ ноги, руки, спины, припускаются пиявицы; но по заживленіи раны, при появленіи болей въ ушибенномъ мѣстѣ, при застарѣлой ломотѣ, къ больному мѣсту приставляются рожки, для уменьшенія прилива крови.

Противовоспалительный способъ леченія, особенно кровопусканіе и холодъ нужно употреблять съ осторожностію у дѣтей, слабыхъ женщинъ, истощенныхъ людей, до настоящей болѣзни страдавшихъ и теперь страдающихъ разными другими болѣзнями.

§ 55. Отвлекательный способъ, отвлекающее леченіе часто употребляется вмѣстѣ съ противовоспалительнымъ, но часто и отдѣльно; онъ имѣетъ цѣлію отвлечь отъ какой-либо важной части тѣла въ излишество прилившуюся къ ней кровь или сильное въ ней раздраженіе, къ частямъ тѣла менѣе важнымъ — наружнымъ: отъ головы и груди — къ брюху, рукамъ и ногамъ, а отъ брюха къ рукамъ и ногамъ. Отвлечение назначается при значительныхъ ушибахъ и ранахъ головы, при сотрясеніи мозга, жестокой головной боли, горячкахъ съ бредомъ, воспаленіи мозга, глазъ, горла,



грудныхъ и брюшныхъ внутренностей, при кровяномъ пострѣлѣ (ударѣ), при одышкѣ, кашлѣ, чахоткѣ, завалахъ или отвердѣніи внутренностей, при обморокѣ и разныхъ обмираніяхъ, также при скрытіи съ кожи на внутренности сывей, и при появленіи отъ того разныхъ опасныхъ припадковъ; напр., когда скарлатина бросится на мозгъ, корь на грудь и причиняють воспаленіе мозга, легкихъ. Отвлеченіе бываетъ нужно при кровотеченіяхъ и при неоявленіяхъ мѣсячныхъ кровей, привычнаго почечуя; въ послѣднихъ двухъ случаяхъ стараются привлечь кровь къ маткѣ и предматочнику и къ заднему проходу. Впрочемъ, вообще отвлеченіе бываетъ дѣйствительнѣе въ продолжительныхъ болѣзняхъ, у пожилыхъ, изнуренныхъ людей, коимъ безъ вреда нельзя пустить крови; но у лицъ раздражительныхъ, молодыхъ, въ началѣ острыхъ болѣзней отвлеченіе нужно употреблять съ осторожностію. Отвлекающія средства съ мѣстомъ ихъ приложенія суть слѣдующія :

1) Кровопусканіе общее и мѣстное : опорожняющая сосуда отъ крови, оно сильно отвлекаетъ кровь отъ внутреннихъ органовъ, заставляя ее устремляться къ опустѣвшимъ сосудамъ.

2) Разныя тренія : руками, полотенцемъ, суконкою, фланелью, сухою или окуренною смолою, намоченною спиртами, щеткою — дѣлаются для оживленія обмершихъ, въ разныхъ видахъ обмираній, въ обморокѣ, пострѣлѣ, холерѣ; растирать можно все тѣло, а болѣе виски, шею, подъ ложечкою, руки и особенно ноги; треніе нужно производить до тѣхъ поръ, пока въ кожѣ не появится жаръ, краснота и маленькая припухлость.

3) Теплота, употребляемая въ видѣ горячихъ кувшиновъ, кирпичей, прикладываемыхъ къ ногамъ, рукамъ, въ видѣ ножныхъ горячихъ ваннъ, съ золою, съ солью, горчицею; они употребляются особенно при болѣзни въ головѣ и груди для привлеченія крови къ рукамъ, ногамъ, когда руки и ноги бываютъ блѣдны и холодны. Ножныя ванны назначаются при недостаткѣ, а ручныя — при излишествѣ мѣсячнаго кровоочищенія у женщинъ; сверхъ того, ножныя ванны полезны



при боли головы, въ горлѣ и груди, при кашлѣ, насморкѣ и проч.

4) Средства, производящія красноту въ кожѣ, суть: лукъ, чеснокъ, хрѣнь, соленая селедка и особенно горчица. Первые три толченіемъ превращаются въ кашу и намазываются на холстинку; горчичный порошокъ съ уксусомъ также превращается въ кашу, которою покрывается слой кислаго тѣста, намазаннаго на холстину; всѣ эти средства, подъ именемъ горчичниковъ, прикладываются къ затылку, спинѣ, на ложечку и особенно къ рукамъ и ногамъ при болѣзняхъ головы, груди и брюха. Сюда же относится черная бургундская смола или варъ; она расплавляется и намазывается на холстину, которая, въ видѣ пластыря, кладется при кашлѣ — на грудь, при болѣзни глазъ — за уши, на затылокъ, при ревматизмѣ — на больное мѣсто. Соленая селедка разрѣзывается вдоль на двѣ половины, которыя прикладываются къ рукамъ, ногамъ; это слабое средство употребляется для дѣтей.

5. Шпанская мушка и нарывный пластырь или мазь употребляются тамъ же, гдѣ и предъидущія средства, но когда нужно произвести сильнѣе раздраженіе и отвлеченіе съ испражненіемъ соковъ. Мушка сильно притягиваетъ подъ кожу къ мѣсту, гдѣ она положена, желтоватую жидкость-сыворотку, и скоро натягиваетъ большіе пузыри, а нарывный пластырь и мазь, приготовляемые изъ рвотнаго камня, дѣйствуютъ медленно и производятъ прыщи какъ бы оспенные. Пластырь постоянно лежитъ, а мазь втирается ежедневно 1 — 2 раза въ извѣстное мѣсто, пока не появятся прыщики. Язвы послѣ мушки и прыщи послѣ нарывнаго пластыря и мази или заживляютъ при перевязкѣ ихъ спускомъ, свѣжимъ масломъ, сливками, или же ихъ поддерживаютъ въ нагноеніи, перевязывая мазью съ примѣсью къ ней мушечнаго порошка, рвотнаго камня; впрочемъ, сообразно ихъ скорости дѣйствія, шпанскія мушки чаще употребляются въ острыхъ, а рвотный камень въ продолжительныхъ болѣзняхъ. Мушка иногда сильно дѣйствуетъ на мочевые органы и причиняетъ рѣзь при испражненіи мочи или



задержаніе ея; въ такомъ случаѣ мушку нужно снять и больному дать въ питье оржатъ, молоко изъ конопляныхъ, маковыхъ сѣмянъ съ селитрою (драхму на 2 — 3 фунта) или 2 — 4 гранами камфоры. Сильныя боли, причиняемыя рвотнымъ камнемъ, прекращаются по снятіи его и по перевязкѣ прыщей масломъ, спускомъ и проч.

Сверхъ сего, для произведенія скорого и сильнаго отвлеченія, употребляютъ жаръ въ видѣ кипячей воды, и даже огонь въ видѣ каленаго желѣза, сожиганія на тѣлѣ цилиндра хлопчатой бумаги, кусочка фосфора, также заволоку, тѣдкій или адскій камень, сѣрную или другую крѣпкую кислоту; но эти средства требуютъ особенной осторожности и потому употребляются рѣдко, и то свѣдущими врачами.

§ 56. Укрѣпляющій способъ леченія, крѣпительное леченіе, противоположно леченію ослабляющему и имѣетъ цѣлю возбудить, оживить силы больного, укрѣпить ослабшее его тѣло, что, однако, сдѣлать гораздо труднѣе, нежели ослабить. Несмотря на то, что чувство слабости замѣчается почти во всѣхъ значительныхъ болѣзняхъ и на множество извѣстныхъ крѣпительныхъ, возбуждающихъ средствъ, нынѣ врачи крѣпительный способъ леченія употребляютъ очень рѣдко; 1-е потому, что, съ уничтоженіемъ болѣзни, по большей части проходитъ и слабость, и 2-е потому, что чрезвычайно трудно съ точностію назначить, въ какихъ болѣзняхъ и когда именно въ извѣстной болѣзни бываетъ полезно крѣпительное возбуждающее леченіе, которое посему или не оказываетъ никакого дѣйствія, не укрѣпляетъ больного, или же, напротивъ, причиняетъ вредъ, усиливаетъ слабость, производитъ новые припадки. При томъ, по разности причинъ (болѣзней), отъ которыхъ зависитъ чувство слабости, различныя и даже совершенно противныя способы леченія укрѣпляютъ больного, напр. слабость при воспаленіи легкихъ проходитъ отъ кровопусканія (слѣдственно отъ ослабленія больного), при горячкахъ отъ рвотныхъ, слабительныхъ, прохлаждающихъ средствъ; но слабость при обморокѣ, кровотеченіи, изнеможеніи тѣла, послѣ судорогъ, родовъ, поноса и пр. проходитъ отъ употребленія



возбуждающихъ, крѣпительныхъ средствъ, а еще болѣе хорошей пищи, оживляющаго питья, свѣжаго, чистаго воздуха. Посему при назначеніи крѣпительнаго леченія нужно быть очень осторожнымъ и не увлекаться чувствомъ слабости больного, потому болѣе, что неумѣстное укрѣпленіе можетъ еще болѣшую причинить слабость, возбудивъ новую болѣзнь (наичаще воспаленіе или горячку), для преодоленія которой потребуется новое усиліе больного, которое потомъ оставитъ послѣ себя и новую слабость.

Крѣпительный способъ леченія почти никогда не имѣетъ мѣста въ дѣйствительныхъ болѣзняхъ, какъ бы ни былъ повидимому слабъ больной, по крайней мѣрѣ; при самомъ лучшемъ соображеніи болѣзни, крѣпительныя лекарства, употребленныя даже опытнымъ и искуснымъ врачомъ, явно не производятъ ожидаемаго отъ нихъ дѣйствія, и потому новѣйшіе врачи употребляютъ сей способъ леченія не въ дѣйствительныхъ болѣзняхъ, но болѣе въ расположеніи къ болѣзнямъ; или впослѣдствіи послѣ тяжкихъ болѣзней.

Вообще крѣпительное леченіе имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ, при чувствѣ слабости, при изнеможеніи, худобѣ тѣла, нѣтъ ни боли, ни жара и жажды, ни сухости во рту, какъ-то: 1) въ расположеніи къ золотухѣ, чахоткѣ, сухоткѣ, цынгѣ, ломотѣ, въ слабости пищеваренія, обнаруживающейся нечистымъ языкомъ, сухостью и горечью во рту, отрыжкой, вѣтрами, тошнотою, тяжестью подъ ложечкою, недостаткомъ аппетита; во всѣхъ такихъ случаяхъ бываютъ полезны горькія вяжущія средства; 2) въ ослабленіи тѣла послѣ его напряженія физическаго и умственнаго; 3) въ выздоровленіи послѣ трудныхъ болѣзней — горячекъ, лихорадокъ, воспаленій, послѣ кровопусканій, кровотеченій, обширныхъ нагноеній при ранахъ, нарывахъ, послѣ продолжительнаго простаго и кроваваго поноса.

Крѣпительныя средства суть: хорошая питательная, легковаримая пища, свѣжее, здоровое питье, холодная вода, квасъ, хорошее вино, чистый, свѣжій, сельскій, горный воздухъ, солнечный свѣтъ, движеніе пѣшкомъ,



верхомъ или въ экипажѣ, ванны изъ холодной воды, купанье въ рѣкѣ, въ морѣ, употребленіе минеральныхъ железныхъ водъ, и наконецъ горькія, вяжущія собственно крѣпительныя, и ароматныя, пряныя или возбуждающія лекарства.

Собственно крѣпительныя суть тѣ лекарства, кои имѣютъ горькій или вяжущій вкусъ, содержатъ въ себѣ горькую вытяжку (*extractum amagum*), дубильное начало (*taninum*), чернильную кислоту (*acidum gallicum*); они дѣйствуютъ постоянно-продолжительно; таковыя суть: тысячелистникъ (*centavreum minus*), трилистникъ (*trifolium fibrinum*), цихорей, одуванчикъ (*taraxacum*), дымчатка (*fumaria*), корень коломбо, завязной (*rad. bistortae*), корень аира — лепешника (*calomus aromaticus*), фіалки, горечавки (*gentiana*), квассія, корка дубовая, гранатниковая (*punica granatum*), ивовая и особенно хинная, и разныя приготовленія изъ желѣза. Всѣ эти средства употребляются въ видѣ наливки или отвара, въ видѣ настойки на виноградномъ винѣ, водкѣ или спиртѣ, вытяжки въ пилюляхъ подъ разными названіями: желудочныхъ капель, пилюль, настоекъ и пр. Если одно или нѣсколько изъ сихъ средствъ назначены правильно, то у больного, при ихъ употребленіи, появляется аппетитъ, поправляется вкусъ, замѣчается чувство пріятнаго жара или холода въ желудкѣ, проходятъ вѣтры, тошнота, отрыжка, восстанавливается правильное испражненіе низомъ, мутная моча дѣлается прозрачною и свѣтлою, исчезаетъ чувство слабости и усталости, появляется крѣпость, полнота и твердость тѣла, румянецъ въ лицѣ, живость въ глазахъ и проч., Но если крѣпительныя средства не имѣютъ мѣста, то, при ихъ употребленіи, состояніе больного дѣлается хуже, прежніе припадки болѣзни усиливаются, къ нимъ присоединяются еще новыя, — жаръ, жажда, сухость во рту, давленіе въ животѣ, слабость, похудѣніе, скорая усталость при движеніи и проч.

Крѣпительныя ароматныя, возбуждающія средства суть всѣ тѣ, которыя имѣютъ пряный, острый вкусъ



и ароматный запахъ; возбуждающее дѣйствіе ихъ не продолжительно и зависитъ отъ содержащагося въ нихъ эфирнаго, летучаго масла, смолы и камеди-смолы; эти средства суть: мята, мелисса, розмаринъ, шалфей, иссопъ, лаванда, богородицкая трава (*thymus*), бѣлая шандра, ромашка, чернобыльникъ простой (*artemisia vulgaris*) и противоглистный (*artemisia contra*), пишма (*tanacetum*), полынь, дягиль (*angelica*), змѣевикъ (*serpentaria*), укропъ, анисъ, хрѣнъ, горчица, крессалать, лукъ, чеснокъ, корица, лавръ, мускатъ, ваниль, инбирь, перецъ, гвоздика, цвѣты и корки померанца, камфора, смола — дурной духъ, гальбанъ, аммоніакъ, мирра, росной и простой ладанъ, бальзамъ мекскій, капаевъ, перувіанскій, скипидаръ, касторей (бобровая струя), мускусъ, амбра, амміакъ, съра и ея составы, виноградное вино, водка, спиртъ, сѣрный и другіе эиры. Всѣ эти средства употребляются внутрь и снаружи въ видѣ наливокъ, настоевъ, капель, спиртовъ, укуса для растиранія, нюханья и пр.

Если постоянно-крѣпительныя средства дѣйствуютъ наиболее на органы пищеваренія, питаніе и отдѣленіе, то летучія возбуждающія лекарства обнаруживаютъ силу свою болѣе на кровяные сосуды, сердце, кровообращеніе и мозгъ; данныя слишкомъ въ большомъ количествѣ, они дѣйствуютъ гораздо вреднѣе, чѣмъ постояннокрѣпительныя, производятъ горячку, воспаленіе и даже припадки отравленія; притомъ они напрягаютъ дѣятельность, послѣ чего въ тѣлѣ остается еще болѣшая слабость: они то для больного тѣла, что кнутъ для усталой лошади, получающей свою силу послѣ отдохновенія и накормленія, которыя въ дѣйствіи сходятся съ крѣпительными средствами. Крѣпительныя средства употребляются продолжительно (мѣсяцы и годы) и въ рѣдкихъ промежуткахъ времени (2 — 3 раза въ сутки), а возбуждающія даются часто (чрезъ 10 — 15 — 30 — 60 минутъ и въ теченіе 1 — 3 дней, рѣдко далѣе. Весьма полезно соединять вмѣстѣ крѣпительныя и возбуждающія средства.

Вообще, однако, при назначеніи крѣпительнаго леченія и



выборъ крѣпительныхъ средствъ, нужно прежде посоветоваться съ врачомъ. (См. въ «Лекарственникъ» крѣпительныя и возбуждающія лекарства).

§ 57. Потогонный способъ, потогонное лечение имѣетъ цѣлю возбудить сильную испарину, или и проливной потъ. Потогонное лечение бываетъ нужно въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь произошла отъ оставленія испарины въ кожѣ, отъ недостаточнаго притеченія крови къ кожѣ и пр. Такія болѣзни суть: разнаго рода простуда, насморкъ, кашель, охриплость голоса, простудная, ревматическая лихорадка, боль въ горлѣ, ломота, простой и кровавый поносъ, холера, разныя сыпи на кожѣ, водяная, любострастная болѣзнь, отѣкъ. Потогонное лечение не имѣетъ мѣста при сильномъ жарѣ въ тѣлѣ и при значительномъ воспаленіи.

Средства, привлекающія кровь къ кожѣ и производящія испарину, суть: разныя растиранія тѣла, уже упомянутыя выше, теплая комната, плотное укутываніе больного въ шерстяныя одѣяла (пеленаніе), или покрытіе его тулупами, шубами, перинами, ваточными одѣялами, движеніе, механическая работа, теплыя ванны, паровыя бани и ванны, теплыя припарки, теплый чай, приготовляемый изъ бузиновыхъ, липовыхъ цвѣтовъ, ромашки, сушеной ягоды малины; для усиленія испарины къ сему чаю прибавляется 1 — 2 грана камфоры, 1 — 2 ложки миндерерного спирта. Возбуждая кровообращеніе, производятъ потъ: обыкновенный чай съ ромомъ, пуншъ, грогъ, глинтвейнъ (Glühwein). Потогонное лечение, кромѣ водяной и любострастной болѣзни, также застарѣлаго ревматизма, бываетъ непродолжительное, и вообще достаточно произвести 2 — 3 раза испарину по всему тѣлу, но въ послѣднихъ трехъ болѣзняхъ и продолжительныхъ сыпяхъ употребляются долго: сассапарель, баккаутъ, сассафрасъ, палсѣнь сладко-горькій, корень фіалки, мыльная трава, сѣра, сѣрные ванны и куренія; эти потогонныя средства, въ отварѣ, употребляются очень долго въ лѣтнее время и весною 14 — 6 — 8 недѣль; ихъ дѣйствіе поддерживается движеніемъ на воздухѣ.

Вообще потогонный способъ леченія есть самый употре-



бительный, особенно въ холодныхъ странахъ и въ холодное время, когда бѣольшая часть болѣзней зависитъ отъ простуды—остановленія испарины въ кожѣ, — и скорѣе всего разрѣшается потомъ; притомъ очень многія болѣзни, какъ острыя, такъ и хроническія, наичаще благополучно оканчиваются переломомъ чрезъ потъ; такъ, кромѣ простудныхъ болѣзней, потогонное лекарство можетъ быть полезно въ падучей болѣзни, пляскѣ св. Витта, истерикѣ, ипохондріи, столбнякѣ, разныхъ нервныхъ боляхъ (лица, зубовъ), въ началѣ воспаленія въ горлѣ (жаба), грудяхъ, заразительныхъ болѣзней (корь, оспа, скарлатина).

Потогонныя лекарства, по ихъ дѣйствию, врачи раздѣляютъ на горячительныя и прохлаждающія. Горячительныя потогонныя средства суть: спиртъ, ромъ, водка и приготовленныя съ ними лекарства, также лекарства бальзамическія, смолистыя, ароматныя, сѣра, ѣдкій амміакъ камфора. Эти лекарства могутъ быть употребляемы для произведенія пота только тогда, когда у больного нѣтъ ни жара, ни жажды и никакого мѣстнаго воспаленія. Прохлаждающія потогонныя лекарства бузина, малина, хина, сурьмяное вино, миндереровъ спиртъ и проч.; эти лекарства полезны въ началѣ простудныхъ болѣзней, при жарѣ, жадѣ и боли.

Такъ-какъ произведеніе пота зависитъ отъ дѣйствій цѣлительной силы нашего тѣла, внутренняго нашего врача, то нерѣдко случается, что и вовсе непотогонное лекарство производитъ сильнѣйшій потъ, который разомъ разрываетъ опасную болѣзнь, прерываетъ ее вначалѣ. Поэтому усиленную испарину можно произвести различно: 1) удаленіемъ механическихъ препятствій, затворяющихъ отверстія въ кожѣ, какъ-то нечистоты, грязи, жесткости, судорогъ кожи; эта причина недостаточнаго испаренія кожи наичаще бываетъ у чернорабочихъ, крестьянъ, ремесленниковъ. Здѣсь полезны: баня, теплыя ванны, омовеніе тѣла теплою водою съ мыломъ, натираніе жесткой кожи саломъ, масломъ, жиромъ, и чай изъ ароматныхъ травъ. 2) Уменьшеніемъ раздраженія въ тѣлѣ; эта причина остановленія испарины въ кожѣ бы-



ваетъ при разныхъ лихорадкахъ и горячкахъ, при острыхъ сыпяхъ (кори, и пр.) и мѣстныхъ воспаленіяхъ; здѣсь производятъ потъ: кровопусканіе, селитра, теплое, водянистое кислое питье, т. е. почти всѣ противовоспалительныя средства и даже холодъ, непродолжительно употребленный.

3) Умноженіемъ раздраженія въ тѣлѣ, т. е. усиленнымъ кровообращеніемъ и приливомъ крови къ кожѣ; въ болѣзняхъ продолжительныхъ, простудныхъ при отсутствіи лихорадки; здѣсь употребляются горячительныя и охлаждающія потогонныя средства, продолжительно въ видѣ кровочистительныхъ отваровъ, эссенцій, капель, сѣрныхъ ваннъ и пр. напр. отваръ Цитмана, помлини, эссенція, сиропъ или рообъ, сассапареля, вино осенняго цвѣта (*vinum colchici*) и пр.

§ 58. Рвотный способъ леченія состоитъ въ возбужденіи рвоты; это есть одно изъ сильнѣйшихъ средствъ произвести въ тѣлѣ больного быструю и рѣшительную перемѣну — спасти его отъ смерти или ускорить несчастное окончаніе болѣзни. Рвота, какъ сказано выше (см. Припадки), производится сжатіемъ желудка и его противочервообразнымъ движеніемъ (\*), направленнымъ кверху; этому движенію желудка содѣйствуютъ грудобрюшная преграда (перепонка мясистая, въ видѣ свода отдѣляющая грудь отъ брюха) и брюшныя мышцы, которыя, при рвотѣ, явно сжимаютъ брюхо кверху. Такое движеніе желудка переходитъ въ пищевое горло и глотку и на пути своемъ сообщаетъ легкимъ, дыхательному горлу и гортани и чрезъ то не только извергаетъ содержащееся въ желудкѣ, но и слизь, гной изъ легкихъ,

---

(\*) Волокны мышечныхъ оболочекъ, желудка и кишокъ, для прогона содержащихся въ нихъ пищи, питья, лекарства и пр., сжимаются и потомъ расширяются, и такъ производятъ движеніе, похожее на ползущаго червячка, а потому и названы червообразными. Это движеніе въ натуральномъ его состояніи происходитъ сверху внизъ, отъ желудка къ заднему проходу; но въ болѣзняхъ оно идетъ снизу вверхъ, отъ кишокъ къ желудку, отъ желудка въ пищевое горло и такъ производитъ рвоту, извергая чрезъ ротъ пищу, питье и пр.



гортани. Послѣдствіемъ рвоты бываетъ умноженіе отдѣленій слюны, желудочнаго сока, желчи и слизи въ легкихъ и потрясеніе всего тѣла, особенно брюшныхъ внутренностей. Тошнота и грызущее чувство подъ ложечкою предъ и послѣ рвоты, общее ослабленіе тѣла, горячительное дѣйствіе рвоты, доказываютъ, что рвотное сильно дѣйствуетъ на мозгъ и нервы, ихъ возбуждаетъ, расслабляетъ и успокоиваетъ.

Искусственная рвота производится или для испражненія изъ желудка разныхъ нечистотъ и вредностей, или для потрясенія тѣла больного съ цѣлю чрезъ потрясеніе произвести въ тѣлѣ спасительныя перемены. Рвота съ первою цѣлю изначается: при обремененіи желудка пищею испорченною, трудноваримою, при накопленіи въ желудкѣ нечистотъ — остатковъ отъ пищи, слизи, желчи и при зависящихъ отъ того: нечистотъ языка, горечи во рту, потери аппетита, тошнотъ и позывъ на рвоту, отрыжкѣ гнилыми яицами, тяжести и давленіи подъ ложечкою, произвольной рвотѣ. Со второю цѣлю рвотное можетъ быть назначено только врачемъ. Посему рвотное дается: при легкомъ воспаленіи горла, въ кашлѣ простудномъ, при трудномъ отдѣленіи харкотины, въ разстройствѣ пищеваренія, въ началѣ желудочной, желчной, перемежающейся лихорадки, кори, оспы, скарлатины, коклюша, при отравленіи свинцомъ, опіемъ, бѣшеною, табакомъ (чрезъ излишнее его куреніе), красавицею, дурманомъ и вообще наркотическими ядами, также пришедшимъ въ память послѣ угара, безчувственно-пьянымъ; далѣе, рвотное даютъ: въ брюшной водянкѣ, глистахъ, завалѣ печени, маіи, меланхоліи, параличѣ, въ пострѣлѣ отъ объяденія (послѣ кровопусканія, отвердѣніи железъ, яичекъ, для удаленія постороннихъ тѣлъ, засѣвшихъ въ пищевомъ, дыхательномъ горлѣ, въ припадкѣ истерики, ипохондріи (рвотное изъ ипекакуаны).

Рвота можетъ быть вредна при воспаленіи въ брюхѣ, беременности, грыжѣ простой и ущемленной, запорѣ, при расположеніи къ приливамъ крови къ головѣ, къ пострѣлу, кровохарканію, при расширеніи сердца, большихъ артерій,



одышкѣ, выпаденіи прямой кишки, матки, большой слабости.

Искусственная рвота производится питьемъ теплой воды въ большомъ количествѣ, введеніемъ пальцевъ въ ротъ до глотки и щекотаніемъ язычка и нѣбной занавѣски; върнѣе же и скорѣе рвотнымъ камнемъ и корнемъ ипекакуаны; эти средства даются вмѣстѣ или порознь въ порошокъ и въ растворѣ; для взрослыхъ върное рвотное составляется изъ одного грана рвотнаго камня и 20 гранъ ипекакуаны въ порошокъ, который дается разомъ; для дѣтей и слабыхъ людей дается растворъ рвотнаго камня, полагая гранъ его на каждую унцію воды, которая и дается взрослымъ по столовой, а дѣтямъ по чайной ложкѣ чрезъ 5 — 10 — 15 минутъ до произведенія тошноты, при появленіи которой (но не прежде, дабы не разжидить рвотнаго и не ослабить его силы) больному даютъ пить теплую воду по чашкѣ или стакану, и прекращаютъ приемы рвотнаго. Вообще бываетъ достаточно, если больного вырветъ 3 — 4 раза. Рвотою извергается слизь, испорченная, несварившаяся пища, желтая, зеленая, черная горькая желчь, яды и даже глисты. Послѣ рвоты, произведенной правильно, больной скоро получаетъ облегченіе въ своей болѣзни и успокоивается. Въ теченіе 2 — 3 часовъ послѣ рвоты больному не надобно давать ничего ни пить, ни ѣсть, особенно твердаго.

Сверхъ того, объ употребленіи рвотнаго нужно замѣтить слѣдующее: когда нужно скоро произвести рвоту, какъ-то при отравленіи одуряющими ядами, ядовитыми грибами, то надобно давать рвотное изъ бѣлаго купороса (сѣрнокислый цинкъ, *sulphus zinci*) 15 — 20 гранъ. Если рвота происходитъ трудно, что чаще всего зависитъ отъ судорогъ въ желудкѣ и пищевомъ горлѣ, то больному можно дать чашку чаю изъ мяты, ромашки съ гофманскими каплями. Но если рвота очень сильна, то нужно дать больному теплаго ячнаго отвара, чрезъ  $\frac{1}{4}$  часа шипучій порошокъ (виннокислая кислота съ двууглекислымъ поташемъ), или на сторону желудка положить суконку, намоченную въ теплой наливкѣ ромашки съ виномъ; если же рвотное состояло изъ рвотнаго камня, то скоро по-



могаетъ отваръ хины, дубовой коры, данный внутрь чрезъ  $\frac{1}{4}$  часа по ложкѣ. Сильную рвоту еще можно остановить, обвивъ вокругъ шеи полотенце, намоченное въ холодной водѣ. У нѣжныхъ, слабыхъ особъ, женщинъ, дѣтей, рвота происходитъ легче и скорѣе, чѣмъ у тучныхъ, полнокровныхъ, крѣпкихъ людей, мужчинъ, стариковъ. При поносѣ рвоту производить рвотнымъ корнемъ, а при рѣдкомъ испражненіи на низъ и запорѣ, рвотнымъ камнемъ. Если послѣ рвоты больной чувствуетъ себя очень слабымъ, то онъ скоро оправляется отъ чашки горячаго чернаго кофія, который притомъ производитъ и потъ. Если дано рвотное въ простудной болѣзни, то больной, хорошо покрытый для усиленія испарины, послѣ рвоты долженъ остаться 2 — 3 часа въ постели. При недостаткѣ рвотнаго лекарства, рвоту можно произвести еще, выпивъ два-три стакана теплой воды простой съ солью, промзглымъ кореньемъ, коноплянымъ, льнянымъ масломъ.

§ 59. Слабительный способъ леченія имѣетъ цѣлію испражнить нечистоты изъ кишекъ, особенно толстыхъ или же излишніе соки изъ тѣла; онъ употребляется очень часто и нерѣдко во з.ю. Такъ-какъ рвотное дѣйствуетъ довольно мучительно и продолжительно, то больные, вмѣсто его, охотнѣе принимаютъ слабительное, которое, при частомъ его употребленіи, расслабляетъ кишки, для возбужденія коихъ къ испражненію нечистотъ, нужно давать слабительное чаще и въ большихъ приѣмахъ, и это усиленіе приѣмовъ восходитъ иногда до того, что самыя крѣпкія слабительныя средства уже не дѣйствуютъ вовсе; такіе люди говорятъ, что у нихъ крѣпкая натура, между-тѣмъ-какъ она у нихъ въ высшей степени ослаблена и, для возбужденія къ дѣйствию, требуетъ сильныхъ побужденій, подобно изнуренной лошади, которая только послѣ сильныхъ ударовъ съ трудомъ двинется съ мѣста и то медленно. Это ослабленіе кишекъ замѣчается у пожилыхъ людей, обыкновенно подверженныхъ упорнымъ запорамъ на-низъ. Посему въ употребленіи слабительныхъ нужно быть очень осторожнымъ, если мы не хотимъ под старость терпѣть множество припадковъ отъ запора на-низъ. Слабительный способъ леченія называется при нахожде-



ни нечистотъ въ кишкахъ, при запоръ на-низъ, при тягости въ нижней части живота, урчаніи въ брюхъ, ломъ и боли въ поясницѣ, для отвлеченія соковъ отъ верхнихъ частей тѣла. Такіе случаи бываютъ: въ продолженіе желудочныхъ, желчныхъ, перемежающихся лихорадокъ, послѣ обремененія желудка пищею, при почечуиномъ расположеніи, при глистахъ и накопленіи слизи въ кишкахъ, желчи въ желтухъ, при водяной болѣзни въ брюхъ, истерикъ, ипохондріи съ запоромъ, умопомѣшательствъ, завалъ брюшныхъ внутренностей, при боли въ горлѣ, кашлѣ, воспаленіи глазъ, головной боли, при расположеніи къ пострѣлу и въ самомъ пострѣлѣ, при значительныхъ поврежденіяхъ головы — ушибъ, ранахъ, сотрясеніяхъ мозга и проч. Въ послѣднихъ случаяхъ слабительное дается для отвлеченія отъ головы крови и соковъ.

Слабительныя средства суть двоякія: собственно слабительныя и проносныя; первыя дѣйствуютъ слабо и прохлаждаютъ, а послѣднія — сильно и горячатъ. Слабительныя суть: магнезія, кремортартаръ, англійская, астраханская, сибирская соли, сѣрноокислая магнезія, горькая Глауберова соль (сѣрноокислая сода), манна, тамариндъ, черносливъ, александрійскій листъ, ревень, касторовое (клещевинное), льняное, конопляное, деревянное масло; эти средства, по слабому ихъ дѣйствию, даются въ большихъ приемахъ: дѣтямъ по 1 — 2 чайныхъ, а взрослымъ по столько же столовыхъ ложекъ; соли даются наичаще при жарѣ въ тѣлѣ, масло при боли въ животѣ, ревень въ порошокъ и наливкѣ, а листъ александрійскій въ наливкѣ. Проносныя суть: сладкая ртуть, сабуръ, ялаппа, сѣра, гутовая камедь, колоцинтъ, скаммоній; эти средства дѣйствуютъ въ малыхъ приемахъ сильно (кромѣ сѣры) и производятъ боли въ животѣ и болезненное испражненіе низомъ; ихъ можетъ назначать только врачъ. Въ день приема слабительнаго не нужно употреблять твердой пищи. Растираніе живота руками ускоряетъ дѣйствіе слабительнаго. Холодная вода, особенно съ поваренной солью, также морская вода, горькая вода, сыворотка, огуречный разсолъ также слабятъ легко и не разгорячая.



§ 60. Мочегонный способъ леченія имѣетъ цѣлю умножить отдѣленіе и испражненіе мочи; онъ назначается при недостаточномъ испражненіи мочи, при накопленіи водянистой жидкости въ тѣлѣ, при воспалинной испаринѣ, а потому употребляется : 1) въ мочевыхъ камняхъ и пескѣ, для удобнѣйшаго ихъ растворенія въ большомъ количествѣ мочи. 2) При водяной болѣзни въ груди и особенно въ брюхѣ, подѣ кожею и при отека ногъ; 3) при разныхъ сыпяхъ на кожѣ — лишаяхъ, часоткѣ, молочномъ струпѣ, послѣ скарлатины, рожи, кори; въ послѣднихъ трехъ болѣзняхъ мочегонныя средства даются поочередно съ слабительными.

Употребительнѣйшія мочегонныя средства суть : морошка, пуншъ съ лимоннымъ сокомъ, арбузы, кремортартаръ, бура, селитра въ большихъ приѣмахъ по 2 — 4 драхмы въ сутки, трехцвѣтная фіалка (*viola tricolor*, hb. jaseae въ молочномъ струпѣ), наперсточная трава (*digitalis purpurea* по грану на приѣмъ 3 — 4 раза въ день), жаренія, толченія можжевеловыя ягоды, скипидаръ, копаевъ бальзамъ, сосновыя шишки, минеральныя углекислыя щелочныя воды. Средства сіи употребляютъ то одни (воды минеральныя), то въ смѣшеніи съ другими, въ порошокъ, отваръ, наливкѣ, въ коноплянномъ, льняномъ и миндальномъ молокѣ. Сильныя мочегонныя средства : шпанскія мушки, морской лукъ, янтарное, можжевеловое масло (*ol. sabinae*) можетъ прописывать только врачъ. Поддерживаютъ дѣйствіе мочегонныхъ средствъ и сами гонятъ мочу домашнія средства : обильное питье теплой и холодной воды, чай съ ромомъ, водкою, виномъ, вода съ уксусомъ и вообще кислое питье, петрушка, спаржа, лимоны, рѣжуха трава, трава ложечная, лукъ, чеснокъ.

Всѣ эти способы леченія на самомъ дѣлѣ рѣдко употребляются отдѣльно; но въ теченіе одной и той же болѣзни, по мѣрѣ измѣненія ея припадковъ, бываетъ нужно давать больному рвотное, слабительное, потогонное или другое какое лекарство.

§ 61. При леченіи больного нужно обращать особенное вниманіе на припадки, уже находящіеся и вновь появляющіеся;



это леченіе называется припадочнымъ и въ его составъ входятъ все другія леченія. Хотя всякій припадокъ зависитъ отъ самой болѣзни, и потому проходитъ съ излеченіемъ болѣзни, однако нѣкоторые припадки требуютъ особеннаго ихъ уваженія и скорѣйшаго прекращенія, иначе они усилятъ самую болѣзнь; притомъ въ тѣхъ случаяхъ (къ сожалѣнію очень частыхъ на дѣлѣ), когда мы не узнали болѣзни, а потому и не можемъ направить противъ нея леченія, — мы замѣчаемъ тотъ, другой ея припадокъ, употребляемъ противъ его приличное средство и такъ ослабляемъ, умѣряемъ, излечиваемъ болѣзнь, подобно полководцу, одерживающему побѣду, разбивая непріятеля не разомъ, а по частямъ — партіямъ, отрядамъ. Здѣсь мы рассмотримъ въ лечебномъ отношеніи только важнѣйшіе припадки.

1) Голодъ въ болѣзняхъ появляется рѣдко и то у беременныхъ, съумасшедшихъ и выздоравливающихъ. Удовлетворять его нужно съ осторожностію, давая больнымъ ѣсть часто, но понемногу, легковаримой пищи; при недостаткѣ аппетита, отнюдь не должно принуждать больного ѣсть пищу. За больнымъ съ превратнымъ аппетитомъ къ неядомымъ вещамъ (глинѣ, землѣ, углю, сырому мясу и проч.) нужно имѣть строгій надзоръ.

2) Жажда есть обыкновенный спутникъ всехъ острыхъ и многихъ хроническихъ болѣзней; ее можно всегда удовлетворять, позволяя больному пить часто, и понемногу, или давая ему сосать сочные плоды — кусокъ лимона, апельсина, винограда, клюкву, смородину и проч.

3) Нечистота и сухость губъ, десенъ, зубовъ, языка, замѣчаемая въ горячкахъ, требуютъ омовенія сихъ частей водою, съ уксусомъ, виномъ и частаго ихъ обтиранія полотенцемъ.

4) Рвота, какъ слѣдствіе обремененія желудка пищею, питьемъ, желудочныхъ нечистотъ, проходитъ отъ воздержанія. Здѣсь же полезны: углекислая вода, шипучіе порошки (лимонная кислота съ углекислымъ поташемъ), Риверіево питье. Для изверженія нечистотъ, нужно дать рвотное; рвота съ сильной болью подъ ложечкою, жаромъ въ тѣлѣ и проч.,



вѣроятно, зависитъ отъ воспаления желудка и требуетъ противовоспалительнаго леченія. Рвота отъ поврежденія желудка при ранѣ его, отвердѣніи, размягченіи, ракъ, успокаивается слизистымъ питьемъ, коноплянымъ, миндальнымъ молокомъ, а часто требуетъ употребленія опиѣ; ко всемъ больнымъ съ упорною рвотою нужно приглашать врача.

5) Запоръ на-низъ, подобно рвотѣ, зависитъ отъ различныхъ причинъ и требуетъ различнаго леченія: вправленія грыжи, леченія воспаления кишекъ, возвращенія въ брюхо выпавшей прямой кишки, разрѣшенія ея опухолей, почечуи, шиповъ, размягченія кусковъ отвердѣлаго кала. Во всехъ этихъ случаяхъ, равно при беременности, запоръ нужно уничтожать растираніемъ живота масломъ, повторительными, смягчительными клистирами, впусценіемъ въ проходъ куска мыла, сальной свѣчи, слабительнымъ; эти средства назначаются и въ запоръ пожилыхъ людей, какъ слѣдствія слабости и бездѣйствія кишекъ.

6) Поносъ также бываетъ припадкомъ различныхъ болѣзней и, сообразно имъ, требуетъ различнаго леченія; поноса отъ неводержности, несваренія пищи, останавливать не должно; поносъ отъ поврежденія, ранъ, язвъ, отвердѣнія кишекъ, печени, поносъ критическій, изнурительный, самостоятельный, простой и кровавый — требуетъ разнообразнаго леченія. То же разумѣется о рѣзѣ и коликахъ, въ трахѣ въ животѣ, о наружномъ испражненіи на-низъ. Въ брюшныхъ болѣзняхъ болѣе нежели гдѣ-либо нужно помнить правило, что припадки проходятъ съ леченіемъ болѣзни и съ удаленіемъ ея причинъ, а потому распознаваніе болѣзни должно быть основаніемъ ея леченія.

§ 62. Пульсъ крѣпкій, частый или скорый, полный, большой, твердый, правильный, ровный, обыкновенно требуетъ противовоспалительнаго ослабляющаго леченія; но слабый, скорый или медленный, мягкій, малый, неправильный, перемежающійся, означаетъ слабость, изнеможеніе больного, и потому указываетъ на крѣпительное, возбуждающее леченіе. Вообще надобно замѣтить, что пульсъ есть вѣрный, а часто единственный припадокъ, на которомъ съ вѣр-



ностию можно назначить приличное леченіе, особенно ослабляющее или крѣпительное.

Кровь густая, скоро створаживающаяся, дающая много творогу и мало сыворотки, покрывающаяся плотною, жирною, желтоватою пленкою, назначаетъ также прохладжающее, ослабляющее леченіе. Усиленное, неправильное біеніе сердца бываетъ припадкомъ множества болѣзней, которыхъ часто не можетъ распознать и опытный врачъ; впрочемъ, сильное, правильное біеніе сердца, съ крѣпкимъ пульсомъ, требуетъ противовоспалительнаго леченія и особенно продолжительнаго употребленія наперсточной травы (1 гр.) съ селитрою (7 — 15 гранъ на приемъ).

Болѣзненное дыханіе, какъ и біеніе сердца, бываетъ также припадкомъ множества болѣзней: воспаленія мозга, подреберной плевы легкихъ и сердца, расширенія главной артеріи и сердца, бугорковъ и чахотки легкихъ, грудной и брюшной водяной болѣзни, заваловъ брюшныхъ внутренностей, пострѣла, соединяемое съ болью, тяжестью, сухимъ и мокрымъ кашлемъ, извергающимъ мокроту бѣлую, желтую, зеленую, кровавую, вонючую и пр.; во всѣхъ этихъ болѣзняхъ дыханіе можетъ быть скорымъ, медленнымъ, малымъ, большимъ, горячимъ, холоднымъ, правильнымъ, прерывистымъ, тихимъ, шумнымъ, свистящимъ, хрипящимъ, храпящимъ, и, сообразно тому, потребовать противовоспалительныхъ, разрѣшающихъ, отвлекающихъ, рвотныхъ, слабительныхъ, мочегонныхъ средствъ.

Жаръ въ тѣлѣ, сухость кожи, требуютъ прохладжающихъ средствъ—селитры, холоднаго, кислаго, обильнаго питья, прохладной комнаты, холодныхъ ваннъ, обмываній, примочекъ; противное леченіе назначается при общемъ или мѣстномъ охлажденіи тѣла: теплое ароматное питье, теплое содержаніе больного, нагрѣваніе рукъ, ногъ, растираніе тѣла, парка, теплыя ванны и проч. Жаръ и холодъ въ перемежающейся лихорадкѣ требуютъ особеннаго леченія. Сухая, теплая, мокрая (потѣющая) кожа не требуетъ особеннаго леченія, кромѣ леченія болѣзни, отъ которой она зависитъ.

§ 63. Умноженное отдѣленіе сыворотки и за-

висящіе отъ него отѣки ногъ, водяная болѣзнь, требуютъ усиленнаго испражненія мочи, низомъ, умноженной испарины, мочегонными, слабительными, потогонными средствами. Умноженное слезотеченіе проходитъ отъ леченія главной болѣзни — воспаленія глазъ и пр. Слинотеченіе чаще зависитъ отъ употребленія ртути, которое въ такомъ случаѣ нужно прекратить, а больному дать теплое, смягчительное (отваръ льняныхъ сѣмянъ съ медомъ), а потомъ крѣпительное (отваръ дубовой коры съ квасцами) полосканье, слабительное, сажать его въ сѣрную ванну. Слинотеченіе, какъ припадокъ болѣзни рта, опухоли щекъ, десенъ, языка, железъ, — проходитъ отъ леченія его болѣзни. Недостатокъ слюны и сухость во рту легко уничтожаются достаточнымъ питьемъ. Умноженное отдѣленіе и испражненіе мочи (изнурительное мочетеченіе) требуетъ особеннаго леченія; но такое же испражненіе мочи въ водяной болѣзни нужно поддерживать мочегоннымъ способомъ леченія. Уменьшенное отдѣленіе мочи, какъ припадокъ горячекъ, лихорадокъ, воспаленій, требуетъ противовоспалительнаго леченія, обильнаго питья; это же разумется о мочѣ блѣдной, свѣтлой, и еще болѣе о мочѣ красной, остропахучей. Моча темная, кровавая, черная, вонючая, зависитъ отъ разныхъ общихъ и мочевого пузыря болѣзней, и не требуетъ особеннаго леченія. Моча горячая бываетъ вмѣстѣ и красная, а моча холодная есть предвѣстникъ смерти. Моча съ пескомъ и мочевыми камнями требуетъ особеннаго леченія растительной пиши. Пленка на поверхности мочи, мочевого сливки, облачко, мочевого осадокъ, проходятъ вмѣстѣ съ главною болѣзнію. Трудное испражненіе мочи, рѣзь, задержаніе и недержаніе мочи требуютъ различнаго леченія, смотря по болѣзнямъ, отъ которыхъ онѣ зависятъ.

§ 64. Леченіе по припадкамъ, зависящимъ отъ органовъ чувствъ и страданія нервовъ, рѣдко имѣетъ мѣсто. Явственно-одутлое лице, при расположеніи къ пострѣлу или даже при одномъ полнокровіи, временномъ обморокѣ, круженіи головы — требуетъ кровопусканія, тощей діеты, слабительнаго; худое, впалое лице не требуетъ особаго



лечения; краснота глазъ требуетъ противовоспалительнаго леченія мѣстнаго или общаго; сжатіе и расширеніе зрачка, смотря по тому, суть ли они болѣзни глазъ, или припадки страданія мозга, брюха, требуютъ различнаго леченія. Чувство сжатія въ вискахъ, затылкѣ, постоянное, сильное бѣшеніе височныхъ, шейныхъ артерій, указываетъ на противовоспалительное леченіе.

§ 65. Необыкновенная сила мышцъ въ горячкахъ, воспаленіи мозга, въ судорогахъ, равно какъ и большая слабость въ началѣ нѣкоторыхъ болѣзней, не указываютъ ни на какое особенное леченіе, кромѣ леченія главныхъ болѣзней; то же разумѣется о сильномъ крикѣ и слабомъ голосѣ, появляющемся въ началѣ острыхъ болѣзней, также въ истерикѣ, бѣшенствѣ и пр.; онъ проходитъ съ излеченіемъ главной болѣзни. Слабый голосъ въ началѣ острыхъ болѣзней отнюдь не означаетъ и общей слабости; но слабый голосъ, появляющійся въ срединѣ и подъ конецъ острыхъ болѣзней, также въ продолжительныхъ болѣзняхъ — чахоткѣ, грудной водяной и пр., показываетъ общую слабость тѣла. Измѣненіе тоновъ и потеря голоса и самой рѣчи зависятъ отъ многихъ болѣзней и не указываютъ на особенное леченіе.

§ 66. Немного болѣзней встрѣчается, въ которыхъ не было бы никакой боли, но требуетъ особеннаго леченія: 1) Боль воспалительная, усиливающаяся отъ давленія болящаго мѣста; она появляется въ началѣ болѣзни, бываетъ постоянная, сильная, съ опухолью и затрудняетъ дѣйствіе болящей части — глотаніе, дыханіе, движеніе; такая боль требуетъ противовоспалительнаго леченія; 2) боль, появляющаяся въ теченіе продолжительныхъ болѣзней, также полувоспалительная, уступаетъ примочкамъ, припаркамъ, теплымъ ваннамъ, клистирамъ, пиявицамъ, рожкамъ; 3) боль нервная унимается отъ прижатія болящаго мѣста; она проходитъ отъ растираній рукою, суконкою, спиртами, а иногда нужно бываетъ употребить и наркотическое лекарство. Сверхъ сего, нужно обращать вниманіе на причину боли и стараться удалить ее.



Припадки боязней чувственныхъ органовъ — усиленное, ослабленное, измѣненное зрѣніе, обоняніе, такой же слухъ, вкусъ, не требуютъ особеннаго леченія; равно припадки разстройства памяти, воображенія, разсудка, не указываютъ на какое-либо особое ихъ леченіе, кромѣ леченія главной болѣзни. Трусливаго, мнимаго, безнадежно-больнаго нужно ободрять и оживлять его надежду на выздоровленіе разными примѣрами, доводами нравственными, физическими. Бредъ, какъ припадокъ горячки, воспаленія въ мозгу, не требуетъ особаго леченія; но односторонній бредъ (монома-нія) лечится различнымъ образомъ, напр. убѣжденія больнаго, что у него стеклянныя ноги, приростающая къ носу муха, что у него лице обращено къ сплѣтъ или и совсѣмъ нѣтъ головы, — могутъ быть излечены разными приѣмами, мнимою операціею, доводами. Безчувствіе больнаго требуетъ употребленія раздражающихъ, отвлекающихъ средствъ, слабительныхъ, холодныхъ примочекъ къ головѣ, кровопусканій. Безсонница, какъ частый припадокъ множества острыхъ болѣзней, рѣдко указываетъ на особое леченіе, отъ котораго она проходитъ еще рѣже; бессонница въ продолжительныхъ болѣзняхъ, проходитъ отъ движенія на свѣжемъ воздухѣ, легкаго упражненія, тихаго разговора, пѣнія, музыки; въ упорной бессонницѣ, по совѣту врача, можно дать больному салатнаго сока (1 — 2 грана *lactucarium*), чай изъ маковыхъ головокъ и даже немного ( $1\frac{1}{2}$  грана) бѣлены, опія. Сонливость, глубокій сонъ, какъ припадокъ воспаленія мозга, пострѣла, ушиба головы, требуетъ кровопусканій, холодныхъ примочекъ къ головѣ, отвлекающихъ, слабительныхъ средствъ.

§ 67. Сверхъ различныхъ способовъ леченія, соответствующихъ натурѣ болѣзней и ихъ припадкамъ, нужно обращать вниманіе на ихъ вышеисчисленныя причины и стараться удалить оныя или по крайней мѣрѣ ограничить, уменьшить ихъ дѣйствіе (пища, питье, воздухъ, жилище, одежда, времена года, климатъ, разныя упражненія и пр.), на свойство самой болѣзни (острой, продолжительной, нервной), на мѣстопробываніе (воспаленіе мозговыхъ оболочекъ или самаго мозга, воспаленіе оболочекъ легкихъ или самыхъ легкихъ и



пр.), на ходъ и продолженіе, періодъ болѣзни, наследственное расположеніе къ извѣстнымъ болѣзнямъ, на возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, слабость или крѣпость, привычки, обращеніе или расположеніе къ чему-либо больного и множество случайныхъ обстоятельствъ; все эти условія успешнаго леченія больныхъ можетъ сообразить только опытный и осмотрительный врачъ, котораго посему вездѣ, гдѣ только можно, нужно приглашать къ леченію сколько-нибудь сомнительныхъ, а тѣмъ болѣе еще притомъ и важныхъ болѣзней.

### ОБЩІЯ ПРАВИЛА.

Прежде нежели мы приступаемъ къ леченію больныхъ, нужно познакомиться съ болѣзнями прилежнымъ и продолжительнымъ чтеніемъ приличныхъ книгъ, написанныхъ для наставленія народа въ сохраненіи его здоровья, стараться пользоваться, гдѣ можно, наставленіями опытныхъ врачей, слѣдить за леченіемъ ими больныхъ въ больницахъ, въ частныхъ домахъ, записывать все нами видѣнное, замѣченное и повѣрять потомъ съ читаннымъ. Почти во всѣхъ наукахъ и искусствахъ результаты нашихъ понятій и дѣйствій можно доказать или опровергнуть логически, фактами, но въ медицинѣ это очень трудно, потому-что при леченіи всякаго больного дѣйствуетъ его невидимый, собственный внутренний врачъ и скрываетъ хорошія и худыя дѣйствія врача видимаго, наружнаго. Нѣтъ примѣра, чтобы человекъ, вовсе незнакомый съ основаніями извѣстной какой-либо науки, рѣшился самоправно вступить въ кругъ ея любителей съ своими законами, наставленіями — уставомъ; но въ медицинѣ это случается ежедневно: люди необразованные, неграмотные, положительно-глупые, объявляютъ о своихъ врачебныхъ открытіяхъ, опытахъ, лечебномъ искусствѣ, не имѣя никакого понятія ни о своихъ лекарствахъ, ни о дѣйствіи ихъ, ни о болѣзняхъ, отъ которыхъ они берутся излечить всякаго боль-

наго. Цѣль же наша въ настоящемъ предпріятіи состоитъ не въ увеличеніи, и безъ того многочисленныхъ, шарлатановъ, знахарей и проч., но въ томъ, чтобы наставить добросовѣстныхъ людей, какъ помогать себѣ и другимъ въ разныхъ обыкновеннѣйшихъ болѣзняхъ. Если посему мы чувствуемъ въ себѣ довольно познаній опытныхъ и книжныхъ, то можемъ приступить къ леченію больныхъ, и то, гдѣ можно, подѣ надзоромъ врача.

Но, съ другой стороны, не должно быть и слишкомъ робкимъ, къ себѣ недоувѣрчивымъ, перъшительнымъ, потому 1) что скромный человѣкъ всегда болѣе можетъ сдѣлать хорошаго, чѣмъ онъ о себѣ думаетъ; 2) что положительная увѣренность въ своихъ познаніяхъ въ медицину, особенно при леченіи внутреннихъ болѣзней, есть дѣло чрезвычайно рѣдкое, даже и для самыхъ опытныхъ и свѣдущихъ врачей, которые во многихъ случаяхъ также не увѣрены ни въ родъ, ни въ степени, мѣсть, теченіи, исходъ болѣзни, какъ и всякій неврачъ. Но врачи, для поддержанія важности своего искусства и самихъ себя, и для пользы больныхъ, скрываютъ эту слабую сторону медицины, которая посему тѣмъ болѣе неизбежна для начинающаго заниматься леченіемъ больныхъ, при которомъ гораздо чаще, чѣмъ гдѣ-либо, сбывается пословица: «смѣлый счастье находитъ тамъ, гдѣ теряетъ его робкій»; «смѣлымъ Богъ владѣетъ»; 3) потому-что, во всякомъ случаѣ, при леченіи каждаго больного мы имѣемъ могущественнѣйшаго союзника противу непріятеля, дѣйствительнѣйшаго помощника: это есть сама натура больного, его внутренній врачъ, настоящій лейбъ-медикъ каждаго изъ насъ, борьба жизни со смертію, здоровья съ болѣзнію, и 4) потому, что, въ сомнительныхъ случаяхъ, мы можемъ наши лечебныя мѣры ограничить приличнымъ помѣщеніемъ больного, благопріятнымъ для него расположеніемъ постороннихъ обстоятельствъ и назначеніемъ простыхъ, невинныхъ средствъ, употребленіе которыхъ часто можетъ принести значительную пользу больному и ни въ какомъ случаѣ не можетъ пасть на нашу совѣсть.



За симъ поступки наши, при леченіи больныхъ, вообще должны быть слѣдующіе :

1) Всякому больному нужно прежде всего доставить приличное помѣщеніе, одежду, пищу, спокойствіе (см. «Призрѣніе»).

2) Потомъ нужно стараться узнать его болѣзнь.

3) Узнавъ съ достовѣрностію болѣзнь, нужно ее лечить приличными средствами (см. «Внутр. и наруж. болѣзни»).

4) Если же мы сомнѣваемся въ вѣрности нашего распознаванія, особенно внутренней болѣзни, то въ леченіи нашемъ больного (мы не говоримъ болѣзни, потому-что мы ее не узнали), мы должны ограничиться приличнымъ его призрѣніемъ, обращеніемъ особеннаго вниманія собственно 1) на больного и причины его болѣзни, 2) на явственные и главные припадки его болѣзни, и 3) на указанія самой природы—внутренняго врача больного, и состояніе разныхъ отравленій тѣла.

5) Въ первомъ отношеніи нужно смотрѣть на тѣлосложеніе и расположеніе къ болѣзни, на полъ, возрастъ, темпераментъ, слабѣйшую часть тѣла, нравственное расположеніе, привычки, бывшія болѣзни, климатъ, мѣстность страны, воздушное состояніе.

6) Плотное, крѣпкое, сухое, жесткое, полнокровное, кроваво-пестрѣлое, апоплексическое (низкій ростъ, короткая шея, большая голова) тѣлосложеніе, сангвиническій, и еще болѣе, холерическій темпераменты, темный цвѣтъ волосъ и тѣла, юношескій и возмужалый возрастъ, мужескій полъ, остановленія обычнаго исpraжненія крови, — почечуйнаго у мужчинъ и мѣсячнаго у женщинъ — холодное время года, сѣверный климатъ, возвышенное мѣстопробываніе, располагають къ разнымъ горячкамъ, воспаленіямъ, кровотеченіямъ и требуютъ противовоспалительнаго, прохлаждающаго леченія.

7) Слабое, нервное, нѣжное, рыхлое, тучное, золотушное, чахотное тѣлосложеніе, меланхолическій и флегматическій темпераменты, дѣтскій и старческій возрастъ и женскій полъ, излишняя потеря крови, теплое, сырое время года,

низменность страны, южный климат располагаютъ къ нервнымъ, желчнымъ горячкамъ, приливамъ крови къ голо-  
вѣ, къ заваламъ въ брюхѣ, поносамъ, слизотеченіямъ, судоро-  
гамъ, сыпамъ, водяной болѣзни и пр., и требуютъ разнообразнаго и осторожнаго леченія, состоящаго въ употребленіи  
легкихъ противовоспалительныхъ, слабительныхъ, моче- и по-  
тогонныхъ, отвлекающихъ средствъ.

8) Наслѣдственное расположеніе: родители, дѣ-  
ды, прадеды въ извѣстномъ возрастѣ и при извѣстныхъ об-  
стоятельствахъ подвергались извѣстнымъ болѣзнямъ: сѣума-  
шествію, чахоткѣ, подагрѣ, мочевымъ камнямъ.

9) Желаніе или отвращеніе отъ чего-либо: есть  
люди, которые болѣютъ отъ того, что имъ отказываютъ въ  
удовлетвореніи ихъ иногда страннаго желанія, или принуж-  
даютъ ихъ къ тому, что имъ не нравится.

10) Привычки, образъ жизни, одѣяніе, пища, жилище,  
также особенно располагаютъ къ болѣзнямъ.

11) Слабая часть тѣла, уже подвергавшаяся болѣзни,  
легче другихъ опять занемогаетъ; таковыя: слизистыя обо-  
лочка, кожа, ихъ болѣзни: воспаленіе горла, насморкъ, ка-  
шель, поносъ, разныя сыпи, ломота, легко возвращаются при  
незначительномъ поводѣ.

12) Появленіе одинакой болѣзни разомъ у мно-  
гихъ людей, какъ-то: весною цынга, лѣтомъ — желчныхъ  
горячекъ, воспаленій мозга, осенью — кровавыхъ поносовъ,  
перемежныхъ лихорадокъ, зимою — воспаленій легкихъ, рев-  
матизмовъ; весною и осенью скарлатины, кори, оспы и проч.  
Всѣ эти обстоятельства (5 — 12) могутъ способствовать рас-  
познанію и леченію болѣзней.

13) Не бывъ увѣреннымъ въ точномъ распознаніи болѣз-  
ни, мы при леченіи больного можемъ руководствоваться при-  
падками: леченіе, направленное противъ главныхъ припад-  
ковъ (боли, жара, жажды, поноса, тошноты и пр.), хотя и  
не такъ бываетъ успѣшное, но за то и безошибочное, а это  
для насъ очень важно. О припадкахъ болѣзни мы уже гово-  
рили; здѣсь только скажемъ о важнѣйшихъ изъ нихъ въ ле-  
чебномъ отношеніи: пульсъ, дыханіе, жаръ и жажда.



14) Пульсъ, или біеніе артерій върнѣ всего можетъ руководить при леченіи больныхъ; онъ показываетъ, что болѣной одержимъ лихорадкою или горячкою, либо воспаленіемъ, опредѣляетъ свойство — характеръ горячки, и указываетъ на ея опасность. По одному пульсу безошибочно можно назначить леченіе, чѣмъ по всемъ прочимъ припадкамъ болѣзни, потому что пульсъ показываетъ внутреннюю дѣятельность сердца и артерій. Скорый, частый пульсъ означаетъ лихорадку; чѣмъ онъ дѣлается скорѣе, тѣмъ опаснѣе лихорадка и чѣмъ рѣже и медленнѣе, тѣмъ она безопаснѣе; пульсъ скорый, по числу удареній въ минуту приближающій къ натуральному, очень благопріятенъ; пульсъ скорый и напряженный, послѣ перелома болѣзни (критическаго пота, поноса), показываетъ неполное рѣшеніе болѣзни, которая посему еще можетъ и ожесточиться. Пульсъ въ приступѣ перемежающейся лихорадки и въ ожесточеніи послабляющей горячки дѣлается частымъ, а во время перемежки первой и послабленія второй — менѣе частымъ и даже медленнымъ. Появленіе частаго пульса въ хроническихъ болѣзняхъ означаетъ, что послѣднія дѣлаются лихорадочными и опасными. Полный, твердый, скорый, крѣпкій пульсъ показываетъ крѣпость силъ больного, воспалительность болѣзни и указываетъ на противовоспалительное леченіе, особенно если притомъ замѣчается боль, жаръ, сухость, бредъ, красная моча. Пульсъ неровный, неправильный или неодинаковый въ разное время дня показываетъ первный характеръ болѣзни.

Опасное положеніе больного върнѣ всего выражается пульсомъ, который въ такомъ случаѣ дѣлается слабымъ, малымъ, дрожащимъ, неровнымъ, перемежающимся.

15) Пульсъ есть лучшій руководитель при назначеніи больному лекарствъ, которыхъ дѣйствіе на больного также выражается въ пульсѣ; это особенно разумѣется о кровопусканіи. Кровь должна течь до-тѣхъ-поръ, пока не начнетъ упадать пульсъ; теченіе крови изъ жилы нужно остановить, если пульсъ вдругъ изъ крѣпкаго и полного начнетъ дѣлаться слабымъ и малымъ, хотя бы притомъ мѣстные припадки болѣзни (одышка, колотье, бредъ, боль) и не уменьшились.



Повтореніе кровопусканія также назначается особенно пульсомъ, т. е. когда онъ опять подымается и дѣлается крѣпкимъ, большимъ, скорымъ. При неопредѣленномъ характерѣ болѣзни, если въ началѣ кровопусканія пульсъ вдругъ упадаетъ, то это означаетъ слабость больного и вредъ кровопусканія; но если, по мѣрѣ теченія крови изъ жилы, пульсъ дѣлается полнѣе, мягче и больше, особенно при глубокомъ вдыханіи больного, то это показываетъ воспалительность болѣзни и пользу кровопусканія. Впрочемъ, опредѣленіе значенія пульса очень трудно и требуетъ продолжительнаго навыка, даже со стороны врача.

16) Если, при употребленіи другихъ лекарствъ, болѣзненный пульсъ начинаетъ приближаться къ натуральному, то это показываетъ хорошее дѣйствіе лекарствъ, ихъ надлежащее назначеніе и излечиваетъ болѣзни; неизмѣняющійся пульсъ, даже при усиленныхъ пріемахъ лекарствъ, есть худой знакъ; а когда пульсъ притомъ дѣлается скорѣе, то это означаетъ, что лекарства были сильны, горячительны или что болѣзнь сама по-себѣ ожесточается.

О видахъ болѣзненнаго пульса сказано прежде; здѣсь скажемъ только еще о его распознаніи. Въ семъ отношеніи нужно прежде знать біеніе артерій у здороваго и больного человѣка; о пульсѣ у здороваго человѣка сказано въ другомъ мѣстѣ (см. «Кровообращеніе»).

17) Для узнанія пульса у больного избирается лучевая артерія предплечія, не далеко отъ большаго пальца снаружи и спереди, гдѣ она кверху лежитъ сейчасъ подъ кожею, а книзу прилегаетъ къ кости. Для вѣрнаго опредѣленія пульса здѣсь 3 — 4 пальца руки переднею поверхностію нужно класть на артерію такъ, чтобы оцупать ее по длинѣ на вершокъ и болѣе; въ такомъ положеніи пальцы на артерію нужно держать 1 — 2 минуты и замѣчать біеніе артерій.

Сначала нужно держать пальцы на артеріи такъ, чтобы они осязали ее вполне, потомъ нужно ими ее слегка то прижимать, то уменьшать прижатіе, стараясь узнать: какъ часто бьетъ артерія, съ какою силою она расширяется и сжимается, и ударяетъ въ наши пальцы, съ какимъ напоромъ и стремле-



ніемъ протекаетъ въ ней кровь. Искусство узнавать пульсъ приобрѣтается упражненіемъ и навыкомъ; для этого нужно часто изслѣдовать его у себя, у другихъ людей здоровыхъ всякаго пола и возраста. Скорость пульса можно повѣрить и по часамъ, исчисливъ сколько разъ онъ ударяетъ въ минуту; но крѣпость или слабость, твердость, мягкость, величину, малость можно узнать только осязаніемъ.

Приступать къ ощупыванію пульса нужно не прежде, какъ послѣ разспроса больного и ласковаго съ нимъ разговора о главнѣйшихъ обстоятельствахъ его жизни и болѣзни. Предъ начатіемъ изслѣдованія пульса, нужно узнать теплоту тѣла больного, охвативъ слегка его предплечіе всею ладонью, и притомъ помнить, что излишняя теплота комнаты, теплая пища и питье, движеніе, потрясеніе и ударъ руки о что-либо твердое, душевное возмущеніе, имѣютъ вліяніе на измѣненіе пульса, и что на все это нужно обращать вниманіе, когда приступаемъ къ опредѣленію біенія артерій.

18) Кровь также много способствуетъ къ опредѣленію болѣзни и состоянія силъ больного; кровь густая, какъ масло, темнокрасная, легко створаживающаяся, дающая много творогу и мало сыворотки, показываетъ крѣпость тѣлосложенія, полнокрое, беременность, неисторченность соковъ и расположеніе къ горячкамъ, воспаленіямъ, кровотеченіямъ, приливамъ. Если кровь очень скоро створаживается, даетъ плотный творогъ, подергивающійся еще плотнѣйшею бѣловатою пленкою, съ трудомъ разрѣзываемою ножомъ, если притомъ изъ створоженой крови мало отдѣляется свѣтлой, прозрачной сыворотки, то такая кровь означаетъ воспаленіе, кроющееся въ тѣлѣ больного, и указываетъ на необходимость противовоспалительнаго леченія. Но если кровь разлагается не скоро на творогъ и сыворотку, если даетъ мало творогу и много сыворотки несвѣтлой, мутной, сама кровь имѣетъ блѣднокрасный цвѣтъ, пленка на творогъ бываетъ рыхлая, желтоватая, зеленоватая или голубоватая, то эта кровь означаетъ слабость больного, долговременную, застарѣлую болѣзнь, порчу соковъ и запрещаетъ кровопусканіе. Оба эти состоянія крови можно

изучить надъ животными, и съ ними очень знакомы мясники.

19) О вліяніи другихъ припадковъ на леченіе, какъ-то: дыханія, пищеваренія, отдѣленій и испражнений, уже сказано выше.

20) Въ леченіи болѣзней нужно слѣдовать указаніямъ н а т у р ы больного; эти указанія замѣчаются особенно въ горячкахъ, лихорадкахъ, воспаленіяхъ и въ нѣкоторыхъ нервныхъ болѣзняхъ.

21) Если больной не терпитъ яркаго свѣта, громкаго разговора, теплой комнаты, укутыванія одѣяломъ, имѣетъ отвращеніе отъ пищи, особенно отъ мясной, жирной, отъ вина, то не должно его ко всему этому принуждать. Если же, напротивъ, больной желаетъ быть въ свѣтлой, теплой комнатѣ, охотно слушаетъ разговоръ другихъ или самъ говорить, имѣетъ жажду, получаетъ позывъ на ѣду, хочетъ выпить рюмку вина, то во всемъ этомъ ему не должно отказывать, стараясь только наблюдать во всемъ умѣренность и осторожность, т. е. пить и ѣсть давать почаще, но понемногу и ничего не доводить до крайности.

22) Нужно обращать особенное вниманіе на то, чтобы у больного ежедневно происходили испраженія кала, мочи и испарины въ кожѣ. Чѣмъ бы ни былъ одержимъ больной и хотя бы не былъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, что довольно часто случается въ горячкахъ и воспаленіяхъ, непремѣнно нужно поддерживать ежедневное испраженіе низомъ средствами, вычисленными при методѣ слабительномъ.

Столько же необходимо и ежедневное испраженіе мочи. Въ горячкахъ моча, особенно красная, жгучая, острая, испражняется въ маломъ количествѣ, пока продолжается жаръ: это ничего не значитъ. Но если бы она совсѣмъ остановилась, то нужно употребить средство противъ запора мочи, особенно же растираніе нижней части живота и срамной промежности какимъ-либо свѣжимъ масломъ, теплыми смягчительными припарками, пары, направляемые на животъ, и теплые ванны съ отрубями, сънною трухою, половиною; питье въ



значительномъ количествѣ теплаго чая. При сухой, жесткой, морщиноватой кожѣ, означающей недостатокъ испарины, последнюю нужно возбуждать, особенно при чувствѣ озноба, средствами, показанными при потогонномъ способѣ леченія.

При недостаткѣ отдѣленія во рту слизи и слины, при сухости языка, десенъ, губъ, нужно понемногу, но часто заставлять больного пить воду простую съ сахаромъ, сиропомъ, кислымъ сокомъ, квасъ, лимонадъ и проч.

---





## ВНУТРЕННІЯ БОЛѢЗНИ.

### А. ОСТРЫЯ БОЛѢЗНИ.

§ 1. Острыми, скоротечными, лихорадочными болѣзнями называются тѣ, которыя происходятъ быстро и неожиданно, сопровождаются измѣненіемъ пульса и теплоты въ тѣлѣ больного и продолжаются отъ 1 до 28 дней. Если человекъ, бывшій вчера совершенно здоровымъ, сегодня занемогъ болѣзнію, которая обнаруживается чувствомъ слабости, ознобомъ, жаромъ, сухости во рту, жаждою, болью въ какой-либо части тѣла: то смѣло можно сказать, что онъ занемогъ острую, скоротечную лихорадочную болѣзнію. Эти болѣзни вообще суть лихорадки или горячки, воспаления и разныя острыя сыпи, оспа и пр.

### 1. ЛИХОРАДКИ ИЛИ ГОРЯЧКИ ВООБЩЕ.

§ 2. Въ обыкновенномъ смыслѣ различаютъ лихорадку отъ горячки тѣмъ, что подъ первую разумѣютъ перемежающую лихорадку, а подъ послѣднюю постоянную лихорадку въ высшей степени ея развитія. Врачи между лихорадкою и горячкою не дѣлаютъ этого различія, потому что та и другая у одного и того же человека, переходя разныя степени своего развитія, изъ лихорадки можетъ сдѣлаться горячкою, и наоборотъ. Врачи принимаютъ нѣсколько видовъ лихорадокъ, или горячекъ, которыя также могутъ оказываться у одного и того же человека, переходя изъ одного вида въ другой.

§ 3. Припадки всякой лихорадки, или горячки, суть: ознобъ, жажда, скорый пульсъ, чувство слабости, горячее дыханіе, измѣненіе мочи въ цвѣтѣ, запахѣ и составѣ. Эти припадки продолжаются или постоянно безъ измѣненія, или же, что замѣчается гораздо чаще, они то усилива-



ются папчаше къ вечеру, то ослабѣваютъ (къ утру и днемъ). Если больной вдругъ почувствовалъ въ себѣ слабость, мляніе, усталость, ознобъ, жаръ, жажду; получилъ скорый, твердый пульсъ, горячее, скорое дыханіе безъ особенной постоянной какой-либо боли; если всѣ эти припадки усиливаются, ожесточаются ввечеру и утихаютъ, ослабѣваютъ къ утру, но совсѣмъ не прекращаются, то безошибочно можно заключить, что больной занемогъ простою—чистою лихорадкою. Но если эти припадки продолжаются постоянно, не ослабѣваютъ даже и къ утру, если притомъ находится гдѣ-либо постоянная, острая или тупая боль, отъ дотрогиванія увеличивающаяся, если замѣчается разстройство какого-либо органа, или части тѣла, то вѣроятно, что при лихорадкѣ есть еще явное-наружное, или скрытное-внутреннее воспаленіе. Следственно послабленіе припадковъ означаетъ простую, чистую лихорадку, а постоянство ихъ—лихорадку съ воспаленіемъ.

§ 4. Теченіе. Лихорадка продолжается 1, -7, -14, -21, -28, дней; эти дни называются рѣшительными, критическими, потому что въ нихъ рѣшается лихорадка, происходитъ ея переломъ (crisis). Въ самомъ же теченіи лихорадки замѣчается ея начало, усиленіе, высшая степень развитія, ослабленіе, выздоровленіе. Рѣшеніе или переломъ лихорадки происходитъ на высшей степени ея развитія; обыкновенно лихорадка рѣшается потомъ или мочею съ осадкомъ, и это рѣшеніе продолжается во все время уменьшенія лихорадки. При несовершенномъ переломѣ, лихорадка продолжается хотя и въ другомъ видѣ, или переходитъ въ другую болѣзнь, либо оканчивается смертною отъ изнуренія тѣла, отъ пораженія внутреннего важнаго органа (легкихъ, мозга, желудка и пр.).

Вѣрные признаки хорошаго перелома лихорадки суть: равномерная мягкость и влажность кожи, сначала свѣтлая; потомъ мутная, а наконецъ осадочная моча, а болѣе всего медленный, мягкій и спокойный пульсъ; особенно важенъ послѣдній признакъ: если, послѣ явнаго перелома, ослабѣваютъ и даже проходятъ всѣ припадки лихорадки, но пульсъ по прежнему остается твердымъ,



скорымъ, раздраженнымъ, то всегда нужно еще опасаться послѣдствій лихорадки.

§ 5. Причины. Обыкновенныя причины лихорадокъ суть разныя значительныя раздраженія тѣла, особенно же быстрыя перемѣны воздушной температуры, смѣненіе теплоты холодомъ или, напротивъ, холода зноємъ, сырость, земныя испаренія, перемѣны времени года, низменныя, болотистыя, прибрежныя мѣста, непривычность къ новому климату, неосторожность въ пищѣ и питъѣ и происходящія отъ того разстройства желудка, сильныя душевныя возмущенія, повальное состояніе атмосферы и разныя заразы. Мѣстопробываніе лихорадки находится болѣе въ кровяныхъ сосудахъ и самой крови, чѣмъ въ первахъ и мозгѣ; но раздраженіе, производящее лихорадку, иногда гнѣздится въ крови (остановленная испарина, повѣтріе, зараза), а очень часто оно есть и мѣстное: ушибъ, рана, приливъ крови, воспаленіе какой-либо части. Примѣчаніе. Все—что сказано прежде о болѣзни вообще, въ отношеніи ея теченія, перелома и причинъ, преимущественно относится къ лихорадкѣ.

§ 6. Виды лихорадокъ. Раздраженіе, какъ причина лихорадки, можетъ сосредоточиться въ известной части тѣла, и тѣмъ произвести разныя виды лихорадки, а именно: воспалительную, когда раздраженіе гнѣздится въ кровяныхъ сосудахъ, и гнилую, когда оно въ самой крови, нервную, когда оно поражаетъ нервы и мозгъ, желудочную, желчную, когда страдаетъ желудокъ, кишки, печень, и ревматическую, простудную, когда болятъ сывороточныя, слизистыя перепонки.

Эти измѣненія или виды лихорадокъ зависятъ или отъ самаго больного, или отъ причинъ болѣзни. 1) Люди полнокровныя, физически дѣятельные, чернорабочій народъ, подвергаются воспалительнымъ; слабыя, нѣжные горожане—нервнымъ, золотушные, обрюзглые—простуднымъ, катаральнымъ; люди, привычшіе свое тѣло къ теплотѣ—ревматическимъ; невоздержные въ пищѣ и питъѣ—желудочнымъ—желчнымъ лихорадкамъ. 2) Известная причина производитъ и опредѣленный видъ лихорадки, наприм. испугъ, горесть—нервную, гнѣвъ—желчную, сильное разгоряченіе тѣла—воспа-



лительную, зараза—гнилую. 3) Эпидемія, или повальное состояніе воздуха, производить у всѣхъ людей одинакую болѣзнь: простудную—весною, воспалительную—зимою, желчную—лѣтомъ, гнилую—осенью. 4) Наконецъ лихорадки отъ ненадлежащаго присмотра за больнымъ, неправильнаго (чаще горячительнаго) леченія въ своемъ теченіи, измѣняетъ начальный видъ, напр. воспалительная переходитъ въ нервную, а нервная въ гнилую лихорадку. Относительно важности, опасности лихорадокъ, вообще ничего нельзя сказать опредѣлительнаго; въ этомъ отношеніи каждая лихорадка имѣетъ свою особенность, о которой и будетъ сказано ниже.

**Леченіе.** Въ лихорадкѣ весьма явственно выражается цѣлительная, врачующая сила нашего тѣла, нашъ внутренній невидимый, врачъ, которымъ благодѣтельная природа надѣлена (каждаго изъ насъ); самая лихорадка есть, такъ сказать, только проявленіе усилія врачебнаго дѣйствія этого внутренняго врача, который, возбужденіемъ лихорадочныхъ движеній (ускореннаго кровообращенія, а съ нимъ пульса, возвышенной теплоты и проч.) старается преодолѣть, устранить причину болѣзни произведеніемъ ея перелома посредствомъ пота, посадочной мочи или болючаго испражненія низомъ. Но какъ это стремленіе цѣлительной силы больнаго тѣла, это возбужденное дѣйствіе внутренняго нашего врача, чаще оказывается излишнимъ, чѣмъ недостаточнымъ, чаще крѣпкимъ, чѣмъ слабымъ, то леченіе лихорадки, выражающейся въ общихъ своихъ припадкахъ, должно быть противовоспалительное, успокоительное, то есть имѣть цѣлю уменьшитъ скорость кровообращенія, умирить жаръ, утушить жажду, способствовать свободному испражненію кака, мочи, испаривъ и такъ содѣйствовать цѣлительной силѣ нашего тѣла, произвести спасительный переломъ. Въ немногихъ случаяхъ силы больнаго бываютъ недостаточны для преодоленія лихорадки и произведенія перелома, и тогда нужно ихъ поддерживать возбуждающимъ крѣпительнымъ леченіемъ.

Поэтому леченіе лихорадки вообще (должно имѣть цѣлю: 1) удалить ея причину, напр. нечистоты изъ желудка, простуду; къ сожалѣнію, однако, обыкновенно случается такъ,



что причина лихорадки уже сама по себѣ исчезла (гнѣвъ, холодъ), или же ее нельзя удалить (зараза). 2) Стараться узнать свойство, натуру, видъ лихорадки и, сообразно тому, назначить леченіе: противувоспалительное, отвлекательное и проч. (см. Методы леченія). Въ этомъ отношеніи, особенно при недостаткѣ врача, мы, во всякой лихорадкѣ, советуемъ исключительно держаться только противувоспалительнаго леченія, и то безъ кровопусканія. 3) Изслѣдовавъ подробно состояніе больного, или замѣтивъ въ немъ гдѣ-либо мѣстное страданіе (воспаленіе), стараться его устранить приличными средствами. 4) Замѣчать: какой путь избираетъ натура больного для произведенія перелома и содѣйствовать ей усилю потогонными, слабительными, мочегонными лекарствами. 5) По возможности, стараться удалить отъ больного все то, что можетъ ожесточить его болѣзнь, или сдѣлать ее сложною, а главныя для этого средства суть слѣдующія:

1) Всякій лихорадочный больной долженъ лежать въ постель и соблюдать тѣлесное и душевное спокойствіе: на это правило указываетъ сама натура больного, производя въ немъ, при каждой лихорадкѣ, чувство усталости, слабости, лѣни, отвращенія отъ движенія или сидѣнія. Притомъ горизонтальное положеніе въ постель сильно способствуетъ уменьшенію лихорадки, уравниваетъ кровообращеніе во всемъ тѣлѣ, уменьшаетъ приливы крови къ разнымъ частямъ тѣла, умѣряетъ жаръ, уменьшаетъ жажду, замедляетъ скорое бѣненіе пульса, способствуетъ натурѣ больного произвести благопріятное окончаніе лихорадки и потому составляетъ необходимое условіе ея леченія. Тѣлесное или душевное безпокойство то же производить въ тѣлѣ лихорадочнаго больного, что вътеръ въ водѣ: волненіе и напоръ крови къ разнымъ частямъ тѣла, особенно къ головѣ и груди.

2) Лихорадочный больной можетъ пить сколько хочетъ, по немногу, но за то часто. При лихорадкѣ въ тѣлѣ издерживается много жидкихъ частей, между тѣмъ какъ онѣ необходимы и для хорошаго перелома; поэтому цѣлительная натура нашего тѣла возбуждаетъ въ больномъ жажду, которую по сему нужно и удовлетворять. Лучшее питье есть



чистая вода, квасъ, лимонадъ, клюквенный сокъ съ водою; а при поносѣ отваръ съ ячменными, овсяными крупами, съ коркою хлѣба, сухарями.

3) Лихорадочный больной не хочетъ и не долженъ быть, особенно твердой, мясной пищи: это тѣмъ легче исполнить, что благотворительная природа возбуждаетъ въ немъ отвращеніе отъ пищи. Для сваренія пищи нужна дѣятельность желудка, а онъ теперь отказывается варить, точно такъ, какъ ноги ходить, руки работать, глаза смотреть; слѣдственно съѣденная пища останется несваренною и увеличитъ только количество нечистотъ въ желудкѣ; но если бы она и сварилась, то умножила бы только массу густыхъ соковъ, теперь и безъ того лишнихъ; поэтому справедливо говорятъ, что кто кормитъ лихорадочнаго больного, тотъ изнуряетъ его и питаетъ только его болѣзнь. Но если появится у больного позывъ на ѣду, то нужно ему давать сначала только жидкую пищу: похлебку съ крупами, овощью, уху съ мелкою рыбою, овсяный супъ съ кореньями.

4) Въ комнатѣ больного должны быть: свѣжій, чистый, прохладный воздухъ, умеренный свѣтъ (полумракъ), тишина; такой воздухъ освежаетъ больного, умряетъ лихорадку и предотвращаетъ ея переходъ въ воспалительную, первную, гнилую; нечистый, спертый, жаркій воздухъ простую лихорадку превращаетъ въ гнилую, первную. Температура комнаты должна быть пріятна для больного, т. е. не выше  $+12^{\circ}$ — $14^{\circ}$  Р.; свѣжесть воздуха въ комнатѣ лучше всего поддерживается отвореніемъ форточки въ окошкѣ, также опрыскиваніемъ стѣнъ, пола водою, уксусомъ; смоляныя, а тѣмъ болѣе кислыя (уксусомъ) куренія вредны. Свѣтъ въ комнатѣ не долженъ беспокоить глазъ больного и, если можно, падать сверху, чрезъ закрытіе занавѣскою нижней половины окошекъ. Для предотвращенія порчи воздуха и удаленія шума, въ комнатѣ больного не должны находиться лишніе люди.

5) Постель больного должна состоять изъ холщеваго или кожанаго тюфяка, набитаго шерстью, сѣномъ, соломой, но не перьями или пухомъ, изъ ваточнаго или шерстянаго не-



тяжелаго одъала, подшитаго холстомъ, и изъ головной подушки, набитой перемъ или сномъ.

6) Въ комнатѣ больного должна быть тишина; отстранять отъ него все, что только можетъ его встревожить, было бы это для него пріятное или горестное.

7) Больной ежедневно долженъ имѣть испражненіе кала и мочи, хотя въ небольшомъ количествѣ.

8) Когда лихорадка уменьшится, послѣдуетъ ея переломъ потомъ, поносомъ, мочею, и начнетъ появляться позывъ на ѣду, то больному нужно сначала давать жидкую пищу; простую кашцу, уху, потомъ куриный, телячій супъ, далѣе личный желтокъ въ смятку, котлетки и наконецъ обыкновенную пищу. Это леченіе во всей силѣ примѣняется ко всѣмъ видамъ лихорадокъ и его надобно придержи- ваться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы не можемъ точ- нѣе опредѣлить лихорадки, т. е. какая именно лихорадка у нашего больного. Слѣдуя этому правилу, мы пред- ставляемъ свободу дѣйствовать натурѣ больного и, не мѣ- шая ея спасительнымъ дѣйствіямъ; даже при несчастномъ исходѣ болѣзни, мы можемъ быть спокойны совѣстію, ибо слѣлаемъ всё по крайнему нашему разумѣнію и не будемъ имѣть причины упрекать себя въ нашихъ неумѣстныхъ рас- поряженіяхъ и леченіи.

§ 7. Воспалительная лихорадка есть именно та болѣзнь, которая случается, чаще, и въ простонарѣчьи на- зывается собственно горячкой.

Припадки этой болѣзни суть: съ самаго начала дрожь и сильный ознобъ, потомъ такой же жаръ, скорое, горя- чее, но свободное и безъ боли дыханіе, твердый, какъ на- тянутая струна, полный и частый пульсъ, горячая, сухая кожа, красный, сухой языкъ, сильная жажда на холодное, кислое питье, красное лице, блестящіе глаза, красная, ост- рая моча, испражняемая съ жженіемъ и въ маломъ коли- чествѣ, трудное испражненіе низомъ или и совсѣмъ запоръ.

Теченіе. Всѣ эти припадки дружно къ утру уменьша- ются, а къ вечеру усиливаются, причемъ появляется голов- ная боль, а часто и бредъ въ ночи; въ теченіи болѣзни замѣчается точность, правильность и порядокъ: она продол-



жается 7 — 14 дней; переломъ бываетъ явный, полный, совершенный, найчаще густою, осадочной мочою, проливаемымъ, теплымъ потомъ, или кровотеченіемъ, особенно изъ носа; иногда переходитъ она въ гнилую или нервную лихорадку. Вообще она не опасна, легко уступаетъ противу-воспалительному леченію, но при ней часто происходятъ и мѣстные воспаления, особенно подреберной плевры (колотье), легкихъ (кашель) и мозга (сильный бредъ), и въ такомъ случаѣ лихорадочные припадки или и совсѣмъ не послабляютъ къ утру, или же послабленіе это бываетъ незначительное и во время его больной нисколько не чувствуетъ себя лучше; притомъ онъ жалуется на какую-либо постоянную боль и въ немъ замѣчается разстройство въ дѣйстви болѣзняка мѣста.

Причины. Воспалительная горячка состоитъ въ раздраженіи, въ усиленной дѣятельности кровеной системы—кровеныхъ сосудовъ и сердца, въ быстромъ кровообращеніи, въ густотѣ крови, которая легко створаживается, даетъ много печенки-творогу съ плотною, жирною наверху плевою, мало сыворотки и легко образуетъ перепонки въ полостяхъ тѣла.

Къ этой болѣзни располагаютъ: особенное повальное состояніе воздуха, гористая, возвышенная, сухая мѣстность, высокое стояніе барометра (т. е. сухой, упругій воздухъ), холодъ (зима), сѣверные и сѣверовосточные вѣтры, 18—35-лѣтній возрастъ, крѣпкое, полнокровное тѣлосложеніе, дѣятельная, рабочая жизнь, особенно на открытомъ воздухѣ, обильное употребленіе водки, вина, горячительныхъ приправъ. При такихъ условіяхъ легко причиняютъ болѣзнь: сильное разгоряченіе тѣла движеніемъ (бѣгомъ, танцами), душевныя возмущенія (гнѣвъ), ушибъ, раны, остановленіе привычнаго кровотеченія: почечуя — у мужчинъ, мѣсячнаго — у женщинъ, мѣстное воспаление (даже нарывъ, вередъ, рожа), возбуждающее горячительное леченіе другихъ болѣзней, простуда.

Леченіе имѣетъ цѣлю ослабить дѣйствіе сердца и кровеносныхъ сосудовъ и умѣрить быстрое кровообращеніе, разжидить кровь и умѣньшить жаръ, а съ нимъ сухость кожи и языка и жажду. Для достиженія всей этой цѣли



главное средство есть кровопусканіе. Нужно однако всегда помнить, что кровопусканіе, особенно общее, т. е. изъ руки, ноги ланцетомъ, шнеперомъ, есть самое сильное и легко опасное средство, которое подрываетъ жизнь и здоровье въ самомъ ихъ корнѣ, и потому, какъ ни полезно оно въ этой лихорадкѣ и въ опасныхъ воспаленіяхъ, но никогда его не надобно дѣлать безъ явной въ немъ необходимости, ибо отъ неумѣстнаго и неумѣреннаго кровопусканія 1) воспалительная лихорадка легко переходитъ въ нервную и гнилую; 2) цѣлительная сила больного тѣла, ослабленная кровопусканіемъ, не можетъ выработать полного перелома лихорадки, которая легко оставляетъ послѣ себя другія болѣзни; 3) выздоравливающіе бывають очень блѣдны или же подвержены обморокамъ, поправляются очень медленно и легко подвергаются другимъ болѣзнямъ: водяной, поносу и проч. Посему при леченіи воспалительной лихорадки нужно обращать главное вниманіе на ея степень, которой въ ней можно назначить двѣ: 1) слабая степень, легкая лихорадка проходитъ при одномъ противувоспалительномъ содержаніи больного. Здѣсь бывають достаточны полутемная, прохладная комната, спокойствіе, воздержность отъ пищи, водянистое кислое питье (№ 1), Риверіева смѣсь (№ 2), шипучій порошокъ (№ 3), внутрь Силитра въ растворѣ (№ 4), или въ порошокъ съ кремортартаромъ (№ 5); если отъ селитры появится поносъ, то вмѣсто ея нашатырь; начинать же леченіе этой степени лихорадки слабительнымъ изъ горькой (Главберовой, астраханской, англійской) соли (№ 6), съ тамаридами, манною, стаканомъ сиворотки, горькой воды, огуречнаго разсола. 2) Сильная степень, жестокая лихорадка обозначается силою припадковъ: полнымъ, твердымъ пульсомъ, сильнымъ, палящимъ жаромъ, жестокою болью головы, по ночамъ бредомъ. Здѣсь главное средство—кровопусканіе, которое часто одно прерываетъ болѣзнь, или же она послѣ того сама проходитъ при надлежащей діетѣ. Но кровопусканіе должно соответствовать степени болѣзни и сложению больного: обильное кровопусканіе повредитъ, а малое не принесетъ пользы; посему, гдѣ есть возможность, нужно посоветоваться съ врачомъ на



счетъ кровопусканія; но гдѣ вѣтъ врача, тамъ, при назначеніи кровопусканія, нужно руководствоваться слѣдующими правилами: 1) при необходимости кровопусканія (а эта необходимость вѣрнѣе всего опредѣляется крѣпкимъ, твердымъ, скорымъ пульсомъ) кровь нужно пускать немедленно, и тѣмъ раньше, тѣмъ лучше; кровопусканіе даже умѣренное, но въ началѣ болѣзни и однажды сдѣланное, часто ее совсѣмъ прерываетъ; но когда она усилится, разовьется воспаление, то 2—4 подобныхъ и даже обильнѣйшихъ кровопусканій не бываютъ уже такъ дѣйствительны. 2) Крови надобно пускать столько, сколько нужно для одолѣнія болѣзни, не болѣе, но и не менѣе; впрочемъ, излишекъ выпущенной крови выздоровѣвшій больной вознаграждаетъ; но когда мало пушено крови, то къ лихорадкѣ можетъ присоединиться воспаление какой-либо внутренности, и тогда выздоровленіе сдѣлается болѣе сомнительнымъ и легко можетъ остаться поврежденіе воспаленной внутренности: нарывъ, отвердѣніе. Мѣриломъ для кровопусканія можетъ быть пульсъ; мѣра выпущенной крови чашками, тарелками или фунтами невѣрна: для ослабленія болѣзни, одному нужно пустить крови 2 — 3 чашки, глубокую тарелку, фунтъ, а другому 3 — 5 чашекъ, полтора фунта, а третьему еще болѣе. Посему когда больному пушена кровь, то нужно взять его руку, во время кровотеченія наблюдать его пульсъ и позволять течь крови изъ жилы до тѣхъ поръ, пока твердый, крѣпкій и полный пульсъ въ оцупываемой нами рукѣ не сдѣлается мягкимъ, не ослабѣетъ и не упадетъ; впрочемъ, никогда не нужно пускать крови до тѣхъ поръ, пока у больного не появится блѣдность въ лицѣ, шумъ и звонъ въ ушахъ, круженіе головы и даже обморокъ; ибо при обморокѣ останавливается кровообращеніе; а какъ при воспалительной лихорадкѣ кровь легко ссѣдается, то въ сердцѣ могутъ произойти сгустки крови (полипы) и даже воспаленіе легкихъ. А какъ обмороки легко происходятъ у робкихъ больныхъ, при сидячемъ ихъ положеніи, то кровь всѣмъ болѣе лучше пускать въ лежачемъ положеніи, въ постель, и остановить теченіе крови, затворивъ пальцемъ отверстіе жилы, какъ скоро за-



мѣтимъ, что пульсъ начнетъ слабѣть, упадать и даже перемежаться.

3) Кровь изъ жилы должна течь быстро, ровно и полною струею; а для этого отверстіе въ жилѣ должно быть достаточно широкимъ. При такомъ кровоточеніи легко спадаются кровяные сосуды отъ опустѣнія, а это ихъ спаденіе умѣряетъ лихорадку и способствуетъ разрѣшенію воспаленія. Медленное кровоточеніе, особенно посредствомъ выжиманія крови изъ вскрытой жилы, мало приноситъ пользы; напротивъ, быстрое кровоточеніе замѣняетъ даже количество выпущенной крови, т. е. фунтъ крови, вытекшей разомъ скоро и быстро, равняется и даже превосходитъ дѣйствіе  $1\frac{1}{2}$ —2 фунтовъ крови, выпущенной медленно и въ нѣсколько пріемовъ. При равныхъ другихъ обстоятельствахъ, кровь пускаютъ обыкновенно изъ руки и притомъ лѣвой спереди на локтевомъ сгибѣ (смот. Кровоупусканіе).

4) Гораздо смѣлѣе можно пускать кровь: если больной 18—35 лѣтъ, полнокровенъ, крѣпокъ, подверженъ частымъ приливамъ крови къ легкимъ (кровохарканію), или головѣ (тяжести и боли головы), и наступаетъ время кровопусканія, къ которому онъ уже привыкъ, если у него прекратилось привычное кровоточеніе изъ носа, задняго прохода (почечуй), мѣсячное очищеніе у женщинъ, если состояніе воздуха и время года располагаютъ къ воспаленію: зима, сильный морозъ, сѣверовосточные вѣтры. При этихъ условіяхъ тѣло легче переносить и лишнюю потерю крови;—наконецъ, если являются признаки мѣстнаго воспаленія въ груди (короткій, сухой или съ полосками крови кашель, колюще въ боку при глубокомъ вдыханіи), въ головѣ (дикій взглядъ, блестяшіе глаза, сильная боль, бредъ, бѣшенство) и проч.

5) Это же обстоятельство нужно брать въ соображеніе, когда сомнѣваемся въ необходимости кровопусканія, а вблизи нѣтъ врача, который бы могъ разрѣшить наше сомнѣніе. Въ подобныхъ случаяхъ можно поступать такъ: пустивъ кровь, нужно внимательно наблюдать пульсъ, и если замѣчаемъ, что онъ начинаетъ упадать, слабѣть, дѣлаться скорымъ, если больной, не робѣвшій при началѣ



кровопускания, скоро поблѣднѣетъ, получить головокруженіе, шумъ и звонъ въ ушахъ, то, не смотря на малость вытекшей крови, нужно прекратить кровоупусканіе.

6) Одного кровоупусканія, особенно у людей крѣпкихъ, полнокровныхъ, 30—40 лѣтъ, привыкшихъ къ кровоупусканію, одержимыхъ притомъ воспаленіемъ въ груди, головѣ, иногда бываетъ недостаточно: чрезъ 8—12—24 часа послѣ перваго кровоупусканія, припадки лихорадки опять усиливаются; въ такихъ случаяхъ нужно пустить кровь въ другой, третій разъ и даже болѣе, если только пульсъ бываетъ притомъ твердый, крѣпкій, а не дѣлается мягкимъ, скорымъ и слабымъ, и если, сверхъ того, выпущенная кровь бываетъ густа, скоро створаживается и покрывается плотною, жирною бѣлоблестящею и тѣнкою, хотя, впрочемъ, послѣдняя и не всегда указываетъ на необходимость новаго кровоупусканія.

Примѣчаніе. Въ настоящее время врачи и не-врачи и самые больные часто во зло употребляютъ кровоупусканіе, увлекаясь въ этомъ случаѣ скорымъ облегченіемъ, которое оно доставляетъ; но эта временная польза часто бываетъ мнимая, и такіе люди въслѣдствіи много страдаютъ отъ потери крови, которая въ ихъ опустѣлыхъ сосудахъ раздѣляется не равномерно, но въ одномъ мѣстѣ накапливается болѣе, причиняетъ тяжесть, жаръ, боль и дѣлаетъ необходимымъ новое кровоупусканіе (излечивая настоящую мѣстную болѣзнь, усиливаетъ общее страданіе), а въ другомъ мѣстѣ крови бываетъ очень мало, сосуды его пустуютъ, тѣло дѣлается блѣднымъ, холоднымъ; сосуды такихъ людей можно сравнить съ мышкомъ, неполно налитымъ жидкостію и лежащимъ на неровномъ мѣстѣ, отъ чего жидкость скопляется въ части мышца, лежащей на отлогомъ, низкомъ мѣстѣ, между тѣмъ какъ другая часть мышца, лежащая на высшемъ мѣстѣ, бываетъ почти пуста. Посему мы еще повторяемъ, что съ кровоупусканіемъ нужно поступать осторожно, гдѣ можно, совѣтоваться съ врачомъ, постоянно наблюдать пульсъ при кровоупусканіи, и если только онъ начнетъ терять свою крѣпость, твердость и полноту, то немедленно останавливать кровотеченіе изъ жилы.



7) Пиявицы, а еще меньше пияска, рожки, не могут замѣнить кровопусканія изъ вены (жилы) крови, руды), хотябы мы приставили 40—80 пиявицъ, или 20—40 рожковъ, и хотя бы онъ высосалъ подкожной крови болѣе, чѣмъ при кровопусканіи; при томъ пиявицы и рожки бываютъ полезны только тогда, когда при лихорадкѣ находится и мѣстная боль (воспаленіе).

8) После кровопусканія, перевязавъ раненную жилу, больному нужно дать отдохнуть, а если захочетъ, то и поспать, оставивъ при немъ человека для наблюденія. За раненною рукою въ разсужденіи кровотеченія. Потомъ въ 2—3 пріемахъ дать слабительное изъ вѣнскаго питья (№ 7) или, просто, изъ Глауберовой, англійской соли съ таминами или майною (№ 6), такъ, чтобы больного прослбило 3—4 раза въ сутки; послѣ этого ему давать еелитру, которой онъ долженъ принять въ сутки около 2 драхмъ (№ 4—5).

9) При употребленіи этихъ средствъ и сказаномъ содержаніи больного (см. выше), припадки лихорадки уменьшаются и появляется переломъ — осадочною мочею, проливнымъ потомъ, какою-либо сыпью, нарывомъ. При появленіи сыпи, больного можно посадить въ теплую простую ванну и потомъ напоить его теплымъ же потогоннымъ чаемъ изъ бузиннаго, липоваго цвѣту, малины (№ 8), а нарывъ привести въ нагноеніе теплыми смягчительными припарками.

10) Но если лихорадка продолжается и даже усиливается и послѣ 6—7 дня и не появляются рѣшительныя (критическія) испражненія, то больному нужно дать (лучше всего на ночь) ложку столовую Миндерерова спирта для направленія перелома на кожу и произведенія пота.

11) Когда же и это не помогаетъ, то случай можетъ быть двоякій:

а) Или воспалительное состояніе прошло, а осталось въ тѣлѣ одно раздраженіе, что узнается изъ скорого, но мягкаго пульса, метучаго жара, недостатка сухости и жажды; здѣсь дать больному Миндереровъ спиртъ съ лавровишневою водою (№ 8), полагая послѣдней не болѣе драхмы въ сутки; или же б) воспалительная лихорадка переходитъ въ



нервную, либо гнилую, изнурительную, и тогда располагается лечение, сообразное этимъ видамъ лихорадки.

12) Припадочное лечение воспалительной лихорадки можетъ быть различное; вѣйчае однако нужно уменьшить головную боль, и для этого особенно полезны: возвышенное положеніе головы, темнота, прохлада въ комнату, тишина, обмываніе головы холодной водою и холодныя примочки, теплыя ножныя ванны, пиявицы къ вискамъ, горчишники къ икрамъ, плечамъ и даже затылку.

13) Послѣ перелома, если только неслишкомъ много было выпущено крови, больные выздоравливаютъ очень скоро, безъ всякаго крѣпительнаго леченія; нужно только беречься въ назначеніи пищи, потому болѣе, что послѣ потери крови такіе больные имѣютъ сильный голодь; но если не появляется позывъ на ѣду, то больному можно дать два раза въ день по 60 капель желудочнаго эликсира Гофмана (по совѣту врача), или хорошаго винограднаго вина, либо горькой настойки.

§ 8. Первая лихорадка, Первическая горячка, Первый Тифъ. Какъ въ воспалительной лихорадкѣ страдаютъ кровяные сосуды и кровь, а чрезъ нихъ поражаются сердце и легкія, такъ въ нервной горячкѣ поражаются нервы и сообщаютъ свое страданіе мозгу.

Припадки. Въ началѣ легкая дрожь, особенно въ спинѣ, чередующаяся съ летучимъ жаромъ, боль и круженіе головы, временное одуреніе, иногда обморокъ, грусть, уныніе, чувство большой слабости, дрожаніе рукъ и ногъ; позже появляется обморокъ, бредъ, сонливость, судороги; пульсъ скорый, малый, слабый, легко прижимаемый пальцами, иногда же медленный, но неполный и твердый, перемѣчивъ и несогласный съ дыханіемъ; при весьма скоромъ пульсѣ, дыханіе натуральное и даже медленное; вообще всѣ припадки непостоянны и перемѣчивы: моча то красная, мутная, то блѣдная и прозрачная; то запоръ, то поносъ; сухость во рту безъ жажды, горячая кожа, при чувствѣ больнымъ озноба; горчишники, мушка не причиняютъ боли въ кожѣ; не смотря на жестокость болѣзни, больной чувствуетъ себя какъ бы здоровымъ; присемъ не за-



мѣняется припадковъ другихъ лихорадокъ, особенно воспалительной, и теченіе лихорадки вообще неправильное: послѣ видимаго ослабленія болѣзни, она, безъ явной причины, вдругъ ожесточается, или же опасныя припадки (обморокъ, бредъ) вдругъ исчезаютъ и больной приходитъ въ память, но не на долго. Замѣтивъ такіе припадки въ здоровомъ донынѣ человѣкѣ, нужно пригласить врача.

Впрочемъ, случается, что все припадки болѣзни бываютъ такъ невѣрны, что и врачъ затрудняется въ ея опредѣленіи. Это бываетъ именно тогда, когда присоединяется воспаленіе желудка или кишекъ. Въ этомъ случаѣ, для разрѣшенія сомнѣнія, кромѣ ощупыванія брюха для узнанія не обнаружить ли больной, отъ прижатія его, боли, — дѣлаютъ пробное кровопусканіе: если, по мѣръ теченія крови изъ жилы, пульсъ подъ пальцами наблюдателя возвышается, полнѣетъ и дѣлается медленнѣе и крѣпче, то это означаетъ воспаленіе въ брюхѣ и указываетъ на необходимость кровопусканія; но если пульсъ дѣлается скорѣе, слабѣе, то нужно заключить о нервномъ свойствѣ болѣзни и скорѣе прекратить кровопусканіе. Это пробное кровопусканіе нужно также предоставить врачу.

Теченіе. По непостоянству припадковъ и самое теченіе этой горячки бываетъ неправильное. Очень часто за нѣсколько дней, и даже недѣль, до появленія лихорадки, такіе люди, не бывъ, впрочемъ, больными, чувствуютъ какую-то одурь и круженіе головы, бываютъ подвержены дрожанію тѣла, бозсонницъ, страшнымъ грезамъ во снѣ и на яву привидѣніямъ. Болѣзнь въ своемъ теченіи измѣняется, то къ лучшему, то къ худшему, продолжается 21—28 дней и даже болѣе; она рѣдко рѣшается явнымъ и полнымъ переломомъ, который чаще бываетъ неполный и оказывается въ видѣ просообразной сыпи, чирьевъ, нарывовъ и помертвѣнія, особенно околушныхъ желѣзъ, глухоты, слѣпоты, потери памяти и всего разсудка.

Выздоровленіе происходитъ медленно и съ трудомъ, — иногда въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Смерть приключается отъ изнуренія поносомъ, отъ паралича, пострѣла (удара), отъ разныхъ воспаленій, особенно въ головѣ и брюхѣ.



Изъ этого слѣдуетъ, что первическая горячка очень опасна и притомъ тѣмъ болѣе, что она, по своимъ признакамъ, обманчива: при видимой безопасности, больной вдругъ можетъ умереть, или же, напротивъ, отчаянный больной выздороветь. Впрочемъ, для опредѣленія опасности болѣзни, нужно особенно смотрѣть на 1) пульсъ: чѣмъ онъ скорѣе, слабѣе, меньше (чувствуется подъ пальцами какъ тонкая нитка), неправильнѣе, тѣмъ болѣе опасности; но чѣмъ натуральнѣе, спокойнѣе, правильнѣе, тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 2) на мочу: совершенно прозрачная, водянистая, либо густая, мутная, красная моча, съ облачкомъ сверху или на днѣ сосуда съ осадкомъ, между тѣмъ какъ по срединѣ сосуда она мутна—опасна; напротивъ того, если мутная моча начнетъ дѣлаться прозрачною, въ ней появляется сначала облачко, а потомъ и густой осадокъ, то можно надѣяться на выздоровленіе; 3) на голову: чѣмъ явнѣе и постояннѣе сонливость, безпокойнѣе сонъ, чѣмъ рѣже, и то на короткое время, больной приходитъ въ себя, мало или и совсѣмъ не жалуется на свою болѣзнь, невнятиѣ его рѣчь, труднѣе высловываніе языка и глотаніе, чѣмъ произвольнѣе испражненіе мочи, кала, значительнѣе судороги, дрожаніе языка, губъ, рукъ, чѣмъ безпокойнѣе онъ мечется въ постель, перебираетъ и какъ бы что-то ловить руками,—тѣмъ опаснѣе болѣзнь; но чѣмъ долѣе остается больной въ памяти, яснѣе говорить, спокойнѣе спать и лежить въ постель,—тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 4) на кожу: сухая, морщиноватая, слабкая кожа, не вездѣ равномерно теплая, мѣстами покрытая просовидною сыпью, синими пятнами, клейкимъ холоднымъ потомъ—опасна; очень опасны: упорный поносъ, кровавые моча и калъ, смрадный, вонючій запахъ отъ больного, пролежни на спинѣ.

Причины. Сущность нервной лихорадки состоитъ въ страданіи нервовъ и мозга, въ которомъ болѣе или меньше участвуютъ кровяные сосуды. Къ этой лихорадкѣ расположены люди слабаго, нѣжнаго тѣлосложенія, слишкомъ чувствительные, бѣлокурые, женщины, особенно роженицы, дѣти. Причиняетъ же ее все то, что ослабляетъ тѣло и по-



трясаеъ духъ: неурожай и голодъ, худая, испорченная пища, спертый, нечистый, напѣтанный животными испареніями воздухъ, и особенное его повальное состояніе; напряженіе, изнуреніе тѣла трудами физическими и умственными; разныя угнетающія страсти: горестъ, печаль, безнадежная любовь, потеря крови и другихъ соковъ (у женщинъ менструальное мѣсячное очищеніе, у мужчинъ потеря сѣмени чрезъ частое совокупленіе половъ, рукоблудіе), постоянный жаръ въ комнатѣ, знойное время года, пьянство, разныя заботы, несчастія, сырость, низкое состояніе барометра и особенная зараза. Кромѣ этого, всякая лихорадка, чрезъ изнуреніе больного, можетъ перейти въ нервную; особенно же часто это замѣчается послѣ воспалительной лихорадки, у простаго, рабочаго народа, живущаго въ тѣсныхъ, темныхъ, грязныхъ, курныхъ избахъ, въ подвалахъ, гдѣ цѣлые десятки мужиковъ, часто съ женами и дѣтьми, съ трудомъ размѣщаются на полу, прилавкахъ, полатахъ, печкахъ и проч.; въ такихъ случаяхъ всегда сначала появляется воспалительная лихорадка, которая, будучи пренебрежена, производитъ настоящее воспаленіе какой-либо внутренности и съ тѣмъ вмѣстѣ переходитъ въ нервную лихорадку, замѣчаемую особенно часто въ чернорабочихъ, городскихъ, тюремныхъ, заводскихъ, фабричныхъ больницахъ.

Леченіе. Ко всякому нервно-лихорадочному больному, гдѣ только есть возможность, нужно пригласить врача, или же отослать его въ больницу; но если нельзя сдѣлать ни того, ни другаго, то леченіе нервно-лихорадки нужно ограничить простыми средствами и отнюдь не употреблять, такъ называемыхъ, нервныхъ, летучихъ, возбуждающихъ лекарствъ: камфоры, эфирныхъ маселъ, вина, спирта, мускуса, бобровой струи и пр. Вообще же нужно поступать такъ:

1) Въ легкой степени, при умѣренно-частомъ пульсѣ (80—100 разъ въ минуту у взрослыхъ, и 120 разъ у дѣтей), при легкомъ, временномъ бредѣ или и отсутствіи его вовсе, кромѣ общихъ противолихорадочныхъ мѣръ, относительно содержанія больного, лучшее средство есть хлориновая вода (№ 9), даваемая по половинѣ, или по цѣлой унціи, въ сутки; для питья вода съ виннымъ уксусомъ, теп-



лая ванна; при бредѣ горчичникъ къ икрамъ, плечамъ, затылку. Если у больного замѣчаются притомъ желудочные припадки, горечь во рту, отрыжка, тошнота, нечистый языкъ, то рвотное (*№* 10), а потомъ легкое слабительное (*№* 6), а при ревматическихъ боляхъ — теплая ванна и на ночь 1—2 столовые ложки Миндерерова спирта, теплый чай изъ бузиновыхъ, липовыхъ цвѣтовъ, сушеной малины и даже изъ соломы.

2) Въ сильной степени — при бредѣ, сонливости, судорогахъ, измѣчивости припадковъ, — нужно прежде всего изслѣдовать, нѣтъ ли у больного воспаления въ головѣ или брюхѣ. О присутствіи воспаления мозговъ можно заключить, если у больного глаза красны и блестящи, взоръ бѣглый, дикій, лице красное и опухлое, шейные сосуды вздуты и сильно бьются, голова горяча, моча красная, пульсъ частый и полный, или же, — отъ прижатія мозга, — медленный; если больной молодъ и крѣпокъ, привыкъ къ кровопусканію, у него прекратилось привычное кровотеченіе (почечуйное, мѣсячное, изъ носа); если въ это время (зимою) существуетъ воспалительно-повальное состояніе воздуха; если, отъ выпитія больнымъ рюмки вина, усиливается его безпокойство, жаръ и бредъ, а пульсъ дѣлается скорѣе. Здѣсь лучшее средство: пиявицы къ вискамъ, позади ушей, къ затылку, къ ложечкѣ и къ тому мѣсту брюха, отъ прижатія котораго измѣняются черты лица больного, и потомъ холодныя примочки къ головѣ, со льдомъ, снѣгомъ, холодныя обливанья тѣла чрезъ каждые 2—4 часа, т. е. по мѣрѣ того, какъ усиливается жаръ и сухость кожи; клистиры съ уксусомъ двѣ ложки уксуса на стаканъ жидкости, частые горчичники къ икрамъ, бедрямъ, а при сонливости и бредѣ — мушка на затылокъ; внутрь дать нашатырь съ поташнымъ (*tartarus tartarisatus*) и рвотнымъ камнемъ (*№* 11).

Воспаленіе въ брюхѣ можно подозрѣвать: если, отъ прижатія брюха въ какомъ-либо мѣстѣ, черты лица больного выражаютъ боль, онъ вздрагиваетъ притомъ, дѣлается болѣе безпокойнымъ, его часто тошнитъ, у него холодютъ руки, ноги, пульсъ тонкій, какъ иголочка и очень скорый. Здѣсь полезны пиявицы къ мѣсту боли (най-



чае подъ ложечку) и теплыя припарки на живость, горчичники къ рукамъ, ногамъ, спинѣ; внутрь — нашатырь съ миндальнымъ, коноплянымъ молокомъ (№ 12). Это же леченіе, кромѣ пиявицъ, нужно продолжать и тогда, когда воспалительныя припадки прекратятся, или ихъ и вовсе не было (что, впрочемъ, случается очень рѣдко), а между тѣмъ безпокойство, бредъ, сонливость, судороги и пр. продолжаютъ. Въ сильной степени этой лихорадки врачи употребляютъ крѣпкія возбуждающія средства: камфору, мускусъ, бобровую струю, эфирныя масла, вино, спиртъ, даже фосфоръ; но мы не советуемъ этого дѣлать: эти средства требуютъ особенной опытности и проницательности при ихъ назначеніи, а безъ того они легко могутъ погасить послѣднюю искру жизни въ больномъ, возбудивъ раздраженіе въ нервахъ и воспаленіе, или по крайней мѣрѣ приливъ крови къ мозгу, отъ чего больной впадаетъ въ безчувствіе, въ жестокой бредъ, непробудный сонъ, или же получаетъ онемѣніе языка, рукъ, ногъ, произвольное испражненіе мочи, кала, помертвѣніе въ живость, — и умираетъ. Впрочемъ, по уменьшеніи жара и безпокойства, при общей слабости, безчувствіи, можно дѣлать вливать въ ротъ по чайной, а взрослымъ по столовой ложкѣ стараго рейнвейна, или простаго хлѣбнаго вина, спирта, разведеннаго водою.

Въ этой степени больные, теряя самосвѣдѣніе, ни чѣмъ не выражаютъ своихъ нуждъ, а потому нужно смотрѣть за ними внимательно и, при всякомъ движеніи рта, шевеленіи губъ, подносить имъ питье воды простой, съ уксусомъ, кислымъ сокомъ, виномъ; равно смотрѣть на произвольное испражненіе мочи и кала и не заставлять больного лежать въ замаранной постелѣ.

Послѣ нервной лихорадки больные выздоравливаютъ очень медленно, и за ними нужно строго смотрѣть, чтобы они не простудились, не разстроили желудка пищею, не были встревожены чѣмъ-либо душевно; имъ давать съ осторожностію и въ маломъ количествѣ легко-варимую пищу (супъ изъ курицы, уху, яйца въ-смятку, молоко); для питья — воду съ виномъ; занимать ихъ легкими, пріятными разказами,



чтениемъ и почае и подолбе доставлять имъ случай дышать свѣжимъ, чистымъ воздухомъ.

§ 9. Желудочная, желчная, брюшная лихорадка. Припадки: нечистый языкъ, покрытый бѣлою, желтою, темноватою слизью; отвращеніе отъ пищи: горькій, вязкій, мѣдный, кислый, слизистый вкусъ во рту; отрыжка, тошнота и рвота; тяжесть и давленіе, а иногда и боль подъ ложечкою, чувство слабости, усталость, лѣнь, тупость и бездѣйствіе памяти, воображенія и вообще сужденія; пульсъ скорый, но не полный и не твердый, какъ въ воспалительной, но и не слабый, какъ въ нервной лихорадкахъ; кромѣ того, тѣлосложеніе больного, повальное состояніе воздуха, время года и другія причины способствуютъ распознаванію этой лихорадки.

Теченіе — не опредѣленно: лихорадка отъ засоренія желудка не продолжительна, но желчная, слизистая, можетъ продолжаться нѣсколько недель. Вообще она рѣшается рвотою, поносомъ, но иногда потомъ, мочою, просовидною сыпью, молочницею во рту, нарывомъ около ушей; за исключеніемъ рвоты и поноса, всѣ другіе переломы бываютъ обыкновенно тогда, когда леченіе лихорадки вначалѣ было пренебрежено, или ее лечили неправильно — возбуждающими, потогонными средствами, и чрезъ то кишечныя нечистоты вошли въ кровь, или когда больной былъ не воздерженъ въ пищу, питьѣ; самъ по себѣ, или по требованію другихъ, вѣлъ и пилъ противъ воли. У людей невоздержныхъ, слабыхъ, эта лихорадка течетъ очень медленно и переходитъ въ изнурительную.

Смотря по роду нечистотъ, собравшихся въ желудкѣ и кишкахъ, эта лихорадка бываетъ пищевая, желчная, слизистая, глистная, можетъ перейти въ воспалительную, нервную, гнилую и сопрягаться съ страданіемъ печени, груди, головы.

Причины. Желудочная лихорадка всегда происходитъ отъ скопленія нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ и излечивается вѣрно и скоро только чрезъ скорое испражненіе сихъ нечистотъ, которыя, не бывъ переварены, отягчаютъ, раз-



дражаютъ желудокъ и кишки и поражаютъ сначала ихъ, а потомъ органы груди и головы. Самыя же нечистоты зараждаются двояко: или оны суть остатки отъ пищи, или отдѣлены желудкомъ, кишками, печенью. Пищевыя нечистоты скопляются, когда мы употребляемъ пищи болѣе, нежели сколько можетъ переварить нашъ желудокъ (очень частый случай лихорадки), или когда ѣдимъ трудно-варимую, непривычную, испорченную пищу, хотя и въ маломъ количествѣ, когда часто ѣдимъ пищу мучнистую, крахмальную, жирную, масляную, здобный, мягкій хлѣбъ, калачи, блины, клецки, макароны, лапшу, ветчину, солонину, жирную, соленую, испорченную рыбу и пр.

Нечистоты, отдѣляемыя брюшными внутренностями, суть испорченный желудочный сокъ, вязкая, густая кишечная слизь, глисты, острая, зеленая, черная желчь. Пищевыя нечистоты поддерживаютъ и усиливаютъ скопленіе желудочныхъ и кишечныхъ нечистотъ; равно какъ и послѣднія, препятствуя пищеваренію, способствуютъ порчѣ пищи и ея накопленію въ желудкѣ и кишкахъ. Впрочемъ, безъ удаленія изъ брюха тѣхъ и другихъ нечистотъ, излеченіе желудочной лихорадки невозможно.

Происхожденію желудочной лихорадки способствуютъ: привычное обжорство и происходящая отъ того слабость, истомленіе желудка и кишекъ, раздраженіе печени, сидячая жизнь, умственные занятія, сжатіе брюха во время работы, распутство, пьянство, влажная погода, болотистое мѣсто, сырые, душные покои, конецъ лѣта и осень до морозовъ, вышеприведенная пища, печаль, досада, гнѣвъ, испугъ, слабость кишекъ послѣ поноса, колика, завады брюшныхъ внутренностей и пр.

Леченіе имѣетъ цѣлю испразжнить желудочныя нечистоты, исправить дѣйствіе желудка и кишекъ.

1) Если у больного находятся легкіе желудочные припадки, безъ тягости въ животѣ, рвоты, то бываютъ достаточны одни разръшающія средства: поташный камень (tartarus tartarisatus), кремортартаръ, нашатырь, уксусокислый поташъ, Главберова, англійская соль — все въ такихъ приѣмахъ, чтобы не слабило, т. е. по 1 и 2 драхмы ѣжымъ,



чувствительнымъ людямъ, можно давать шипучій порошокъ (№ 3), Миндереровъ спиртъ; при водянистомъ поносѣ—нашатырь. Эти средства разбиваютъ, растворяютъ вязкую слизь, поправляютъ отдѣленіе въ желудкѣ и кишкахъ, собираютъ, такъ сказать, нечистоты вмѣстѣ, дѣлаютъ ихъ скопленіе кверху или книзу явнымъ, а испражненіе необходимымъ. Но если при употребленіи сихъ средствъ въ теченіе 2—4 дней не происходитъ явнаго скопленія нечистотъ ни кверху ни книзу, а лихорадка продолжается безъ перемѣны, то нужно изслѣдовать брюхо и нижнюю часть груди; причемъ перѣдко открываются слѣды боли въ желудкѣ, кишкахъ, печени; въ такомъ случаѣ къ больному мѣсту нужно приставить 6—12—20 пиявицъ и сдѣлать нѣсколько смягчительныхъ припарокъ.

2) При явномъ скопленіи нечистотъ кверху, т. е. въ желудкѣ и верхней части кишекъ, бываетъ горечь во рту, частая отрыжка, тошнота, позывъ на рвоту, чувство полноты и давленія подъ ложечкою, урчаніе. Здѣсь нужно дать больному рвотное, разомъ (№ 10, а), или въ раздѣленныхъ пріемахъ для слабыхъ (№ 10, б), а для дѣтей № 76); раздѣльные пріемы нужно повторять чрезъ 10—15 минутъ до тѣхъ поръ, пока не появится рвота. Когда больного начнетъ рвать, то, для облегченія рвоты, давать ему пить по чашкѣ теплой воды, ромашковой, теплой же, наливки; больного должно вырвать не менѣе трехъ разъ, для чего бываетъ потребно отъ двухъ до пяти пріемовъ. Рвотное всегда вѣрнѣе давать въ раздѣльныхъ пріемахъ, ибо полный пріемъ рвотнаго у иныхъ людей можетъ произвести опасную рвоту. Если больной полнокровецъ, крѣпокъ, имѣетъ сильную головную боль и около желудка, твердый, полный пульсъ, то предъ рвотнымъ нужно пустить кровь: иначе во время рвоты можетъ произойти пострѣлъ (ударъ); притомъ у полнокровныхъ послѣ кровопусканія и самая рвота происходитъ скорѣе и легче. При готовности къ рвотѣ, последняя происходитъ отъ выпитія теплой воды и шекотанія пальцами въ глоткѣ (нёба). Но если въ желудкѣ скопилось много нечистотъ (послѣ объяденія) и онѣ въ немъ оставались долго, отъ чего и желудокъ сдѣлался нечувстви-



тельнымъ, или уже появился водянистый поносъ, то нужно дать полное рвотное разомъ, и притомъ изъ скрупула рвотнаго корня (а не камня); послѣ сего, для возбужденія желудка, противъ его, на брюхо можно положить мушку, а для унятія поноса дать больному внутрь 6—10 капель настойки опія.

Многіе больные не любятъ рвотнаго и, вмѣсто его, охотнѣе принимаютъ слабительное: это несправедливо и можетъ быть вредно. Слабительное не можетъ замѣнить рвотнаго, равно и напротивъ; то, что природа хочетъ испражнить верхомъ, не можетъ быть съ такимъ успѣхомъ извергнуто низомъ. Нечистоты, извергаемыя рвотою, проходятъ короткій путь и быстро; но эти же нечистоты, испражняемыя низомъ, движутся медленнѣе, проходятъ длинный путь, на которомъ онѣ всасываются и обращаются въ кровь; съ другой стороны, слабительное, кромѣ нечистотъ, испражняетъ и нужные соки и ослабляетъ больного. При запорѣ на-изъ, нужно послѣдній прежде разрыть клистиромъ и потомъ уже дать рвотное; иначе можетъ произойти смертельная рвота отъ переплетенія кишекъ между собою.

3) При явномъ скопленіи нечистотъ въ нижней части кишекъ замѣчаются: полный, мягкій животъ, тяжесть въ его нижней части, боль въ поясницѣ и бедрахъ, урчаніе въ животѣ, частые, вонючіе вытры, смрадные ненатуральнаго цвѣта испражненія. Здѣсь полезны: лучше въ раздѣльныхъ малыхъ, чѣмъ разомъ въ большихъ приѣмахъ, огуречный разсолъ, сыворотка, сокъ изъ моркови, свеклы, сърнокислая магнезія (горькая, сибирская, англійская соль), поташный камень, строкислый поташъ, манна, тамаринды, черносливъ; при вязкой слизи—нашатырь, при малой чувствительности—александрійскій листъ въ видѣ въискаго питья (№ 5, № 6, № 7), ревень, а при чувствительности—клещевинное (касторовое), конопляное, деревянное масло. Эти испражняющія средства больной принимаетъ столько, чтобы ежедневно было 3—4 испражненія низомъ, и продолжаетъ ихъ до тѣхъ поръ, пока не прекратится лихорадка, не очистится языкъ и не появится позывъ на сту и сами испражненія не примутъ натуральнаго цвѣта. Если же ли-



хорадка продолжается и притомъ находится водянистый поносъ; то нужно бываетъ или повторить рвотное изъ рвотнаго корня, или дать слабительное изъ ревеня съ магнезією. Это леченіе можетъ продолжиться отъ трехъ дней до трехъ недѣль. Подъ конецъ леченія слабительныя (лучше всего ревенъ) соединяются съ горькими лекарствами—одуванчикомъ, трилистникомъ, горечавкою (№ 15).

Выздоровливающіе послѣ желудочной лихорадки должны наблюдать строгую діету по крайней мѣрѣ 2—4 недѣли, не ѣсть безъ позыва на ѣду, удовлетворять аппетитъ не до пресыщенія и вставать изъ-за стола полуголодными; лучше ѣсть чаще, но понемногу, чѣмъ рѣдко, да много, и употреблять свѣжую, легковаримую пищу, но не жирную и не молоко.

§ 10. Гнилая лихорадка, горячка. Припадки. — Гнилая горячка начинается подъ видомъ воспалительной, нервной или желудочной, особенно желчной, а потомъ появляются ея собственные припадки: высокая слабость, изнеможеніе, слабый, малый, скорый, легко сжимаемый пальцемъ пульсъ, ѣдкая, жгучая теплота, т. е. послѣ прикосновенія къ тѣлу такого больного, въ пальцахъ прикасавшагося человека на долго остается непріятное чувство жженія; испарина и дыханіе издають вонючій запахъ, который еще болѣе чувствуется въ калѣ и мочѣ; первый бываетъ притомъ жидкій, темный, черный, а послѣдняя мутная, кровавая и легко различается, издавая острый, нашатырный запахъ; на брюхѣ, груди появляются въ кожѣ краснобагровыя, синія, темныя пятна, холодный, клейкій потъ, кровотеченіе изъ носа, рта, десенъ, легкихъ, задняго прохода; на плечахъ, спинѣ, крестцѣ происходятъ пролежни, на рукахъ и ногахъ помертвѣніе (антоновъ огонь); истекающая кровь бываетъ черная, жидкая, не разлагается на творогъ и сыворотку, но остается въ видѣ жидкой каши. Кромѣ того, въ гнилой горячкѣ замѣчаются головокруженіе, обмороки, бредъ, судороги, черныя, сухія, потрескавшіяся губы и языкъ, покрытые плотною корою засохшей слизи; въ началѣ болѣзни рвота желчью, а къ концу—поносъ съ непроизвольнымъ, вонючимъ испражненіемъ кала и мочи.



**Причины.** Гнилая горячка или есть слѣдствіе другой лихорадки, какъ сказано выше, когда больной бываетъ подверженъ вреднымъ вліяніямъ: нечистому, спертому воздуху въ тѣсномъ, сыромъ, грязномъ жилищѣ, теплотѣ съ сыростию въ душныхъ землянкахъ, казематахъ, тюрьмахъ; когда больного, въ ложномъ понятіи подкрѣпить его, насильно заставляютъ ѣсть мясную пищу, пить крѣпкое вино, кутаютъ для защиты отъ простуды его въ одѣяло, держать на печкѣ и пр. Или же гнилая горячка возникаетъ сама по себѣ у людей худосочныхъ, подверженныхъ заваламъ внутренностей, цынгъ, водяной, любострастной болѣзни, употреблявшихъ много ртути. При неурожаяхъ—общемъ голодѣ, холодѣ, гнилая горячка развивается повально и бываетъ даже заразительна.

**Леченіе.** Гнилая горячка есть самая опасная: немногіе отъ нея выздоравливаютъ и притомъ всегда очень медленно; посему къ такимъ больнымъ всегда нужно приглашать лекаря. Важнѣйшее условіе при леченіи этой болѣзни состоятъ въ хорошемъ помѣщеніи больныхъ: въ чистой, сухой, свѣтлой комнатѣ, умеренно-прохладной и наполненной свѣжимъ, чистымъ, сухимъ воздухомъ; поить его часто, но понемногу, чистою водою, или съ уксусомъ, кислымъ сокомъ; голову примачивать холодною водою съ уксусомъ; тѣло почаще обмывать губкою, намоченной въ холодной водѣ, простой, или съ уксусомъ; въ комнатѣ курить слегка уксусными парами, освѣжать воздухъ въ комнатѣ отвореніемъ форточки въ окнѣ, топлениемъ печки, не закрывая трубы, прысканіемъ воды, уксуса на полъ, на стѣны; больного покрывать легко, голову класть на постель возвышенно; наблюдать за чистотою въ постель и послѣ всякаго непроизвольнаго испражненія перемѣнять белье, одѣяло,—а остальное предоставить цѣлительной силѣ больного и искусству врача.

Впрочемъ, гнилая горячка всегда есть слѣдствіе общаго несчастія—неурожая, голода, пожара, войны;—посему оказывается разомъ на многихъ людяхъ повально, и потому, по распоряженію начальства, въ такихъ случаяхъ для леченія больныхъ присылаются врачи изъ ближайшихъ мѣстъ.



§ 11. Кромѣ гнилой горячки, которая, при скопленіи больныхъ, портя воздухъ, производитъ особенную заразу, есть другія заразы, которыя производятъ собственныя имъ горячки съ нарывами, пятнами, сыпями. Сюда принадлежатъ: чума, сибирская язва, оспа, корь, скарлатина, водобоязнь, крупъ, коклюшъ. О нѣкоторыхъ изъ этихъ болѣзней мы будемъ говорить впоследствии; другія же (чума) не могутъ быть съ пользою преподаны въ народномъ смыслѣ.

§ 12. Переменная, перемежающаяся лихорадка, лихорадка, трясца, тѣтка. Переменная лихорадка, или собственно лихорадка, отличается отъ предыдущихъ лихорадокъ, или горячекъ, тѣмъ, что главные лихорадочные припадки въ ней на нѣкоторое время вовсе прекращаются, потомъ опять появляются, вновь прекращаются и т. д.

Припадки. Правильная лихорадка начинается потягою, зѣвотою, лѣнью и усталостію, потомъ дрожью, переходящею въ ознобъ, сменяемый жаромъ, который оканчивается теплымъ повсемѣстнымъ потомъ; во время дрожи и озноба пульсъ бываетъ твердый, скорый, сжатый, въ жаръ—полный и скорый, а при потѣ—мягкій, моча при ознобѣ блѣдная, свѣтлая, въ жаръ—красная и свѣтлая, а послѣ пота мутная, съ осадкомъ кирпичнаго цвѣта; во время озноба больного томить жажда, во время жара мучить головная боль. У людей молодыхъ, полнокровныхъ, впервые подвергшихся лихорадкѣ, ознобъ бываетъ очень сильный, такъ-что тѣло сжимается какъ бы отъ стужи, кольца спадываютъ съ пальцевъ, больной стучитъ зубами, какъ сильно озлябшій, подпрыгиваетъ на кровати и не можетъ нагрѣться на теплой печкѣ, подъ шубами и перинами; столько же силенъ бываетъ и жаръ: отъ больного пышетъ какъ отъ нагрѣтой печки, онъ изнемогаетъ отъ внутренняго жара, стонетъ, мечется, не терпитъ никакого покрова и сильно страдаетъ отъ головной боли. Съ появленіемъ теплаго пота сначала на лбу, потомъ на груди, спинѣ, животѣ и наконецъ на всемъ тѣлѣ, иногда такъ обильнаго, что промокаетъ все бѣлье и постель, — всѣ припадки лихорадки прекращаются, больной забывается, засыпаетъ и пробуждается какъ бы совсемъ здоровымъ.



Тотъ періодъ времени, въ который продолжается эта лихорадка, называется приступомъ, пароксизмомъ лихорадочнымъ; онъ продолжается отъ 4 до 6—12 часовъ и даже болѣе; въ прочее время больной бываетъ свободенъ отъ лихорадки (перемежка).

Приступы обыкновенно появляются правильно въ известное время: разъ въ сутки, чрезъ 24 часа (л. ежедневная), разъ въ двое сутокъ, чрезъ 48 часовъ (л. трехдневная), и разъ въ трое сутокъ, чрезъ 72 часа (л. четырехдневная) и даже чрезъ семь дней (лих. еженедѣльная). Иногда въ известное время т. е. въ теченіе 24—48—72 часовъ бываютъ два приступа въ такомъ порядкѣ, что первый приступъ, по времени его появленія и по припадкамъ, соответствуетъ третьему, а второй четвертому. Такая лихорадка называется двойною.

Лихорадка, которой приступы состоятъ изъ явныхъ припадковъ, называется явною, доброкачественною; она легко распознается и излечивается. Но случаются лихорадки, особенно въ жаркихъ, болотистыхъ странахъ, въ знойное лѣто, съ перваго взгляда неимѣющія никакого сходства съ лихорадкою. Такія лихорадки появляются: подъ видомъ боли въ головѣ, въ зубахъ, животѣ, спинѣ, рукахъ, ногахъ, онѣмѣнія, паралича, сонливости, безгласія, поноса со рвотою на подобіе холеры, колюща въ груди, воспаленія глазъ, легкихъ, печени; называются скрытыми, маскированными и узнаются только тѣмъ, что сказанные припадки появляются въ известное время, потомъ проходятъ, опять возвращаются въ то же время и т. д., и что послѣ ихъ приступа въ мочѣ замѣчается кирпичнаго цвѣта осадокъ. Эти лихорадки, появляясь подъ видомъ сонливости, безчувствія, глубокаго обморока, пострѣла, паралича, судорогъ, бываютъ очень опасны, убиваютъ больного во 2—3-мъ приступѣ, и потому называются еще и злокачественными. Онѣ встрѣчаются въ южныхъ мѣстахъ Россіи въ Мало- и въ Новороссіи, въ Бессарабіи, Крыму, по обѣимъ сторонамъ Кавказа, въ Астрахани.

Отъ стеченія разныхъ обстоятельствъ, перемежная лихорадка можетъ сдѣлаться безпрерывною (воспалительною).



послабляющею, желудочною и нервною; продолжается же она очень неопредѣленно: иногда оканчивается въ 1—2—4 пароксизма, а иногда тянется мѣсяцы и годы, прекращается и опять возвращается; особенно упорна въ излеченіи и легко возвращается (четверодневная лихорадка). Лихорадка, обнаруживающаяся въ настоящемъ своемъ видѣ, не опасна, но скрытныя, маскированныя, злокачественныя лихорадки очень опасны. Четверодневныя, продолжительныя, упорныя, перемежныя лихорадки также опасны по ихъ послѣдствіямъ, которыя суть завалы брюшныхъ внутренностей, худосочіе, водянка, разныя нервныя боли. Впрочемъ, замѣчено, что люди, страдавшіе до лихорадки разстройствомъ желудка, завалами брюшныхъ внутренностей, иногда избавлялись отъ сихъ болѣзней, именно чрезъ лихорадку, которая производитъ въ тѣлѣ больного вообще сильный переворотъ.

**Причины.** Сущность перемежной лихорадки состоитъ въ приливѣ крови отъ поверхности тѣла къ внутреннимъ его частямъ и въ отливѣ крови отъ сихъ частей опять къ кожѣ. Этотъ приливъ крови къ внутренностямъ и отливъ ея къ кожѣ сопровождается ознобомъ, жаромъ и потомъ; во время прилива кровь отъ кожи устремляется къ головѣ, груди и брюху, и отъ того кожа пустѣетъ, дѣлается блѣдною, морщиноватою, сухою, жесткою и появляется ознобъ; послѣ сего цѣлительная сила больного противодействуетъ этому напору крови, силится прогнать ее опять къ окружности тѣла и наступаетъ жаръ, полнота въ кожѣ; наконецъ это волненіе крови—приливъ и отливъ—оканчивается потомъ, которымъ и рѣшается лихорадочный приступъ, опять появляющійся въ опредѣленное время и въ прежнемъ порядкѣ.

Главныя причины лихорадки суть: земныя, болотныя испаренія; посему лихорадка рѣдко бываетъ зимою, когда замерзла вода и земля, также въ холодныхъ, гористыхъ, песчаныхъ странахъ, въ сухое время года; не обыкновенно появляется въ прочія времена года, въ сырыхъ, низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ тепломъ климатѣ, въ дождливое, пасмурное, туманное время года, послѣ наводненія.



Посему въ некоторыхъ странахъ лихорадка есть собственная мѣстная болѣзнь, особенно между жителями по берегамъ рѣкъ, озеръ, болотъ. Здѣсь она льтомъ, въ знойное время, дѣлается повальною и во время полевыхъ работъ, крестьяне, почуюшіе на открытомъ мѣстѣ, на землѣ, ею занемогаютъ въ такомъ числѣ, что даже останавливаются полевые работы. Разстроенное пищевареніе, объяденіе, трудноваримая пища (весною жирная рыба), сонъ послѣ объѣда на сырой землѣ, въ саду (приспать лихорадку), у воды, простуда, промоченіе на дождѣ, купанье въ холодной водѣ, завалы въ брюхѣ, худосочіе ломотное (подагренное), любострастное, цынгетное, золотушное; наконецъ сама лихорадка, долго продолжавшаяся, оставляетъ большое къ себѣ расположеніе и легко возвращается при малѣйшемъ поводѣ, отъ неосторожности въ пищу и проч. Такіе люди имѣютъ болѣзненный, блѣдножелтый, даже грязный цвѣтъ лица, опухоль въ животѣ, отѣкъ ногъ, скоро устаютъ и неспособны ни къ какому продолжительному занятію.

Леченіе. Обыкновенная перемежная лихорадка излечивается легко; но не должно торопиться ея леченіемъ, а дать ей повториться въ 3—6-хъ приступахъ; ибо чрезъ обильный потъ и густо-осадочную мочу, появляющіяся послѣ всякаго приступа, природа очищаетъ соки больного и излечиваетъ его отъ многихъ застарѣлыхъ болѣзней брюха; торопливое же прекращеніе лихорадки можетъ воспрепятствовать этому ея благотворному дѣйствию. Впрочемъ, не нужно позволять ей и продолжаться слишкомъ долго, ибо она изнуряетъ силы больного и производитъ другія болѣзни. Вообще при леченіи сей лихорадки нужно наблюдать слѣдующія правила:

1) Нужно стараться, чтобы приступъ засталъ больного съ пустымъ желудкомъ, который въ это время ничего переварить не можетъ; посему за 3—4 часа до приступа больной ничего не долженъ ѣсть, хотя бы онъ и имѣлъ позывъ на ѣду; предъ приступомъ нужно развлекать вниманіе больного другими предметами, чтобы онъ мало думалъ о лихорадкѣ, которой приступъ отъ сего въ самомъ дѣлѣ бываетъ



легче; въ этомъ отношеніи полезно обманывать больного, переставивъ часы впередъ, и такъ увѣривъ его, что время приступа уже прошло.

2) При появленіи первыхъ припадковъ лихорадки, больной долженъ лечь въ постель и хорошо укрыться. Для утоленія жажды, больному давать часто, но понемногу, пить воду, чай изъ бузины, ромашки, мяты, мелиссы. Во время жара больного содержать прохладнѣе, но не давать ему совсѣмъ раскрываться, дабы не замедлить появленія пота; поить его лимонадомъ, квасомъ, водою съ кислымъ сокомъ. При появленіи пота, больного укрывать тщательно, защищать отъ простуды, вѣлѣть ему лежать въ постели спокойно, дать ему выпить теплаго чаю изъ бузины, липового цвѣта, соломы и позволить встать съ постели и переменить бѣлье не прежде, какъ совсѣмъ прекратится потъ.

Чѣмъ строже больной наблюдаетъ эти предосторожности въ приступѣ, тѣмъ лучше онъ чувствуетъ себя во время перемежки; отъ пренебреженія же ихъ и перемежка бываетъ несовершенна и приступъ жестокъ. Послѣ того, приступая къ леченію лихорадки, нужно стараться узнать и удалить ея причину. Въ этомъ отношеніи нужно иногда больному дать рвотное, или слабительное (при объяденіи, разстройствѣ пищеваренія), потогонное (при простудѣ); лечить отъ заваловъ внутренностей, отъ цыги, любострастной и проч.

3) Выждавъ 4—6 приступовъ лихорадки, нужно начинать леченіе ея такъ: если языкъ нечистъ и горечь во рту, если притомъ, для удаленія причины лихорадки, мы не давали рвотнаго, то нужно его теперь дать больному за 1—2 часа до приступа, во время котораго давать больному нашатырь съ селитрою и кремортартаромъ, а по прошествіи приступа въ безлихорадочное время—нашатырь же въ наливкѣ изъ ромашки, трилистника, тысячелистника, корня пра. Эти средства иногда прекращаютъ лихорадку; они сильнѣе дѣйствуютъ въ порошокъ (№ 13), или вытяжкѣ (№ 14); ихъ нужно продолжать въ промежуткѣ 2 — 3 приступовъ. Но если лихорадка не проходитъ и даже ея приступы не ослабѣваютъ, то нужно употребить настоящее про-



тиволихорадочное лекарство: ни хину, или хинную соль, предъ употребленіемъ которыхъ нужно смотрѣть, чтобы желудокъ былъ чистъ и языкъ не покрытъ слизью, чтобы больной въ лихорадочнаго приступа былъ совершенно спокоенъ тѣломъ и душою, имѣлъ натуральный пульсъ, не чувствовалъ ни жара, ни сухости во рту, и нигдѣ никакой боли.

4) Вѣрнѣе всего хина дѣйствуетъ послѣ рвотнаго; она употребляется такъ: въ свободное отъ лихорадки время взрослый больной принимаетъ по полудраммѣ, или, по цѣлой драммѣ, чрезъ часъ въ ежедневной, чрезъ два часа въ трехдневной, и чрезъ два-три часа въ четверодневной лихорадкѣ, въ мелкомъ порошокъ лучшей хины (царской, красной), такъ, чтобы въ промежуткѣ времени между приступами принять около унціи хины; если же даемъ хинную соль, то больной въ такое же время долженъ ее принять 7—16 гранъ, принимая по 1—2 грана въ порошокъ или въ растворъ (№ 15); послѣдній пріемъ хины, или ея соли, до новаго приступа лихорадки долженъ быть самый больной 1—2 драммы хины, 2—4 грана хинной соли и (принять предъ самымъ приступомъ. Если хина, или ея соль, производятъ поносъ, то это означаетъ, что онѣ не перевариваются, что желудокъ нечистъ; въ такомъ случаѣ нужно уменьшить пріемъ хины, соединить ее съ нашатыремъ по 5—8 гранъ на пріемъ, или къ каждому пріему хины, или ея соли, прибавлять каплю опійной настойки, либо давать хину въ мадеръ, водкѣ; но если хина производитъ запоръ, то она соединяется съ ревенемъ (5—10 гранъ на пріемъ), а когда причиняетъ давленіе въ желудкѣ, ищменіе тошноту и даже рвоту, то она смѣшивается съ порошокъ корицы, тиббрия, мушкатнаго орѣха, или порошокъ хины запивается ложкою хорошаго вина, или же и самый порошокъ принимается въ винѣ (мادرъ, портвейнъ, водкѣ).

5) Въ большей части случаевъ это леченіе бываетъ успѣшно: при немъ лихорадка, постепенно ослабѣвая, послѣ 3—4-го приступа прекращается вовсе; но, не смотря на то, должно продолжать противолихорадочное леченіе, уменьшая его постепенно, такъ, чтобы въ первомъ промежуткѣ време-



ни, послѣ прекратившагося приступа, употребить весь пріемъ порошковъ, какъ бы въ ожиданіи приступа, во второмъ—половину, въ третьемъ—одну треть, а въ четвертомъ—четверть полного пріема. Посему леченіе лихорадки можетъ продолжиться 8—14 дней и даже болѣе, особенно если лихорадка продолжалась уже нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, либо возвращалась неоднократно.

Во все время леченія лихорадки и потомъ еще въ теченіе шести недѣль, нужно соблюдать строгую діету: не есть рыбы, молока, творогу, смѣтаны, масла, яицъ, свинины, ветчины, солоницы, картофеля, мягкаго хлѣба, блиновъ, пироговъ, сдобнаго тѣста; избѣгать простуды, купанья, житья около воды, обращенія съ женщинами; не употреблять слабительныхъ лекарствъ, а особенное испражненіе низомъ поддерживать промывательными, кускомъ сала, мыла, вводимымъ въ задній проходъ, растираніемъ живота, и, въ крайности—ревенемъ.

6) Иногда хина, или ея соль, употребленныя въ промежуткѣ 3—4-хъ приступовъ, не прогоняютъ лихорадки, которая притомъ или а) усиливается: больной чувствуетъ тяжесть, слабость, и послѣ приступа имѣетъ нечистый языкъ, горечь, скорый пульсъ. Здѣсь нужно либо совсѣмъ оставить употребленіе хины, и въ другой разъ дать больному рвотное, либо слабительное, или же уменьшить пріемъ хины, или ея соли, и соединить ихъ съ нашатыремъ; б) или же лихорадка не усиливается, но и не прекращается отъ употребленія хины, или ея соли. Здѣсь нужно увеличить пріемъ хины, или ея соли, или прибавить 5—10 капель настойки опія къ послѣднему предъ приступомъ порошку.

7) Дѣтямъ и взрослымъ, немогущимъ принимать въ порошокъ хины, дается хинная соль въ растворѣ ( $\frac{1}{2}$ —15); также можно ставить клистиры съ отваромъ хины; или порошокъ хины, превративъ въ кашу и прибавивъ къ нему вина, класть, въ видѣ припарки, на животъ и продолжать это средство до прекращенія приступовъ.

8) Если нельзя достать хины, или больной очень бѣденъ, то можно употребить средства, отчасти замѣняющія хину. Эти средства суть почти все растенія, имѣющія



горькій, вяжущій вкусъ, какъ то: корка ивовая (вербная), дубовая, каштановая, померанцовая, грецкихъ орѣховъ, корень айра (лепешника), горечавка, кофе, трилистникъ, золототысячникъ и тысячелистникъ, полынь, перецъ, паутина. Всѣ эти средства даются въ порошокъ отъ скрупула до драхмы на пріемъ, въ отваръ (корки), или наливкѣ (корни и травы), полагая полунціи, или унцію, на 8—12 унцій воды, уваривая до 6—8 унцій жидкости и давая по одной—двѣ столовыя ложки. Паутина, прежде очищенная, дается въ водѣ, или на хлѣбъ съ масломъ, во время перемежки отъ 30 до 40 гранъ. Перецъ дается зернами по 5—10 штукъ на пріемъ или въ порошокъ, либо въ настойкѣ перчиковка. Приступъ лихорадки иногда удается отвратить умѣренно-плотнымъ перевязываніемъ рукъ и ногъ въ ихъ верхней части, такъ, чтобъ затруднить только восхожденіе крови въ подкожныхъ венахъ, но не остановить кровообращенія въ рукахъ и ногахъ, не произвести въ нихъ охладѣнія, оказывающагося послѣ тугой перевязки. Эта перевязка препятствуетъ приливу крови отъ рукъ и ногъ къ груди и брюху и тѣмъ отвращаетъ и самый приступъ, который иногда можетъ быть подавленъ и напряженнымъ воображеніемъ, или напр. переставить часы назадъ и увѣрить больного, что время лихорадочнаго приступа уже прошло.

9) Возвратъ и упорство перемежной лихорадки. Излеченная лихорадка возвращается найчаще ежедневная на 7—14, а трехдневная на 21 день отъ послѣдняго приступа. Эти возвраты происходятъ отъ недостаточнаго пріема хины, и ея соли, отъ погрѣшности въ пищѣ, отъ продолженія тѣхъ же вліяній, какія и прежде причинили лихорадку, отъ занятія обычною работою прежде, нежели бывшій больной достаточно укрѣпится въ силахъ. Определить всѣ эти причины возврата можно только внимательнымъ изслѣдываніемъ положенія больного. Возвратная лихорадка лечится такъ же, какъ и первоначальная: при нечистотѣ желудка—рвотнымъ, кишекъ—слабительнымъ, а потомъ хиною, или ея солью; но леченіе хиною должно быть продолжительнѣе, и въ 7—14—21 день отъ послѣдняго приступа хину давать такъ, какъ бы въ эти дни дѣйствительно были приступы. Во



время леченія возврата нужно наблюдать очень строгую діету и употреблять крѣпительную пищу: мясо, дичь, хорошее вино, горькія настойки, кофе настоящій, или желудочный, безъ сливокъ; всячески стараться не разстроить пищеваренія и не изнурять силъ больного. Если возвратъ зависитъ отъ мѣстности обитаемой страны, то нужно, буде можно, перемѣнить мѣстопробываніе на то время, пока свирѣпствуетъ повально лихорадка. Хинная соль скорѣе хины прекращаетъ лихорадку, которая однако послѣ хинной соли и легче возвращается; посему въ упорныхъ лихорадкахъ нужно предпочитать чистую красную хину въ порошокъ, а по прекращеніи приступовъ—въ винномъ или спиртномъ настоѣ, полагая 1—2 унціи порошка хины на бутылку вина, настаивая ее долго въ вольномъ духу и употребляя такое вино два раза въ день по рюмкѣ.

(10) Леченіе опасныхъ перемежныхъ лихорадокъ, обнаруживающихся подъ видомъ сонливости, безчувствія, удара или пострѣла, обморока, судорогъ (столяняка), поноса со рвотою, удушья, колюща и проч. должно быть самое дѣятельное и скорое: здѣсь дорогъ каждый часъ, ибо смерть можетъ последовать во второмъ, а навѣрное въ третьемъ приступѣ. Посему, если послѣ подобнаго припадка, въ мочѣ больного замѣчается осадокъ кирпичнаго цвѣта, то немедленно больному нужно дать хинную соль, и притомъ въ такомъ количествѣ, чтобы онъ до слѣдующаго припадка принималъ ее 16—24 грана; послѣдній пріемъ предъ приступомъ долженъ быть двойной 3—6 гранъ и притомъ для взрослого соединенъ съ  $\frac{1}{2}$ —1 граномъ опія. Въ лихорадкѣ подъ видомъ пострѣла (удара) опій также есть главное средство, и его нужно давать больному чрезъ два часа 1—2 грана, увеличивая пріемы до тѣхъ поръ, пока онъ не придетъ въ память; если же больной не можетъ глотать, то ему ставится клистирь съ 1—2 драхмами опіиной настойки.

По причинѣ большой опасности сего лихорадки, мы для нея принуждены отступить отъ принятаго нами правила—не совѣтовать сильно дѣйствующихъ средствъ; потому что опія въ семь случаевъ нельзя замѣнить ни чѣмъ, а употребляя его такъ, какъ здѣсь показано, не должно опасаться никакого вреда.



У людей молодыхъ, полнокровныхъ, нужно пустить немного (6—10 унцій) крови; у всѣхъ же такихъ больныхъ растирать тѣло суконками, щетками, къ головѣ прикладывать холодныя примочки, при сонливости опрыскивать лице холодною водою, при обморокъ—къ груди теплыя припарки, при колотѣхъ, удушѣхъ, давать внутрь шипучіе порошки (при рвотѣ) и всё это продолжать съ настойчивостію во всё время приступа.

11) Послѣдствія перемежной лихорадки бываютъ очень различны; вообще они суть: послабляющая лихорадка, наичаще желудочная или желчная, отѣкъ ногъ или водянка подкожная, брюшная, грудная, одышка, кашель, колика, желтуха, сухотка, чахотка, нервныя боли, падучая, слѣпоты, глухота, но чаще всего отрѣдѣніе, завалъ печени и селезенки. Эти послѣдствія зависятъ отъ невозможности удалить причины лихорадки, отъ продолжительности, упорства лихорадки, поздняго и недостаточнаго ея леченія и отъ другой болѣзни, находившейся у человѣка до лихорадки, но только теперь и послѣ лихорадки развившейся въ полномъ своемъ видѣ.

Всѣ эти послѣдственныя болѣзни требуютъ приглашенія врача; впрочемъ, онѣ лечатся и послѣ лихорадки такъ же, какъ и тогда, когда онѣ происходятъ отъ другихъ причинъ. Вообще противъ нихъ бываютъ полезны разрѣшающія, горькія и отчасти слабительныя средства: одуванчикъ, осока, айръ, цихорій, трилистникъ, золототысячникъ, полынь; соли: нашатырь, уксусокислый поташъ, составы виннаго камня (*tartarus tartarizatus*, *boraxatus*, *solubilis*), морковный, рѣдечный сокъ; травы и корни употребляются въ видѣ отвара или наливки съ солями, полагая на шесть унцій жидкости 1—2 драхмы соли. При опухоли печени, и особенно селезенки и слабости больного, бываетъ весьма полезна хинная соль по 2 грана 2—3 раза въ сутки, также желѣзные цвѣты нашатыря (*flores ammoniaci martialles*), или, просто, желѣзный зеленый купоросъ. Всѣ эти средства нужно давать подъ надзоромъ врача.

§ 13. Простудная, катарральная лихорадка и простуда-катарръ. — Припадки. Подираніе по кожѣ, вздра-



гиваніе, потомъ настоящій ознобъ, смѣляемый жаромъ, во время котораго опять на короткое время появляется ознобъ; дыханіе скорое, горячее; пульсъ твердый, скорый; жажда, сухость во рту; частый позывъ къ испражненію мочи, которая истекаетъ иногда съ рвзью, жженіемъ, бываетъ мутная, съ бѣлымъ или краснымъ осадкомъ; большой чувствительнъ къ переменѣ температуры; даже при поворотѣ въ постель, когда только часть тѣла немного обнажится, онъ вдругъ чувствуетъ дрожь, любитъ теплоту и легко потѣетъ. При этомъ замѣчается страданіе слизистыхъ оболочекъ носа, горла, гортани, легкихъ; страданіе носа (насморкъ) обнаруживается сначала обильнымъ изъ него истеченіемъ острой, жидкой, водянистой слизи, иногда съ полосками крови, потомъ появляется сухость во рту, зудъ, тягость, залеганіе, чиханіе, тяжесть и боль во лбу, надъ глазами, чувствительность глазъ и умноженіе слезотеченія, наконецъ начинаетъ отдѣляться густая, гноевидная, а потомъ бѣлая слизь, которая постепенно приходитъ въ свое обыкновенное состояніе. При пораженіи горла, гортани, легкихъ (катарръ, кашель) замѣчается въ нихъ сначала сухость, трудное глотаніе, осиплость голоса или безгласіе, сухой кашель съ рвжущею болью въ груди или шекотаніемъ въ горлѣ; далѣе выкашливается жидкая, прозрачная, а потомъ желтая, бѣлая, густая, гноевидная слизь, которая постепенно приходитъ также въ натуральное состояніе. Чаше всего насморкъ предшествуетъ кашлю, но иногда и къ кашлю присоединяется насморкъ. Простудное страданіе можетъ занимать слизистыя оболочки и другихъ частей: глазъ, кишекъ, мочевого пузыря, маточнаго рукава; въ нихъ оно обнаруживается: въ глазахъ подъ видомъ простуднаго ихъ воспаленія (см. это), въ кишкахъ—поносомъ съ бѣлослизистыми, бѣловидными испражненіями, въ мочевомъ пузырь—мутною, густою, слизистою мочою, рвзью, жженіемъ, въ маточномъ рукавѣ—бѣлыми.

Теченіе. Простудная лихорадка продолжается 4—7—14 дней, и обыкновенно окончивается выздоровленіемъ; но если она сопряжена съ мѣстнымъ страданіемъ какой-либо изъ сказанныхъ частей, то послѣднее очень часто остается и послѣ лихорадки. Вообще же простуда—катарръ, какъ



самостоятельная, мѣстная болѣзнь, т. е. какъ воспаленіе слизистой оболочки, имѣетъ два періода: первый обозначается раздраженіемъ и болью въ слизистой оболочкѣ и истеченіемъ прозрачной, водянистой слизи; во второмъ же раздраженіе и боль утихаютъ и отдѣляется изъ носа густая, желтая, непрозрачная слизь, а изъ горла и лёгкихъ такая же мокрота, иногда въ большомъ количествѣ. Второй періодъ продолжается неопредѣленное время: отъ двухъ недѣль до нѣсколькихъ мѣсяцевъ, переходитъ въ привычный насморкъ, боль горла, глазъ, въ застарѣлый кашель; послѣдній, при золотушномъ тѣлосложеніи, или чахотномъ расположеніи, можетъ даже перейти въ чахотку.

Причины. Сущность простудной лихорадки есть раздраженіе, а сущность катарра—воспаленіе слизистыхъ оболочекъ; то и другое чаще происходитъ отъ простуды, т. е. отъ внезапнаго остановленія испарины. Люди блѣдыя, золотушные, изнѣженные, блѣдно—одутлые, тучные, привыкшіе къ теплотѣ, теплой одеждѣ, сидячей жизни, пьюшіе много и часто тёплаго чаю—особенно расположены къ катарру, который у нихъ легко происходитъ отъ быстрой переменъ теплоты на холодъ и обратно, отъ сквознаго вѣтра весною, осенью, въ холодныя лѣтнія ночи, отъ низменнаго, болотистаго мѣстопребыванія, отъ сырыхъ, теплыхъ, душныхъ избъ, отъ особеннаго состоянія атмосферы (катарръ, гриппъ 1833 года). Крестьяне чаще получаютъ катарръ зимою, когда они изъ теплой избы, или съ горячей печки, бани, вдругъ выбѣгаютъ въ однихъ рубахахъ, а часто босые и голые на морозъ въ 15 градусовъ; у горожанъ насморкъ и простудный кашель чаще появляются послѣ промоченія ногъ при оттепели.

Леченіе. Простая простудная лихорадка, безъ мѣстнаго страданія, проходитъ отъ теплаго содержанія, умѣреннаго пота. Больнаго помѣстить въ теплой, сухой, свѣтлой комнатѣ, внутрь дать ему пашатырь съ селитрою или кремортартаромъ, а на ночь напоить теплымъ чаемъ изъ бузины, липы, малины, соломы, сънной трухи или груднымъ чаемъ (составленнымъ изъ цвѣтовъ медвѣжьяго ушка, съ травою шалфея, бузиною, корня солодкового, проскурнаго и



фіалковаго (*iris florentina*), и сѣмень укропа, каждого по равной части) и пр. и укрыть его тепло, а если вспотѣетъ, то перемѣнить бѣлье. Послѣ пота проходить лихорадка, но остается насморкъ, кашель, поносъ, бѣли и пр.

Насморкъ также проходить самъ по себѣ; впрочемъ, въ началѣ можно носъ и лобъ натирать льдомъ, а внутри ноздри вымазывать масломъ, свѣжимъ (свѣчнымъ) саломъ; при сильномъ, сухомъ насморкѣ, съ болью во лбу, можно втягивать носомъ теплые пары изъ молока съ ромашкою, просвирками и пр.

То же разумѣется и о катарральномъ кашлѣ, въ которомъ сверхъ того, полезны: при боли въ горлѣ полосканье изъ ромашки, шалфея, отрубей, льнянаго сѣмени съ молокомъ и медомъ; при боли же въ горлѣ и груди, сверхъ того, полосканья и вдыханья паровъ, какъ при насморкѣ; шею и грудь вымазать саломъ, или покрыть толстою (синею) бумагою, напитанною масломъ или насыпанною стружками мыла. Если при кашлѣ мокрота отдѣляется несвободно, то внутрь давать нашатырь (по 5 гранъ на пріемъ) съ солодковымъ корнемъ въ порошокъ или въ отваръ изъ просвирокъ, салепа, мальвы съ медомъ, сахаромъ, сиропомъ, Миндереровъ спиртъ съ сокомъ бузиновыхъ, вишневыхъ, малиновыхъ ягодъ, съ черносливомъ. Если кашель уже продолжается 2 — 4 недѣли, то больному давать сѣру (по 5 — 10 гранъ на пріемъ) съ нашатыремъ, отваръ девасила (*inul. helen.*), фіалки (*iris florent.*) съ сюрмянымъ виномъ (5—10 капель на пріемъ); на голоть тѣль носить шерстяную, фланелевую фуфайку; при постоянной боли въ груди положить на нее мушку или пластырь изъ черной смолы (вара) и наблюдать приличную діету; не пить вина и кофе, но молоко, сыворотку, кумысъ, сокъ рѣпы, моркови, свекловицы; рѣдко употреблять щи и борщъ, говядину и дичь, а чаще—супъ, кашницу, легкую рыбу, курицу, телятину, молоко, яйца; беречься отъ простуды; стараться дышать теплымъ воздухомъ, закрывая ротъ на походкѣ одеждою, платкомъ; ибо простудный кашель, разъ появившійся, легко возвращается при малѣйшемъ поводѣ, особенно въ сырое, холодное время—весною и осенью. При обильномъ изверженіи мокроты бываетъ полезенъ исландскій мохъ



въ отварѣ, или въ видѣ студени, съ молокомъ, либо сахаромъ. При упорномъ, застарѣломъ, уже неоднократно возвращавшемся кашлѣ, предъ употребленіемъ сказанныхъ средствъ нужно прибѣгнуть къ совѣту врача; стараться, перемѣнить квартиру, почаще гулять на открытомъ, сухомъ воздухѣ, весною и осенью употреблять исландскій мохъ; грудь ежедневно обмывать холодною водою и растирать суконною, щеткою; при большой чувствительности кожи, носить на голой груди шерстяную фуфайку.

§ 14. Ревматическая ломотная лихорадка и ревматизмъ-ломота. — Признаки. Общія лихорадочныя привадки (ознобъ, жаръ, пульсъ, моча), здѣсь тѣ же, что и въ катарральной; собственные же припадки суть разнаго рода боли въ мышцахъ, иногда соединенныя съ опухолью. Эти боли бываютъ колючія, рѣжущія, стрѣляющія, грызущія, ломящія, давящія. Онѣ появляются въ рукахъ и ногахъ, въ спинѣ, груди, въ шеѣ, лицѣ и головѣ; бываютъ то постоянны, то переходятъ съ одного мѣста на другое, иногда съ наружныхъ частей на внутреннія. Постоянныя боли, какъ знакъ мѣстнаго воспаления мышечныхъ оболочекъ, нерѣдко сопутствуются жаромъ и опухолью — въ свѣжемъ, недавнемъ, остромъ, лихорадочномъ, и одною опухолью въ видѣ блѣднаго отека — въ застарѣломъ, безлихорадочномъ ревматизмѣ. Часть, пораженная ревматизмомъ, болѣе или менѣе затрудняется въ своемъ дѣйствіи, и болѣзнь оказывается подъ видомъ онѣмѣнія, паралича руки, ноги, сѣпоты, глухоты, колотья въ груди, рвоты, поноса, колики въ животѣ, рѣзы въ мочевомъ пузырь и каналѣ. Узнать въ такихъ случаяхъ свойство болѣзни очень трудно и нужно для сего обратить особенное вниманіе на ея причины и прежнее страданіе больного. Ревматизмъ, какъ боль, сходствуетъ съ подагрой, но отличается тѣмъ, что онъ поражаетъ мышцы, а подагра — связки, хрящи и кости сочлененій (ногъ, рукъ). Ревматизмъ появляется во всякомъ возрастѣ и полѣ, при здоровомъ тѣлосложеніи и правильномъ, дѣятельномъ родѣ жизни, безъ предшествовавшаго разстройства пищеваренія, безъ особеннаго измѣненія въ составѣ мочи; но подагра оказывается только въ зрѣломъ



возрастъ, у стариковъ, у людей дряхлыхъ, жившихъ и живущихъ неводержно; ей предшествуетъ разстройство пищеваренія, въ мочѣ подагрика появляется густой известковый осадокъ, а въ суставахъ твердыя, костяныя опухоли. Впрочемъ, у пожилыхъ людей къ подагрѣ можетъ присоединиться ревматизмъ, и наоборотъ.

Причины. Ревматическая лихорадка и ревматизмъ, относительно ихъ сущности и причинъ, сходятся съ простудною лихорадкою и катарромъ, съ тою только разностию, что въ ревматизмъ и его лихорадкѣ остановленная испарина кожи бросается на сывороточныя оболочки мышцъ. Постоянная, непрерывная и непримѣтная испарина кожи, отъ дѣйствія на послѣднюю свѣжаго, холоднаго, сквознаго воздуха, останавливается; задержанная, испаряемая жидкость бросается на сывороточныя оболочки и производитъ въ нихъ или только раздраженіе, или же и воспаленіе; притомъ это задержаніе испарины происходитъ или вдругъ и причиняетъ острый, иногда очень жестокий ревматизмъ, особенно у крѣпкихъ, молодыхъ, рабочихъ людей; или же она останавливается медленно, постепенно, и тѣмъ развивается тихій, медленный, упорный ревматизмъ у людей нѣжныхъ, слабыхъ, бездѣйственныхъ.

Впрочемъ, причины ревматизма суть тѣ же, что и катара, и уже исчислены выше. Сверхъ того, ревматизмъ бываетъ постояннымъ припадкомъ любострастной, цыготной и раковидной болѣзней, въ которыхъ онъ, подъ видомъ болей, особенно къ ночи, въ суставахъ, около плечъ, поясницы и проч., продолжается до тѣхъ поръ, пока не откроются язвы.

Леченіе. — 1) Ревматическая лихорадка лечится точно такъ же, какъ и простудная—усиленнымъ потомъ. Больнаго нужно напоить теплымъ чаемъ изъ бузины, малины, липы, соломы, положить въ теплой комнатѣ въ постель и, укрывъ плотно, дать ему пропотѣть порядкомъ, послѣ чего проходятъ жаръ и боли. 2) Но если болѣзнь послѣ пота не изменилась къ лучшему, то нужно повторить потогонное леченіе: въ чай прибавить Миндерерова спирта (чайную, столовую ложку на чашку воды), а мѣсто болей хорошо вытереть летучею, камфорною мазью. Сверхъ потогоннаго, на



ночь, днемъ давать больному селитру въ большихъ пріемахъ (2 — 3 драхмы въ сутки). 3) Если лихорадка прошла, но остаются боли, особенно въ лицѣ (флюсъ), то больное мѣсто нужно продолжать натирать мазью и класть на оное смягчительныя припарки въ теченіе 2 — 4 часовъ, потомъ остановить ихъ употребленіе на столько же часовъ, и опять возобновить; это прерывчатое употребленіе припарокъ дѣлается для того, чтобы не произвести нагноенія, непрерывно припаривая больное мѣсто. 4) Если боли не унимаются, но останавливаютъ движеніе члена и жестоко беспокоятъ больного, если притомъ больное мѣсто горячо, красно, или по крайней мѣрѣ припухло, то нужно припустить пиявицы, или даже бросить кровь крѣпкому, полнокровному больному, потомъ сдѣлать 2—3 припарки, и наконецъ на больное мѣсто поставить мушку, которую иногда нужно и повторить на ближайшемъ мѣстѣ даже 2 — 4 раза и поддержать въ нагноеніи 1—2 недѣли. У людей недостаточныхъ, когда притомъ ревматизмъ уже продолжался 2 — 3 недѣли, вмѣсто пиявицъ, можно поставить рожки, если это позволяетъ больное мѣсто. 5) Если боли умѣренны и уже продолжаются 2—3 недѣли, то больное мѣсто можно покрывать пластыремъ изъ чернаго вара, вошанкою, клеѣнкою, заячьимъ, кроличьимъ мѣхомъ, растирать его, особенно въ банѣ, лещучею мазью съ настойкою горчицы, стручковаго или круглаго перца, или по временамъ прикладывать горчичникъ.

6) Въ упорномъ ревматизмѣ полезны: продолжительное употребленіе Миндерерова спирта или нашатыря, сыры, баккаута, паслена сладкогорькаго въ отварѣ, сурьмянаго вина (*vinum antimonii*), вина осенняго цвѣта (*vinum colchici autumnalis*), настойки сажи, жиръ рыбы трески, и по временамъ рвотное или слабительное; снаружи теплыя ванны съ отрубями, сънною трухою, ароматными травами, мыломъ съ солью, сънною печенкою, щелокомъ; растиранія муравейнымъ, березовымъ спиртомъ, горнымъ масломъ (*petroleum*), русская баня, электричество, гальанизмъ, источники (Фонтанелли), ношеніе на голомъ тѣлѣ шерстяной фуфайки; разныя минеральныя воды, особенно кавказскія сърныя; сергѣевскія, карльсбадскія, теплицкія и другія; также сакскія



(въ Крыму), астраханскія, эзельскія грязи, или ванны, приготовляемыя изъ морскаго ила. (Литер. та мислима 8—9)

7) Недавно начали съ пользою употреблять въ застарѣломъ ревматизмѣ холодную, ключевую, чистую воду въ видѣ питья по 6—21 и болѣе стакановъ въ сутки, купанья, обливанья, обмыванья, дождевыя ванны, струи и проч. Холодная вода не только излечиваетъ отъ ревматизма, но уничтожаетъ и расположеніе къ нему, которое очень часто остается у людей, разъ ему подвергавшихся; нужно только наблюдать постепенность въ температурѣ воды, понижая ее не вдругъ, но понемногу 12—8—5 градусовъ и ходить пѣшкомъ послѣ всякой ванны или купанья до появленія испарины въ кожѣ или пота.

8) При леченіи ревматизма нужно также обращать вниманіе на его причины: позаботиться о сухомъ, свѣтломъ, чистомъ жилищѣ, хорошемъ одѣяніи, не жирной и не кислой пищѣ, избѣгать простуды, сырой, холодной погоды, при флегматическомъ, тучномъ тѣлосложеніи; при разстройствѣ пищеваренія давать по временамъ слабительныя, алаппу или ревенъ съ сырою; при любострастномъ худосочиі—сассапарель или осоку, пасленъ сладко-горькій въ отварѣ а при чесоточномъ, лишайномъ—сыру. При выборѣ всѣхъ сихъ средствъ можно посоветоваться съ врачомъ.

Примѣч. Самый упорный, сильный, частый и, по своимъ послѣдствіямъ, опасный ревматизмъ бываетъ въ поясничныхъ мышцахъ (боль въ поясницѣ) и въ бедренномъ суставѣ, гдѣ онъ причиняетъ невладеііе ногами сначала удлинненіе, а потомъ укороченіе ногъ и хроманіе.

§ 15. Медленная, изнурительная лихорадка. — Припадки. Если лихорадка продолжается безпрерывно болѣе 6-ти недѣль, то она называется медленною. Медленная лихорадка можетъ продолжаться мѣсяцы и годы, имѣть послабляющій ходъ, т. е. въ одно время дня усиливается, а въ другое послабляетъ; но пульсъ бываетъ во всякое время чаще натуральнаго; больной чувствуетъ постоянно слабость, таеітъ, худѣетъ, чахнетъ, получаетъ изнурительный потъ, поносъ и умираетъ высохнувъ до кожи и костей.



**Причины.** Изнурительная лихорадка всегда есть следствие другой какой болѣзни: предшешей острой горячки, оставившей послѣ себя общую слабость въ тѣлѣ, воспаленія, оставившаго послѣ себя отвердѣніе, нагноеніе, изліяніе сыворотки, также кроющагося въ тѣлѣ худосочія: золотушнаго, ревматическаго, цынготнаго, любострастнаго, подагреннаго; эта же лихорадка происходитъ отъ непомерныхъ, тяжелыхъ работъ, постоянныхъ умственныхъ занятій, недостатка пищи, отъ нищеты и разнаго рода лишеній—свѣта (въ тюрьмѣ), чистаго воздуха, приличной одежды, жилища и проч.

Сообразно симъ причинамъ, медленная лихорадка бываетъ:

1. **Нервная**; въ ней не замѣчается никакого мѣстнаго страданія, но общая слабость тѣла, слабый пульсъ, моча то свѣтлая, какъ вода, то мутная, чувствительность къ холоду, чаще ознобъ, нежели жаръ, рѣдко потъ, уныніе, грусть, гипохондрическіе или истерическіе припадки, особенно по утрамъ, натошакъ, ожесточеніе лихорадки въ это время и послабленіе ея послѣ обѣда. Эта лихорадка особенно замѣчается послѣ нервной горячки, неумѣренности въ соитіи половъ, большой потери крови, послѣ бѣлей, поноса, пота, умственныхъ занятій: при ней больной таетъ подобно воску, безъ видимой, явной боли.

2. **Чажоточная лихорадка**; при ней замѣчается мѣстное страданіе: кашель съ обильною гнойною мокротою, обширное нагноеніе при ранахъ, язвахъ, нарывахъ; сверхъ сего, она отличается отъ нервной тѣмъ, что въ ней замѣчается явный жаръ, склонность къ воспаленію; лихорадка ожесточается послѣ обѣда, причемъ на щекахъ виднѣтъ багровый румянецъ, а ладони и подошвы горятъ; къ утру появляется клейкій, кислый, обильный потъ и происходитъ безъ особенной явной причины изнурительный поносъ, сначала кратковременный, потомъ продолжающійся нѣсколько дней и даже недѣль, испражняющій низомъ бѣловатую, питательную жидкость.

3. **Припадоочная медленная лихорадка** походитъ на нервную; зависитъ отъ значительной степени отвердѣнія и разстройства внутренностей—заваловъ въ печени, селезенки,



въ кишечныхъ желѣзахъ, бугорковъ въ легкихъ, расширенія сердца или большихъ кровяныхъ сосудовъ, золотухи, любо-страстной, цынготной, водяной болѣзни, застарѣлаго ревматизма, подагры, разныхъ сыпей—чесотки, лишая, коштуна и проч.

Леченіе. Медленная лихорадка рѣдко излечивается, потому-что ея причины или неизвѣстны, или ихъ удалить нельзя. Леченіе ея нужно начинать по предварительному совѣщанію съ врачомъ. Въ первой лихорадкѣ нужно прежде прекратить умственныя занятія, изнурительныя работы, плотское совокупленіе половъ, рукоблудіе (онанія), поселить больного въ свѣтлой, сухой комнатѣ, въ деревнѣ, въ пріятномъ для него обществѣ, почаще выводить его на свѣжій воздухъ въ теплое время по утрамъ и въ вечеру—на солнышко, а днемъ подъ тѣнь въ садъ, лѣсъ, рошу; въ семъ же отношеніи бываютъ очень полезны прогулки пѣшкомъ, путешествія и особенно морскія. Самое леченіе должно состоять въ употребленіи: теплыхъ ваннъ съ отрубями, солодомъ, съ ароматными травами; хины въ отварѣ, наливкѣ, настоекѣ на водѣ, водкѣ, въ такомъ же видѣ травы полыни, корня аира, горечавки, коломбо, минеральныхъ желѣзныхъ водъ, особенно съ молокомъ; болѣе же всего нужно ожидать пользы отъ хорошей, легковаримой, питательной пищи, теплаго, здороваго климата, движенія на воздухъ и отъ хорошаго чистаго вина: рейнвейна, мадеры, хереса, токайскаго, аликантскаго и пр.

Чохотная лихорадка не требуетъ никакого особеннаго леченія, кромѣ леченія болѣзни, отъ которой она зависитъ и съ которой она и оканчивается—смертію, рѣдко выздоровленіемъ.

Леченіе припадочной медленной лихорадки также зависитъ отъ леченія самой болѣзни—золотухи, цынги, подагры, заваловъ и проч.; въ этихъ обояхъ послѣднихъ видахъ лихорадки питательная діета, пока не прекратится главная болѣзнь, бываетъ бесполезна.



## ВОСПАЛЕНІЯ.

§ 16. При описаніи лихорадокъ мы упоминали, что при нихъ часто появляется воспаленіе; но въ лихорадкахъ оно есть случайное явленіе. Гораздо чаще воспаленіе есть начальная болѣзнь и само производитъ лихорадку, или собственно горячку; впрочемъ, припадочное и самостоятельное воспаленіе есть одно и то же относительно его сущности, причинъ и леченія.

**Признаки.** Главные признаки воспаленія суть: боль, жаръ, краснота и опухоль, явственно оказывающіяся въ наружномъ воспаленіи: вередъ, нарывъ и проч.; но въ воспаленіи внутреннихъ, слѣдственно невидимыхъ частей тѣла, эти припадки не бываютъ такъ явны, зато появляются признаки разстройства или совершеннаго прекращенія дѣйствія воспаленныхъ органовъ и воспалительной лихорадки (горячки). Впрочемъ, и при внутреннихъ воспаленіяхъ боль есть постояннѣйшій припадокъ, особенно при воспаленіи перепончатыхъ частей: желудка, кишекъ, брюшины и проч., но при воспаленіи мясистыхъ, толстыхъ, массивныхъ органовъ, мозга, легкихъ, печени и проч. боли не бываютъ во все, или же она чувствуется слабо, но за то замѣчается давленіе, какъ бы свинцовая тяжесть, біеніе. Впрочемъ, при такъ называемомъ скрытномъ, тихомъ, медленномъ воспаленіи внутреннихъ частей боль бываетъ непримѣтна и для самаго больного, который и самъ можетъ ее не чувствовать, и такую боль можно узнать только тогда, когда мы, ощупывая его брюхо, наткнемся на такое мѣсто, въ которомъ, отъ прижатія его руками, обнаруживается боль, или когда заставимъ больного вздыхать медленно и глубоко, причемъ онъ замѣчаетъ въ груди боль, затрудненіе въ расширеніи легкихъ. Жаръ и опухоль при внутреннихъ воспаленіяхъ не замѣчаются, развѣ воспаленное мѣсто лежитъ близко къ поверхности тѣла (печень), или самое воспаленіе будетъ

\*) Здѣсь говорится о воспаленіи внутреннихъ частей; о воспаленіи же наружныхъ сказано при наружныхъ болѣзняхъ.



очень сильно. Жаръ головы—при воспаленіи мозга, и горячее дыханіе — при воспаленіи легкихъ, бываютъ довольно явны. Весьма важно различить воспалительную боль отъ нервной: стѣсненіе дыханія, боль и рѣзь въ животѣ, тошнота, рвота, боль головы, могутъ зависѣть какъ отъ воспаления, такъ и отъ судорогъ, спазмъ; но воспалительная боль требуетъ кровопусканія, которое бываетъ вредно въ нервной боли. Для различенія сихъ родовъ боли нужно замѣтить, что если появленію боли предшествовали лихорадочные припадки, т. е. ознобъ, а потомъ жаръ, жажда, сухость во рту и въ кожѣ, если притомъ замѣчается полный, крѣпкій, или по крайней мѣрѣ скорый и твердый пульсъ, красная, жгучая моча, если самая боль бываетъ постоянна, отъ давленія усиливается и отъ пробнаго припуска пиявицъ уменьшается: то такая боль есть воспалительная. Но если у больного нѣтъ никакихъ лихорадочныхъ припадковъ, — ни жара, ни жажды, ни сухости, если притомъ пульсъ натуральный, или же и скорый, но слабый, моча блѣдная, водянистая, если самая боль перемежается — то усиливается, то уменьшается, при давленіи болящаго мѣста не увеличивается, но даже уменьшается послѣ пробнаго припуска пиявицъ, перемѣняется: то такая боль, вѣроятно, есть нервная, судорожная.

Течение. Внутреннія, острые воспаленія, продолжаются 7—14 дней, рѣдко долѣе; они или совершенно разрѣшаются: переломомъ чрезъ обильный потъ, мочу, поносъ, кровотечение, умноженное отдѣленіе харкотины, или переходятъ въ тихое, медленное воспаление, въ нагноеніе, помертвѣніе, отвердѣніе, выпотѣніе и изліяніе пасоки, воды; или, наконецъ, послѣ нихъ остается срастеніе воспаленнаго органа съ окологлежащими частями (наибаче легкихъ съ подреберною плевою), слабость, раздражительность воспаленнаго мѣста, разстройство его дѣйствія (потеря памяти, разсудка, слѣпота, глухота, параличъ).

Совершенное разрѣшеніе внутренняго воспаления узнается изъ прекращенія лихорадки, послѣ извѣстнаго перелома и мѣстныхъ припадковъ, особенно боли; но если послѣ ви-



димаго перелома, лихорадочные припадки продолжаются, особенно пульсъ остается твердымъ и скорымъ, то воспаление разрѣшилось несовершенно, хотя бы его мѣстные припадки и уменьшились. При переходѣ воспаления въ нагноеніе, вдругъ появляется дрожь и ознобъ, лихорадка не прекращается, а въ воспаленномъ мѣстѣ чувствуется тяжесть и бьющая боль. Переходъ въ помертвѣніе или антоновъ огонь, означаетъ быстрымъ и совершеннымъ прекращеніемъ боли и всякаго чувства въ воспаленномъ мѣстѣ; причѣмъ замѣчается видимое изнеможеніе больного, малый, перемежный, дрожащій пульсъ, охладѣніе рукъ и ногъ, искаженіе чертъ лица, клейкій, холодный, вонючій потъ—и смерть. Другіе исходы воспаления (отвердѣніе, выпотѣніе, срастеніе) распознать очень трудно, и то развѣ въ дальнѣйшемъ его теченіи — по послѣдствіямъ.

Причины. Сущность воспаления состоитъ въ раздраженіи какой-либо части тѣла, въ умноженномъ къ ней притеченіи крови, въ ускоренномъ кровообращеніи и въ усиленномъ кровотовереніи. Слѣдствіемъ всего этого бываетъ, что кровь дѣлается гуще, створожистѣе, притекаетъ къ воспаленному мѣсту въ большемъ количествѣ, чѣмъ изъ него вытекаетъ, проникаетъ въ тѣ сосуды, гдѣ она въ здоровомъ состояніи не бываетъ; а отъ этого происходитъ опухоль и краснота; отъ прижатія нервовъ скопившейся кровію появляется боль, а отъ ускореннаго прохода крови развивается болѣе теплоты и происходитъ жаръ, высоко выработанная кровь содержитъ много бѣлковины и волокнины, бываетъ густа, легко створаживается, даетъ мало сыворотки и много творогу, покрывающагося плотною, желто-бѣлою плѣнкою (воспалительная плева).

Люди молодые, полнокровные, раздражительные, крѣпкіе особенно расположены къ воспаленію, котораго происхожденію способствуютъ: остановленіе привычнаго почечуя, мѣсячныхъ кровей, кровоупусканія, прекращеніе кормленія дитяти грудью, сидячая жизнь, очень питательная пища, спиртные напитки. Воспаленіе производятъ разныя раны и удары, переломы, вывихи, жаръ, холодъ, яды, жемчъ, моча, остроты крови: золотушная, цынготная, любостраст-



ная, неумѣренное напряженіе тѣла или ума, продолжительныя корчи.

Воспаленіе можетъ произойти во всѣхъ мѣстахъ и частяхъ нашего тѣла, гдѣ только проходятъ кровяные сосуды, т. е. вездѣ; оно тѣмъ скорѣе и легче происходитъ, чѣмъ полнокровныя части и органы тѣла—напр. мышцы, легкія, печень и проч.

Виды воспаленія. Оно различается по степени: слабое и сильное; по мѣсту: воспаленіе въ мягкихъ, сочныхъ перепончатыхъ частяхъ сильнѣе, скоротечнѣе и опаснѣе (въ легкіхъ, печени, желудкѣ) чѣмъ въ твердыхъ, малосочныхъ (связкахъ, костяхъ, хрящахъ); здѣсь оно течетъ медленно; рожевидное, оказывающееся въ кожѣ, и особенное, специфическое, зависящее отъ золотухи, цынги, любострастной, ломотной болѣзни, отъ чесотки, лишаевъ, кори, оспы, красухи и пр. Воспаленіе острое, дѣятельное, оказывается явно, течетъ быстро и требуетъ скорого леченія, а воспаленіе тихое, медленное, скрытное, остающееся послѣ несовсѣмъ разрѣшившагося остраго или оказывающееся у людей слабыхъ, золотушныхъ, цынготныхъ и пр. развивающееся уже и до того въ больщихъ частяхъ тѣла (при бугоркахъ въ легкіхъ, завалѣ въ печени, разныхъ отвердѣніяхъ) оно обнаруживается скрытно и течетъ очень медленно, продолжаясь мѣсяцы и годы. Воспаленіе внутреннее и наружное; первое всегда опаснѣе, но чаще разрѣшается, а последнее рѣдко разрѣшается, но обыкновенно переходитъ въ нагноеніе, нарывъ, отвердѣніе.

Леченіе. Цѣль при леченіи всякаго воспаленія есть одна и та же: уменьшить приливъ крови къ воспаленному мѣсту, разрѣшить, разогнать тамъ ея скопленіе и застой, отвлечь кровь къ другому, противоположному мѣсту, разжидить, развести густую кровь, уменьшить жаръ, утишить, успокоить кровообращеніе; всего этого можно достигнуть противовоспалительнымъ леченіемъ, которое описано при воспалительной лихорадкѣ и, отдѣльно, въ противовоспалительномъ способѣ леченія. Леченіе воспаленія должно начинать удаленіемъ его причины, напр. извлеченіемъ пули, занозы изъ тѣла, удаленіемъ яда и проч., а потомъ употреблять



противовоспалительныя средства : кровопусканіе, піявицы, селитру, кремортартаръ, кислое, холодное питье и другія средства, приведенныя при описаніи противовоспалительнаго способа леченія ; при воспаленіи въ головѣ полезны холодныя примочки, а при воспаленіи въ груди и брюхѣ—мягчительныя припарки.

Для уменьшенія прилива крови къ воспаленному мѣсту, послѣ противовоспалительнаго, полезенъ отвлекающій способъ леченія : потогонныя (особенно ножная ванна), слабительныя, горчичники и мушка, которая для взрослого должна быть въ ладонь величиною и оставаться на тѣлѣ до тѣхъ поръ, пока не натянетъ пузыря во всю свою обширность.

Противовоспалительное леченіе, во всей его обширности, нужно при воспаленіи сильнымъ, острымъ, внутреннемъ, обнаружившемся въ мягкихъ, сочныхъ, массивныхъ частяхъ (мозгъ, лёгкихъ); но при воспаленіи слабымъ, наружномъ, оказавшемся въ малосочныхъ частяхъ (перепонкахъ, хрящахъ), рожевидномъ, зависящемъ отъ особенной причины (цынги, золотухи и пр.), при воспаленіи тихомъ, медленномъ, хроническомъ, противовоспалительное леченіе должно ограничиваться умѣреннымъ крипускомъ піявицъ, кровососными банками, мушкою или горчичникомъ, припарками и внутреннимъ употребленіемъ селитры, кислаго питья; главное же леченіе сего воспаленія нужно направлять противъ его причины: заваловъ внутренностей, отвердѣній, золотухи, цынги, любострастной болѣзни, ревматизма, подагры, чесотка, лишаевъ, и пр.

§ 17. Приливъ, притеченіе крови, мѣстное полнокровіе.—Признаки всякаго прилива суть : болѣе или менѣе неправильное дѣйствіе органа, подвергшагося приливу; тупость умственныхъ способностей; тяжелое, трудное дыханіе; расстройство пищеваренія; разнаго рода боль : стрѣльба въ головѣ, колюще въ груди, тяжесть, полнота, жаръ въ брюхѣ. Всѣ эти припадки усиливаются отъ напряженія ума или тѣла, отъ скорого движенія, спиртныхъ напитковъ, невоздержности въ ѣдѣ праной, горячительной пищи. Сверхъ сего, въ прочихъ частяхъ тѣла, отдаленныхъ отъ мѣста прилива, особенно въ ногахъ, также въ рукахъ, иногда въ ли-



ць, замѣчается недостатокъ крови: блѣдность, спаденіе частей и холодъ.

Приливы крови, продолжающіеся значительное время или усилившіеся до извѣстной степени, кромѣ разстройства дѣйствія той части, гдѣ они происходятъ, причиняютъ множество общихъ и мѣстныхъ болѣзней, а именно: приливы крови въ головѣ производятъ головную боль, тягость, помѣшательство, разсудка, параличъ, темную воду, воспаление глазъ, глухоту и шумъ въ ушахъ; приливы къ груди—одышку, кашель, кровохарканіе, сильное бѣіеніе сердца, колотье; приливы къ брюху причиняютъ тяжесть въ животѣ, трудное пищевареніе, отрыжку, вѣтры, рѣзь, поносъ, запоръ, желтуху, завалы внутренностей, особенно печени и селезенки, водянку, изнуреніе; наконецъ, приливы крови бываютъ причиною падучей болѣзни, ипохондрій, истерики, чахотки, пострѣла (удара) и разныхъ острыхъ и медленныхъ воспаленій, расширенія и разрыва артерій и венъ, кровотеченій.

Какъ дѣйствіе явнаго прилива крови къ головѣ можетъ служить угаръ, къ груди—одышка послѣ скорого бѣга, бѣіеніе сердца отъ радости, гнѣва, испуга, а къ брюху—почечуй съ разными его припадками. Приливъ крови отличается отъ воспаленія только степенью; онъ предшествуетъ всякому воспаленію, хотя и не всегда переходитъ въ воспаленіе, въ которомъ, кромѣ прилива, бываетъ еще особенное раздраженіе, усиленное кровообращеніе и кровотвореніе.

Причины. Приливъ крови происходитъ двоякимъ образомъ: или кровь притекаетъ къ извѣстному мѣсту въ болѣе-мъ противъ натурального количествѣ, будучи туда чѣмъ-либо привлекаема или гонима отъ другаго мѣста,—такой приливъ называется дѣятельнымъ напоромъ крови, или же, напротивъ: кровь къ какому-либо мѣсту притекаетъ въ обыкновенномъ, но вытекаетъ изъ него въ меньшемъ количествѣ—приливъ крови страдательный, застой крови.

Раздраженіе въ какомъ-либо мѣстѣ, или стремительный ударъ волны крови отъ сердца, бываетъ причиною ея напора къ тому мѣсту. Такъ жаленіе крапивою, треніе кожи привлекаютъ къ ней кровь; такъ попавшая въ глазъ песчинка наливаетъ его кровію; умственные занятія, бессон-



ница, пьянство, горячка съ бредомъ — привлекають кровь къ мозгу; раздраженіе матки при появленіи мѣсячныхъ кровей, во время беременности, при отвердѣніи матки — привлекаетъ къ ней кровь въ излишествѣ. Волненіе крови, отъ гнѣва, неожиданной радости, испуга, послѣ сильнаго движенія (бѣга, танцовъ и проч.) — бываетъ причиною напора крови къ сердцу, легкимъ, головѣ. Такъ у людей полнокровныхъ, плотнотѣлыхъ, короткошеихъ, кровь чрезъ короткіе и широкіе шейные сосуды легко напиратъ къ головѣ и производитъ пострѣль — ударъ, тяжесть и боль головы и пр.

Застой крови происходитъ очень медленно, тихо и не-примѣтно и притомъ или отъ слабости частей, неимѣющихъ достаточной силы выгнать приливающуюся къ нимъ кровь, или отъ затруднительнаго истока изъ нихъ самой крови. Такъ скопленіе и застой крови происходитъ въ частяхъ, ослабленныхъ ушибомъ; такое же скопленіе крови замѣчается у цынготныхъ, у любострастныхъ больныхъ, много принимавшихъ ртути, въ гнилой горячкѣ и пр. Затруднительный истокъ и застой крови въ нижней части тѣла бываетъ: въ ногахъ (расширеніе венъ и отѣкъ ногъ) отъ долговременнаго и частаго стоянія, при беременности, отъ прижатія беременною маткою соседнихъ частей, около задняго прохода, въ сосудахъ прямой кишки (почечуй или геморрой), отъ частаго, долгаго сидѣнія при сжатомъ впереди брюхѣ. Въ самомъ брюхѣ застой крови происходитъ очень часто около печени, въ воротной венѣ, изъ которой, при затвердѣніи печени, крови подниматься вверхъ очень трудно; въ брюхѣ же и въ груди застой крови причиняють опухоли, расширенія сосудовъ, отвердѣнія внутренностей, бугорки въ легкихъ при чахоткѣ, скопленіе воды при водяной болѣзни, тѣсная одежда, шнуровка, перетяжка живота для красоты талии; въ головѣ кровь скопляется при зобѣ, сжимающемъ шейные сосуды, при низкомъ положеніи головы во время сна.

Наконецъ, бываетъ еще приливъ, по своему происхожденію, довольно важный; напр. при поврежденіи головы (ушибъ, ранъ) сначала происходитъ приливъ, а потомъ воспаленіе и нарывъ въ печени; или же напротивъ при раз-



стройствъ пищеваренія, при изліаніи желчи въ желудокъ, при глистахъ, запоръ низомъ, почечуѣ—приливается кровь къ головѣ и причиняетъ боль, круженіе головы, бредъ, забывчивость, умопомъшательство. Такъ остановленная испарина въ кожѣ, лихорадочный ознобъ прогоняють кровь къ внутренностямъ, особенно къ селезенкѣ; такъ пропущенное привычное кровопусканіе, непоявленіе въ свое время мѣсячныхъ кровей, прекращеніе почечуйнаго кровотоchenія—бываютъ причиною приливовъ крови къ брюшнымъ и груднымъ внутренностямъ, кровавой рвоты, кровохарканія, сильнаго біенія сердца.

Припадки приливовъ и застоевъ крови въ особенности: 1) къ головѣ. Сильный и быстрый приливъ къ головѣ у людей полнокровныхъ, пожилыхъ (между 45 и 60<sup>ю</sup> годами) можетъ мгновенно убить человека или повергнуть его въ безпамятство (пострѣлъ, или ударъ), послѣ чего можетъ остаться параличъ въ какой-либо части тѣла, потеря памяти и пр. Въ легкой степени приливъ крови къ головѣ обозначается краснотою и припухlostію лица, яркимъ блескомъ глазъ, наливающимися кровію, шумомъ и звономъ въ ушахъ, круженіемъ, тягостію и болью въ головѣ, біеніемъ въ вискахъ и на шеѣ съ боку, твердымъ, скорымъ, полнымъ пульсомъ; причеиъ руки, а особенно ноги, бываютъ холодны. Вообще, во время прилива крови къ какому-либо мѣсту, противоположная сему часть бываетъ полубезкровна, блѣдна и холодна.

2) Припадки прилива крови къ груди: частая перхота и позывъ къ кашлю; тяжесть въ груди, колюще, сильное біеніе сердца; твердый, полный пульсъ; красное или даже синее лице; въ высшей степени прилива, происшедшаго очень быстро, появляется обморокъ, съ блѣднымъ, впалымъ лицемъ, холоднымъ потомъ, недостаткомъ пульса, кровохарканіе, задушеніе (пострѣлъ—ударъ въ легкія).

3) Припадки прилива крови къ животу: полное, вздутое, горячее брюхо, чувствительное при дотрогиваніи; блѣдное лице; тихое, медленное дыханіе; едва примѣтный пульсъ; холодныя руки и ноги; рвота; безпамятство.

Припадки и виды застоя крови исчислены выше; впро-



чемъ, распознать застой крови довольно трудно, и потому въ такихъ случаяхъ нужно приглашать врача, а это тѣмъ возможнѣе, что и самая болѣзнь происходитъ очень медленно, и даетъ время больному посоветоваться съ врачомъ. Наконецъ, надобно замѣтить, что чѣмъ явственнѣе приливъ или застой крови въ одномъ мѣстѣ, тѣмъ значительнѣе бываетъ недостатокъ крови въ другомъ, отдаленномъ мѣстѣ. Такъ при приливѣ крови къ головѣ бываютъ блѣдныя и холодныя руки и ноги, къ груди—блѣдное, осунувшееся, впалое лицо и холодный потъ, къ брюху (въ лихорадочномъ ознобѣ) — морщиноватая кожа, зябкость всего тѣла, блѣдное лицо, недостатокъ полноты въ рукахъ и ногахъ.

Сильные и быстро-происходящіе приливы къ головѣ причиняютъ скоропостижную смерть пострѣломъ, или оставляютъ послѣ себя потерю памяти, помѣшательство ума, онѣмленіе; къ груди—обмороки, обмираніе и смерть отъ задушенія; къ брюху—безпамятство, рвоту, судороги. Всѣ же эти приливы, безъ отливовъ крови, постоянно продолжавшіеся нѣсколько времени, производятъ воспаленіе мозга, лёгкихъ, желудка, печени, кишекъ. Умѣренные приливы, но продолжительные и часто возвращающіеся, причиняютъ въ головѣ частыя боли, слабость умственныхъ способностей и другія разстройства душевныя; въ груди—одышку, упорный кашель, бугорки въ лёгкихъ, грудную водяную болѣзнь, расширеніе сердца, а въ брюхѣ—завалы въ печени и селезенкѣ, размягченіе селезенки, брюшную водяную болѣзнь и проч. Эти же болѣзни, равно какъ и выше исчисленныя, происходятъ и отъ застоевъ, впрочемъ, наичаще развивающихся въ печени и селезенкѣ.

**Лечение.** Основаніе леченія приливовъ есть то же, что и при воспаленіи, т. е. уменьшить напоръ крови къ известному мѣсту, разогнать или удалить уже прилившуюся кровь, отвлечь ее къ другому мѣсту, утишить, усмирить, успокоить кровообращеніе.

1) Если припадки прилива крови развились быстро и въ высокой степени, притомъ у крѣпкаго, видимо-полнокровнаго челоуѣка, послѣ разгоряченія тѣла, простуды, бани,



неумѣренности въ пищу, угара; если больной находится въ безчувствіи, задыхается, подверженъ рвотѣ: то необходимо общее, а потомъ и мѣстное кровопусканіе, прохладная комната, холодныя примочки къ головѣ, теплыя примочки къ груди и животу, селитра къ кремортартаромъ, кислое питье, слабительныя изъ солей, горчичники и ножныя ванны, тощая, голодная діета; мѣстное кровопусканіе производится пиявицами.

2) Если происходят приливы крови въ меньшей степени и притомъ у людей слабыхъ (а это очень часто случается), то бываютъ достаточны тѣ же средства, только безъ общаго кровопусканія, и, сверхъ того, движеніе пѣшкомъ, въ экипажѣ, плаваніе и особенно растираніе мѣста прилива, а еще болѣе отдаленныхъ, охладѣвшихъ частей (наичаще рукъ и ногъ), руками, сушонками, щетками, спиртомъ, сухія и кровесосныя банки на самое мѣсто прилива.

3) При сильномъ приливѣ крови къ головѣ нужно поступать какъ при пострѣлѣ (см. это). Въ легкой степени, какова бываетъ отъ зноя, угара, похмѣлья, ушиба, разстройства пищеваренія, въ разныхъ горячкахъ, а особенно желчныхъ, у гипохондриковъ, истеричекъ и проч. достаточны холодныя обливанья и примочки головы простою водою или съ уксусомъ, прикладываніе къ вискамъ квашеной капусты, пластинокъ кислыхъ бураковъ, лимонныхъ кружковъ, пиявицы къ вискамъ, горчичники къ затылку, плечамъ, икрамъ, ножныя ванны съ золою, горчицею; внутрь — слабительныя изъ солей, холодное, кислое питье, селитра съ кремортартаромъ, горькая вода, огуречный рассолъ, кусочки свѣжаго хлѣбу, соленые огурцы (при похмѣльи).

4) При сильномъ приливѣ крови къ груди нужно дѣйствовать, какъ при обмираніи — задушеніи. Здѣсь необходимо прежде всего пустить кровь изъ руки и потомъ употребить выше приведенныя прохлаждающія средства. Въ легкой степени прилива крови къ груди, особенно какъ слѣдствіе привычнаго кровопусканія, которому срокъ приближается, или уже прошелъ, и которое наичаще появляется въ исходѣ зимы и въ началѣ весны, — превосходно дѣйствуетъ порошокъ изъ 1-го гр. наперсточной травы, 10 гранъ



селитры и 20 гранъ кремортартара, употребляемый 3 — 4 раза въ день въ холодной водѣ, въ теченіе 2-хъ 3-хъ недѣль. Кроме того, здѣсь нужно дѣлать и все то, что сказано выше о леченіи прилива крови вообще, особенно же растираніе рукъ и ногъ и горчичники къ икрамъ.

5) При сильномъ приливѣ крови къ животу (похожемъ отчасти на обморокъ рождающей женщины) прежде всего нужно припустить пиявицы къ тѣмъ мѣстамъ живота, которыя чувствительнѣе и теплѣе другихъ при осязаніи; поставить кlistиръ, сначала простой, потомъ съ уксусомъ; растирать руки и ноги суконками, щетками; къ икрамъ и плечамъ поставить горчичники; къ ноздрямъ подносить почаще летучій нашатырный спиртъ, дымъ отъ горящаго пера; когда больной придетъ въ память, въ немъ разовьется воспалительная горячка и останется явная чувствительность въ брюхѣ, то — или повторить припускъ пиявицъ, или подно-кровнымъ пустить кровь; внутрь дать слабительное сначала изъ постнаго, коноплянаго, кастороваго масла, а потомъ изъ горькой соли; ревеня, изъ вѣнскаго питья (№ 7); къ брюху прикладывать мягчительныя припарки, втирать въ него масло съ бѣленою. Въ легкой степени прилива къ брюху достаточны частыя растиранія его руками, разминаніе и шевеленіе кишекъ пальцами и продолжительное употребленіе слабительныхъ изъ вѣнскаго питья, отвара и вытяжки корня осокля, одуванчика, ревеня, сърыхъ цвѣтовъ съ кремортартаромъ.

6) Лечение застоя въ крови имѣетъ цѣлю привести ее въ большее движеніе; а для этого нужно ее разжидить и доставить ей свободнѣйшій проходъ отъ мѣста застоя. Здѣсь прежде нужно посоветоваться съ врачомъ; впрочемъ, бывають полезны растиранія, движеніе тѣла, ванны, купанье, особенно въ морѣ, сыворотка, обильное питье воды простой (водолеченіе), минеральной, особенно щелочной, каковы на-пр. карльсбадскія, эмскія, щелочныя кавказскія, продолжительное употребленіе соковъ изъ свѣжихъ растений: одуванчика, цикорея, трилистника, моркови, рѣпы, разрывающихъ кlistировъ (№ 16); пища должна быть легко-варимая, не жирная и не мучнистая. Поэтому не дѣть пироговъ,



блиновъ, клѣцокъ, крутой каши, свинины, ветчины, колбасъ, сыру, зимою картофеля. Такъ-какъ застой крови есть продолжительная болѣзнь, которая притомъ отъ времени дѣлается очень сложною, то всегда нужно совѣтоваться съ врачомъ, прежде чѣмъ приступимъ къ такъ называемому разрѣшающему леченію.

Наконецъ всѣ люди, разъ подвергшіеся приливу крови къ какой-либо части тѣла, должны долго остерегаться отъ душевнаго или физическаго разгоряченія тѣла и всего того, что производитъ волненіе крови, жаръ, боль головы, одышку, тяжесть въ животѣ, тошноту, запоръ на-низъ и пр.

§ 18. Воспаленіе мозга.—Признаки. Воспаленію мозга, какъ и всякому другому, часто предшествуютъ сильный ознобъ, а потомъ метучій жаръ, безпокойный, прерывистый, неукрѣпляющій сонъ съ страшными грезами, тяжесть, давленіе, жаръ въ головѣ безъ боли, мутный, дикій взоръ, тоскливость, уныніе, или же безпричинная радость и болтливость, даже легкое помѣшательство ума, сверканіе предъ глазами. Дѣйствительные признаки воспаленія мозга суть: бредъ съ бѣшенствомъ, или же безчувственность, сонливость, либо попеременно то и другое: больной то кричитъ и бѣснуется, то храпитъ безпробудно. Явные признаки прилива крови къ головѣ: красное, вздутое, опухлое лицо, красные, яркіе глаза, жаръ во всей головѣ, а наипаче во лбу, вискахъ и затылкѣ, сильное, явное бѣненіе шейныхъ и височныхъ артерій, больной часто хватается руками за голову, вскрикиваетъ; воспалительная лихорадка со всѣми ея припадками.

Впрочемъ, надобно помнить, что сонливость, или бредъ, не исключительные суть признаки воспаленія мозга, ибо они замѣчаются и въ простой, но сильной воспалительной, нервной лихорадкѣ, и въ приливахъ крови къ головѣ, напр. у пьяницъ, угорьвшихъ, въ приступѣ удара или пострѣла, при ушибахъ и сотрясеніяхъ головы; но сонливость, или бредъ, всегда показываютъ приливъ крови къ головѣ, какъ необходимое условіе всякаго воспаленія. Иногда замѣчается сильная головная боль, а иногда ея нѣтъ вовсе: первое бываетъ при воспаленіи мозговыхъ оболочекъ и появляется вмѣстѣ



съ бредомъ, а последнее при воспаленіи самага мозга—съ сонливостію, безчувствіемъ.

Воспаленіе мозга разрѣшается безъ всякихъ послѣдствій, или оставляетъ послѣ себя помѣшательство ума, слабость и потерю памяти, зрѣнія, слуха, водянку въ головѣ, онѣмѣніе разныхъ частей тѣла—рукъ, ногъ, языка.

Причины. Всякое сильное или продолжительное раздраженіе мозга: сильный холодъ или жаръ, удареніе солнечныхъ лучей на открытую голову (у крестьянъ во время лѣтнихъ работъ въ полѣ), сильныя движенія духа: гнѣвъ, радость, испугъ, страхъ; пьянство, ушибы, рауы и сотрясенія головы; удары въ шею, спину и поясницу; сильные и частые приливы крови къ головѣ, особенно при остановившемся почечуиномъ, мѣсячномъ кровотеченіи, переносъ на мозгъ скарлатинной заразы, молока у роженицъ; раздраженіе въ брюхѣ, причиняемое желчью, глистами; всякая сильная лихорадка, особенно нервная; неумѣренное плотское совокупленіе, рукоблудіе (онанія), истерика, ипохондрія. Воспаленіе мозга есть чрезвычайно опасная болѣзнь, а потому требуетъ немедленнаго призыва врача.

Леченіе состоитъ въ уничтоженіи раздраженія мозга и прилива къ нему крови; оно бываетъ различно, по качеству и причинамъ воспаленія мозга, а именно:

1) Настоящее сильное воспаленіе мозга. Обыкновеннѣйшій случай: больной безпрестанно бредитъ то тихо, то съ бѣшенствомъ, или находится въ безчувствіи, сонливости, съ припухlostію въ лицѣ, горячею головою, красными глазами, дикимъ взглядомъ, напряженными шейными венами и сильнобьющимися шейными и височными артеріями, съ лихорадкою, крѣпкимъ, скорымъ пульсомъ, красною мочею. Здѣсь нужны: кровопусканіе изъ руки, повторительный припускъ пиявицъ къ затылку, вискамъ, позади ушей, къ ноздрямъ, потомъ ко всей коротко остриженной головѣ, холодныя примочки изъ воды съ уксуcomъ, льдомъ снѣгомъ, или изъ воды съ нашатыремъ (и селитрою по полууцѣи того и другой на фунтъ воды); обливаніе головы чрезъ два часа, или и чаще, смотря по тому, какъ скоро опять усиливается



жаръ, уменьшившійся послѣ перваго обливанія; горчичники къ икрамъ, подошвамъ, шпанская мушка на затылокъ; внутрь—селитра съ кремортартаромъ, горькою солью, рвотнымъ камнемъ (№ 6), вѣнскимъ питьемъ (№ 7).

Когда воспаленіе ослабѣетъ, — а это можно узнать изъ того, что лихорадка, краснота лица и глазъ, бѣненіе шейныхъ артерій уменьшаются, но бредъ и сонливость еще продолжаютъ, — то нужно ограничиться прохладнымъ содержаніемъ больного (безъ холодныхъ примочекъ), свободнымъ испражненіемъ пизомъ, приложеніемъ къ затылку или и къ обрѣтой головѣ нарывнаго пластыря, продолженіемъ употребленія горчичниковъ и вообще отвлекающаго способа леченія.

2) Нервное (слабое) воспаленіе мозга, замѣчаемое у пьяницъ, рукоблудовъ (онанистовъ), ипохондриковъ, истеричекъ и называемое вообще бѣлою горячкою. Здѣсь полезны: умереннохолодная примочка къ головѣ, теплыя ванны, отвлекающія средства, особенно же опій, который дается въ такомъ количествѣ, чтобы онъ произвелъ сонъ, а именно: взрослымъ мужчинамъ по 1—2 грана на приемъ, а юношамъ и женщинамъ по  $\frac{1}{2}$ —1 грану чрезъ 1—2 часа, пока больной не заснетъ глубокимъ, тихимъ сномъ, въ которомъ нужно его оставить до пробужденія.

Если это воспаленіе есть слѣдствіе пьянства и появляется у крѣпкихъ, полнокровныхъ людей, то, предъ употребленіемъ опія, часто нужно бываетъ пустить кровь.

3) Желудочное воспаленіе мозга отъ раздраженія желчью, глистами. Здѣсь необходимы сначала кровопусканіе, а потомъ пиявицы къ головѣ и холодныя примочки и затѣмъ уже разрѣшающія, слабительныя.

4) Воспаленіе мозга у роженницъ отъ переноса молока, требуетъ также дѣятельнаго противовоспалительнаго леченія, кромѣ котораго здѣсь нужны теплыя припарки къ грудямъ и животу для привлеченія молока, высасываніе молока изъ груди, слабительныя, клистиры. Послѣ сего воспаленія мозга часто остается помѣшательство ума.

5) Воспаленіе мозга отъ переноса на него скарлатины всегда бываетъ жестокое, требуетъ дѣятельнаго леченія (всѣ же противовоспалительнаго и отвлекающаго); оно



обыкновенно переходитъ въ водянку мозга, и много походить на дѣтское воспаление мозга съ выпотнѣемъ, т. е. дѣтскую водянку мозга.

6) Воспаленіе мозга, какъ слѣдствіе остановленнаго теченія мѣсячныхъ кровей, у женщинъ, кромѣ общаго приличнаго леченія, требуетъ кровопусканія изъ ноги, припуска пиявицъ къ дѣтороднымъ частямъ, къ заднему проходу, припарокъ къ нижней части живота, мажильныхъ клистировъ, пожныхъ ваннъ съ золою и горчицею, горчишниковъ къ верхней и внутренней части бедръ, къ поясницѣ.

7) Воспаленіе у дѣтей отъ остановившагося кровотоечения изъ носа скорѣе всего уступаетъ припуску пиявицъ къ ноздрямъ. — О воспаленіи мозга отъ ушиба, сотрясенія, ранъ головы, сказано при наружныхъ болѣзняхъ въ особенности.

§ 19. Воспаленіе спиннаго мозга. — Признаки: боль на одномъ какомъ — либо мѣстѣ спины, и притомъ или постоянная, или же проходящая и потомъ опять возвращающаяся на то же мѣсто; по прошествіи нѣсколькихъ дней, или же недель и даже мѣсяцевъ, у больного замѣчается онемѣніе рукъ, а чаще ногъ. Подобное же онемѣніе, или параличъ, замѣчается иногда и во внутреннихъ органахъ, смотря по мѣсту воспаленія спиннаго мозга. При воспаленіи сего мозга противъ шеи и груди бываетъ трудное глотаніе, одышка, сухой кашель, усиленное бѣшеніе сердца, обмороки; а при воспаленіи спиннаго мозга противъ брюха и въ поясницѣ — отрыжки, рвота, тяжесть въ желудкѣ, запоръ кала и мочи, или же непроизвольное ихъ испражненіе. Посему воспаленіе спиннаго мозга можетъ быть причиною множества болѣзней, какъ то: паралича, сухотки, запора, изнурительнаго поноса, задержанія и недержанія мочи, удушья, кашля и пр.

Для вѣрнѣйшаго распознаванія воспаленія спиннаго мозга, нужно всю спину, начиная отъ затылка до крестца, изслѣдовать пальцами, прижимая позвонки съ боковъ и по срединѣ, причемъ отъ давленія боль усилится на мѣстѣ воспаленія спиннаго мозга; то же самое можно замѣтить,



если по всей спинѣ тихо проводить губку, намоченную не слишкомъ горячею водою, и присемъ также, при движеніи губки чрезъ воспаленное мѣсто, боль въ послѣднемъ дѣлается примѣтною.

Воспаленіе спиннаго мозга бываетъ или острое, соединенное съ лихорадкою, или тихое, медленное; вообще же оно продолжается довольно долго: недѣли, мѣсяцы и даже годы. Оно разрѣшается (острое) или же переходитъ въ выпотѣніе сыворотки (водянки позвоночнаго канала), нагноеніе, кистозу позвонковъ, срастеніе послѣднихъ и негибкость спины. — Причиною сего воспаленія бываютъ: неосторожное поднятіе дѣтей за голову, ушибы въ спину, паденія на спину, ревматизмъ, переносы на спину ревматизма, подагры, разныхъ сыпей, почечуиные приливы крови и пр. Лечение должно быть противовоспалительное; особенно полезны: повторительный припускъ пиявицъ къ воспаленному мѣсту, слабительныя, повторительное приложеніе мушки, долго поддерживаемой въ нагноеніи (Фонтанелли).

§ 20. ЖАБА, воспаленіе въ горлѣ. — Жабюю называется всякое воспаленіе въ горлѣ и на шеѣ, органовъ глотанія и дыханія, какъ то: языка, слинныхъ желѣзъ, глотки, пищевого горла, гортани и дыхательнаго горла. Его признаки суть: больное, трудное, а иногда и совсѣмъ невозможное глотаніе; измененный голосъ; несвободное дыханіе. Сверхъ того, смотря по мѣсту воспаленія и по степени его, замѣчается: слюнотеченіе и плеваніе (отъ умноженнаго отдѣленія слины и труднаго ея глотанія); покрытіе частей во рту выпотѣвшею, вязкою, желтою, бѣлою слизью; сухость во рту; скопленіе крови въ головѣ, по причинѣ затрудненнаго ея низтеченія отъ прижатія кровяныхъ сосудовъ распухшими частями; красное, свѣе, распухшее лицо; хрипливое дыханіе; сонливость и даже кровяной пострѣлъ. Вся эти припадки бываютъ сильныя и опасныя при воспаленіи органовъ дыханія, чѣмъ глотанія.

Теченіе. Болѣзнь совершенно разрѣшается или же переходитъ въ нарывъ, помертвѣніе, либо оставляетъ послѣ себя отвердѣніе, наичае въ слинныхъ желѣзахъ; но она можетъ причинить и смерть и притомъ чрезъ переходъ въ



помертвѣніе или же чрезъ задушеніе, либо пострѣлъ. Пострѣлъ бываетъ самъ по себѣ отъ накопленія крови въ голову и при помертвѣніи; больной задушается отъ того, что воспаленныя и распухшія части совершенно препятствуютъ проходу воздуха чрезъ гортань въ лёгкія.

Причины. Обыкновеннѣйшая причина жабы есть: простуда шеи во время питья холодной воды при разгоряченномъ тѣлѣ; отъ скорой ходьбы или ѣзды противъ холоднаго вѣтра при открытомъ ртѣ; отъ промоченія ногъ. Заразы, лихотворная, скарлатинная особенно часто бросаются на шейныя части и причиняютъ жабу.

Изъ сего явствуетъ, что жаба можетъ быть то незначительною, то очень опасною болѣзнію; и потому, если у больного замѣчается жаръ во всемъ тѣлѣ, скорый, частый пульсъ, очень трудное глотаніе и дыханіе, красное, опухшее лицо, то надобно поспѣшить приглашеніемъ врача.

Леченіе. 1) Въ легкой степени достаточно общее противовоспалительное леченіе и слабительное изъ льнянаго, кастороваго масла, горькой соли, горькой воды и, сверхъ того, мѣстное: полосканіе рта (№ 18), или мазь для горла изъ просвирнаго сиропу, меду сначала съ бурою, а потомъ, когда уменьшится боль, съ квасцами (№ 19); вдыханіе теплыхъ паровъ изъ молока, ромашки; смягчительныя припарки; втираніе въ шею летучей мази; обвязываніе шеи суконкою, фланелью, шерстянымъ чулкомъ (по замѣчанію простаго народа, съ лѣвой ноги); если же все это не помогаетъ въ теченіе 2—3 дней, то припускъ пиявицъ къ шеѣ спереди и съ боковъ.

2) Въ сильной степени жабы (при трудномъ глотаніи и дыханіи, опухоли шеи, невозможности раскрыть ротъ, желтой рвѣ, синемъ, красномъ, распухшемъ лицѣ и проч.) нужно прежде пустить кровь изъ руки, или ноги, а потомъ приставить пиявицы и притомъ употреблять вышесказанныя средства. Если и послѣ этого глотаніе и дыханіе остаются затруднительными, то къ смягчительнымъ припаркамъ прибавить листьевъ бѣлены, а къ шеѣ приставить мушку и даже дать рвотное, но только—повторяемъ—послѣ кровопусканія. Рвотное (изъ раствора рвотнаго камня № 10 б.)



здесь бываетъ очень полезно, особенно если притомъ замѣчается блѣдный, нечистый языкъ, горечь во рту, отрыжка, тошнота, давленіе подъ ложечкой; трудное же глотаніе не затруднить рвоты.

3) Ревматическая жаба. При ней бываетъ сильнѣе боль, чѣмъ опухоль въ горлѣ; языкъ покрытъ бѣлою, вязкою слизью; воспаленіе занимаетъ миндальныя желѣзы, язычекъ, нѣбную занавѣску. Здесь рвотное также очень полезно, а потомъ слабительное изъ горькой соли; внутрь — нашатырь; снаружи — втираніе въ шею летучей мази, припарки, горчичники къ шеѣ или затылку; полосканье изъ шалфея, мяты и особенно изъ аниса (*pimpinella anisum* (№ 18 № 19) съ квасцами, нашатыремъ, медомъ, уксусомъ; отъ сего полосканья отдѣляется множество густой слизи и вязкой слюны. Если припадки усиливаются, то нужны: кровопусканіе, пиявицы и мушка на шею, или затылокъ.

О воспаленіи околоушныхъ и подъязычныхъ слюнныхъ желѣзъ, о привычной и гнилой жабѣ сказано въ другомъ мѣстѣ.

§ 21. Воспаленіе въ груди. Самыя частыя и обыкновенныя воспаленія встрѣчаются въ груди потому, что легкія безпрестанно находятся въ сношеніи съ воздухомъ, а чрезъ то и необходимо подвергаются влиянію его измѣненій: холоду, жару, сырости, сухости, вреднымъ парамъ и газамъ пыли. Чаше всего эти воспаленія занимаютъ или подреберную и легочную плевру и отличаются особенно болью, колющемъ при вдыханіи, или же поражаютъ самыя легкія (ихъ существо) и причиняютъ давленіе, тяжесть и тоску; но боль присемъ бываетъ умѣренная; воспаленія и плевъ и существа легочнаго вмѣстѣ, производятъ и сильную боль и тяжесть въ груди. Воспаленіе слизистой оболочки легкихъ, выстилающей ихъ внутреннюю поверхность — дыхательныя ветви, — есть катарръ легкихъ, кашель и уже описано выше. Впрочемъ, воспаленіе грудной плевры и существа легкихъ на самомъ дѣлѣ часто встрѣчаются вмѣстѣ и требуютъ одинакаго леченія.

Признаки: дрожь, ознобъ, жаръ, боль въ груди, при вдыханіи переходящая въ колюще, крѣпкій, частый и полный пульсъ при воспаленіи плевры; или же тягость, дав-



леніе, сжатіе въ груди, мягкій, малый, неровный, перемежающійся пульсъ при воспаленіи легкихъ. Въ обоихъ воспаленіяхъ дыханіе бываетъ горячее, скорое, частое, но короткое; больной бьется глубоко вздохнуть и дышитъ больше брюхомъ; если обнажить его, то можно видѣть, что брюшная стѣна движется часто и скоро, а грудная слабо и тихо. При глубокомъ вдыханіи появляется кашель, который при воспаленіи грудной плевы вообще бываетъ сухой, но при воспаленіи легкихъ кашель только въ началѣ воспаленія бываетъ сухой, а потомъ дѣлается мокрымъ; мокрота бываетъ сѣрая, бѣлая, желтая, кровавая; а въ высшей степени воспаленія легкихъ — откашливается чистая, пѣнистая кровь. При всѣхъ грудныхъ воспаленіяхъ замѣчается воспалительная лихорадка съ жаромъ, жаждою, сухостию во рту и кожѣ, красною, жгучею мочою и сказаннымъ пульсомъ; послѣдній однако измѣняется по степени и обширности болѣзни и изъ полного, твердаго и крѣпкаго дѣлается слабымъ и мягкимъ. Это происходитъ отъ двухъ причинъ: больной, страшась боли тотъ глубокаго вдыханія и расщиренія груди, дышетъ коротко, слабо расширяетъ грудь, стараясь дышать больше брюхомъ, отъ чего замедляется кровообращеніе чрезъ легкія и сердце; или же, при сильномъ воспаленіи и накопленіи крови въ легкіяхъ, послѣднія дѣлаются непроходимыми для крови, которая отъ того также замедляется въ обращеніи и въ обоихъ случаяхъ пульсъ дѣлается слабымъ и мягкимъ; но если больного заставить нѣсколько разъ глубоко вздохнуть или кашлять, то его мягкій и слабый пульсъ сей же часъ на нѣкоторое время дѣлается полнымъ и твердымъ и эта переменна пульса бываетъ очень явственна, если, во время глубокаго вдыханія или кашля больного, щупать его пульсъ.

Степень, теченіе. Воспаленіе въ груди бываетъ въ различной степени: въ видѣ легкаго колотья, простаго кашля и труднаго дыханія до задохнутія съ бредомъ и сонливостию, по причинѣ прилива крови къ мозгу и затрудненнаго ею оттуда низтеченія. Оно появляется или первоначально ознобомъ, или же развивается въ теченіе другой какой-либо,



особенно лихорадочной болѣзни. Продолжается оно 3—7—14 и рѣдко 21 день; рѣшается потомъ, мочею, кровотеченіемъ изъ носа и, сверхъ того, изверженіемъ, чрезъ отхаркиваніе мокроты блѣжелтой, густой какъ студень, но не вязкой, какъ бы зернистой, иногда съ кровяными полосками; послѣ такого рѣшенія больной совершенно и скоро выздоравливаетъ. Но часто, особенно воспаленіе самыхъ лёгкихъ, переходитъ въ нагноеніе, и нарывъ лёгочный. Въ этомъ случаѣ боль въ груди уменьшается, но совсѣмъ не прекращается, и продолжается чувство давленія, тяжести, особенно при глубокомъ вдыханіи, положеніи на боку; кашель хотя и тише, но продолжается; пульсъ остается скорымъ; одышка при легкомъ движеніи и скорая усталость; голосъ теряетъ свой тонъ и крѣпость, дѣлаясь пискливымъ, какъ бы дѣтскимъ; по временамъ у больного замѣчается ознобъ и дрожь, послѣ обѣда жаръ въ щекахъ, ладоняхъ и подошвахъ; изверженіе обильной гноевидной харкотины; исхуданіе тѣла, изнурительная лихорадка. При переходѣ груднаго воспаленія въ отвердѣніе, лихорадка прекращается, но остается короткое дыханіе, одышка, сухой кашель, летучая боль въ груди, по временамъ возвращается колющее, послѣ котораго отдѣляется много харкотины, и это повторяется все чаще и чаще, а потомъ развивается чахотка. Наконецъ, воспаленіе лёгкихъ причиняетъ смерть чрезъ задушеніе, скопленіемъ крови въ лёгкихъ, лопнутіемъ нарыва, помертвѣніемъ, а воспаленіе грудной плевы оставляетъ послѣ себя приращеніе лёгкихъ къ ребрамъ и грудную водяную болѣзнь.

Причины. 1) Натуральное расположеніе лёгкихъ къ воспаленію, состоящее въ ихъ полнокровіи; ибо чрезъ легкія проходитъ кровь всего тѣла, въ лёгкихъ развивается много теплоты, которой выходъ съ воздухомъ часто воспаляется, и наконецъ, обширная поверхность лёгкихъ, находящаяся въ безпрестанномъ сообщеніи съ воздухомъ. 2) Лихорадка и горячка, ускоряя кровообращеніе въ тѣлѣ, въ большомъ количествѣ пригоняютъ кровь къ лёгкимъ, гдѣ она скопляется, задерживается и причиняетъ наконецъ воспаленіе, особенно при раздраженномъ и безъ того состояніи лёгкихъ. 3) Сухой,



упругій воздухъ (при высоко́мъ состояніи ртути въ барометрѣ), сѣверные и восточные вѣтры, сухой холодъ. По этому воспаления въ груди чаще замѣчаются зимою, въ концѣ осени и въ началѣ весны. 4) Мясная пища, спиртные напитки, продолжительный бѣгъ, танцы, напряженіе груди при пѣніи, крикъ, громкомъ чтеніи, простуда при разгоряченномъ тѣлѣ (послѣ бани у простаго народа); грудной катарръ, ревматизмъ, прекращеніе мѣсячнаго у женщинъ, привычнаго почечуйнаго кровотеченія у мужчинъ; удары, ушибы, сдавленія груди тяжестью (тельгою, бревномъ), раны и пр. Воспаленія легкихъ чаще замѣчаются у мужчинъ, въ юношескомъ и возмужаломъ возрастѣ.

Воспаленіе въ груди вообще очень важно, и потому требуетъ призыва врача; впрочемъ, оно легче и скорѣе другихъ воспаленій уступаетъ приличному леченію.

Леченіе. Кровопусканіе, селитра, рвотный камень и мушка суть самыя дѣйствительныя средства при воспаленіи въ груди.

1) Въ легкой степени воспаленія одной грудной плевы или плевы и легкихъ, происшедшемъ отъ простуды, очень часто бываютъ достаточны: растираніе груди летучею мазью, смягчительныя припарки, горчичникъ на бокъ, теплая ножная ванна съ золою, теплый потогонный чай на ночь, а внутрь селитра или нашатырь въ отварѣ просвинокъ съ солодовымъ сокомъ (№ 21).

2) При воспаленіи одной грудной плевы, т. е. при колотьи безъ тяжести въ груди, у людей нѣжныхъ, слабыхъ, достаточны бываютъ припускъ 20—30 пиявицъ, потомъ мушка на бокъ, а внутрь селитра въ отварѣ просвинокъ съ вишнымъ камнемъ. Если послѣ пиявицъ на другой день колотье не уменьшается и пульсъ остается твердымъ и полнымъ, то надобно или опять приставить пиявицы, или же, вѣрнѣе, пустить кровь изъ руки.

3) Если больной имѣетъ воспаленіе самыхъ легкихъ т. е. когда у него замѣчается тяжесть, давленіе въ груди, брюшное дыханіе, сухой или съ мокротными полосками кашель, то кровопусканіе изъ руки необходимо. Въ обоихъ воспаленіяхъ (т. е. плевы и легкихъ) кровь нужно пускать



изъ руки, соответствующей больному боку въ груди, и крови давать течь до тѣхъ поръ, пока при колотьи полный и твердый пульсъ не сдѣлается мягкимъ и малымъ, а при воспаленіи лёгкихъ — до тѣхъ поръ, пока слабый и мягкій пульсъ не подымется и не сдѣлается полнѣе и тверже и пока давленіе и тяжесть въ груди не уменьшатся, а въ лицѣ больного не появится видимое успокоеніе; а для того, во время теченія крови изъ вены, больного нужно почаще заставлять производить медленныя и глубокія вздыханія; крови должна течь большою струею, и для сего дѣлать въ венѣ довольно широкій разрывъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ не должно пускать крови до обморока, во время котораго легко ссыдается кровь въ сердцѣ и происходятъ полипы отъ ссыданія крови. Поэтому кровь пускать нужно въ лежачемъ положеніи больного и при появленіи блѣдности въ лицѣ, круженія въ головѣ, шума въ ушахъ и пр. остановить теченіе крови. Кровопусканіе нужно повторить, если припадки воспаленія, уменьшившіеся сейчасъ послѣ перваго кровопусканія, потомъ опять усилятся; въ такихъ случаяхъ присутствіе врача очень нужно. Надобно однако знать, что чѣмъ завремениѣе и обильнѣе сдѣлано первое кровопусканіе, тѣмъ оно дѣйствительнѣе, и тѣмъ рѣже бываетъ нужно второе или третье кровопусканіе. Чахотное тѣлосложеніе, привычка пускать кровь еще необходимымъ дѣлаютъ кровопусканіе; но въ такихъ случаяхъ кровь надобно пускать въ небольшомъ количествѣ, 1—2 чашки чайныя.

Послѣ кровопусканія, при воспаленіи лёгкихъ, нужно дать больному рвотный камень съ селитрою (№ 20). Если чрезъ сутки послѣ кровопусканія ослабѣютъ общіе (жаръ, сухость, пульсъ), но не уменьшатся мѣстные (тяжесть давленіе, колотье въ груди) припадки воспаленія, то нужно положить противъ больного мѣста на грудь мушку, величиною въ ладонь. Для ускоренія отвлеченія мокроты изъ лёгкихъ, внутрь давать селитру съ ванилыремъ и сокомъ солодковаго корня въ отварѣ просвиры (№ 25), льнянаго сѣмени или ячневыхъ крупъ, а для питья назначить грудной чай (№ 26) ячный, овсяный изъ вишневой, аравійской ка-



меди, отваръ съ медомъ, сахаромъ, солодковымъ корнемъ. Если сырая, прозрачная мокрота отдѣляется трудно, при томъ кашель силенъ; то полезны, отваръ салепа съ вишневымъ, малиновымъ или другимъ сиропомъ, либо медомъ, и микстура изъ миндальнаго, прованскаго, льнянаго или другаго масла со слизью сказанной камеди, сокомъ солодковаго корня, сиропомъ и вытяжкою бѣлены (№ 20).

4) Воспаленіе въ груди зависитъ отъ страданія въ брюхѣ. Больной имѣетъ сильнѣйшее колотье и давленіе въ груди, но безъ твердаго и полного пульса, и сверхъ того въ немъ замѣчается отрыжка, тошнота, даже рвота, горѣчь во рту, бѣлый, желтый, нечистый языкъ, полнота подъ ложечкою, желтизна глазъ, губъ, всей кожи. Къ такому больному необходимо пригласить врача, при недостаткѣ котораго нужно поступать такъ: если припадки страданія груди очень сильны, то надобно прежде пустить кровь и потомъ дать рвотное изъ рвотнаго камня въ растворъ (№ 10 б.); но при умѣренномъ страданіи груди дать прямо это же рвотное, которое часто извергаетъ множество слизи и желчи, послѣ чего припадки болѣзни прекращаются и больной выздоравливаетъ при употребленіи селитры или нашатыря съ рвотнымъ камнемъ (№ 20),—питья изъ кремортартара; рвотное иногда нужно и повторить.

5) Ревматическое колотье. Здѣсь болѣзнь гнѣздится въ грудныхъ мышцахъ и происходитъ или прямо отъ простуды, или же отъ бывшаго ревматизма на другомъ мѣстѣ тѣла, и перешедшаго на грудь. Ревматическое колотье отличается тѣмъ, что оно отъ наружнаго прижатія грудныхъ мышцъ усиливается, а при сдавленіи всей груди (напр. широкимъ поясомъ, полотенцемъ) больной безъ особенной боли можетъ глубоко вздохнуть. Здѣсь бываетъ полезно то же леченіе, что и въ легкой степени воспаленія въ груди (см. выше п. I) и сверхъ того мушка на больной бокъ. Впрочемъ, и это воспаленіе груди можетъ усилиться до того, что дѣлаетъ необходимымъ кровопусканіе изъ руки, или по крайней мѣрѣ припускъ пиявицъ къ боку.

6) Медленное, продолжительное колотье или по временамъ, но часто возвращается, или же непрерывно продол-



жаются недѣли и мѣсяцы, соединяется притомъ съ кашлемъ и одышкою. Оно бываетъ ревматическое или почечуйное. Первое узнается по общимъ припадкамъ ревматизма и лечится какъ послѣдній, особенно продолжительнымъ употребленіемъ медленно нарывающей мушки (*vesicatorium perpetuum*), пластыря изъ смолы (вара), ношеніемъ на голомъ тѣлѣ фланелевой, шерстяной рубашки, фуфайки.

7) Почечуйное колотье узнается изъ того, что больной былъ подверженъ почечую, что во время испражненія крови низомъ, колотье уменьшается и усиливается, когда почечуйное теченіе прекращается; также при полосканіи рта по утрамъ холодною водою, вдругъ появляется съ кашлемъ кровавая мокрота; у женщинъ это колотье зависитъ отъ неправильнаго мѣсячнаго очищенія. Въ семь колотьи бываютъ полезны: припускъ нѣвидѣ къ боку или къ заднему проходу, внутрь слабительное изъ сѣры съ кремортартаромъ и магнезією (№ 44), стѣрныя минеральныя воды.

Продолжительное колотье, зависящее отъ страданія легкихъ, бываетъ предвѣстникомъ чахотки, при которой объ немъ и будетъ упомянуто.

Запущенное, пренебреженное колотье есть то, когда оно продолжается 8—10 дней безъ врачебнаго пособія. Оно оказывается въ различныхъ видахъ: 1) больной имѣетъ сильнѣйшіе припадки воспаленія въ груди: стѣсненіе, тяжесть, короткое, трудное, хрипливое дыханіе, одышку, частый, сухой, кровавый кашель, забывчивость, сонливость, бредъ, красное, горячее лице, скорый, малый, слабый пульсъ, красную, горячую мочу, запоръ на низъ; больному или совсемъ не пускали, или пустили мало крови. Здѣсь необходимъ совѣтъ врача, который смѣлымъ, но осторожнымъ кровопусканіемъ даже на 10-й—12-й день болѣзни, можетъ иногда спасти больного отъ смерти. 2) У больного замѣчаются сіи же грудные припадки, но притомъ блѣдное, впалое лице, свѣтлая водянистая моча, холодныя руки и ноги, ему уже была пущена кровь и не однажды; здѣсь также помощь врача необходима, хотя часто и она бываетъ безуспѣшна. 3) У больного запущеннаго, кромѣ грудныхъ припадковъ, есть сильная тоска, слабость, при малѣйшемъ



движеніи — поворотъ на бокъ, — склонность къ обмороку, нечистый, желтый, бурый, черный, корявый, потрескавшійся языкъ, отрыжка, тошнота, горечь, рвота, мутная моча, водянистый поносъ. Здѣсь необходимо дать больному рвотное изъ рвотнаго корня, сначала 15 гранъ за одинъ разъ, а потомъ по 5 гранъ, чрезъ 10—15 минутъ, пока не произойдетъ рвота.

Послѣ всякаго воспаленія въ груди, благополучно разрешившагося, больной въ теченіе 2—3 мѣсяцевъ долженъ еще воздерживаться отъ напряженія груди и разгоряченія тѣла; а потому не бѣгать, не танцовать, не пить, долго и громко не говорить и въ слухъ не читать. Но если прошло воспаленіе, а остался сухой кашель, перхота, то бываютъ полезны: сыворотка, кумысъ, зельтерская, кавказская, нардзанная вода съ молокомъ, сокъ изъ моркови, рѣпы, свекловицы и постоянная мушка между плечами. Если, напротивъ, продолжится кашель съ отдѣленіемъ жидкой, бѣлой мокроты съ явнымъ изнуреніемъ больного, то послѣднему нужно давать по два раза въ день 3—4 унціи студени изъ исландскаго моха съ молокомъ и сахаромъ. Здѣсь приглашеніе врача также необходимо.

Диета при воспаленіяхъ въ груди, вообще противувоспалительная; послѣ болѣзни особенно полезны молочная пища и свѣжій, чистый воздухъ.

Воспаленіе сердца узнается очень трудно; впрочемъ, по припадкамъ и леченію, оно въ сущности сходствуетъ вообще съ воспаленіемъ въ груди, а потому мы объ немъ въ особенности говорить не станемъ.

§ 22. Воспаленія брюшныхъ внутренностей вообще отличаются тѣмъ, что 1-е, при нихъ замѣчается слабый, малый, почти какъ ниточка, тонкій пульсъ, означающій сильную степень воспаленія и его опасность; 2-е, боль бываетъ то очень сильная, такъ-что больной не терпитъ даже легкаго дѣянія на животъ, то ее вовсе не бываетъ, или крайней мѣрѣ ее можно открыть только при сильномъ прижатіи брюха, которое посему нужно ощупывать по всемъ мѣстамъ и притомъ долго и неоднократно, и 3-е, по сей же причинѣ брюшныя воспаленія распознаются иногда очень



трудно и потому къ такимъ больнымъ, по возможности, всегда нужно приглашать врача.

§ 32. Воспаленія брюшины. Такъ-какъ брюшина выстилаетъ всю внутреннюю поверхность брюшной полости и занимаетъ верхнюю, среднюю и боковыя части брюха, то воспаленіе ея можетъ начинаться въ разныхъ мѣстахъ брюха.

Признаки: боль въ разныхъ мѣстахъ живота, наичаше около пупка, усиливающаяся при дотрогиваніи къ брюху, при поворотѣ въ постылѣ, даже отъ легкаго одѣяла; напряженіе и вздушіе живота, упругаго какъ барабанъ; по мѣрѣ распространенія воспаленія кверху, появляется тошнота и рвота, а книзу—запоръ кала, задержаніе мочи. Воспаленіе брюшины можетъ сообщиться всѣмъ брюшнымъ внутренностямъ, которыя она одѣваетъ.

Причины. Раны, ушибы брюха, ущемленіе пупочной, паховой грыжи, простуда во время лежанія лѣтомъ въ полѣ, брюхомъ на сырой землѣ, беременность и особенно роды и переносъ молока послѣ родовъ отъ груди—наичаше бывають причиною сего воспаленія, весьма опаснаго тѣмъ, что оно легко сообщается другимъ внутренностямъ, переходитъ въ помертвѣніе или брюшную водянку.

Леченіе—общее противувоспалительное; особенно полезны: припускъ, даже неоднократный, пиявицъ къ мѣсту начальной боли, смягчительныя припарки и теплыя примочки живота изъ отвара ячннхъ крупъ, просвирокъ, льнянаго сѣмени, ржаной муки, отрубей, посредствомъ шерстяныхъ ветошекъ, втираніе въ животъ летучей мази съ камforoю, масла бѣлены, слабительное изъ кастороваго, деревяннаго, прованскаго, льнянаго масла, смягчительныя клистиры изъ отвара льнянаго сѣмени съ масломъ, теплыя ванны и мушля на животъ.

§ 24. Воспаленіе желудка. Признаки: постоянная, жестокая, рѣжущая, жгучая, стрѣляющая боль въ сторонѣ желудка, т. е. подъ ложечкою и отчасти влѣво; боль усиливается отъ прижатія, глубокаго вдыханія, принятія пищи; вздутіе и напряженіе сначала только верхней части, а потомъ и всего живота, часто съ замѣчательнымъ въ немъ



біеніємъ, частая отрыжка, тошнота и рвота послѣ проглотченія пищи, питья, даже простой воды; икота, тоска, безпокойство, малый, слабый, нитеобразный пульсъ; охолодѣніе рукъ и ногъ, разныя судороги, даже водобоязнь, чувство большой слабости, обмороки при поднятіи головы, поворотъ на постель.

Причины: вдругъ прекратившійся желчный и кровавый поносъ, холера, кровавая рвота, прекращеніе почечуйнаго и мѣсячнаго кровотеченія, сильная продолжительная рвота, гнилая, вредная пища, гнилыя копченныя колбасы, сырая, соленая испортившаяся бѣлужина, разныя яды, особенно мышьякъ, сулема, мѣдь (зеленый купоросъ), ушибы и раны верхней части живота, толчки въ сторону ложечки при полномъ желудкѣ.

Это воспаленіе очень опасно и течетъ быстро: въ три дня, а часто въ 12-ть часовъ, оно оканчивается смертію отъ помертвѣнія желудка, кроваваго пострѣла, обмороковъ, изнеможенія. При медленнѣйшемъ теченіи, оно оканчивается отвердѣніемъ, суженіемъ желудка. Чѣмъ быстрее упадетъ пульсъ, дѣлаясь малымъ и слабымъ, и скорѣе хладѣютъ руки и ноги, тѣмъ опаснѣе болѣзнь и необходимѣе призывъ врача.

Леченіе должно быть противувоспалительное: чѣмъ слабѣе пульсъ и холоднѣе руки, тѣмъ необходимѣе и обильнѣе должно быть кровопусканіе изъ руки, и потомъ припускъ 30 — 50 пиявицъ къ сторонѣ желудка. Внутреннія средства, особенно соли, даже селитра вредны, а надобно давать больному миндальное, конопляное молоко, коровье молоко съ водою, сыворотку; при сильной, неутолимой жаждѣ, больному давать сосать виноградъ, апельсинъ, пить по чайной ложкѣ лимонадъ, воду съ вишневымъ, клюквеннымъ сокомъ или по маленькимъ кусочкамъ сосать ледъ. Снаружи—втираніе въ сторону желудка простаго, или на бѣлень настоящаго льнаго, деревяннаго масла съ настоякою опія, смягчительныя припарки съ листьями бѣлены, муш-

---

Отъ сего-то воспаленія у насъ вымираютъ иногда цѣлыя семейства крестьянъ, падавшихся въ постное время сырой соленой бѣлужины.



ка, смягчительные клистиры съ опійною настойкою (10—20 капель на клистирь), теплыя ванны съ отрубями.

При воспаленіи желудка отъ проглоченія яда лечение то же, что и при отравленіи (см. эту ст. въ отдѣлѣ о «Сохраненіи здоровья»). При жженіи, тошнотѣ и рвотѣ послѣ употребленія испорченныхъ копченыхъ колбасъ, сырой, соленой бѣлужины, немедленно надобно давать больному рвотное изъ рвотнаго корня и камня (*№* 10), потомъ поставить клистирь изъ наливки александрійскаго листа и англійской соли съ масломъ льнянымъ, или дать слабительное изъ кастороваго, льнянаго масла. Если жженіе и сухость въ горлѣ не уймутся, то дать 12—15 капель опіиной настойки, или  $\frac{1}{2}$ —1 гранъ опіи. При воспаленіи желудка, какъ слѣдствіи переноса на него подагры, лучшее средство есть мушка на животъ и горячія припарки къ мѣсту подагры, также горчичники и мушка.

§ 25. Воспаленіе кишекъ. Признаки: жестокая, постоянная, жгучая, стрѣляющая, рѣжущая боль въ какой-либо части живота, усиливающаяся отъ наружнаго прижатія; больной не терпитъ даже легкаго одѣяла на брюхѣ, млеетъ и быстро изнемогаетъ; вздутый, напряженный, горячій животъ; запоръ на-низъ, тошнота, рвота сначала водою, слизью, а потомъ и каломъ, икота, тоска—безпокойство, метаніе въ постель, неутолимая жажда; малый, сжатый, слабый пульсъ и тѣмъ слабѣе, чѣмъ сильнѣе воспаление; блѣдное лице, холодныя руки и ноги; припадки воспалительной горячки.

Теченіе очень быстрое. Болѣзнь или разрѣшается благополучно, или переходитъ въ помертвѣніе, при которомъ боль вдругъ хотя прекращается, но положеніе больного не улучшается: онъ впадаетъ въ безпамятство, непроизвольно испражняетъ воюнчій, черный калъ, распространяетъ вокругъ себя трупный запахъ и пр. Иногда воспаленіе кишекъ переходитъ въ нагноеніе, слѣдствіемъ коего бываетъ чахотка съ поносомъ, или же въ отвердѣніе, которое бываетъ причиною упорнѣйшихъ запоровъ на-низъ.

Причины почти тѣ же, что и воспаленія желудка; сверхъ того, воспаленіе кишекъ очень часто происходитъ отъ про-



моченія ногъ, простуды живота во время лежанія брюхомъ на сырой, голой землѣ, отъ остановленія почечуйнаго, мѣсячнаго кровотеченія, послѣ родовъ, отъ употребленія сильныхъ слабительныхъ лекарствъ, отъ ущемленной грыжи, отъ глистовъ, пьянства, объеденія. Эта болѣзнь очень опасна: иногда въ 12 часовъ убиваетъ больного, къ которому посему немедленное приглашеніе врача необходимо.

Леченіе то же, что и при воспаленіи желудка: чѣмъ слабѣе и меньше пульсъ, тѣмъ необходимѣе кровопусканіе, которое продолжать до тѣхъ поръ, пока пульсъ не возвысится и не сдѣлается примѣтнымъ; послѣ чего, если на одномъ мѣстѣ сосредоточилась боль, то тутъ приставить 30—40—50 пиявицъ; масляныя въ животъ втиранія, смягчительныя съ бѣленою припарки, или такія же горячія примочки (отваръ льнянаго сѣмени, отрубей, ячнхъ крупъ) посредствомъ суконокъ; смягчительныя, теплыя ванны съ отрубями, масляно-слизистыя клистиры ставимые чрезъ каждые 4—6 часовъ; внутрь конопляное, миндальное молоко съ бѣленою (по  $\frac{1}{2}$ —1 грану на пріемъ), коровье молоко, сыворотка; но пока продолжается боль, не должно внутрь давать никакого слабительнаго и никакой соли, особенно селитры, нашатыря. Если пріутихнетъ воспаленіе, больной терпитъ прижатіе живота, но имѣетъ тошноту или и рвоту, то внутрь ему дать масляную эмульсію съ бѣленою или опиумъ (№ 22); для слабительнаго избирать касторовое или льняное масло и давать его чрезъ два часа по столовой ложкѣ. Если у больного прежде была грыжа, то нужно осмотрѣть грыжевое мѣсто и поступать, какъ сказано при ущемленной грыжѣ.

Больной, выздоровѣвшій послѣ воспаленія желудка и кишекъ, долго долженъ быть осторожнымъ въ діетѣ, воздержнымъ въ пищѣ, не употреблять капусты, гороху, свеклы, яблокъ, грушъ,—вообще всякой пищи, отдѣляющей вѣтры въ кишкахъ и располагающей къ рвзв, поносу; или же разгорячающей, какъ то: перецъ и другія пряности, хрѣнь, горчица; не пить квасу, молодого, кислаго пива, водки; на животъ носить набрюшникъ изъ фланели, суконки; не дожить-



ся животомъ на сырую, голую землю; наблюдать за свободнымъ испражненіемъ низомъ и пр.

§ 26. Воспаленіе печени. Признаки: боль въ правой верхней сторонѣ брюха отъ ложечки, подъ правыми ложечными ребрами и въ правой лопаткѣ. Если воспаленіе занимаетъ верхнюю, выпуклую поверхность печени, которою она прилегаетъ къ грудобрюшной преградѣ, то боль бываетъ въ сказанныхъ мѣстахъ острая, колючая, жгучая; она походитъ на грудное колотье, простирается спереди чрезъ ложечку къ грудной кости, а сзади къ правой лопаткѣ, книзу же доходитъ иногда до правой ноги; сухой кашель, тошнота, отрыжка, желчная рвота; всѣ эти припадки усиливаются при положеніи больного на правомъ боку. Но если воспаленіе занимаетъ нижнюю, вогнутую поверхность печени, которою она прилегаетъ къ желудку и гдѣ находятся желчеотдѣлительные сосуды, то боль бываетъ тупая, давящая, свинцовая; замѣчается желтый цвѣтъ лица, глазъ, губъ, желтослизистый языкъ, желтизна всей кожи (желтуха), темная, желтошафранная моча, тошнота, рвота, икота, горечь во рту; больному легче лежать на правомъ, чѣмъ на лѣвомъ боку. Въ обоихъ случаяхъ правая верхняя сторона брюха подъ ребрами вздута, горяча, при давленіи болитъ и замѣчается воспалительно-желудочная лихорадка. Воспаленіе верхней части печени вообще соблюдаетъ острый, быстрый, а нижней—медленный, продолжительный ходъ.

Теченіе воспаленія печени бываетъ вообще медленное и удобно распространяется на легкія, особенно правое; оно разръшается: кровотеченіемъ изъ носа, задняго прохода (открывшимся почечуемъ), рожею на наружныхъ частяхъ тѣла, проливнымъ потомъ, окрашивающимъ рубашку въ желтый цвѣтъ, желчнымъ поносомъ; или же переходитъ въ медленное, хроническое воспаленіе, въ отвердѣніе существа печени, засоренія печеночныхъ сосудовъ (заваль печени), оставляетъ послѣ себя брюшное поликровіе, наконецъ это воспаленіе переходитъ въ нагноеніе, которое впоследствии причиняетъ чахотку; гной изливается или въ полость брюха, въ кишки, желудокъ, причиняя поносъ, рвоту, или



черезъ брюшную стѣну пробивается кнаружи въ видѣ нарыва, или, наконецъ, прокладываетъ себѣ путь черезъ легкія и производитъ легочную чахотку.

Причины: простуда, сильный гнѣвъ, разгоряченія тѣла движеніемъ, спиртные напитки (пьяницы вообще страдаютъ часто острымъ и постоянно медленнымъ воспаленіемъ печени), сильныя рвотныя, раны и ушибы брюха и головы, быстрое пріостановленіе простаго и натужнаго поноса, прекращеніе привычнаго почечуйнаго кровотеченія и приливъ черезъ то крови къ печени; лѣтній зной, жаркій климатъ: низменныя болотныя мѣста особенно располагаютъ къ воспаленію печени, которое посему, въ лѣтнее время въ разныхъ мѣстахъ южной Россіи, вмѣстѣ съ перемежными лихорадками, появляется повально. Медленное воспаленіе печени очень часто бываетъ слѣдствіемъ упорныхъ перемежныхъ лихорадокъ—отъ приливовъ крови къ брюху во время лихорадочныхъ приступовъ. Воспаленіе печени, хотя и не такъ опасно, какъ воспаленіе желудка и кишекъ, но какъ оно легко переходитъ въ медленное воспаленіе и нагноеніе, или оставляетъ послѣ себя завалы въ печени, то если болѣзнь не прекратится отъ первыхъ принятыхъ противъ нее мѣръ, въ теченіе 3—6 дней, необходимо посоветоваться съ врачомъ, особенно для употребленія такимъ больнымъ внутрь сладкой ртути, а снаружи втиранія ртутной сѣрой мази.

Леченіе то же, что и при колотѣ въ груди: кровопусканіе изъ руки, и особенно припускъ пиявицъ подъ правыми ребрами и у ложечки, также къ заднему проходу, масляныя втиранія, мягчительныя теплыя припарки и мушка; внутрь—селитра, винный камень, отваръ тамариндъ, черносливъ (№ 4); для питья—сыворожка, лимонадъ, растворъ кремортартара; клистиры изъ наливки александрійскаго листа съ англійскою солью, мыломъ, льнянымъ масломъ.

Медленное, тихое воспаленіе бываетъ чаще остраго, и оно обозначается: постоянною или по временамъ возвращающеюся болью въ сторонѣ печени, чувствомъ тяжести и опухолью въ правомъ боку, жаждою, сухостию и горечью во рту, желтизною лица и языка, особенно по утрамъ, красною, мутною мочею, неправильнымъ испражненіемъ на-



низъ — то запоромъ, то поносомъ. Все эти припадки замѣчаются чаще у людей, подверженныхъ упорной перемежной лихорадкѣ, пьянству.

Въ семь воспаленіи печени особенно полезны: сладкая ртуть съ водяною вытяжкою сабура внутрь, и втираніе снаружи въ сторону печени сѣрой ртутной мази; но оба эти средства нужно употреблять подъ наблюденіемъ врача. Далѣе, здѣсь полезны: свѣжіе соки растений: одуванчика, цикорія, трилистника, золототысячника, моркови, рѣпы, свеклы, петрушки, пастернака; сыворотка, минеральныя, щелочныя воды: кавказскія, сергіевскія, крейцбрунскія, ахенскія, сакскія, эзельскія грязи; теплыя, мыльныя и щелочныя ванны, ножныя ванны изъ теплой воды съ соляною и селитряною кислотою (царская водка) унція на 2 ведра воды, при боли — припускъ пиявицъ къ сторонѣ печени, смягчительныя припарки, масляныя втиранія.

Примѣчаніе. При воспаленіи кишекъ, и особенно печени, прекрасно дѣйствуетъ сладкая ртуть съ опіемъ, но ихъ надобно употреблять не иначе, какъ подъ надзоромъ врача; во время ихъ приѣма и день послѣ него не давать больному ничего кислаго; больного содержать нѣсколько теплѣе, и послѣ приѣма ртути и по окончаніи болѣзни дать ему 2—4 теплыя ванны, даже 1—2 сѣрныя.

§ 27. Воспаленіе почекъ. Признаки: колючая, рѣжущая, жгучая, давящая боль въ боку поясницы, въ самомъ перехватѣ живота къ спинѣ, откуда простирается книзу и впереди вдоль мочеточниковъ къ мочевому пузырю; трудное испражненіе и даже задержаніе мочи (послѣднее при воспаленіи обѣихъ почекъ, очень рѣдко случающемся); красная, острая моча, истекающая съ жженіемъ, у мужчинъ личко больной стороны поетъ, домиетъ, припухаетъ и поднимается кверху — къ паху; часто вся нога больной стороны нѣмѣетъ, появляются боли во всемъ животѣ, тошнота, рвота; при положеніи на спинѣ, на больномъ боку, при хожденіи, стояніи, припадки болѣзни усиливаются, но ослабѣваютъ при согбенномъ положеніи и на здоровомъ боку; присемъ замѣчается воспалительная лихорадка, неутолимая жажда, иногда запахъ мочи въ испаринѣ, дыханіи.



**Теченіе.** Это воспаленіе разрѣшается довольно скоро и часто; оставляетъ послѣ себя отвердѣніе; переходитъ въ нагноеніе, и если гной испражняется съ мочею, то можно надѣяться на выздоровленіе.

**Причины:** почечные камни, пьянство, продолжительная тряская ѣзда въ телѣгѣ, верхомъ, прыганіе, танцы, удары въ поясницу, поднятіе значительныхъ тяжестей, почечуиный приливъ крови, мочегонныя средства — можжевеловое, литарное масло и особенно шпанскія мушки.

**Леченіе** то же, что и воспаленія печени, т. е. вообще противувоспалительное; только не надобно внутрь давать никакихъ солей, особенно селитры и нашатыря, а снаружи не прикладывать шпанской мушки; но давать внутрь конопляное, миндальное молоко, слабительныя изъ кастороваго, льнянаго масла, отваръ тамариндъ, черносливъ; ставить часто простые, смягчительныя клистиры, прикладывать къ больному мѣсту смягчительныя припарки и особенно 1 — 2 раза въ день сажать больного всего, или по ложечку, въ теплую ванну съ отрубями, сыпью трухою; при сильной боли въ поясницѣ и рѣзѣ въ мочевомъ каналѣ давать порошокъ изъ сладкой ртути съ опіемъ, какъ при воспаленіи печени.

Если послѣ сего воспаленія останется боль и тягость въ поясницѣ (медленное воспаленіе, затвердѣніе), то надобно продолжить масляныя втиранія, или просто растиранія поясницы рукою, щеткою, суконкою, по временамъ прикладывать пиявицы, дѣлать ванны съ отрубями, сыпью трухою, а внутрь принимать уксусокислый поташъ, разрѣшающіе соки и вытяжки; пить парзанную, зельтерскую воду съ молокомъ, сыворотку.

§ 28. Воспаленіе мочевого пузыря.—Признаки: острая, жгучая, рѣжущая боль въ средней и нижней части живота надъ лономъ между пахами; тутъ же скоро появляется припухлость, съ напряженіемъ и жаромъ, отъ прижатія которой боль усиливается и возбуждается позывъ къ испражненію мочи; моча красная, мутная, острая, испражняется съ жженіемъ и трудомъ, прерывистою струею, или и совсѣмъ останавливается; запоръ па-лизъ, воспалительная



лихорадка съ твердымъ, скорымъ пульсомъ; при высшей степени болѣзни—тоска, икота, рвота, охлажденіе рукъ и ногъ.

Теченіе очень быстрое, особенно у молодыхъ людей. Воспаленіе разрѣшается потомя, густою, мутною мочею переходить въ смертельное помертвѣніе, либо въ нагноеніе, при которомъ нарывъ вскрывается въ мочевоу пузырь и испражняется съ мочею, или же гной прокладываетъ себѣ ходъ въ срамную промежность, мошонку у мужчинъ, большія губы у женщинъ, въ прямую кишку; либо, наконецъ, у стариковъ переходить въ отвердѣніе, которое бываетъ причиноу труднаго испражненія мочи и повторительнаго воспаления мочеваго пузыря.

Причины: простуда, промочка ногъ, ушибы, раны нижней части живота, переносы на мочевоу пузырь ревматизма, подагры, любострастной болѣзни, приливъ къ пузырю почечуиной крови, мочегонныя лекарства, мочевые камни и песокъ, прекращеніе мѣсячнаго теченія, беременность, роды и послѣдствія родовъ. Воспаленіе мочеваго пузыря очень опасно, и потому требуетъ немедленнаго пособія и призыва лекаря.

Леченіе то же, что и при воспаленіи почекъ: кровопусканіе, пиявицы, припарки, масляныя втиранія въ промежность съ бѣленою или опиємъ, магчительныя клистиры, нары на животъ, ванны и полуванны; внутрь миндальное, конопляное молоко. Если совсѣмъ остановится испражненіе мочи, то непременно нужно поставить больному катетеръ, а это советуемъ предоставить врачу или свѣдущему фельдшеру.

Послѣ воспаленія почекъ и мочеваго пузыря долго 2—4 мѣсяца—ненадобно употреблять вина, водки, кислыхъ шей, молодаго или окислаго стараго пива, браги, воздержаться отъ соитія.

§ 29. Воспаленіе матки.—Признаки: боль въ средней и нижней части живота, надъ лобкомъ, при наружномъ дотрогиваніи усиливающаяся; примѣтная опухоль, боль и жаръ въ маточномъ рукавѣ и отверстіи матки, боль, жжение при испражненіи низомъ съ чувствомъ, какъ-будто что-либо твердое и горячее стоитъ въ заднемъ проходѣ; если



провести два пальца чрезъ задній проходъ, то кпереди можно ощупать твердое горячее тѣло—воспаленную матку; рѣзь и жженіе при испражненіи мочи; въ высшей степени болѣзни задержаніе мочи и запоръ низомъ, тошнота, рвота икота, лихорадка. Это воспаление, какъ и другія, разрѣшается при отдѣленіи изъ маточнаго рукава гноеводной слизи, крови, переходитъ въ нагноеніе, съ истеченіемъ гноя чрезъ рукавъ, и оставляетъ послѣ себя отвердѣніе, которое въ послѣдствіи можетъ перейти въ ракъ. Впрочемъ, оно течетъ медленнѣе другихъ брюшныхъ воспаленій и не такъ опасно.

Причины: простуда; промочка ногъ; сотрясенія матки во время танцовъ; поднятіе тяжестей; трудные, продолжительныя роды; насилія акушера, или бабки, при родахъ; остановленіе мѣсячнаго кровотеченія; послѣ родового отдѣленія слизи, наклоненіе матки въ сторону; замедлившійся выходъ изъ матки послѣда, или насильственное его отдѣленіе бабкою; неосторожное остановленіе кровотеченія изъ матки холодными примочками живота, впрыскиваніями въ матку; сильныя средства, принятыя съ цѣлію произвести выкидышъ, открыть теченіе мѣсячныхъ кровей (сабуръ, можжевельное, янтарное масло, шпанскія мушки).

Леченіе то же, что и при воспаленіи мочевого пузыря; сверхъ того, здѣсь можно впрыскивать въ маточный рукавъ мягчительные теплые отвары изъ льнянаго сѣмени, просвирнаго корня, цвѣтовъ ромашки, коровьяго тѣплаго молока.

Примѣч. 1-е. У женщинъ бываетъ еще и воспаленіе яичниковъ. Оно обозначается болью и ограниченною опухолью надъ правымъ или лѣвымъ пахомъ; впрочемъ, оно узнается довольно трудно, и лечится такъ же, какъ и воспаленіе матки. Воспаленіе яичниковъ опасно тѣмъ, что оно легко переходитъ въ отвердѣніе и потомъ причиняетъ разные припадки, а часто и водяную болѣзнь въ брюхѣ.

Примѣч. 2-е. Еще въ нижней части живота около паховъ случается воспаленіе мышцъ поясничныхъ, бедренныхъ, брюшныхъ; оно отличается болью въ поясницѣ, спинѣ, пахахъ, бедрахъ, также при движеніи и поворотѣ бедръ; больной ходитъ нагнувшись и хромаетъ; снаружи



не замѣтно ни опухоль, ни красноты кожи. Это воспаленіе походить на воспаленіе почекъ, но при немъ не бываетъ запора на-изъ, труднаго мочеиспусканія и рѣзи въ моче-вомъ каналѣ. Оно течетъ очень медленно и обыкновенно оканчивается обширнымъ, смертельнымъ нагноеніемъ въ паху, костоюю въ позвонкахъ, бедренномъ сочлененіи, неизлечимою хромотою, вывихомъ бедра, извуреніемъ всего тѣла. Это воспаленіе есть собственно ревматизмъ и происходитъ у людей извѣженныхъ (городскихъ) отъ золотухи, ломоты, простуды, почечуя, любострастной болѣзни, отъ поднятія и ношенія значительныхъ тяжестей; причемъ человекъ замѣчаетъ какъ-будто что у него порвалось въ животѣ, невольно вскрикиваетъ, сгибается и скоро не можетъ распрямить спины; отъ ударовъ въ пахъ, прыжковъ, паденія на спину, задницу. Лечится же оно какъ воспаленіе брюшины, — особенно пиявицами, припарками, ваннами, мушкою.

Примѣч. 3-е. О другихъ воспаленіяхъ, какъ то: глазъ, ушей, рта и пр. какъ подлежащихъ зрѣнію, говорено при наружныхъ болѣзняхъ.

Примѣч. 4-е. Не желая раздѣлять острыхъ болѣзней, мы въ слѣдъ за симъ опишемъ и сыпи, сначала острыя: оспу, скарлатину, корь и пр., а потомъ и продолжительныя, хроническія; но прежде дадимъ нѣкоторыя понятія о сыняхъ вообще.

## НАКОЖНЫЯ БОЛѢЗНИ, ИЛИ СЫПИ

§ 30. Сыпью или наочною болѣзнію называется всякое измѣненіе кожи въ цвѣтъ, видъ или устройство, зависящее однако не отъ наружной причины, напр. краснота кожи отъ огня, холода, ужаленія крапивою, горчичника, краснота и опухоль кожи отъ ужаленія пчелою, наказанія розгами и пр. не есть сыпь; но краснота или бѣлизна кожи, равно измѣненіе ея вида, замѣчаемое при чесоткѣ, лишаяхъ, любострастной болѣзни, въ оспѣ, кори и пр. есть нажная болѣзнь, или сыпь.

Сыпи, какъ нажныя болѣзни, происходящія отъ внутренней причины большаго тѣла, обнаруживаются въ слѣдующихъ видахъ:



1. Въ видѣ пятенъ красныхъ, желтыхъ, синихъ. Эти пятна зависятъ или отъ прониканія красной крови въ тончайшіе сосудцы кожи, проводящіе въ здоровомъ состояніи тѣла блѣдный, безцвѣтный сокъ; такіа пятна замѣчаются въ горячкахъ, скарлатинѣ, цынгѣ, послѣ ушибовъ, наказаній.

2. Въ видѣ прышковъ, или пупыршковъ, съ возвышеніемъ одной верхней кожицы, но не кожи, и безъ образованія пузырька. Эти прыщики суть плотныя зернышки, или шарики, несодержащіе въ себѣ жидкости. Такіе прыщики замѣчаются въ кори, крапивной сыпи; они же оказываются подъ видомъ угрей, бородавокъ и пр.

3) Въ видѣ пузырьковъ подъ поднявшеюся кожицею, содержащихъ въ себѣ жидкость. Они происходятъ въ оспѣ, чесоткѣ и пр.

4) Въ видѣ струпа, корки, шелухи, происходящихъ отъ выпотѣвшей изъ кожи и засохшей пасоки, гноя, напр. сухой лишай, чесотка, молочный струпъ.

5) Въ видѣ язвъ, соединенныхъ съ разстройствомъ кожи и нагноеніемъ; напр. мокрый разъедающій лишай, проказа, любострастная болѣзнь, вообще всякія язвы.

Впрочемъ, эти виды сыпей подлежатъ многоразличнымъ измѣненіямъ: гладкія пятна переходятъ въ прыщики, а сии въ пузырьки; струнья въ язвы, а язвы покрываются струпомъ; и потому по одному наружному виду сыпи нельзя опредѣлить съ точностію ея свойства, натуры.

Гораздо важнѣе знать различіе между лихорадочною и безлихорадочною сыпью. Лихорадочныя, или острые сыпи, еще до появленія своего на кожѣ, возбуждаютъ въ тѣлѣ больного лихорадку, которая есть непремѣнный спутникъ сыпи, и только по совершенномъ развитіи ея въ кожѣ, прекращается; въ другихъ сыпяхъ не замѣчается лихорадки, или по крайней мѣрѣ она не есть существенная принадлежность сыпи, но можетъ быть и не быть, и теченіе сыпи отъ того не измѣнится.

Лихорадочныя, острые сыпи продолжаются отъ 7 до 28 дней; безлихорадочныя, медленныя сыпи продолжаются неопредѣленное время: нѣсколько дней, мѣсяцовъ и даже многіе годы. Важность и опасность лихорадочныхъ сыпей зави-



ситъ отъ самой лихорадки, а лихорадка отъ степени, мѣста развитія сыпи. Высыпанію обширной, густой сыпи на кожѣ сопутствуетъ и сильная лихорадка, которая бываетъ еще жесточе и опаснѣе, когда сыпь развивается не на кожѣ, а на внутреннихъ перепонкахъ: кишекъ, легкихъ или мозга.

Безлихорадочныя сыпи вообще прямо сами по себѣ не опасны; но онѣ разстроиваютъ иногда части тѣла, производятъ порчу соковъ, худосочіе, которое, въ свою очередь, угрожаетъ изнуреніемъ тѣла и смертію.

Причины. Лихорадочныя и безлихорадочныя сыпи, ни по своему происхожденію, существенно различаются: въ первыхъ лихорадкахъ, какъ сказано, есть или существенная потребность болѣзни, или же сыпь случайно возникаетъ въ теченіе самой лихорадки.

Существенно лихорадочныя сыпи имѣютъ своимъ основаніемъ особенную заразу (ядъ), которая, проникнувъ въ тѣло больного, возбуждаетъ въ немъ лихорадку, предшествующую появленію сыпи на кожѣ, сопутствующую высыпанію и оканчивающуюся увяданіемъ или подсыханіемъ сыпи. Эта лихорадка возбуждается раздраженіемъ, которое производитъ въ тѣлѣ сыпная зараза, продолжается при изверженіи заразы изъ тѣла на кожу, и прекращается не прежде, какъ съ прекращеніемъ раздраженія и въ кожѣ, возбужденнаго заразою, и ея произведеніемъ—сыпью. Самая же зараза попадаетъ въ тѣло здороваго челоуѣка или изъ воздуха, при особенномъ, заразительномъ состояніи послѣдняго, или отъ больного, уже зараженнаго тѣла, или же изъ того и другаго источника вмѣстѣ, т. е. первоначально изъ воздуха, а потомъ изъ воздуха и чрезъ сообщеніе сыпныхъ людей съ здоровыми. Въ этихъ случаяхъ явная, видимая лихорадка есть только явленіе сыпи, которой причиною бываетъ скрытная, невидимая зараза.

Въ другихъ лихорадочныхъ сыпяхъ, лихорадка есть существенная болѣзнь, а сыпь ея случайное явленіе—припадокъ, зависящій то отъ внутреннихъ причинъ больного, то отъ наружныхъ обстоятельствъ. Эти причины суть: сильный жаръ больного, привлекающій къ кожѣ излишніе соки, которые, слишкомъ раздражая кожу, производятъ въ



ней сыпь; это же происходитъ отъ излишней теплоты въ воздухъ (въ жаркое время), отъ теплой, мягкой, перинной постели, теплаго укутыванія больного, обильнаго теплаго питья для возбужденія пота, отъ одѣванія больного жесткимъ, нечистымъ, шерстянымъ одѣяломъ, отъ прикладыванія на кожу раздражающихъ средствъ — горчичниковъ, мушки, хрѣна (у людей вѣжныхъ, чувствительныхъ, блѣднокожныхъ), отъ употребленія горячительныхъ напитковъ, отъ нечистаго, спертаго, душнаго воздуха въ комнатѣ больного. Внутреннія причины появленія сыпи въ лихорадкѣ суть: нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ, т. е. скопленіе въ нихъ испорченной пищи, слизи, желчи, глисты, острота крови, простудная, ревматическая, подогрѣнная, золотушная, цинготная, почечуйная; во всѣхъ этихъ случаяхъ при лихорадкѣ сыпь есть случайная болѣзнь.

Безлихорадочныя, хроническія, продолжительныя сыпи происходятъ также частію отъ зараженія здороваго больнымъ (чесотка), частію же отъ неопрятности въ родѣ жизни и отъ слабости и раздраженія кожи. Нечистоплотность, неопрятность въ одѣвѣи, жилищѣ, такъ обыкновенныя между простымъ народомъ, живущимъ въ курныхъ, грязныхъ, темныхъ избахъ, также между бѣдными Евреями, болѣе всего располагаютъ къ сыпямъ, останавливая испарину въ кожѣ и чрезъ то способствуя скопленію въ тѣлѣ назначенныхъ къ испражненію соковъ. Останавливая испарину, располагаютъ къ сыпямъ: болотистыя мѣста, сырое время года, сырыя, душныя жилища; острая, соленая, копченая, жирная, испортившаяся пища: сыръ, колбасы, рыба, ветчина, солонина, пьянство, обжорство. Они, разстроивая пищевареніе, доставляя острый питательный сокъ въ излишествѣ, располагаютъ къ сыпямъ. Чесоточная и любострастная заразы прямо производятъ сыпи; также причиняютъ сыпь безъ лихорадки: порча крови и худосочіе золотушное, подагрѣнное, цинготное; скопленіе желудочныхъ и кишечныхъ нечистотъ, глисты, завалы внутренностей, запоры на-низъ; приостановленія почечуйнаго, мѣсячнаго кровоточенія; полнокровіе, извѣженность кожи и ея слабость у стариковъ; медленныя отравленія (на заводахъ) ртутью;



свинцомъ, мышьякомъ; жаркій климатъ, жаркое время года, теплая, жесткая одежда.

Безлихорадочныя сыпи, упорныя, застарѣлыя, оставляютъ привычное къ себѣ расположеніе: мѣсто сыпи превращается въ отдѣлительный органъ, чрезъ который болѣе тѣло извергаетъ изъ себя вредные соки; наконецъ разстройство кожи чрезъ изъязвленіе бываетъ причиною упорности и неизлечимости сыпи, которая иногда зависитъ отъ особаго, сыпнаго расположенія, обнаруживающагося въ членахъ разныхъ фамилій наследственно.

Леченіе. Лихорадочныя сыпи проходятъ вмѣстѣ съ лихорадкою, а потому леченіе ихъ есть противулихорадочное: нужно лечить лихорадку, а сыпь пройдетъ вмѣстѣ съ нею.

При леченіи безлихорадочныхъ, продолжительныхъ сыпей, главное дѣло состоитъ въ возстановленіи дѣйствія кожи—испарины помощію мѣстныхъ наружныхъ и общихъ внутреннихъ лекарствъ. Нужно однако помнить, что если причина сыпи глубоко вкоренилась въ тѣлѣ, зависитъ отъ порчи соковъ, разстройства внутренностей, то излеченіе такой сыпи одними мѣстными средствами не вѣрно и даже опасно: невѣрно потому, что сыпь скоро опять появится, а опасно потому, что она можетъ броситься на внутреннія части,—особенно легкія, дыхательное горло. Посему леченіе безлихорадочныхъ сыпей надобно начинать:

1. Открытіемъ и удаленіемъ ихъ причинъ: нечистоплотности, неопрятности въ одѣяніи, жилищѣ, исправленіемъ испорченнаго, сыраго воздуха; замѣною худой, трудно варимой пищи хорошею, легковаримою; исправленіемъ худосочія, волотушнаго, любострастнаго, цынготнаго, момотнаго; удаленіемъ скопившихся въ брюхѣ нечистотъ; возстановленіемъ почечуйнаго, мѣсячнаго кровотеченія; соблюденіемъ при полнокровіи тощей, голодной діеты, а при исхуданіи тѣла употребленіемъ питательной, сочной пищи. Часто отъ одного сего леченія сыпь проходитъ безъ употребленія мѣстныхъ средствъ. Впрочемъ, такъ-какъ предложенныя здѣсь мѣры требуютъ особеннаго соображенія и основательнаго ихъ обсужденія, то предъ началомъ леченія застарѣлыхъ, повидимому сложныхъ сыпей, нужно пригласить врача.



2. Если по удаленіи сихъ причинъ сыпь, она не проходитъ, или нельзя открыть причины сыпи, то надобно полагать, что сыпь есть мѣстная, самостоятельная болѣзнь, и тогда употреблять противусыпныя лекарства, дѣйствующія на кожу. Эти средства суть: сухой, чистый, горный воздухъ; здоровая, свѣжая, негорячительная пища; чистая, ключевая, рѣчная вода; движеніе пѣшкомъ, верхомъ, въ экипажѣ; плаваніе; чистоплотность, опрятность въ одеждѣ и жилищѣ; частыя обмыванія и растиранія тѣла; усиленное отдѣленіе мочи, испарины, испражненія низомъ, — мочегонными, потогонными и слабительными средствами. Изъ нихъ мочегонныя суть: петрушка, сельдерей, спаржа, арбузы, кремортартаръ, бура, селитра, эвентерская, кавказская, нарзанная вода, легкій пушъ съ лимономъ, буксусокислый поташъ, морской лукъ, наперсточная трава, ослабительныя: ревень, аллаина, кремортартаръ, магnezія, вѣнское питье; потогонныя, собственно дѣйствующія при излеченіи сыпей: сѣрный цвѣтъ, сурьма въ разныхъ составахъ, дерево баккаутъ, корень сассапареля, и лапушика, и осоки, и тебли псалёна, сладкогорикаго, корка вяза. Мѣстно употребляютъ: мыльная, известковая вода, растворъ хлоридовой известки, сѣрное молоко, сѣрное, смоляное, дегтярное мыло, сѣрную угольную мазь, простыя и сѣрыя ванны, и даже обмываніе, или купанье въ простой водѣ; и пареніе въ легкой банѣ — бывають иногда достаточны для излеченія сыпи, особенно при постоянномъ въ продолжительномъ ихъ употребленіи подъ надзоромъ врача.

3) Если сыпь есть чисто-мѣстная, недавняя, наприм. чешотка отъ зараженія, то ее смѣло можно лечить одними мѣстными средствами. Сыпь, продолжившаяся нѣсколько мѣсяцевъ и даже годы, хотя бы она начально была мѣстная — отъ зараженія, непременно уже произвела порчу соковъ въ тѣлѣ, и потому должна быть лечима, кромѣ наружныхъ, и внутренними средствами. Съ другой стороны, послѣ уничтоженія общей (внутренней) причины сыпи, послѣдняя не проходитъ и поддерживается мѣстно — кожей; такую сыпь смѣло можно лечить мѣстными средствами, которыя вообще употреблять тѣмъ смѣлѣе и настоятельнѣе,



тъмъ продолжительнѣе было леченіе сыпи внутренними средствами. Впрочемъ, при всякой застарѣлой сыпи т. е. продолжавшейся нѣсколько лѣтъ, приступая къ леченію, нужно употреблять и отводящія средства, особенно слабительныя и искусственныя язвы (источники, фонтанели).

### **А. ЛИХОРАДОЧНЫЯ, ОСТРЫЯ СЫПИ.**

§ 31. Лихорадочныя, острыя сыпи, т. е. оспа, корь и скарлатина, отличаются отъ всѣхъ другихъ лихорадочныхъ сыпей тѣмъ, что онѣ зависятъ отъ особенной заразы (яда), заражающей въ воздухѣ, а потомъ развивающейся и въ больномъ тѣлѣ; что онѣ свойственны дѣтскому и юношескому возрасту, въ которомъ онѣ бывають почти у каждаго челоуѣка; соблюдаютъ извѣстный порядокъ въ своемъ теченіи и продолжаются определенное время; что ихъ времени теченія нельзя искусствомъ ни сократить—ускорить, ни продлить—замедлить, и что челоуѣкъ, развѣ перенесшій эти сыпи, вторично имъ не подвергается. Поэтому леченіе ихъ есть чисто-наблюдательное и состоитъ въ отвращеніи всего того, что можетъ усилить сыпную лихорадку, встревожить, разгорячить больного, въ удержаніи сыпи на кожѣ, въ умѣреніи разныхъ припадковъ, въ поддержаніи свободного испражненія низомъ и мочи и пр.

§ 32. Оспа.—Признаки: послѣ дрожи, или озноба, появляется жаръ и развивается лихорадка воспалительная; больной три дня горитъ, а на четвертый день показываются на кожѣ красныя пятна, которыя чрезъ три дня превращаются въ пузырьки, еще чрезъ три дня переходятъ въ нагноеніе и нарывчики, которые на 11-й день, отъ начала лихорадки, прорываются и къ 14-му дню превращаются въ сухіе струпья. Это общій очеркъ теченія простой, правильной, натуральной оспы; въ особенности же она имѣетъ слѣдующій ходъ:

1) Периодъ зараженія. Въ немъ не замѣчается никакихъ припадковъ; зараза вошла въ тѣло больного, но остается въ немъ скрытою, не возбуждая никакого противудѣйствія. Этотъ предположительный періодъ простирается отъ 3-хъ до 14-ти дней.



2) Периодъ зараженія, или лихорадочный. Вдругъ, или постепенно, развиваются лихорадочные припадки, которые безпрерывно продолжаются три дня, послабляя на короткое время. Оспенная лихорадка отличается особенностію своихъ припадковъ, по которымъ ее, при оспенной эпидеміи, можно узнать, даже до появленія самой оспы. Эти припадки суть: палящій жаръ въ кожѣ, тошнота, рвота, вонючій запахъ дыханія, мочи, кровотеченіе изъ носа, головная боль, у взрослыхъ усиливающаяся до бреда; у дѣтей — судороги; боль въ животѣ и поясницѣ.

3) Периодъ высыпанія оспы. Въ концѣ третьяго лихорадочнаго ожесточенія (усиленнаго жара), т. е. около четвертаго дня, отъ начала лихорадки, начинается высыпаніе оспы прежде всего на лицѣ, потомъ на груди, животѣ, а на концѣ на рукахъ и ногахъ; высыпаетъ же оспа въ видѣ красныхъ пятенъ, быстро увеличивающихся. При внимательномъ разсмотрѣніи этихъ пятенъ чрезъ увеличительное стекло, или чрезъ осязаніе пальцами, можно замѣтить, что каждое пятно на ощупь бываетъ шероховатое, представляет маленькое возвышеніе, пупырышекъ — зародышъ будущаго пузырька; этимъ оспенныя пятна отличаются отъ гладкихъ пятенъ, бывающихъ въ кори; и въ разныхъ горячкахъ. Оспа высыпаетъ въ теченіе 3—4 дней; отъ сего оспенныя пятна у больного замѣчаются въ разной степени зрѣлости: на лицѣ уже подсыхаютъ, на рукахъ и ногахъ еще только наливаются. Когда оспа высыплется окончательно, то лихорадка прекращается и больной чувствуетъ себя лучше.

4) Периодъ нагноенія. Пятна поднимаются въ прыщички, небольшіе, на верхушкѣ вдавленные, наполненные жидкостію; эти прыщички скоро увеличиваются и наполняются желтымъ гноемъ, отъ чего зрѣлая и цѣлая оспина походить на половину спѣлой и крупной горошины, или высухой жемчужины. Этотъ періодъ продолжается также 3—4 дня. Въ немъ замѣчаются сверхъ того: 1) появленіе вновь лихорадки (нагноительной), по причинѣ повсемѣстнаго нагноенія оспины; 2) опухоль около гноящихся оспинъ, особенно на лицѣ, которое отъ сего вздувается, глаза затворяются; опухаютъ также руки и ноги; открывается иногда



симптомъ; впрочемъ, лихорадка вторично появляется только при многочисленности оспинъ. Это вѣрно, что оспины начинаютъ подсыхать и превращаться въ струпья; это продолжается 4—8 дней, да большія оспины подсыхаютъ и долѣе. Подсыхание, равно какъ и нагноение, въ подобномъ высыпаніи, начинаются на лицѣ, потомъ на груди, животѣ, рукахъ и привѣскахъ.

Начало подсыханія на лицѣ есть самое опасное въ время болѣзни, которая теперь легко можетъ перейти въ чумную мертвѣнне оспинъ, причинить воспаленіе мозга, лёгкихъ, кишечъ, теудорогидноопасную горячку. Сверхъ сего, послѣ оспы часто остается безобразное лице, отъ рабинъ, отъ сыпота, отъ разстройства глазъ, отъ пятенъ прозрачныхъ оболочекъ, продолжительное воспаленіе глазъ, истощеніе явля, о лёгочная охотка, костоуда, упорныя язвы, и т. д. и т. д. и т. д.

Относительно паружнаго вида оспинъ, оспа бываетъ раздѣльная и сливная. Въ раздѣльной оспѣ, оспины сидятъ отдѣльно одна отъ другой, а въ сливной, оспы сбиваются въ кучку по нѣскольку, и признагоеніи сливаются вмѣстѣ и образуютъ обширную гнойную и струпную поверхность. Сверхъ того, ходъ и натура оспы измѣняется тѣмъ, что къ ней присоединяется нервная, желудочная, гнилая лихорадка; тѣмъ, что она высыпаетъ быстро и разомъ по всему тѣлу, или же медленно и неравномерно, и неправильно, въ одномъ мѣстѣ подсыхаетъ, а въ другомъ нагнаивается, а въ третьемъ высыпаетъ; самыя оспины несовершенно созреваютъ, бываютъ невыпуклы, а вдавлены, не гнойны, а водянисты, пусты, кровависты; попухоа лица преждевременно опадаются, а оспины подсыхаютъ.

Оспа есть самая опасная болѣзнь. До открытія прививанія, она одна умерщвляла  $\frac{1}{4}$  часть всѣхъ дѣтей, и теперь самаго крѣпкаго человека въ теченіе 8 дней она можетъ превратить въ живой гнилой трупъ. Опасность оспы зависитъ отъ жестокости ея лихорадки и отъ числа оспинъ, особенно на лицѣ, отъ присоединенія воспаления внутренностей, отъ возраста, качества оспенной заразы и отъ иммунитета. Чѣмъ сильнѣе лихорадка до появленія оспы, тѣмъ, вѣроятно, будетъ опаснѣе и самая оспа; чѣмъ болѣе высыпаетъ оспы,



пийтъ, особенно на лицѣ, чѣмъ онѣ сливѣе, чѣмъ раньше и явственнѣе развиваются воспаленія лёгкихъ, кишокъ, чѣмъ взрослое челоуѣкъ, тѣмъ опаснѣе оспа; ибо дѣти легче переносятъ оспу, чѣмъ взрослые; но и у первыхъ она бываетъ опасна, если совпадаетъ съ прорѣзываніемъ зубовъ. Поквальная оспа опаснѣе спорадической, т. е. изрѣдка появляющейся на немогихъ людяхъ въ разныхъ домахъ, селеніяхъ, городахъ. Поквальная оспа опять бываетъ легче, въ началѣ и въ концѣ эпидеміи, и жестока въ ея срединѣ. Судороги предъ высыпаніемъ оспы не важны, но онѣ опасны предъ подсыханіемъ; опасно, если вдругъ высыпаетъ много оспинокъ. Чѣмъ неправильнѣе ходъ оспы, — когда она на одномъ мѣстѣ подсыхаетъ, на другомъ нагнаивается, а на третьемъ только еще высыпаетъ, — тѣмъ опаснѣе. Не хорошо, когда оспины бываютъ вдавлены, блѣдны, красноваты, но хуже всего кровавыя испражненія низомъ и кровавая моча во время подсыханія.

**Причины.** Основная причина оспы есть особенная зараза, или ядъ, и расположеніе къ ней нашего тѣла. Зараза первоначально зараждается въ воздухѣ, а потомъ развивается и въ тѣлѣ оспеннаго, больного, отъ котораго сообщается здоровому, расположенному къ ней челоуѣку. Зараженіе чрезъ сообщеніе здоровыхъ съ больными происходитъ скорѣе, чѣмъ чрезъ воздухъ; ибо оспа, появившаяся на одномъ дитяти въ какомъ-либо семействѣ, навѣрно потомъ перейдетъ и на всѣхъ прочихъ дѣтей того же семейства, не имѣвшихъ оспы; между тѣмъ, какъ дѣти свободныхъ отъ оспы семействъ, дыша оспенно-поквальнымъ воздухомъ, не всегда подвергаются болѣзни, хотя бы имъ и не была прежде привита предохранительная оспа. Расположеніе къ оспѣ существуетъ въ дѣтскомъ и юношескомъ возрастахъ, рѣдко оно остается въ тѣлѣ далѣе 30 лѣтъ отъ роду. Оно состоитъ въ какой-то жаждѣ дѣтскаго тѣла къ оспенному яду; тѣло дитяти, перенесшаго натуральную оспу, теряетъ это къ ней расположеніе и потому натуральная оспа бываетъ только однажды въ жизни у одного и того же челоуѣка; развѣ жажда его тѣла къ заразѣ не совсемъ будетъ насыщена въ первую оспу, и тогда оспа по-



является и въ другой разъ, но вообще бываетъ не опасна и слаба.

Ядъ, вошедшій въ тѣло здороваго изъ больного человека, или изъ воздуха, остается скрытымъ отъ 3-хъ до 14-ти дней; потомъ онъ возбуждаетъ противудѣйствіе зараженнаго тѣла—оспенную лихорадку, посредствомъ которой болѣе тѣло старается переработать оспенный ядъ и извергнуть его вонъ, отлагаетъ его въ кожу, въ которой высыпаютъ оспины, наливаются, созреваютъ, подсыхаютъ и спадаютъ въ видѣ черныхъ струнцевъ. При множествѣ оспинъ, во время ихъ нагноенія, опять появляется лихорадка (нагноительная), которая зависитъ отъ раздраженія кожи безчисленнымъ множествомъ оспенныхъ парывчиковъ отъ всосанія гноя и вновь поступленія въ кровь оспеннаго яда; причемъ прекращается испареніе въ кожу, задерживаются другія отдѣленія, и отъ того происходитъ опухоль въ лицѣ, на кожѣ и слинотеченіе. Эта вторая оспенная лихорадка, особенно во время подсыханія, бываетъ всегда опасна, по причинѣ появляющагося теперь воспаленія въ разныхъ органахъ, истощенія, обезсиленія тѣла, всасыванія ядовитаго гноя. Изъ сего явствуетъ, что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ замѣчается неправильный ходъ оспы, приглашеніе и советъ врача необходимы.

Леченіе. Такъ-какъ оспы нельзя ни прервать, ни сократить ея хода, какъ это можно сдѣлать съ горячками и воспалениями, то леченіе оспы есть собственно наблюдательное и состоитъ въ обращеніи вниманія на оспенную лихорадку, высыпаніе, наливаніе и подсыханіе оспинъ и на случайные припадки, зависящіе наиболѣе отъ воспаленія внутренностей; посему въ правильномъ ходѣ оспы не нужно никакихъ особенныхъ лекарствъ, кромѣ внимательнаго наблюденія за больнымъ и за натуральными его дѣйствіями: жаждою, испражненіемъ на-низъ, мочею и пром. Все то, что разгорячаетъ тѣло, обременяетъ желудокъ, тревожитъ больного, отъ него должно быть удалено. Главныя условія правильнаго хода лихорадки и самой оспы суть: умѣренная темнота и прохлада комнаты, свѣжій воздухъ, тишина, спокойствіе больного, строгая, почти го-



лодная діета, для питья чистая вода, или съ какимъ-либо кислымъ сокомъ, и свободное ежедневное испражненіе низомъ. Почти невѣроятно, какое сильное вліяніе имѣютъ эти условія, особенно прохладное содержаніе больного, на правильный ходъ оспы и ея благополучное окончаніе; напротивъ того, теплое содержаніе больного, въ перинной постелѣ, душной, нечистой, свѣтлой комнатѣ, теплое питье, потогонныя лекарства и правильную, доброкачественную оспу дѣлаютъ опасною. Особенное леченіе оспы по ея періодамъ, есть слѣдующее:

I. Въ періодъ раздраженія, лихорадочномъ, кромѣ прохладнаго содержанія и свободнаго испражненія низомъ, особенно ничего не нужно; испражненіе низомъ производить посредствомъ вѣнскаго питья (№ 7), или прохладяющаго слабительнаго (№ 6), также клистирами. Сильный бредъ у дѣтей требуетъ горчичниковъ къ плечамъ, икрамъ, теплыхъ ножныхъ ваннъ, клистировъ, слабительныхъ; судороги часто скоро проходятъ у дѣтей отъ открытія окна и впусценія въ комнату свѣжаго, прохладнаго воздуха. Если при судорогахъ лице у дитяти блѣдно, руки и ноги холодны, моча свѣтлая, водянистая, то нужно ему сдѣлать теплую ванну, поставить клистиръ къ подошвамъ горчичники; если замѣчаются нечистоты въ желудкѣ (бѣлый, желтый языкъ, горечь во рту, отрыжка, тошнота, рвота, то нужно дать прежде рвотное изъ раствора рвотнаго камня, а потомъ слабительное, если послѣ рвотнаго чрезъ 1—2 часа не будетъ на-низъ. Если больной лежитъ въ безчувствіи, спитъ, имѣетъ притомъ красное лицо, горячій лобъ, то нужно приставить пиявицы позади ушей, числомъ отъ 4-хъ до 12-ти, смотря по числу лѣтъ больного, обмывать лобъ и лице холодною водою, внутрь давать селитру съ кремортартаромъ; особенно часто нужно обмывать глаза и потомъ покрывать кусочками холстины, натертой камфорою, чтобы на глазахъ не произошли оспины. Повторяемъ, что во всѣхъ сихъ случаяхъ нужно пригласить врача.

Въ періодъ высыпанія леченіе то же, что и въ предъидущемъ. Если будетъ замѣчено, что прозрачная роговая оболочка глазъ начинаетъ тускнеть — знакъ появленія на



ней оспинъ — то глаза нужно примачивать холодною водою, или свинцовою примочкою, а между плечами поставить горчичникъ, чтобы туда отвлечь оспины.

Въ періодъ наливапія, или нагноенія, при правильномъ теченіи оспы, достаточны тѣ же средства, что и въ первыхъ двухъ періодахъ. Но если оспа дѣлается сливною, если появляется вновь лихорадка (нагноительная), развиваются воспаленія въ головѣ, груди, брюхѣ, то присутствіе врача необходимо. Въ такихъ случаяхъ нужно стараться уменьшить раздраженіе въ кожѣ отъ множества нагнаивающихся оспинъ, очищать кровь отъ всосаннаго оспеннаго яда. Раздраженіе въ кожѣ можно уменьшить, прокладывая оспенныю острою, тонкою иглою или повторяя это неоднократно, но смѣрною напоянностію оспинъ гноемъ, особенно на лицѣ, шеѣ, груди и животѣ. Изверженію гноя изъ крови можно способствовать усиленнымъ испражненіемъ на низъ и мочи, посредствомъ кислаго питья, особенно изъ кремортартара (№ 1), опрятнымъ содержаніемъ больного, частымъ возобновленіемъ свѣжаго воздуха, перемѣною бѣлья, простыни и одеяла.

Если появляется въ семь періодъ воспалительная лихорадка, узнаваемая по значительной краснотѣ, окружности оспинъ, по сильному жару и жаждѣ, твердому, крѣпкому пульсу, по припадкамъ воспаленія въ головѣ, груди или брюхѣ, то дѣтямъ не старѣе 15 лѣтъ, припустить пиявицы противъ мѣста воспаленія, количествомъ вдвое противъ числа лѣтъ, а взрослымъ юношамъ пустить даже кровь изъ руки, сверхъ того, смотря по мѣсту воспаленія, поставить мушку къ затылку, на бокъ, на животъ, а внутрь дать сладкую ртуть съ сахаромъ отъ  $\frac{1}{2}$  до 2 гранъ, смотря по лѣтамъ больного, чрезъ два часа по порошку, пока не ослабитъ 2—4 раза низомъ. Если, напротивъ, лихорадка имѣетъ нервное свойство (см. эту болѣзнь), или оспины бываютъ вдавлены, впалы, водянисты или и совсѣмъ пусты, блѣдны, не окружены краснотою, кожа блѣдная, холодная, опухоль въ лицѣ, малая, отекая и (т. е. послѣ давленія пальцемъ, въ ней остается впадина); если притомъ руки трясутся, языкъ и губы дрожатъ, то настоятельно назна-



чается призвать врача, который въ семь случаевъ вѣроятно дастъ больному юпій со сладкою ртутью (№ 32). Еще необходимѣе приглашеніе врача при гнилостной оспенной лихорадкѣ, т. е. когда оспины принимаютъ синій, бурый цвѣтъ, окружаются кровавыми, черными пятнами, помертвѣваютъ, издають смрадный запахъ, когда появляется кровотеченіе изъ носа, рта, кровавая моча, кровавый поносъ. При недостаткѣ врача здѣсь нужно ограничиться употребленіемъ холода въ видѣ холодныхъ примочекъ всего тѣла, особенно головы и груди, холодныхъ обмываній, прохладною компанатою и частымъ возобновленіемъ въ ней свѣжаго воздуха, открывая форточки въ окнахъ даже въ зимнее время; впрочемъ, нервная и гнилая оспа рѣдко оканчивается благополучно, даже при самомъ благоразумномъ ея леченіи опытными врачами.

Въ этомъ періодѣ оспа иногда вдругъ скрывается, т. е. оспины не нагнаиваются, но блѣднѣютъ, вянутъ и опадаютъ вмѣстѣ съ окружающею ихъ опухолью; что особенно явственно замѣчается на лицѣ. Эта перемена въ оспѣ чрезвычайно опасна, и такіе больные рѣдко выздоравливаютъ; впрочемъ, для вызванія оспы къ прежнему ея мѣсту, кладутъ на затылокъ, грудь, руки и ноги горячники, а потомъ мушкы, теплыя, даже горячія припарки ко всей груди, спинѣ и животу, внутри даютъ больному какое-либо хорошее вино.

Въ періодъ подсыханія нужно испражнять изъ тѣла всосавшейся оспенной ядъ посредствомъ усиленнаго испражненія низомъ и мочи. Здѣсь полезны внутри: сладкая сыворотка, кремортартаръ, петрушка, пастернакъ, горькая соль, касторовое, льняное масло, огуречный рассолъ. Въ семь періодъ, отъ скорого подсыханія оспинъ, можетъ произойти приливъ крови и воспаленіе въ мозгъ съ безчувствіемъ и сонливостію, или въ лёгкихъ съ одышкою и кашлемъ; въ обоихъ случаяхъ главное средство состоитъ въ скоромъ припускѣ пиваицъ къ головѣ или груди, или даже въ кровопусканіи, если больной—юноша или взрослый человекъ. Здѣсь также нуженъ совѣтъ врача.

Выздоровливающимъ послѣ оспы нужно доставлять свѣ-



жій, чистый воздухъ, прогулку, кормить больше растительною, чѣмъ животноею пищею; особенно не давать имъ никакого мяса, которое легко горячить и способствуетъ чрезъ то отложенію оспеннаго яда на внутренности и происхожденію въ нихъ воспаленія. Выздоровливающіе послѣ опасной, злокачественной оспы, еще долго должны оставаться подъ надзоромъ врачей.

Предохранительная оспа есть та, которая искусственно производится въ челоѣкѣ, посредствомъ прививанія ему оспенной матеріи, взятой отъ коровьей оспы, или изъ оспины дитяти, которому была привита предохранительная оспа. Дитя, которому была привита предохранительная, или коровья оспа, подвергается отъ того легкой и всегда безопасной оспѣ и теряетъ способность впоследствии занемочь натуральною оспою; же если послѣдняя иногда у него и появляется, то всегда въ легкомъ видѣ. Прививаніе коровьей оспы основано на томъ наблюденіи, что коровницы, заразившіяся отъ коровъ оспою, которая у нихъ (коровъ) появляется на вымени, никогда не подвергаются натуральной оспѣ.

Первоначально прививали дѣтямъ и взрослымъ коровью оспу, а потомъ начали брать отъ такихъ людей матерію изъ привитой оспы; сія-то матерія называется предохранительною матеріею, а привитая оспа—прививною предохранительною оспою. Прививаніе предохранительной оспы открыто Англичаниномъ Джаверомъ въ 1798 году, и у насъ оно введено Правительствомъ въ непрѣмную обязанность каждаго прививать эту оспу всемъ людямъ, не имѣвшимъ натуральной оспы.

Выборъ и храненіе прививной оспенной матеріи, способъ прививанія, теченіе прививной оспы и пр. изложены въ отдѣлѣ наружныхъ болѣзней, подъ статьею: «Прививаніе оспы.»

§ 33. Ложная, вѣтренная оспа, полусопа.—Ложная оспа; ея признаки: послѣ лихорадки, продолжавшейся сутки, или болѣе, появляются на нѣкоторыхъ частяхъ, или и на всемъ тѣлѣ, оспинки, величиною и видомъ похожія на оспу натуральную, чрезъ сутки нагнаивающіяся и чрезъ сутки подсыхающія; впрочемъ, иныя оспинки нагнаиваются мед-



ление. Посему ложная оспа отличается отъ настоящей скорѣйшимъ теченіемъ, которое въ послѣдней продолжается 12—14 дней, а въ первой ограничивается 3—4 днями. Кроме того, ложная оспа всегда безопасна и излечивается одною натурою большого. Ложная оспа замѣчается у людей, имѣвшихъ натуральную оспу, при новой эпидеміи послѣдней; она, кажется, зависитъ отъ недостаточнаго насыщенія тѣла оспеннымъ ядомъ и чрезъ то отъ несовершеннаго уничтоженія воспримчивости тѣла къ оспѣ.

Вѣтренная оспа, полуспа, содержится такъ къ прививной, какъ ложная къ натуральной, съ тою разностию, что какъ прививная оспа дѣйствуетъ слабѣе натуральной и слабѣе погашаетъ расположеніе тѣла къ оспенному яду, то происходящая послѣ первой (прививной), вѣтренная оспа встрѣчается чаще и бываетъ сильнѣе оспы ложной, являющейся послѣ натуральной.

Вѣтренная оспа въ теченіи своемъ походитъ на оспу натуральную, но вообще бываетъ слабѣе и безопаснѣе: первая лихорадка легка, а второй, нагноительной, не бываетъ вовсе; оспины слабо наливаются пасокою, бываютъ даже совсѣмъ пусты (отъ чего она и названа вѣтренною, воздушною оспою); засыхая, покрывается жесткимъ, но тонкимъ струпомъ, не оставляетъ послѣ себя рябинъ въ кожѣ, но только красныя пятна, и то не надолго.

Причины. Вѣтренная оспа есть несовершенная; она происходитъ, какъ сказано, отъ несовершеннаго погашенія въ тѣлѣ расположенія, или воспримчивости, прививною оспою къ яду натуральной оспѣ, которая посему и дѣйствуетъ на такихъ людей, но только въ слабой степени, именно потому, что прививная оспа отчасти уже освоила, сроднила тѣло съ оспеннымъ ядомъ. Это недостаточное насыщеніе тѣла прививною оспою, и остающееся за тѣмъ расположеніе къ зараженію оспою натуральною, зависитъ отъ слабой, старой, испорченной прививной оспенной матеріи или отъ недостаточнаго, неполнаго ея привитія, также отъ нерасположенія тѣла, во время привитія, къ воспріятію оспеннаго яда, отъ неполнаго зараженія тѣла прививною оспою. Для отвращенія вторичной, вѣтреной оспы, совѣтуютъ прививать въ дру-



гой разъ коровью, или предохранительную оспу. Это впрочемъ предоставляется произволу; ибо вѣтренная оспа вообще не опасна; вторичное приваніе часто не удается (оспа не принимается), а между тѣмъ появляется вѣтренная оспа.

§ 34. Корь. — Признаки: простудная лихорадка съ частымъ чиханіемъ, слезотеченіемъ, кашлемъ; на 3—4-й день лихорадки выступаютъ нѣсколько возвышенныя, красноватая пятна, шириною въ 1—2 линіи, на ощупь немного шероховатая; эти пятна продолжаются три-четыре дня, потомъ пропадаютъ, и послѣ нихъ лупится кожица въ видѣ отрубей. Иногда лихорадка и пятна такъ бывають легки и кратковременны, что ихъ и не замѣчаютъ ни о бывшей кори догадываются только по лупленію кожицы.

Періодъ зараженія и раздраженія, лихорадочный. Время зараженія корью всегда неизвѣстно. Лихорадочный періодъ продолжается 3 дня: появляется простудная лихорадка сначала съ ознобомъ, а потомъ съ жаромъ, истеченіемъ слезъ изъ глазъ, изъ носа слизи съ чиханіемъ, свѣтобоязнію, сухимъ, частымъ, звонкимъ, короткимъ кашлемъ, болью въ лбу, по ночамъ съ бредомъ; у маленькихъ дѣтей появляются иногда судороги: о семъ періодѣ говорятъ, что дитя горитъ на корь.

Періодъ высыпанія: чрезъ три дня послѣ начала лихорадки, появляется сыпь сначала на лицѣ, груди, рукахъ и пр. въ видѣ малыхъ, красныхъ пятенъ, немного возвышенныхъ и на ощупь шероховатыхъ, но безъ пузырьковъ, какъ въ оспѣ; сыпь продолжается 3—4 дня, проходя на однихъ прежнихъ, и появляясь на другихъ новыхъ мѣстахъ; если она значительна, то припухаютъ лице и руки, но не столько, какъ въ оспѣ; страданіе глазъ, шеи и горла усиливается; иногда присоединяется даже воспаленіе глазъ, дыхательнаго горла (съ осиплымъ голосомъ) и легкихъ (грудное дыханіе, колюще). Пятна, сохранивъ въ теченіе трехъ дней красноту, потомъ блѣднѣютъ и исчезаютъ сначала тамъ, гдѣ они прежде и появились, при семъ дѣлается тише насморкъ и кашель, равно и воспаленіе глазъ. — По выступленіи кори на кожѣ, лихорадка, какъ и при оспѣ, прекращается; но если она и теперь продолжается, то это значитъ, что или корь очень сильно выступила и раздра-



жаетъ кожу, или же что присоединилось воспаление, обыкновенно, глазъ, горла, лёгкихъ.

Періодъ подсыхавія, лущенія. Черезъ 1—3 дня послѣ исчезанія пятенъ, начинается сходить, лупиться кожа, отдѣляясь въ видѣ тонкихъ отрубей; это продолжается въ несколько дней; но если корь была легка, то лупленіе кожицы непримѣтно. Теперь же появляются и разные переломы кори: потъ, моча съ осадкомъ, поносъ и прекращаются все припадкы: насморка, кашля, воспаления глазъ. Но при неосторожномъ содержаніи дитяти, особенно на счетъ простуды, теперь же могутъ появиться разные воспаления въ животѣ, головѣ и особенно въ груди—лёгкихъ. Послѣ сильной, неправильной кори могутъ остаться упорныя воспаления глазъ, кашель, бугорки въ лёгкихъ и чахотка, одышка, отѣки, водянка; а при неосторожномъ содержаніи дѣтей отъ простуды и сырости, можетъ появиться упорный, кровавый поносъ съ изнуреніемъ; послѣдній особенно часто замѣчается между крестьянскими дѣтьми, когда ихъ послѣ кори рано начинаютъ выносить на воздухъ, простуживаютъ и останавливаютъ испарину въ кожѣ.

Правильная корь вообще не опасна; но она дѣлается таковою отъ присоединенія разныхъ воспаленій, особенно въ груди, и отъ неосторожнаго обращенія съ дѣтьми послѣ кори. Почти половина и даже  $\frac{2}{3}$  корьныхъ дѣтей умираетъ отъ послѣдствій кори, по невѣдѣнію родителей, что ихъ дѣти имѣли корь и по недосмотру за дѣтьми при выздоровленіи.

Причины. Корь, подобно оспѣ, зависитъ отъ особенной заразы, которая, какъ и оспенная, заражается въ воздухѣ, и развивается въ самомъ больномъ и заражаетъ чрезъ воздухъ и чрезъ сообщеніе здоровыхъ съ больными; впрочемъ, заразительность кори менѣе чѣмъ оспы. Корь также, подобно оспѣ, бываетъ только разъ въ жизни у одного и того же человѣка, который, разъ выдержавъ корь, теряетъ послѣ того къ ней расположеніе. Она появляется какъ частно (спорадически) на отдѣльныхъ лицахъ, такъ и повально—разомъ на многихъ людяхъ. Вообще однако корьный ядъ слабѣе и летучѣе оспеннаго, отъ чего и самая



корь бываетъ вообще легче оспы и не можетъ быть привита, а потому мы не имѣемъ предохранительной кори. Корьный ядъ дѣйствуетъ исключительно на слизистыя оболочки и потому поражаетъ носъ, глаза, дыхательное горло и легкія, а въ періодъ выздоровленія — кишки (повосомъ).

**Леченіе.** Оспа, корь, скарлатина и судорожный кашель, какъ болѣзни, для полнаго своего развитія и окончанія требующія определеннаго времени, не могутъ быть прерваны, остановлены или сокращены въ своемъ ходѣ, но зато, при правильномъ теченіи не требуютъ и никакого леченія, производимаго одною натурою больного. Искусственно лечить такихъ больныхъ нужно только тогда, когда болѣзнь уклоняется отъ правильнаго своего хода и бросается на разныя внутренности, причиняя въ нихъ воспаленіе.

Вначалѣ съ корьными больными нужно поступать, какъ съ простудными, т. е. содержать ихъ въ умеренной теплотѣ и удалять отъ нихъ всякій поводъ къ простудѣ, и для того оставлять больного безвыходно въ постель, на тюфякъ, подъ шерстянымъ одеяломъ, лѣтомъ двѣ, а зимою три недѣли, при температурѣ въ комнатѣ 15° Реом.; это лучшее средство способствовать правильному теченію кори, предотвратить ея переносы на внутренности и худыя послѣдствія. Прочее леченіе правильной легкой кори, состоитъ въ слабой, почти голодной діетѣ, въ достаточномъ питъи и, подъ конецъ кори, при скупленіи кожицы, въ легкомъ слабительномъ изъ кремортартара съ магнезіею.

Въ первомъ періодъ больного беспокоятъ глаза и кашель. Глазное воспаленіе умѣряется темнотою комнаты и теплою примочкою глазъ изъ отвара просфирнаго корня, мальвы, льняныхъ сѣмянъ, теплаго молока, а кашель — питьемъ овсянаго, ячнаго отвара съ изюмомъ, кориною, черносливомъ, солодковымъ корнемъ.

Во время высыпанія корь скрывается отъ простуды, погрѣшности въ діетѣ (объяденія), душевнаго возмущенія (страха, испуга, гнѣва, и пр.); въ этомъ случаѣ призывъ врача необходимъ. Впрочемъ, по сокрытіи кори, если у больного не видно никакихъ воспалительныхъ припадковъ въ горлѣ или груди, но замѣчается потъ, густая, осадочная



моча или умеренный поносъ, то здѣсь также, кромѣ теплаго потогоннаго чаю, — изъ бузины, малины, липы, — болѣе ничего не нужно дѣлать: натура сама прицѣла нужныя мѣры для предотвращенія вредныхъ послѣдствій отъ скрытія сыпи. Но если появляются воспаленія горла (трудное глотаніе), лёгкихъ (трудное дыханіе, колотье), мозга (бредъ, безчувствіе), или желудка, кишокъ (рвота и сильная боль въ животѣ), то немедленно послать за врачомъ, при недостаткѣ котораго, больному къ мѣсту воспаленія прилѣпить пиявицы и даже пустить кровь изъ руки (16—20-ти дѣтнему больному), поставить горчичники, или и мушку, сдѣлать ножную ванну съ золою и горчицею, и внутрь дать селитру съ канфорою, миндереровымъ спиртомъ въ тепломъ чаѣ изъ бузины, ромашки, липоваго цвѣта (№ 23). Если появится сильный поносъ, то его нужно остановить отваромъ изъ рисовыхъ, ячмыныхъ крупъ, корня салепа и даже дать 4—6 капель опійной настойки, 2—3 раза въ день, пока неостановится поносъ.

Въ періодъ лупленія кожицы, какъ и при по дсыханіи оспы, нужно стараться о выведеніи изъ тѣла корьнаго яда поддержаніемъ испарины и испражненія низомъ и мочи. Для этого комната больного должна быть теплая и онъ долженъ постоянно оставаться въ постель подъ шерстянымъ одѣяломъ, пить теплый потогонный и грудной чай, поддерживать свободное испражненіе низомъ и мочи водою съ кремортартаромъ, какъ сказано при оспѣ. Если теперь появится воспаленіе горла, лёгкихъ и пр., то нужно пригласить врача, при неимѣніи котораго поступать какъ вообще при воспаленіи сихъ частей (см. выше). Если по очищеніи кожи остается упорный кашель, то нужно продолжать потогонныя средства, теплыя ванны, поддержать въ нагноеніи мушку на груди, сзади между лопатокъ положить смоляной пластырь, на головѣ тѣмъ носить шерстяную, фланелевую рубашку, больного поить сладкою сывороткою, зельтерскою водою съ ослинымъ молокомъ, по временамъ давать ему сѣрный цвѣтъ, студень изъ исландскаго моха съ молокомъ и сахаромъ. Этотъ кашель также требуетъ приглашенія врача.



§ 35. Скарлатина, красуха. — Признаки: воспалительная лихорадка, боль въ шеѣ или горлѣ, обширныя красныя, неограниченныя пятна, спаденіе кожицы большими кусками; пятна бываютъ на ошупь гладки, рѣдко на нихъ появляются пузырьки; послѣ скарлатины часто появляется водяная болѣзнь.

Періодъ раздраженія, горьнія на скарлатину. Лихорадка съ палящимъ жаромъ, очень частымъ пульсомъ и болью въ горлѣ; частый пульсъ и боль въ горлѣ суть отличительныя припадки скарлатинной лихорадки, которая вмѣстѣ съ болью горла всё усиливается до появленія сыпи; у иныхъ больныхъ дѣтей появляются судороги и бредъ, но при лихорадкѣ не замѣчается у больныхъ ни чиханія, ни слезотеченія, ни кашля, свойственныхъ корьной лихорадкѣ.

Періодъ высыпанія: на 2—3-й день лихорадки появляются яркочерныя, гладкія, неограниченныя, часто очень обширныя пятна, сначала на плечахъ, рукахъ, а потомъ на груди, брюхѣ и ногахъ, рѣдко однако на лицѣ; они дѣлаются краснѣе и больше и появляются новыя; боль въ горлѣ усиливается. Если посмотреть теперь въ ротъ, то въ задней его части также можно замѣтить красноту и опухоль язычка, нѣбной занавѣски, миндалярныхъ желѣзъ. Не смотря на появленіе сыпи, лихорадка не утихаетъ, какъ въ оспѣ. Сыпь бываетъ летучая, подобно рождѣ: исчезаетъ на одномъ и появляется на другомъ мѣстѣ, а нерѣдко бросается на внутренности, и въ такомъ случаѣ происходитъ воспаленіе въ головѣ, груди, животѣ. Этотъ періодъ продолжается 5—6 дней.

Періодъ лупленія, спаденія кожицы. На девятый день, а иногда и позже, со времени появленія пятенъ сыпи, начинается сходить кожаца иногда большими кусками, на рукѣ въ видѣ перчатки, на ногѣ—чулка; кожаца сходитъ со всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ были пятна, а потому часто и во рту, послѣ воспаленія горла, и притомъ не однократно съ одного и того же мѣста. Въ семъ періодѣ лихорадка прекращается и появляется критическая, густая моча съ осадкомъ.

Впрочемъ, нужно помнить, что скарлатина очень непостоянна и часто измѣняетъ свой ходъ: то покрываетъ все тѣ-



ло пятнами, какъ бы краснымъ сукномъ, то вовсе не бываетъ пятенъ, а одна боль въ горлѣ, и болѣзнь можно узнать только по ея послѣдствію — спаденію кожи и отѣку лица, рукъ, ногъ; то, едва появившись на кожѣ въ видѣ пятенъ, бросается на внутреннія части тѣла и причиняетъ смертельное воспаленіе (наичаще въ головѣ)

Самое обыкновенное послѣдствіе скарлатины есть водянка, которая можетъ причинить смерть въ нѣсколько дней. Этой болѣзни надобно опасаться, если кожа сходитъ слабо, медленно или и совсѣмъ не сходитъ, или кожа остается сухою и жесткою, моча дѣлается мутною, красною и усиливается лихорадка, особенно къ вечеру. Появленіе же водянки обозначается отѣкомъ въкъ, опухолью лица, рукъ, ногъ, всего тѣла, вздутіемъ живота, одышкою, сонливостію, смотря по тому, гдѣ происходитъ скопленіе воды: подъ кожей, въ брюхѣ, груди, головѣ. Также послѣ скарлатины остаются: воспаленіе глазъ, гноетеченіе изъ уха, нарывы около ушныхъ желѣзъ, быстро разрушающіе сосѣднія части.

Скарлатина гораздо измѣнчивѣе оспы и кори и самая обманчивая болѣзнь; иногда она бываетъ такъ легка, что изъ сотни больныхъ ни одинъ не умираетъ; въ другое время смертность отъ скарлатины бываетъ какъ отъ чумы, т. е. едва четвертый выздоравливаетъ. Въ частности, то она убиваетъ въ 12—24 часа, подобно пострѣлу, то причиняетъ смертельное воспаленіе мозга, помертвѣніе въ горлѣ (гнилую жабу), водяную болѣзнь; то, напротивъ, течетъ такъ тихо, что даже не видно на больномъ никакой сыпи и о самой скарлатинѣ можно заключить изъ того, что у больного начинается шелушиться кожа и появляется отѣкъ; даже легкая скарлатина, во время лупленія кожи, вдругъ можетъ обратиться на мозгъ, произвести водяную въ немъ болѣзнь и окончиться смертію въ нѣсколько дней. Въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣти умираютъ отъ жабы съ помертвѣніемъ, они умираютъ собственно отъ скарлатины, хотя бы ее до того и нельзя было замѣтить. Посему къ больнымъ скарлатиною всегда нужно приглашать врача и, не смотря на видимую доброкачественность болѣзни, внимательно наблюдать за ними.



**Причины.** Скарлатина, подобно оспѣ и кори, возникаетъ изъ воздушной заразы, которая потомъ развивается и въ больныхъ; по сему скарлатиною заражаются и чрезъ воздухъ и чрезъ сообщеніе съ больными. Скарлатинная зараза поражаетъ преимущественно горло и кожу рожевиднымъ воспаленіемъ, которое, подобно рождъ, удобно перемѣняетъ мѣсто, останавливается испарину, и потому легко причиняетъ водянку. Расположеніе тѣла къ скарлатинѣ также уничтожается у тѣхъ, кто ее однажды имѣлъ, но не такъ совершенно, какъ къ оспѣ и кори, и потому скарлатина бываетъ иногда по два раза у одного и того же человека.

**Леченіе** должно быть противовоспалительное. Въ легкой степени скарлатины во всѣхъ ея періодахъ бываютъ достаточны: трехнедельное содержаніе больного въ умеренно-теплой комнатѣ, во время горнія и высыпанія прохладящая и слабящая микстура (№ 6), а во время слущенія кожи потогонная и мочегонная смѣсь (№ 24).

Въ сильной степени, при палящемъ жарѣ, яркой краснотѣ сыпи, очень скоромъ пульсѣ, нужно наблюдать, чтобы не произошло воспаленіе мозга или другого органа. Въ этой степени похваляются два средства: окисленная соляная кислота или хлориновая вода, дѣтямъ по 2 — 3 драхмы, а взрослымъ по 2—3 унціи въ сутки (№ 9) и скорое обмываніе кожи (но только при сухой, горячей кожѣ и при тяжести головы) холодною водою посредствомъ губки или мочалки, особенно головы, шеи, груди и спины, послѣ чего больного кладутъ въ постель и покрываютъ теплымъ одѣяломъ; это обмываніе повторять чрезъ 2—3 часа, по мѣрѣ того, какъ опять усиливается жаръ. При сильной боли въ горлѣ или тяжести головы можно приставить пиявицы спереди вокругъ шеи, или позади ушей, къ вискамъ. При палящемъ жарѣ, сенливости или бредѣ (т. е. воспаленіи мозга) полезны холодныя примочки къ головѣ и обливаніе головы холодною водою; но здѣсь присутствіе врача необходимо.

Боль въ горлѣ, т. е. воспаленіе его, скарлатинная жаба требуетъ смягчительныхъ полосканій рта и горла (№ 18—19), горчичниковъ къ затылку, пиявицъ къ шеѣ (см. «Жабу»).



Послѣ скарлатины слабой, а тѣмъ болѣе послѣ жестокой, нужно строго наблюдать (за больнымъ во время лупленія кожи, чтобы не произошла водянка. Главное дѣло здѣсь состоятъ въ томъ, чтобы не подвергаться перемѣнѣ теплоты, и потому нужно оставаться въ постелѣ, пока продолжается лупленіе кожи; вообще же не выходить изъ комнаты, а въ томъ четыре, а зимою шесть недѣль; всё это время не ходить ни въ баню, ни въ ванну, и вообще не мочить кожи. Если кожа жестка и сходить медленно, то можно на голомъ тѣлѣ носить шерстяную рубашку, шерстяные чулки, поддерживать испарину, испражненіе низомъ и мочи (см. «Методы леченія слабительной, мочегонной»), отѣкшія мѣста увивать бинтомъ, растирать суконкою. Если при отѣкѣ замѣчается и лихорадка, то нужно пригласить врача, и противъ мѣста боли приставить пиявицы. Во все время не выхода больного изъ одной комнаты, нужно соблюдать діету, не ѣсть ничего трудноваримаго, не пить горячительнаго (кофе, вина, водки), и избѣгать душевныхъ волненій (гнѣва, радости и пр.).

При повальномъ свирѣпствованіи скарлатины, для предохраненія отъ оной здоровыхъ дѣтей, совѣтуютъ употреблять красавицу (*Belladonna*) въ гомеопатическихъ приѣмахъ: для этого гранъ вытяжки (экстракта) красавицы растворяютъ въ унціи воды, и сего раствора даютъ дѣтямъ отъ 3-хъ до 5—10 капель, смотря по возрасту, однажды въ сутки, лучше по утру натощакъ. Но если, не смотря на это предохранительное леченіе, при повальной скарлатинѣ, дитя начнетъ горѣть, то надобно дать ему рвотное изъ раствора рвотнаго камня въ водѣ (№ 10, б.) такъ, чтобъ больного вырвало 2—3 раза; это рвотное умѣряетъ лихорадку, очищаетъ желудокъ и кишки и даетъ болѣзни благопріятное направленіе.

§ 36. Крапивянка *urticaria*.—Признаки. Слабая, едва примѣтная лихорадка, большія, красноватая, какъ отъ ужаленія крапивою, неограниченныя пятна, въ срединѣ съ бѣлымъ возвышеннымъ мѣстомъ въ видѣ пузыря; пятна и пузыри походятъ на тѣ, которые появляются послѣ жалаенія крапивою и также зудятъ и жгутъ. Крапивянка въ



теплоту пропадаетъ, а въ холодѣ легко выступаетъ и дѣлается продолжительною (хроническою). Она зависитъ отъ расстройства испарины въ кожѣ или отъ остроты соковъ, любовнаго, золотушной, ломотной, подагренной, цынготной, и лечится такъ, какъ вообще всѣ сыпи (см. выше «О сыпяхъ вообще»).

§ 37. Просянка, просовидная сыпь (*miliaria*). — Признаки. Просянка бываетъ бѣлая и красная. Бѣлая просянка есть ни что иное, какъ маленькіе, подобныя просупузырьки, по нѣскольку сливающимся вмѣстѣ; красная просянка состоитъ изъ просовидныхъ пупырышковъ, отличающихся болѣе осязаніемъ, чѣмъ зрѣніемъ; сами они и окрестность ихъ кожи бываютъ красны. Бѣлая просянка случается чаще красной; впрочемъ, онѣ иногда и обѣ появляются вмѣстѣ; при той и другой замѣчается лихорадка, обильный кисло-промытый потъ, сухой кашель, стѣсненіе въ груди, дыханіе съ частыми вздохами.

Теченіе просянки бываетъ различно: она высыпаетъ на 3—4, или на 7—8, либо даже на 8—14 день послѣ начала лихорадки; высыпавъ, она иногда вдругъ скрывается и опять появляется; высыпаетъ то слабо, то сильно — по всему тѣлу, особенно на груди и рукахъ, но лицо оставляетъ свободнымъ. Предъ высыпаніемъ у больного замѣчается: при лихорадкѣ кислый потъ, стѣсненіе въ груди, тоскливое дыханіе, сухой кашель, безпокойство, ознобъ, зудъ въ кожѣ, даже судороги и бредъ; съ появленіемъ сыпи всѣ эти припадки исчезаютъ, но иногда продолжаютъ и даже усиливаются. Послѣ просянки замѣчается незначительное лупленіе кожи.

Причины. Просянка есть болѣе припадокъ лихорадки, чѣмъ самостоятельная болѣзнь; она показываетъ важность лихорадки и бываетъ особенно спасна тогда, когда она, появляясь рано или поздно, не облегчаетъ главной болѣзни. Впрочемъ, просянку можно почитать критическою, если она появляется на 7, 11, 14 день лихорадки и облегчаетъ больного. Просянка можетъ скрываться и причинять судороги, пострѣлъ, задушеніе. Причиною просянки бываетъ розстройство кожаной испарины, расположеніе къ



ревматизму, простудѣ, слишкомъ тѣплое содержаніе лихорадочныхъ больныхъ, мягкая пуховая постель, спершіеся воздухъ въ комнатѣ больного, излишнее употребленіе потогонныхъ, горячительныхъ лекарствъ, скопленіе нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ; у женщинъ просянка замѣчается послѣ родовъ. Эта болѣзнь встрѣчалась очень часто въ тѣ времена (въ 17 столѣтіи), когда врачи слишкомъ обще употребляли потогонное горячительное леченіе, — была слѣдственно искусственная; теперь она замѣчается очень рѣдко.

Леченіе. Появленіе просянки предотвращается легкимъ одѣяніемъ больного, постелью изъ тюфяка, матраца, умеренною теплотою въ комнатѣ, свѣжимъ, чистымъ воздухомъ, слабительными. Но если просянка есть переломъ, то ее нужно поддерживать умеренно тѣплымъ содержаніемъ больного. Впрочемъ, при появленіи просянки и сильнымъ потѣ, полезна хлориновая вода (№ 9), слабительное изъ тамиранды, или чернослива съ кремортартаромъ. Если сыпь вдругъ скроется, но въ слѣдъ за тѣмъ появится поносъ и больному не дѣлается хуже, то ничего не нужно дѣлать, а только теплѣе содержать больного. Но если она бросится на мозгъ, или грудь, и причинитъ сонливость, бредъ, безпамятство или трудное дыханіе, тяжесть, кашель, колотье, то нужно призвать врача, а между тѣмъ употребить горчичники, мушку, теплыя ванны, приставить пиявицы къ головѣ, груди или даже пустить кровь (взрослымъ). Продолжительная просянка безъ лихорадки есть часто припадокъ золотухи, цынги, любострастной, подагры, ревматизма и проходитъ вмѣстѣ съ излеченіемъ главной болѣзни.

§ 38. Кровяныя пятна. — Признаки: красныя, синія, фіолетовыя, бурныя, черныя пятна, шириною въ 1—2 линіи, круглыя, неправильныя, ограниченныя, появляющіяся на разныхъ мѣстахъ, какъ припадокъ какой-либо болѣзни, съ лихорадкою и безъ нея; небольшія кровяныя пятна походятъ на слѣды укушенія блохъ, только безъ черной точки по срединѣ. Въ лихорадкахъ кровяныя пятна, подобно просянкѣ, появляются въ разное время теченія лихорадки, продолжаются неопредѣленное время, пропадаютъ безъ луп-



ленія кожи, не производятъ никакой перемѣны въ лихорадкѣ, но означаютъ ея ухудшеніе.

**Причины.** Кровяныя пятна происходятъ отъ выступленія крови изъ сосудовъ подъ кожу, какъ слѣдствія слабости, порчи или разжиженія (гнили) крови; они появляются при кровотеченіяхъ, цынги, отъ раздраженія кожи мушкою, горчичниками, ваннами, отъ излишней теплоты, въ воспалительныхъ, желудочныхъ, желчныхъ, гнилыхъ лихорадкахъ, при задержаніи кишечныхъ нечистотъ. Поэтому кровяныя пятна сходятся съ крапивянкою и нерѣдко бываютъ вмѣстѣ.

**Леченіе.** Кровяныя пятна проходятъ вмѣстѣ съ болѣзнію, отъ которой они зависятъ; собственно же леченіе пятенъ есть то же, что и просянки.

§ 39. Молочница.—**Признаки.** Маленькія, бѣлыя, возвышенныя, твердоватыя язвочки или раночки на губахъ, языкѣ, щекахъ, небѣ, зѣвѣ, простирающіяся иногда чрезъ весь кишечный каналъ до задняго прохода. Эти язвочки причиняютъ жгучую, колючую боль, особенно отъ кислой, соленой пищи и питья, трудное глотаніе, кашель, тошноту, отрыжку, рвоту, рѣзъ въ животѣ, поносъ; по временамъ пропадаютъ и опять появляются. Появленію молочницы предшествуютъ: сухость во рту, жажда, чувство давленія, шекотанія въ горлѣ, неловкость въ шеѣ, осиплость, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, тяжесть подъ ложечкою, сонливость.

**Причины.** Молочница есть сыпь на внутренней, слизистой оболочкѣ рта, пищевого горла, желудка и кишекъ и происходитъ отъ разстройства пищеваренія, отъ скопленія нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ, отъ порчи соковъ другими застарѣлыми болѣзнями—ломотою, любострастною, золотухою; она появляется въ высшей степени водянки, чахотки, желудочныхъ горячекъ, воспаленій, также послѣ неосторожнаго употребленія ртути. Молочница сама по себѣ не опасна, но она можетъ быть причиною воспаленія и помертвѣнія; притомъ появленіе ея въ другихъ болѣзняхъ всегда означаетъ опасность послѣднихъ.

**Леченіе.** При лихорадочной молочницѣ прежде всего



нужно очистить желудокъ и кишки рвотнымъ и слабительными; послѣднія давать изъ кастороваго, коноплянаго масла, вѣскаго питья; очистить воздухъ въ комнату; больному давать свѣжую, мягкую, легкую пищу: песоленую и некислую, и чистую воду, и притомъ лечить главную болѣзнь. Собственно противъ молочницы, если она причиняетъ рвоту и жаръ, нужно употреблять полосканье изъ наливки льнянаго семени, просвирнаго корня съ медомъ, молокомъ, язвинныя мѣста намазывать бурою съ медомъ (№ 22). Если молочница безъ особенной боли и продолжительна, то язвинныя мѣста во рту можно намазывать густымъ отваромъ льнянаго семени съ медомъ и квасцами, или бѣлымъ купоросомъ. Если молочница простирается въ желудокъ и кишки (что означаютъ тошнота, рѣзъ въ животѣ и изжога), то больному строго запретить употребленіе острой, соленой, кислой пищи и питья, а давать ему конопляное, маковое, миндальное, коровье молоко, ставить клистиры изъ отвара ячменныхъ, овсяныхъ крупъ, крахмала, льнянаго семени съ масломъ коноплянымъ, безъ соли и мыла.

О дѣтской молочницѣ см. ниже.

## **Б. БЕЗЛИХОРАДОЧНЫЯ, ХРОНИЧЕСКІЯ СЫПИ.**

§ 40. Чесотка. — Признаки. Маленькіе съ красноватою окружностію пузырьки, содержащіе то прозрачную, водянистую, то мутную, гнойную жидкость. Эти пузырьки прорываются и превращаются въ струпы, то сухіе, то мокрые, гнойныя. Пузырьки первоначально появляются между пальцами на рукахъ, и отсюда распространяются по всему тѣлу, кромѣ лица, на которомъ чесотка никогда не бываетъ. Сверхъ сего, чесотка отличается сильнымъ, нестерпимымъ зудомъ.

Причины. Чесотка зависитъ отъ особенной заразы, а потому и сама есть въ высшей степени заразительна, но только чрезъ непосредственное сообщеніе здороваго съ больнымъ, или съ его зараженными вещами. Первоначально чесотка происходитъ отъ неопрятности, нечистоплотности; поэтому она замѣчается почти безвыходно между неопрытными Еврея-



ми, Литвинами, Бѣлоруссами; притомъ она развивается первоначально между ручными пальцами, гдѣ наиболѣе скопляется неопрятности, напротивъ того, на лицѣ, ежедневно умываемомъ водою, вовсе не бываетъ чесотки, которая также рѣдко встрѣчается между опрятными Русскими, еженедѣльно парящимися въ банѣ.

Чесотка есть безлихорадочная, медленная хроническая сыпь; она продолжается мѣсяцы и годы, явно не разстроивая здоровья; впрочемъ, застарѣлая чесотка дѣлаетъ чело-вѣка забитымъ, прожорливымъ, располагаетъ тѣло къ исхуданію, изнуренію и портитъ соки, — причиняетъ худосочіе, бываетъ упорна въ излеченіи. Въ пузырькахъ и подъ струпьями и не застарѣлой, но сильной чесотки зараждаются насѣкомыя (родъ вшей), причиняющія нестерпимый зудъ и свербежъ.

Лѣчение состоитъ въ уничтоженіи чесоточной заразы сѣрою. Нужно однако помнить, что чрезъ натираніе сѣрою чесотныхъ частей тѣла, можно уничтожить чесотную заразу только въ кожѣ, но зараза, проникшая глубоко въ кожу и въ соки, чрезъ то не уничтожается, и потому послѣ такого одного паружнаго леченія чесотка или вновь возраждается, или же, что еще хуже, она бросается на внутренніе органы и причиняетъ чахотку, боль въ желудкѣ, водяную, падучую болѣзнь. Посему при леченіи чесотки нужно наблюдать слѣдующія правила:

1. Если чесотка появилась у здороваго чело-вѣка и недавно, не болѣе 2—3 недѣль, то можно ее уничтожить употребленіемъ сѣры снаружи въ видѣ сѣрной воды (№ 25.), мази (№ 26.), сѣрнаго мыла (№ 27.); предъ всякимъ втираніемъ мази, или мыла, въ чесоточныя мѣста, послѣднія нужно обмывать водою съ простымъ мыломъ и стирать мазь, лучше всего въ банѣ, послѣ ванны, у теплой печки. Мазь втирать тихо и долго, стараясь раздавливать пузырьки и отдѣлывать струпья; иногда отъ одного, двухъ втираній пропадаетъ чесотка. Для нѣжныхъ дѣтей, вмѣсто сѣрной, можно употреблять девясильную мазь. Гораздо однако вѣрнѣе болному давать и внутрь сѣрный цвѣтъ или очищенную сѣру по 10—20 гранъ ежедневно по утрамъ натошакъ на лом-



ть хлѣба съ масломъ, такъ, чтобы въ испражненіи низомъ была замѣтна сѣра.

2. Если чесотка у вѣзрослага челоѵѵка продолжалась уже нѣсколько недѣль и даже мѣсяцевъ, то леченіе нужно начинать употребленіемъ внутрь сѣрныхъ цѣтѵовъ ежедневно по утрамъ въ теченіе 1—2 недѣли, пить притомъ кровочистительный отваръ (№ 29) и принимать ванны съ мыломъ, золою, отрубями, сѣнною трухою, или 2—3 раза въ недѣлю ходить въ баню.

3. Въ застарѣлой чесоткѣ, неуступающей сему леченію въ теченіе 4—6 недѣль, нужно посоѵѵтоваться съ врачомъ. Въ этой чесоткѣ, къ сѣрной мази нужно прибавить мелкаго порошка бѣлаго купороса, бѣлой чемерицы, табаку (№ 27), пить притомъ отваръ изъ лопушника, осоки, молодыхъ сосновыхъ шишекъ, принимать ванны изъ винной гущи (браги послѣ гонки хлѣбнаго вина).

При леченіи всякой чесотки не нужно употреблять ничего кислаго, жирнаго, не пить квасу, сыровцу, кислыхъ шей, браги, не ѣсть свинины, свиннаго копченаго сала, ветчины, солонины жирной, соленой рыбы, раковъ, соблюдать чистоту тѣла и опрятность въ бѣльѣ, въ жилищѣ. Послѣ излеченія застарѣлой чесотки полезно купаться въ рѣкѣ, чистомъ прудѣ, принимать холодныя ванны, часто ходить въ баню.

4. Въ упорныхъ случаяхъ, нужно смотрѣть не былъ ли чесоточный прежде подверженъ любострастной, золотушной, цынготной болѣзни, и прибѣгнуть къ приличному леченію. Если, напротивъ, застарѣлая чесотка, безъ всякаго леченія скроется и у больнаго появится отѣкъ ногъ, разные припадки въ груди, животѣ, то необходимо нужно давать ему сѣру внутрь, сажать его въ сѣрныя ванны (сдѣлать на тѣлѣ источники, фонтанели) и даже искусственно привить чесотку на томъ мѣстѣ, гдѣ она прежде была. Впрочемъ, въ этихъ обоихъ случаяхъ приглашеніе врача необходимо.

§ 41. Лишай—Признаки. Маленькіе, кучками сидящіе пузырьки, окруженные краснымъ пятномъ, находящіеся на разныхъ частяхъ тѣла, причиняющіе то зудъ, то жженіе



и боль, то сухіе, чешуйчатые т. е. покрытые тонкимъ струпомъ, какъ бы отрубями, то мокрые т. е. отдѣляющіе острую, водянистую жидкость, покрытые толстыми струпами, превращающіеся въ лишайныя обширныя язвы; изъ сихъ язвъ отдѣляется много ѣдкой, водянистой жидкости, растрavляющей сосѣднія, здоровыя части; окружность лишанной язвы бываетъ тверда. Лишай, подобно чесоткѣ, есть продолжительная, безлихорадочная сыпь, но едва ли заразительная.

Причины. Лишай состоитъ въ особенной порчѣ соковъ и разстройствѣ состава кожи; то и другое бываютъ врожденны и наследственны въ цѣлыхъ фамиліяхъ. Причины лишая суть: разстройство печени, -неправильное отдѣленіе желчи, золотуха, разстройство испарины въ кожѣ отъ сырой, холодной, неопрятной квартиры, сырой, болотистой страны, почечуиные приливы крови къ кожѣ, неправильное мѣсячное очищеніе, излишній жаръ, жесткая и неопрятная одежда, старость съ ея жесткою, морщиноватою кожею и задержаніемъ мочи, худосочіе любострастное, подагренное, цынготное. Всѣ эти причины особенно легко причиняютъ лишай у людей тонко- и нѣжнокожихъ, слабыхъ, при сухомъ, остромъ воздухѣ (весною). Теченіе лишая неопредѣленно: онъ проходитъ въ нѣсколько дней, недѣль и продолжается цѣлые годы, даже всю жизнь; возвращается на то же мѣсто или на новое, или же, не прекращаясь, переходитъ съ одного мѣста на другое, усиливается зимою и къ веснѣ, и дѣлается легче лѣтомъ. Лишай есть тягостная и упорная болѣзнь, но бываетъ опасенъ только тогда, когда онъ сильно разстроиваетъ кожу, производитъ обширныя язвы, нагноеніе, изнуреніе или, скрываясь снаружи, бросается на внутреннія части.

Леченіе. Нужно удалить причину, но ее вообще открыть очень трудно; по этому леченіе лишайныхъ больныхъ лучше всего производить подъ надзоромъ врача. Прежде всего больному нужно назначить легкую діету, свѣжую, удобоваримую пищу, не пряную, не горячительную; доставить ему чистый, свѣжій воздухъ, и наблюдать чистоту тѣла и опрятность въ одеждѣ. Если больной до появленія лишая страдалъ печенію, то леченіе нужно направить противъ сей болѣзни (см. «Заваль печени»). Если причина лишая зависитъ



отъ почечуя, а это узнается по значительному зуду, краснотѣ, жару и боли въ лишаѣ, то полезна съра съ кремортартаромъ и другими противупочечуйными средствами. Это же леченіе полезно и при неправильномъ мѣсячномъ очищеніи, какъ причинѣ лишаѣ; далѣе нужно обратить вниманіе, не подверженъ ли больной золотухѣ, любострастной, подагрѣ, и направить леченіе противъ сихъ болѣзней (см. эти болѣзни). Если причины удалены или онѣ не открыты, а лишаѣ продолжается, то леченіе производится противулишайными средствами, которыя суть: пашленъ сладкогорькій въ отварѣ ежедневно по 2—4 драхмы или вытяжкѣ съ магнезією въ пилюляхъ по 2—6 гранъ, сѣрный цвѣтъ, отваръ вязовой корки (*Cort. ulmi campestris*), баккаута, сассапареля, графитъ или карандашъ отъ скрупула до драхмы въ день, продолжительное употребленіе крѣпкаго отвара трехцвѣтной фіалки (анютины глазки); при воспаленіи въ лишаѣ внутрь — сыворотка, свѣжіе соки изъ одуванчика, цикорія, пирея, подбѣла, дымчатки; соляная кислота по 10—25 капель въ водѣ три раза въ день, и одинъ съ крахмаломъ (оба эти средства принимать по совѣту врача); сѣрныя минеральныя воды: кавказскія, сергіевскія, тифлисскія, ахалцыхскія, ненидорфскія, грязи сакскія (въ Крыму), астраханскія, эзельскія (на Балтійскомъ морѣ). Снаружи полезны: отваръ толченыхъ лѣсныхъ орѣховъ, свѣжее масло грецкихъ орѣховъ, растворъ буры (*№ 43*), хлориновой извести, известковая вода. При сильномъ зудѣ и жженіи — спермацетъ съ миндальнымъ масломъ, маковое масло, свѣжія густыя сливки. Въ воспалительныхъ сильно-болящихъ лишаихъ весьма дѣйствительны: припускъ пѣвицы вокругъ лишаѣ, холодная примочка, сокъ изъ свѣжихъ листьевъ березы, подорожника, или и самые листья, прикладываемые къ лишаю и перемѣняемые по мѣрѣ того, какъ они высыхаютъ; покрытіе лишаевъ кожей или внутренностями сей части убитаго кролика, зайца, барашка. Въ упорныхъ лишаихъ иногда помогаетъ чистый деготь, котораго чашка смѣшивается въ мазь съ двумя желтками яйца и чашкою свѣжихъ сливокъ, или просто съ двумя чашками льнянаго масла; эту мазь втирать два раза въ день въ лишайныя мѣста. При наружномъ леченіи упорныхъ ли-



шаевъ пужно прежде поставить на тѣлѣ источникъ и, по временамъ, больному давать слабительное.

§ 42. Проказа, лепра.—Признаки. Морщановатая бугристая, чешуйчатая, толстая, безобразная кожа, покрытая слоистыми струпами, а мѣстами и язвами. Она причиняетъ зудъ, жжение, жестокия боли, особенно по ногамъ, разрушаетъ кожу, кости, носъ, ротъ (подобно любострастной болѣзни), унижаетъ человека до скота, причиняетъ изнуреніе и смерть съ жестокими страданіями.

Проказа появляется въ разныхъ видахъ и степеняхъ, и называется восточною, западною, сѣверною. У насъ она мѣстно встрѣчается въ Крыму, на Дону, за Кавказомъ и въ Астрахани, составляя видъ восточной проказы; также постоянно свирѣпствуютъ въ Сибири, именно въ Тобольской, Томской губерніяхъ и въ Камчаткѣ. Врачи еще не опредѣлили заразительна ли проказа, и одни ее почитаютъ любострастною болѣзнію, а другіе смѣсю любострастной, золотушной и цынготной, болѣзней.

Леченіе очень трудно и должно быть предоставлено врачу. Продолжительное употребленіе кавказскихъ водъ оказывалось иногда дѣйствительнымъ въ излеченіи прокаженныхъ, для которыхъ при кавказскихъ водахъ устроено особенное заведеніе.

Шолуди, парши.—Признаки. На волосистой части головы и чаще на тѣмени изъ небольшихъ язвинъ отдѣляется вязкая, ѣдкая, вонючая жидкость, которая причиняетъ зудъ, густѣетъ и превращается въ толстый, рыхлый, бѣлый или желтый струпъ.

Причины. Шолуди свойственны дѣтямъ и происходятъ отъ неопрятности или тѣплаго содержанія головы, золотушнаго расположенія; они чаще встрѣчаются въ Малороссіи, Бѣлороссіи. Съ тѣхъ поръ, какъ начали стричь волосы и водить дѣтей съ открытыми головами, шолуди замѣчаются рѣже. Простолюдины, для избѣжанія отлачи въ рекруты, прививаютъ себѣ искусственно парши, надѣвая шапки паршивыхъ людей.

Леченіе. Прежде всего надобно остричь волосы, но не очень низко, чтобъ не простудить головы, потомъ голову об-



мыльотваромъ лопушника, репейника, сосновыхъ шишекъ; толстые струлья размачивать теплымъ молокомъ, мыльнымъ водою, также глинянымъ масломъ, свежимъ топленымъ свинымъ жиромъ; толстые струлья смягчаются отъ обкрытія ихъ толстымъ листомъ свежей или оквашенной капуста, ломтями изъ цѣльной свеклы; по спадеши струльевъ, шолуды лечатся втираніемъ въ язвенную, красную тлявину льнянаго, деревяннаго масла, свиного жиру; вгнутрь 1—2 раза въ недѣлю давать слабительное изъ ревеня или янтарнаго магnezію, пить отвары изъ молодыхъ сосновыхъ шишекъ, лопушника, осоки, сассапареля, и ходить чаще въ баню. Въ застарѣлыхъ упорныхъ шолудяхъ нужно удалить испортившіеся корни волосъ, если они сами не выпали. Для этого узкія тесемки липкаго пластыря (который можно пригото- вить изъ простой, растопленной и смѣшанной съ мукою смо- лы и потомъ намазанной на холстинѣ) кладутся на шею уди- вое мѣсто головы и потомъ чрезъ 1—2 дня слегка ежеднев- но отдираются съ волосами; смолистую черешку съ мукою можно оставить на головѣ до тѣхъ поръ, пока она сама не отпадетъ. Впріемъ перѣдко можно видѣть, что и шолуды зажили.

§ 43. Краснота тѣла, лица. — Признаки. Красный пят- на, разной величины и вида на разныхъ частяхъ тѣла, осо- бенно на шеѣ и груди у женщинъ, или же небольшіе, бѣло- ватые пузырьки, сидящіе на красномъ основаніи. Пятна и пузырьки легко и скоро проходятъ безъ всякихъ послѣдствій; зависать же отъ полнокровія, частыхъ приливовъ крови къ головѣ, отъ шиурованій тѣла, запоровъ на низъ, скуд- наго мѣсячнаго очищенія. Лечение противувоспалительное: прохладное содержаніе тѣла, купанье въ холодной водѣ, холодныя ванны, малопи- тательная растительная пища, плоды, овощи, молоко, рыба, но не мясо и не дичь; для питья: вода, квасъ, жидкій чай, но не вино, не кофе, не шоколадъ; повторительныя слаби- тельныя ежедневно, чрезъ день, 2—3 раза въ недѣлю изъ горькой соли, горькой воды, венскаго питья; обмываніе на ночь лица, или и груди, холодною водою.

§ 44. Рядность лица. — Признаки. Разной величины



яркокрасныя, пурпуровыя, сизыя и сизія пятна на щекахъ, около носа и на самомъ носу; притомъ иногда замѣчается большая припухлость кожи. На этихъ пятнахъ, или и сами по себѣ, сидятъ на носу и щекахъ твердые, кругловатыя пупырышки, содержащія въ себѣ гнойную, водянистую, кровяную жидкость. Главная причина сихъ пятенъ и пупырышей состоитъ въ особенномъ расположеніи кожи, и потому они замѣчаются наследственно въ цѣлыхъ семействахъ; также они происходятъ у людей, преданныхъ пьянству, страждущихъ печенюю, почечуемъ, неправильнымъ мѣсячнымъ кровотеченіемъ.

Леченіе, трудное и рѣдко успѣшное, должно производить по совѣту врача. Оно состоитъ въ удаленіи сказанныхъ причинъ, если только ихъ удалить можно, въ продолжительномъ употребленіи слабительныхъ, особенно изъ горькой соли или воды, въ ношеніи на плечахъ источниковъ, въ треніи между лопатками щеткою, суконкою до красноты, въ употребленіи ножныхъ ваннъ съ горчицею, золою, косметическаго умыванья (№ 30), умыванья изъ сѣры съ камforoю (№ 31), въ ношеніи шерстяныхъ, вощаныхъ чулковъ или носковъ. Средства свинцовыя, стягивающія, вредны.

§ 45. Ковтуна. Колтуна. — Признаки. Волосы всклокоченные, перепутанные, сбитые въ одинъ или въ нѣсколько комковъ, или косъ, на подобіе войлока. Въ началѣ болѣзни изъ волосъ, или изъ головы, высачивается вязкая жидкость, склеивающая волосы; въ высшей степени ковтунъ волосы дѣлаются чувствительными и появляются наросты на ногтяхъ. Появленію ковтунъ предшествуютъ: лѣнь, слабость, усталость, головокруженіе, лихорадка, боль въ головѣ, рукахъ и ногахъ, сильновонючіе поты. По сбитіи волосъ въ комки, эти припадки прекращаются; но если прежде созрѣнія ковтунъ отрывать волосы, то можетъ произойти параличъ, слѣпота, глухота и пр. У жителей Польши и Бѣлоруссіи ломота, язвы, сыпи часто зависятъ отъ ковтунъ и проходятъ вмѣстѣ съ появленіемъ его въ волосахъ.

Ковтуна есть мѣстная болѣзнь Польши, Бѣлоруссіи, частію Малороссіи. Онъ, кажется, происходитъ отъ нечистоплотности и неопрятности, а можетъ быть и отъ воды, мѣстности стра-



ны; во многихъ семействахъ замѣчается наследственнымъ. Вообще, ковтунъ очень продолжителенъ и трудно излечивается. Лечение рѣдко удается и должно быть производимо подъ надзоромъ врача. Еслибы можно было предвидѣть, что лихорадочное состояніе есть предтеча ковтуну, то нужно давать больному потогонныя лекарства: чай изъ бузинова цвѣта, Миндереровъ спиртъ, камфору и, особенно, сурьму (по совѣту врача), дѣлать теплыя ванны. Когда пройдетъ лихорадка и начнутъ свиваться волосы, то продолжать то же леченіе и, сверхъ того, назначить больному пить кровоочищительный отваръ изъ осоки, допущника, сосновыхъ шишекъ, сассапареля. Когда ковтунъ созрѣетъ, т. е. когда прекратится отдѣленіе пасоки изъ волосъ, а это узнается по тому, что волосы теряютъ свой блескъ, вонючій запахъ и чувствительность, — то сбившіеся въ войлокъ волосы можно отрѣзать; но если отрѣзать волосы прежде созрѣнія ковтуну, то ковтунная матерія можетъ броситься на важныя части тѣла и причинить воспаление мозга, слѣпоту, глухоту, кровохарканіе. Въ Польшѣ и Бѣлоруссіи часто скрытыя и упорныя болѣзни излечиваются появленіемъ ковтуну.

§ 46. Плъшивость. — Признаки. Волосы теряютъ свой блескъ, мягкость, дѣлаются сухими, шершавыми, дwoятся и выпадаютъ, сначала обыкновенно на тѣмени, а потомъ на лбу, рѣдко на вискахъ и затылкѣ. Причиной выпаденія волосъ бываетъ все то, что разстроиваетъ питаніе тѣла, какъ то: старость, разныя горячки, воспаление мозга, рожа на лицѣ и головѣ, любострастная болѣзнь, леченіе ртутью, распутство, сильный страхъ, продолжительныя душевныя страданія, житейскія заботы.

Леченіе. Если волосы выпадаютъ у молодыхъ людей, страдавшихъ прежде какою-либо тяжкою болѣзнію и притомъ выпадаютъ неравномерно по всему тѣмени, но только мѣстами, то можно полагать, что волосныя корни еще не повреждены и здѣсь лучше всего обрить 2—3 раза всю голову: отъ одной этой мѣры волосы начнутъ расти равномерно по всей головѣ. Сверхъ сего, обритую голову нужно ежедневно обмывать отваромъ корня изъ репейника, или просто водою съ мыломъ, и потомъ натирать ее кистымъ жи-



ромъ, деревяннымъ масломъ, или какою либо помадою; волосы можно остричь въ другой и въ третьей разъ, если послѣ первой стрижки они не ставятъ расти равномерно. Всѣ же косметическія средства, выхваляемыя шарлатанами въ газетахъ, для рошенія и укрѣпленія волосъ, никогда этого непроизводятъ и служатъ только обманомъ для легковѣрныхъ.

§ 47. Веснушки. — Признаки. Круглыя, небольшія, желтобурныя пятна, безъ боли и безъ зуда, появляющіяся на чаще на лицѣ и рукахъ весною и лѣтомъ и пропадающія зимою. Онѣ чаще замѣчаются у блондинокъ, рыжеволосыхъ женщинъ, имѣющихъ блую и нежную кожу, и зависятъ отъ дѣйствія солнечнаго свѣта на открытую кожу.

Трудно предотвратить, а еще труднѣе излечить веснушки. Съ перваго цѣлю нужно защищать лицо и руки отъ солнечнаго свѣта и умывать лицо послѣ всякаго возвращенія въ домъ весною и лѣтомъ съ воздуха. Веснушки дѣлаются блѣднѣе и рѣже отъ обмыванія лица и рукъ водою съ лимоннымъ, очищеннымъ брусничнымъ, клюквеннымъ сокомъ, квасомъ, сыровцемъ, отъ прикладыванія на ночь къ лицу кислаго тѣста, барды, отъ умыванія лица на ночь перегапанною водою изъ свѣжихъ огурцовъ. Похваляемыя противъ веснушекъ косметическія средства имѣютъ своимъ основаніемъ буру, какою-либо кислоту, и никогда, впрочемъ, не избавляютъ отъ веснушекъ, а только обманываютъ легковѣрныхъ красавицъ.

§ 48. Родимое пятно. — Признаки. Врожденное пятно краснаго, желтаго, бураго, фіолетоваго, чернаго цвѣта, различной величины и формы, то гладкое, плотное, то волосами покрытое, мягкое, губчатое, возвышенное какъ наростъ. Оно остается безъ переменъ на всю жизнь, или же отъ ушиба, ожога, озноба или другаго какого раздраженія, пухнетъ, разрастается въ рыхлую, мягкую опухль, которая легко причиняетъ кровотеченіе и превращается въ опасную болѣзнь — ракъ.

Родимыя пятна зараждаются во время нахожденія младенца въ матерней утробѣ, и потому они перьдко у дѣтей замѣчаются на томъ же мѣстѣ и бываютъ такого же вида, какъ и у родителей. Испугъ беременной женщины, сильное воз-



мушение ея души также имѣютъ вліяніе на происхожденіе родимыхъ пятенъ у зародышей (\*).

Лечение родимаго пятна нужно предпринимать только въ крайности и то подъ надзоромъ врача; ибо, всякое неосторожное раздраженіе пятна можетъ имѣть опасныя послѣдствія — опухоль, кровотеченіе, ракъ; особенно опасны родимыя пятна на шеѣ и лицѣ.

Скопленія въ видѣ жемчужины и т. п. на шее и на лицѣ. Эти скопленія состоятъ изъ множества мелкихъ пузырьковъ, наполненныхъ жидкостью, которая можетъ быть прозрачною или мутною. Они могутъ быть врожденными или приобретенными. Врожденные скопленія появляются въ раннемъ возрастѣ, а приобретенныя — въ позднѣйшемъ. Лечение этихъ скопленій должно быть осторожнымъ, такъ какъ они могутъ быть связаны съ другими болезнями. Если скопленія не причиняютъ неудобствъ, то ихъ не нужно лечить. Если же они причиняютъ неудобства, то ихъ можно лечить съ помощью хирургическаго вмешательства. Однако, такое лечение должно быть осторожнымъ, такъ какъ оно можетъ привести къ поврежденію тканей. В некоторыхъ случаяхъ скопленія могутъ исчезнуть сами по себѣ, но это случается не всегда.

(\*) Одна женщина, во время беременности испугавшаяся мыши, родила младенца съ пятномъ.



## II. ХРОНИЧЕСКІЯ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЯ, МЕДЛЕННЫЯ БОЛѢЗНИ.

§ 49. Въ статьѣ «о болѣзняхъ вообще» мы сказали, какъ отличаются острыя болѣзни отъ хроническихъ. Последнія часто бываютъ слѣдствіемъ первыхъ, напр. послѣ воспаленія мозга—умопомѣшательство, легкихъ—чахотка, водяная въ груди; или же къ продолжительнымъ присоединяются острыя болѣзни: къ чахоткѣ—воспаленіе желудка и пр.; словомъ: въ натурѣ тѣхъ и другія болѣзни часто переходятъ одна въ другую, или присоединяются одна къ другой. Въ предъидущемъ отдѣлѣ уже описана часть хроническихъ болѣзней, занимающихъ кожу; здѣсь будутъ изложены прочія хроническія болѣзни, если и не всѣ, то по крайней мѣрѣ наичаще встрѣчающіяся.

Скопленіе нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ.

§ 50. Эти болѣзни встрѣчаются очень часто. Немного найдется людей, особенно изъ городскихъ жителей богатыхъ, роскошныхъ, любящихъ поѣсть и выпить, у которыхъ бы, по достиженіи сорокалѣтняго возраста, съ ослабленіемъ пищеваренія, не стали наконецъ скопляться нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ. Нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ, кромѣ того, что онѣ сами по себѣ разстроиваютъ пищевареніе, а слѣдственно и здоровье всего тѣла, имѣютъ еще большое вліяніе и на другіе важные органы—мозга, сердце и лёгкіе. Какъ сердце необходимо для кровообращенія, лёгкія—для дыханія, мозгъ—для чувствованія, такъ необходимъ желудокъ для питанія тѣла, и разстройство пищеваренія имѣетъ вліяніе на всѣ дѣйствія нашего тѣла: оно отзывается въ лёгкихъ одышкою, въ сердцѣ—тоскою и усиленнымъ его бѣніемъ, въ мозгѣ,—ипохондріею, слабостію зрѣнія и пр. Вторая особенность скопленія сихъ нечистотъ состоитъ въ ихъ леченіи: какъ засорившаяся проточная труба должна быть очищена, такъ и скопленіе въ желудкѣ нечистотъ можетъ быть удалено только испражняющими средствами, которыя здѣсь также необходимы, какъ потогонныя въ ревматизмъ, простуду, противувоспалительныя



въ воспаленіяхъ, съра—въ чесоткѣ. А какъ при общей нашей невождержности, мы особенно часто страдаемъ отъ засоренія желудка, то вообще испражняющій способъ леченія есть вмѣстѣ и самый успѣшный. Даже не узнавъ причинъ болѣзни, мы, давъ больному слабительное, невольно, такъ сказать, оцѣню, натыкаемся на оную и уничтожаемъ. Поэтому самые славные врачи были именно тѣ, которые придерживались испражнительнаго способа леченія. Знаменитость, ренутація врачей, часто зависятъ отъ желудка тѣмъ, что отъ употребленія рвотнаго и слабительнаго. Наконецъ, такъ какъ, при нашей невождержности, печень, желудокъ и кишки всегда имѣютъ болѣе работы, то они дѣлаются, такъ сказать, источною трубою и для другихъ органовъ, ихъ болѣзней и нечистотъ тѣла, и потому часто, при нашемъ образѣ жизни, очень многія болѣзни рѣшаются чрезъ желудокъ и кишки—рвотою и поносомъ.

Признаки: нечистый языкъ, покрытый бѣлою, желтою слизью, непріятный вкусъ во рту, недостатокъ хорошаго запаха на тѣлу. Если нечистоты скопились въ желудкѣ, то у больного замѣчается подъ ложечкою чувство тяжести, давленія, напряженія, горькій, кислый вкусъ, отрыжка, тошнота, рвота, боль во рту, тяжесть въ головѣ; но при скопленіи нечистотъ въ кишкахъ бываютъ: вздутіе, тяжесть, напряженіе во всемъ животѣ, урчаніе, какъ бы переливъ чего-то, и боль въ немъ и въ поясницѣ, частый отходъ воночухъ вѣтровъ, поносъ, а чаще запоръ. Сверхъ того, могутъ быть разные другіе припадки, зависящіе отъ вліянія брюха на грудь (сухой кашель, одышка, біеніе сердца) голову, (боль, слабость зрѣнія, пятна предъ глазами, тоска, расстройство духа и пр.); притомъ при всѣхъ брюшныхъ болѣзняхъ замѣчается лѣнь, усталость, слабость, гораздо въ высшей степени, нежели дѣйствительно то можно полагать, судя по другимъ припадкамъ болѣзни. Эта слабость происходитъ отъ угнетенія нервовъ нечистотами, съ испражненіемъ которыхъ и она проходитъ; особенно слабость бываетъ сильна при изліяніи желчи въ желудокъ.

Причины: Нечистоты въ желудкѣ могутъ накопиться двоякимъ образомъ: или отъ остающейся въ нихъ неперева-



ною пищей, жирной, трудно-варимой, употребленной въ большомъ количествѣ и отъ недостаточнаго испражненія низомъ пищевыхъ остатковъ; или же отъ неправильнаго, усиленнаго отдѣленія и порчи желудочнаго сока, слизи и желчи. Тогда другое скопленіе нечистотъ происходитъ отъ неводержимости, жотъ жирной, трудно-варимой, неевъжей пищи, отъ встревоженія духа во время бды, или скоро послѣ оной, отъ запоровъ, низъ, частаго употребленія рвотныхъ, слабительныхъ средствъ, отъ простуды полнаго желудка и отъ новленія испаринъ въ кожу, отъ сырости жилища, отъ ослабленія желудка невоздержною жизнью, распутствомъ, другими близкими, особенно переможною лихорадкою.

Выше сказано, что желудочныя нечистоты имѣютъ сильное вліяніе на дѣйствіе другихъ органовъ и причиняютъ въ нихъ болѣзни: хандра, тошнота, задумчивость, мушья, предъ глазами, слабость зрѣнія, одышка, кашель, тяжесть въ груди, біеніе сердца и прочее часто зависятъ отъ нечистотъ въ брюхѣ и излечиваются рвотнымъ, слабительнымъ. Но какъ зависимость этихъ болѣзней отъ брюшныхъ нечистотъ узнается довольно трудно, то совѣтъ врача необходимъ въ такихъ случаяхъ.

Дважды вредны жирная, сочная, мясная пища, особенно свинина, творогъ, сыръ, масло, сало, слица, жирная рыба, раки, пироги, блины, горячій, мягкій, слобный хлѣбъ, ма-малыга, демипка, клѣцки; полезны: жидкій супъ или каша изъ крупами и кореньями, овощью, каша, простокваша, молоко, зрѣлый картофель, жаркое. Впрочемъ, мавное состоитъ въ количествѣ: и вредная пища будетъ невредна, если ее употребляютъ въ маломъ количествѣ (полубаждать); а на-противъ, и полезная будетъ вредна, если ею обременять же-лудокъ—набаждать до пресыщенія.

Два чина состоитъ въ испражненіи нечистотъ рвотнымъ или слабительнымъ. Рвотныя назначаются при скопленіи нечистотъ въ желудкѣ: скоро послѣ роскошной трапезы, послѣ испуга, гнѣва, страха, и слабительныя при скопленіи нечистотъ въ кишкахъ и обыкновенно происходящемъ не вдругъ, а медленно. Впрочемъ, предъ назначеніемъ того или другаго средства, нужно прежде разсмотрѣть самую испраж-



ненія: если они содержатъ куски непереварившейся пищи или слюды чистой желчи, то можно дать рвотное; въ противномъ случаѣ — слабительное. После испражненія нечистоты отъ обремененія желудка пищею, нужно еще нѣсколько времени принимать порошочки изъ магнезій и ревеня и держать строгую, почти голодную діету.

Лечение скопленій въ желудкѣ и кишкахъ въ особенностяхъ.

1. Скопленіе желчи. — Признаки: желтый, бурый, нечистый языкъ, горечь во рту, жирный вкусъ, отрыжка, тошнота, рвота зеленою, желтою желчью, тяжесть и давленіе подъ ложечкою, сильная тоска, боль вѣдбу, безпокойство, отвращеніе отъ мясной, жирной пищи, жажда на кислое питье, желтый цвѣтъ лица, особенно глазныхъ бѣлковъ, рѣзъ въ животѣ, желчный поносъ, облегченіе припадковъ послѣ желчной рвоты. Когда скопившаяся въ желудкѣ желчь испортится, то она дѣлается острою и производитъ на зубахъ оскомину, садитъ въ горлѣ судороги и воспаленіе.

Скопленіе и разлитіе желчи иначе происходитъ летомъ, въ знойное время, когда человекъ спитъ ночью на сырой землѣ (почувствъ на сынокость во время жатвы въ полѣ), также послѣ обремененія желудка пищею, особенно жирною, трудноваримою, или охлажденія его холодною водою, арбузами, дынями, или послѣ гнѣва, испуга, страха, радости, у людей черноволосыхъ, раздражительныхъ, холериковъ, въ Іюль и Августѣ, а въ южной полосѣ Россіи и въ Сентябрѣ.

При увѣренности въ излітіи желчи въ желудокъ, нужно дать рвотное, лучше всего изъ раствора въ водѣ рвотнаго камня въ раздѣльныхъ пріемахъ; послѣ рвотнаго назначить кислое питье изъ лимоннаго, клюквеннаго, брусничнаго соку, квасу, сыворотки, изъ кремортартара. При боли и рѣзѣ въ животѣ дать слабительное изъ кастороваго, постнаго, льнянаго масла, втирать въ животѣ то же масло, простое или постоянное на листьяхъ бѣлены (№ 32), смягчительныя теплыя припарки къ животу изъ льнянаго сѣмени, отрубей, сѣнной трухи, намазавъ саломъ, масломъ сторону припарочной тряпки, прилегающую къ животу. Если боли усилятся до того, что возбуждять жаръ или лихорадку, если и



лёгкое прижатіе живота сдѣлается нестерпимымъ, то необходимо пригласить врача; при недостаткѣ котораго, нужно къ животу припустить пиявицы 10—40 штукъ, смотря по лѣтамъ, тѣлосложенію больного и степени болѣи, и сверхъ того, продолжать сказанныя припарки, а внутрь назначить миндальное, конопляное, маковое (при поносахъ) молоко.

2. Скопленіе слизи въ желудкѣ и кишкахъ. — Признаки: чувство тяжести въ животѣ, давленіе подъ ложечкою, нѣтъ ни голода, ни жажды, языкъ покрытъ бѣлою слизью, частая отрыжка, вкусъ во рту прѣсный, вязкій, травяной, урчаніе въ животѣ отъ вѣтровъ, по утрамъ тошнота и сухость во рту (нагараютъ); малая теплота во всемъ тѣлѣ, чувство холода подъ ложечкою, блѣдность лица, слабость, лѣнь, отвращеніе отъ движенія, скорая усталость, равнодушіе ко всему, медленный, слабый пульсъ, холодное, рѣдкое дыханіе, блѣдная, мутная, осадочная моча, иногда съ кровью, припадки глистовъ. Къ ослизенію желудка и кишекъ расположены особенно дѣти, флегматики, бѣлокурые, тучные люди, ведущіе сидячую жизнь, употребляющіе въ излишество мучную, жирную пищу: блины, клѣцки, пироги, грибы, картофель, свинину, ветчину, колбасы, сыръ, баклажки, свиги, бѣлушину, лососину, раки и пр.; живущіе въ сырыхъ мѣстахъ, неопрятныхъ домахъ.

Леченіе. Лучшее средство здѣсь нашатырь въ соединеніи съ слабительными: горькою солью, александрийскимъ листомъ, ревенемъ (№ 33), даваемая въ такомъ количествѣ, чтобы ежедневно 2—3 раза легко прослабило. Эти средства нужно продолжать до тѣхъ поръ, пока не появится аппетитъ и мутная моча не сдѣлается свѣтлою; притомъ не должно употреблять мучнистой, жирной пищи, а есть щи съ говядиною, квашеную капусту, свеклу, соевые огурцы, рѣдьку, хренъ, пить по немногу горькой настойки, горькое пиво, быть почаще на свѣжемъ воздухѣ, ходить бѣшкомъ по гористымъ мѣстамъ, въ сосновомъ лѣсу.

3. Скопленіе въ желудкѣ кислоты. — Признаки: оскомины на зубахъ безъ явной причины, кислый вкусъ, кислая отрыжка, изжога, кислый запахъ выдыхаемаго воздуха, голодь, иногда очень сильный, но безъ жажды, нечистые,



камнемъ ду корней. Обложенные зубы, блѣдность языка и лица. Всѣ эти припадки жестокаются послѣ кислой, — и утихаютъ послѣ мясной пищи. Кислота особенно часто накопляется въ желудкѣ удѣтей, при завазѣ въ печени и недостаточномъ отдѣленіи желчи у женщинъ (истеричекъ), у ипохондриковъ, у людей полнокровныхъ, подверженныхъ неправильному почечую, ведущихъ сидячую жизнь.

**Лечение.** Кислота въ желудкѣ притупляется и уничтожается магнезіею, порошокъ изъ раковыхъ жернововъ, раковинъ, чистымъ простымъ мѣломъ, глинною, известковою водою, углемъ изъ березы, жженныхъ костей, пережженного хлѣба (въ порошокъ) и особенно бѣлымъ болусомъ (глиною), также лепешками дареста (*pastelles d'Arcete*). Всѣ эти средства употребляются въ небольшихъ количествахъ по 20—30 гранъ, 2—3 раза въ сутки. Зарожденіе кислоты предотвращается употребленіемъ мясной пищи, воды съ виномъ, горькаго пива, горькой настойки изъ полыни, горечавки, трилистника, ирнаго корня, движеніемъ, работою въ саду, въ полѣ, огородѣ, купаньемъ въ рѣкѣ, морѣ, холодными ваннами.

§ 51. Завазы, застои въ брюхѣ. — Признаки: вздутый, полный животъ, то упругій, то мягкій, какъ тѣсто; ощупывая брюхо, въ немъ можно замѣтить боль подъ ребрами, уложечки (твердыя, подвижныя опухоли) испражненія низомъ бываютъ рѣдки и въ маломъ количествѣ, жидки или тверды; они состоятъ то изъ прозрачной слизи, то изъ переполнокъ желчныхъ камешковъ; по временамъ появляется поносъ непереварившеюся пищею, тяжесть и давленіе въ животѣ, особенно послѣ еды, даже умеренной, исхуданіе тѣла, особенно рукъ и ногъ, блѣдножелтый цвѣтъ лица, чувствительность къ холоду и злбкость; въ высшей степени брюшныхъ заваловъ появляется одышка, біеніе сердца, сухой кашель или съ вязкою, жидкою, свѣтлою мокротою.

Эти завалы состоятъ навчаше въ накопленіи густаго, вязкаго кала въ мѣвой кишкѣ, причемъ замѣчается твердоватая опухоль и боль въ нижней части живота надъ правымъ пахомъ, или же такой калъ скопляется въ прямой кишкѣ, и тогда замѣчается боль въ крестцѣ, чувство давленія и чего-то посторонняго надъ заднимъ проходомъ, въ которомъ пальцемъ



можно иногда ощупать твердый камень. Оба эти завала причиняют нервною очень важныя и упорныя болѣзни: судороги въ желудкѣ, упорную рвоту въ животѣ, расстройство пищеваренія, почечуи, лихорадку, истерику, меланхолю, умопомѣшательство, падающую болѣзнь, параличъ, кровотечение. По сему при всѣхъ этихъ болѣзняхъ нужно внимательно изслѣдовать брюхо и для совѣта приглашать врача.

**Примѣчаніе.** Вообще нужно твердо помнить, что при обыкновенномъ нынѣшнемъ образѣ жизни, такъ называемыя продолжительныя, хроническія болѣзни, гдѣ бы и подъ какимъ бы видомъ онѣ ни обнаруживались, по болѣйшей части зависятъ отъ расстройства брюшныхъ органовъ. Поэтому тѣ врачи, которые, при леченіи больныхъ стараются дѣйствовать на желудокъ и кишки, бываютъ вообще очень счастливы въ своей практикѣ.

Леченіе состоитъ въ употребленіи разрыхляющихъ клистировъ (№ 17): изъ одуванчика, цикорея, мыла, бычачьей желчи, рѣдченаго соку, горькой соли, нашатыря (№ 40). Эти клистиры въ количествѣ 1—1½ стакана ставятся ежедневно 1—3 раза; клистирную жидкость вырскивать медленно и осторожно, чтобы она, какъ можно далѣе оставалась въ животѣ, для чего больной, послѣ клистира, долженъ лежать на правомъ боку. Если клистирная жидкость скоро выходитъ назадъ, то нужно употреблять ее въ меньшемъ количествѣ (½—1 стаканъ) и безъ всякой соли и мыла, которыя къ жидкости прибавляются въ послѣдствіи, когда больной привыкнетъ къ клистирамъ. Предъ постановленіемъ клистира и до выхода его нужно растирать брюхо суконками, разминать руками. Діета и образъ жизни при завалахъ такіе же, какъ и при накопленіи слизи въ желудкѣ.

**Источеніе.** Источеніе, ахотка, смхотка, болѣзнь.

§ 52. Изнуреніе, истощеніе тѣла называется то, что когда человекъ болѣе издерживаетъ соковъ, нежели сколько ихъ получаетъ чрезъ питаніе: расходъ соковъ превышаетъ ихъ приходъ. Изнуреніе тѣла въ особенности зависитъ 1) отъ воспаленнаго вхожденія въ тѣло питательныхъ соковъ, напр. у дѣтей при засореніи брыжеечныхъ желѣзъ, всасывающихъ сосудовъ; питательный сокъ не проходитъ изъ кишекъ въ кровь, и отъ



того дѣти; имѣя большое брюхо, сохнутъ—сухотка; 2) отъ излишней потери соковъ и непомѣрнаго напряженія силъ, напр. послѣ кровотеченій, потери мужскаго сѣмени, поноса, изнурительнаго мочетеченія, продолжительнаго, постоянного раздраженія—истощеніе; и 3) отъ нагноенія въ какомъ либо важномъ органѣ, найчаще въ горлѣ и легкихъ—чахотка.

Изнуреніе, сухотка, чахотка вообще очень важныя и опасныя болѣзни. Впрочемъ, ихъ несчастный (смертельный) исходъ много зависитъ отъ причины и степени изнуренія, отъ положенія больного и обстоятельствъ его жизни. Всякое изнуреніе въ высшей степени неизлечимо; но и незначительное изнуреніе у людей бѣдныхъ, терпящихъ недостатокъ въ пищѣ, одѣяніи, здоровомъ жилищѣ, легко дѣлается смертельнымъ. Сухотка, истощеніе, очень продолжительны и не такъ опасны; самое опасное изнуреніе есть отъ нагноенія—чахотка. Впрочемъ, многія и другія болѣзни, при несчастномъ исходѣ, оканчиваются изнуреніемъ, какъ напр. лихорадки, горячки, воспаленія, обширныя раны, язвы, нарывы, сѣпи. Теченіе вообще состоитъ въ выполненіи слѣдующихъ трехъ условій: 1) удалить причину болѣзни, гдѣ это можно; 2) уменьшить изнуреніе тѣла и ослабить, прекратить лихорадку; 3) поддерживать питаніе тѣла приличною пищею, легковарною, питательною, негорячительною. Подробное выполненіе всѣхъ этихъ условій на дѣлѣ, будетъ изложено при описаніи истощенія, чахотки и сухотки въ особенностяхъ.

§ 53. Чахотка. — Признаки: кашель, давленіе, колодь, боль въ груди, лихорадка, исхуданіе тѣла, безпечность больного о своемъ здоровьи, невниманіе къ своей болѣзни, возрастаніе надежды на выздоровленіе по мѣрѣ усиленія болѣзни. Кашель бываетъ то сухой, то мокрый; давленіе, колодь и боль въ груди при лихорадкѣ появляются по мѣрѣ ожесточенія болѣзни въ легкихъ. Чахотка есть очень частая и притомъ убійственная болѣзнь. Изъ числа всѣхъ умирающихъ, почти пестая часть, по крайней мѣрѣ въ городахъ, умираетъ отъ чахотки. Она продолжается мѣсяцы и годы. Вполнѣ развившаяся чахотка неизлечима; это особенно замѣчается при врожденномъ на-



хотномъ расположеніи, которое отъ всякой другой болѣзни еще скорѣе переходитъ въ чахотку; въпрочемъ, у женщинъ беременность замедляетъ ходъ чахотки, которая вообще проходитъ нѣсколько періодовъ.

**Первый періодъ.** Началъ чахотки. Узнать болѣзнь въ ея началъ очень важно, ибо тогда можно замедлить и даже остановить ея развитіе. Здѣсь нужно обратить вниманіе на нѣкоторыя болѣзни, особенно часто подающія поводъ къ происхожденію чахотки. Такія болѣзни суть: 1) повторительный простудный кашель (катарръ), ослабляющій легкія. Есть люди, которые при всякой простудѣ тѣла, особенно въ началъ весны и осенью, легко получаютъ кашель, слизистая оболочка воспаляется, и притомъ въ одномъ или въ обоихъ легкихъ, и отдѣляетъ множество гноеводной слизи: послѣ всякаго такого воспаления легкія ослабѣваютъ. Впрочемъ, новѣйшіе врачи доказываютъ, что такой кашель не только не располагаетъ, но еще предотвращаетъ настоящую чахотку.

2) Расположеніе легкихъ къ частымъ приливамъ крови и къ воспаленію. Это расположеніе находится то въ самыхъ легкихъ, то въ дыхательномъ горлѣ. Его признаки суть: частый, сухой кашель, появляющійся послѣ выпитія холодной воды, проглоченія куска льда, съѣденія мороженаго, скорой ходьбы противъ рѣзкаго, холоднаго вѣтра; постоянная или преходящая летучая боль и колюще, одышка, скорый пульсъ, дѣлающійся еще скорѣйшимъ послѣ легкаго движенія. Всѣ эти припадки ожесточаются отъ всякаго разгоряченія тѣла: отъ пѣнія, громкаго чтенія, рѣчи, смѣха, крика, гнѣва, спиртныхъ напитковъ. Притомъ такіе люди легко подвергаются кровохарканію—красною пѣнистою кровью.

3) Брюшныя болѣзни также бываютъ поводомъ происхожденія чахотки: расстройство пищеваренія, скопленіе нечистотъ и вѣтровъ въ желудкѣ и кишкахъ; завалы печени, почечуіные приливы и застои крови. Здѣсь появленію чахотки предшествуютъ разные припадки, страданія брюшныхъ внутренностей (см. эти болѣзни); притомъ и припадки чахотки усиливаются послѣ невоздержности въ пищѣ,



запора или поноса, но не отъ движенія, смѣха, плача и прочаго; таковой кашель усиливается въ продолженіи

4) Прекратившееся теченіе и устремленіе на лёгкія крови почечуиной, мвсечной; скрывающаяся подагра, Шиншай, чесотка, золотуха; заживленіе застарѣлыхъ язвъ, фонтанелей; несовершенное рѣшеніе кори, оспы, скарлатины, судорожнаго кашля. Во всѣхъ этихъ случаяхъ послѣ видимаго прекращенія извѣстной болѣзни, появляется боль въ груди, одышка, кашель.

Второй періодъ. Развитіе чахотки. Часто появляются припадки то воспаленія въ груди (колотье, боль, давленіе, жаръ въ тѣлѣ, сухой кашель), то гноенія (влажный кашель съ изверженіемъ белой, желтой, зеленой, сыровоточной мокроты). Въ этомъ періодѣ начинается изнурительная лихорадка, сначала въ видѣ перемежающей, потомъ послабляющей къ утру, и наконецъ почти непрерывной, продолжающейся цѣлыя сутки. Эта лихорадка ввечеру начинается ознобомъ, переходящимъ ночью въ жаръ, который къ утру оканчивается проливнымъ, клейкимъ, непріятнымъ потомъ; въ ладоняхъ и подошвахъ чувствуется непріятный, томительный жаръ, — больной для рукъ и ногъ ищетъ въ постель холоднаго мѣста; на щекахъ, особенно послѣ обѣда, замѣчается ограниченный багровый румянецъ, исхуданіе тѣла, слабость мышцъ; но позывъ на вѣдущорощъ, даже до обжорства; то запоръ на низъ, то поносъ; откашливаемая мокрота бываетъ гноевидная. Въ этомъ періодѣ въ лёгкихъ уже находятся язвы, но больной питаетъ твердую надежду на выздоровленіе и полагаетъ, что еслибъ не кашель, то онъ былъ бы совсемъ здоровъ.

Періодъ третій. Чахотка въ полномъ видѣ. Появляется обильный, изнурительный, клейкій потъ, такой же поносъ; въ мутной мочѣ на поверхности замѣчаются жирныя блески; лихорадка навѣщаетъ больного дважды: съ полуночи и послѣ обѣда; больной видимо слабѣетъ и худѣетъ, сильно страдаетъ отъ непрерывнаго кашля, задыхается при малѣйшемъ движеніи, извергаетъ вонючую мокроту по цѣлымъ фунтамъ въ сутки, но не теряетъ надежды на выздоровленіе. Наконецъ, появляются отеки ногъ, безгла-



ісіе, молочница въ рту, хрипѣніе мокроты въ горлѣ, одышка до обморока, остановленіе изверженія мокроты, самозабвеніе и — безиробудный сонъ и т. п. (4).

Причины. Чахотка первоначально состоитъ въ томъ, что въ лёгкихъ зараждаются маленькіе бугорки въ разномъ количествѣ; эти бугорки бываютъ наполнены плотною матеріею, потомъ они увеличиваются въ числѣ и объятности, смятаются, воспаляются, нагнаиваются и такъ по немногу разрушаютъ составъ, строеніе лёгкихъ. Эти воспаленія и нагноенія лёгочныхъ бугорковъ повторяются очень часто и производятъ у больного то припадки воспаления, жаръ, сухость въ глоткѣ, жажду, боль, колющія въ груди, сухой кашель — то нѣтъ: давленіе въ груди, обильный потъ, мокрый кашель, одышку. Особенныя причины чахотки суть: чахотное устройство тѣла (см. Гигіену), узкая, плоская, спереди и съ боковъ сжатая грудь, отстоящая отъ груди, какъ бы торчащая въ видѣ крыльевъ, плоская, длинная, тонкая шея, высокій ростъ, длинныя руки и ноги, бѣлые зубы, блѣлая, нѣжная кожа, сквозь которую просвѣчиваютъ толстыя голубыя жилы; вспыльчивость и раздражительность характера, сангвиническій темпераментъ, безпечность и равнодушіе къ своему здоровью, стараніе больного уверить другихъ, что припадки его болѣзни происходятъ не изъ груди, а напр. изъ брюха. При такомъ устройствѣ тѣла, и особенно груди, проходъ крови чрезъ сжатую легкія воспаляется, а потому у чахотныхъ дѣтей часто течетъ кровь изъ носа, а у взрослыхъ изъ лёгкихъ (кровохарканіе); поэтому же кровь у нихъ, при малѣйшемъ тревоженіи, бросается въ лицо въ видѣ яркаго румянца, скопляется въ рукахъ и ногахъ и причиняетъ жаръ въ ладоняхъ и подошвахъ; мѣста въ лёгкихъ, непроходимыя для крови, такъ сказать, высыхаютъ и въ нихъ происходятъ бугорки точно такъ, какъ часть поверхности болота, не напоемая болѣе водою, разрѣшается въ бугры и кочки.

Это устройство тѣла, это расположеніе къ чахоткѣ бываетъ наследственное — родителями сообщается дѣтямъ, и потому нередко случается, что цѣлыя семейства вымираютъ отъ чахотки. Впрочемъ, и нечахотныя женщины, у кото-



рыхъ развитіе таза было воспрепятствовано пинуровками, разными болѣзнями (англійскою), раждають чахоткорасположенныхъ дѣтей, особенно первенцовъ, которые, въ свою очередь, сообщаютъ расположеніе къ чахоткѣ своимъ дѣтямъ. Возрастъ отъ 16 до 30 лѣтъ особенно располагаетъ къ чахоткѣ; ибо въ это время наиболѣе подвергаются развитію грудные органы и въ нихъ происходятъ быстрыя и важныя перемѣны, а люди бываютъ очень раздражительны, вспыльчивы, дѣятельны, обуреваемы страстями.

Тѣло чахоткорасположеннаго слабо развивается въ толщину, но за то быстро растётъ въ длину, и потому высокіе, тонкіе люди наичаще подвергаются чахоткѣ.

Испорченная атмосфера: влажный, спертый, нечистый воздухъ, налитанный животными испареніями: парами и газами, развивающимися въ большихъ, многолудныхъ городахъ, на заводахъ и фабрикахъ, сильно способствуетъ развитію чахотки, отъ которой посему въ городахъ умираетъ  $\frac{1}{4}$ , а въ деревняхъ  $\frac{1}{10}$  покойниковъ.

Роскошь, невоздержность въ пищу и питіе, неправильный образъ жизни, развратъ, работы въ разныхъ мастерскихъ, извѣстныя ремесла (см. Гигіену), частыя и сильныя напряженія легкихъ при пѣніи, крикѣ, громкомъ чтеніи, сильное движеніе, бѣгъ, танцы, особенно при мѣсячномъ очищеніи, спиртные напитки, раннее, непомѣрное напряженіе дѣтородной силы (совокупленіемъ, рукоблудіемъ, къ которому чахотные очень склонны), раннее замужство, частые роды, продолжительное кормленіе грудью; золотушное расположеніе, англійская болѣзнь, искривленіе спины, груди—горбъ спереди, сзади, съ боковъ, также бываютъ причинами чахотки.

При чахотномъ расположеніи ускоряють развитіе чахотки: пренебреженный, упорный, простудный кашель (катарръ), повторительное кровохарканіе, колотье и воспаленіе въ груди, сильныя, частыя напряженія легкихъ при громкомъ чтеніи (у дьячковъ), разговоръ (у актёровъ), при пѣніи, крикѣ, вдыханіи острыхъ паровъ (ртути, мышьяку), газовъ на разныхъ заводахъ, рудоконьяхъ, ушибы, раны, сотрясеніе груди, переносъ на легкія подагры, ревматизма, золотухи, че-



сотки, кори, почечуйнаго и мѣсячнаго кровотеченія. Всѣ эти причины могутъ произвести чахотку, даже у людей, неимѣющихъ врожденнаго къ ней расположенія.

А. Лечение чахотки въ первомъ періодѣ, въ ея началѣ. О предупрежденіи чахотки изъ врожденнаго расположенія тѣла изъяснено въ Гигіенѣ. Если не всегда удается предотвратить чахотку, то по крайней мѣрѣ нѣрѣдко можно замедлить ея развитіе, особенно когда человекъ прожилъ уже до 30 лѣтъ. Признаки въ этомъ періодѣ суть: чахотное тѣлосложеніе, и особенно узкая грудь, ускоренное дыханіе и одышка при малѣйшемъ движеніи, восхожденіи на высокую и крутую лѣстницу, гору, невозможность глубоко вздохнуть, перхота и сухой кашель при разговорѣ, громкомъ чтеніи, пѣніи, охриплость послѣ крика, гнѣва, яркій, ограниченный румянецъ щекъ, особенная краснота языка, похожаго на кусокъ свѣжаго мяса, очередная смена летучаго озноба жаромъ, скорый, твердоватый пульсъ.

Лечение чахотки въ этомъ періодѣ есть предохранительное; оно должно имѣть цѣлю съ одной стороны сдѣлать свободнымъ проходъ крови въ груди, а для того стараться распространить, растянуть грудную полость, такъ сказать раздвинуть грудныя стѣны, а съ ними расширить и лёгкія, а съ другой уменьшить, ограничить приливъ крови къ груди, и тѣмъ облегчить проходъ ея чрезъ лёгкія. Выполненіе этихъ правилъ предохранительнаго леченія чахотки мы здѣсь изложимъ подробно.

Въ просторной, широкой груди свободно расширяются и лёгкія, а чрезъ нихъ свободно протекаетъ и кровь. Узкая, сжатая, чахотная грудь вѣрнѣе всего расширяется частыми, глубокими, медленными вдыханіями. Надежнѣйшія для этого средства суть: перемѣна воздуха, морское путешествіе, движеніе, бѣганье, верховая ѣзда, плаваніе въ водѣ, вѣираніе, втягиваніе въ грудь сколько можно болѣе воздуха, или глубокое вдыханіе. Всѣ эти средства прямо или косвенно раздвигаютъ грудныя стѣны, расширяютъ грудь и лёгкія и дѣлаютъ свободнымъ проходъ чрезъ нихъ крови.

Замѣчено, что чахотнорасположенные люди въ молодыхъ



лѣтахъ перемѣнивъ воздухъ своей родины — съверный на южный и даже южный на съверный, теряли расположеніе къ чахоткѣ, которая опять появлялась у нихъ, когда они рано возвращались на родину. Это происходитъ отъ того, что воздухъ родины, какъ привычный, мало раздражаетъ лёгкія и не возбуждаетъ ихъ къ глубокимъ и частымъ вдыханіямъ, которыя человекъ непременно принужденъ производить, дыша новымъ, непривычнымъ для него воздухомъ. Перемѣняя воздухъ родины, нужно избрать новое жилище для больного, южнѣе прежняго, въ мѣстахъ сухихъ, возвышенныхъ, гористыхъ, въ сосѣдствѣ сосновыхъ лѣсовъ: здѣсь, онъ долженъ оставаться до 25—30 лѣтъ, пока не утвердятся окончательно развитіе груди. У насъ, въ Россіи, жители съверной полосы могутъ переселиться на югъ въ Малороссію; а средней, въ Крымъ, на Кавказъ, въ Астрахань. Поселившись въ новомъ мѣстѣ, нужно производить ежедневно 2—3 раза искусственныя втягиванія воздуха и сверхъ того почаще вдыхать глубоко. Для чахоткорасположенныхъ семействъ самое неблагопріятное жилище и воздухъ суть именно тѣ, гдѣ они родились и получили зародищъ къ болѣзни.

Путешествіе дѣйствуетъ благотворно на чахоткорасположенныхъ, также перемѣна воздуха; но плаваніе по морю приноситъ еще и особенную пользу тѣмъ, что морской воздухъ всегда чище земнаго, притомъ первый напитанъ соляными частицами, которыя возбуждаютъ лёгкія къ частымъ и глубокимъ вздохамъ.

Движеніе. Дикіе народы и животныя весьма рѣдко подвергаются чахоткѣ, которая замѣчается очень часто между образованными, особенно городскими жителями и домашними животными. Кромѣ воздуха и привольной жизни первыхъ, это, особенно зависитъ отъ движенія; поэтому расположенныхъ къ чахоткѣ дѣтей нужно занимать разными гимнастическими упражненіями: заставлять ихъ работать въ саду, огородѣ, копать землю, возить песокъ, обрѣзывать деревья, лазить по деревьямъ, носить умѣренныя тяжести, постепенно увеличиваемыя, качать воду изъ колодца, плавать въ лодкѣ по рѣкѣ, или пруду, грести воду веслами. Все эти роды



движеній упражняютъ руки и заставляютъ грудныя мышцы широко расширять грудь.

Но самое действительное предохранительное отъ чахотки средство есть намѣренное, медленное и глубокое вдыханіе, втягиваніе въ грудь сколько можно болѣе воздуха, производимое ежедневно почаше въ теченіе 1—2—6 мѣсяцовъ и долѣе. Для произведенія этого вдыханія, берутъ небольшую кадочку, —эта кадочка наполняется парнымъ молокомъ или горячею водою, въ которую можно положить ромашки, льняныхъ сѣмянъ, хмелевыхъ шишекъ, —молоко или вода наполняютъ  $\frac{2}{3}$  кадки, которая потомъ покрывается плотно крышкою, имѣющею два небольшія отверстія, изъ коихъ одно служитъ для вхожденія въ кадку наружнаго воздуха, а въ другое вставляется кожанная или резиновая трубочка длинною въ 1—2 $\frac{1}{2}$  аршина, или въ пять футовъ, а толщиною въ небольшой палецъ—мизинецъ; на одномъ концѣ трубочки находится винтъ, которымъ она и ввинчивается въ отверстіе кадочной крышки, а другое снабжено мундштукомъ изъ рога, слоловой кости, янтаря; въ этомъ мундштукѣ, какъ и въ чубучномъ, находится отверстіе; мундштукъ больной вставляетъ себѣ въ ротъ. Трубка можетъ быть длиннѣе или короче, тоньше или толше, смотря по тому, свободнѣе ли, или труднѣе больной расширяетъ грудь и втягиваетъ воздухъ. Черезъ короткую и толстую трубу воздухъ легче и скорѣе проникаетъ въ лёгкія, а чрезъ длинную и узкую труднѣе и медленнѣе. Если посему больной, втягивая чрезъ трубку изъ кадки пары и воздухъ, чувствуетъ затрудненіе и боль въ груди, то это означаетъ, что трубка для него тонка и длинна, и въ такомъ случаѣ нужно ее замѣнить кратчайшею и толстѣйшею. Вообще надобно начинать втягиваніе воздуха въ лёгкія и расширять грудь чрезъ толстыя и короткія трубки, а потомъ переходить къ тончайшимъ и длиннѣйшимъ. Впрочемъ, надобно замѣтить и то, что длинная трубка избавляетъ больного отъ стѣсненія въ груди, которое появляется отъ близкаго къ нему положенія вдыхательнаго снаряда, притомъ длинная трубка задерживаетъ воздухъ, и не позволяетъ ему быстро выходить изъ лёгкихъ, а это послѣднее обстоятельство и составляетъ глав-



ное условіе пользы вдыхательнаго снаряда, ибо для наполненія лёгкихъ воздухомъ, больной принуждёнъ сильно расширять грудь.

Втягиваніе воздуха нужно производить ежедневно два раза, при пустомъ желудкѣ: по утру на тощакъ и въ вечеру предъ ужиномъ или чаемъ. Втягиваніе паровъ и воздуха нужно продолжать 10—15—30 минутъ, развѣ больной почувствуетъ тягость, боль въ груди или получить кашель: въ такомъ случаѣ втягиваніе воздуха тогда же прекращается и больному дается отдыха 2—5 дней; потомъ опять возобновляется операція. Но если эти припадки не прекратятся чрезъ 2—5 дней сами по себѣ, то на болящее мѣсто груди прикладывается мягчительная припарка, или приставляются къ нему пиявицы. Также вредно втягиваніе воздуха чрезъ трубку при расширеніи сердца, сильномъ кашлѣ, удушѣ, колотѣ въ груди, кровохарканіи; но въ такихъ случаяхъ оно бываетъ и не нужно.

Главное дѣло при семъ втягиваніи воздуха состоитъ въ томъ, чтобы грудь и лёгкія расширять медленно, постепенно и безъ всякихъ насилій. Предъ втягиваніемъ паровъ посредствомъ трубки, можно бока груди и спину натирать свѣжимъ саломъ и масломъ. Кромѣ того, втягиваніе воздуха чрезъ трубку нужно производить стоя и удалить всё то, что препятствуетъ расширенію груди, напр. тѣсное платье, полный желудокъ. Воздухъ выпускать изъ груди нужно также медленно и безъ всякаго усилія и притомъ не весь, дабы не сжимать лёгкихъ и не слишкомъ стуживать грудь. Втягиваніе смоляныхъ паровъ изъ дѣгтя, скипидара и пр. дѣйствительно можетъ быть только расширеніемъ груди и лёгкихъ, но смоляные пары сами по себѣ не только безполезны, а даже вредны раздраженіемъ лёгкихъ, которое они производятъ. Кромѣ этого втягиванія воздуха, больной долженъ какъ можно почаще вдыхать глубоко и медленно при всѣхъ своихъ занятіяхъ.

Въ Англіи, для предохраненія отъ чахотки, у людей, къ ней расположенныхъ, стараются возбудить простудный кашель, катарръ, который, подобно искусственному втягиванію воздуха такъ же, но гораздо сильнѣе и скорѣе рас-



пираетъ грудную полость и расширяетъ легкія. Для этого немного вспотѣвшаго, разгоряченнаго больного, особенно послѣ бани, ванны, можно заставлять глотать по немногу холодную воду, кусочки льда; съ открытою шею, вышедъ изъ теплой комнаты, гулять въ сырую и холодную погоду и усиленно вдыхать холодный воздухъ; дѣйствительнѣйшее же для этого средство состоитъ въ ношеніи на шеѣ особеннаго стального ожерелья. Это ожерелье умеренно-плотно охватываетъ шею, не сжимая однако ее; производитъ легкое давленіе и развиваетъ воспаленіе въ дыхательномъ горлѣ, которое сообщается и слизистой оболочкѣ легкихъ. Тамъ, гдѣ оно примѣтно давитъ, звено ожерелья можно обтянуть ватою или подложить кусокъ сухой, мягкой губки. Ожерелье давитъ на шею спереди у вилочки, но оно не должно давить боковыхъ частей шеи и не прижимать шейныхъ сосудовъ. Впрочемъ, излеченіе чахотки чрезъ втягиваніе воздуха и вѣтріе и спокойіе для больного, чѣмъ случайно или искусственно происшедшимъ катарромъ, который причиняетъ и безпокойный кашель и затруднительное дыханіе; да притомъ возбужденіе искусственнаго катарра есть средство довольно невѣрное и даже опасное, поэтому мы его и не советуемъ употреблять безъ надзора врача.

Б. Лечение развившейся чахотки рѣдко бываетъ удачно, а еще рѣже оно достигается лекарствами, которыхъ, впрочемъ, очень много похваляется противъ чахотки. Предохранительное леченіе нужно продолжать и при дѣйствительно уже начавшейся чахоткѣ. Далѣе, въ чахоткѣ нужно обращать особенное вниманіе на приливы крови къ груди, на воспаленія, по временамъ возникающія въ легкихъ, и на изнурительную лихорадку. Всѣ это достигается противувоспалительнымъ леченіемъ — кровопусканіемъ изъ руки, припускомъ къ груди, наичаше подъ ключицами, пиявицъ, селитрою и приличною діетою.

Если въ лихорадочномъ ознобѣ замѣчается постоянная гдѣ-либо въ груди боль, колюще, тяжесть, давленіе, сухой кашель, головная боль (отъ воспаленнаго возврата крови отъ головы къ груди), если больному болѣе 14 лѣтъ, то нужно ему пустить 4 — 5 унцій изъ руки крови. Такое



кровопускание, еще неизнуренных чахоткою больных, не только их не ослабляет, но даже освѣжаетъ, укрѣпляетъ и прекращаетъ самую лихорадку. Кровопускание нужно дѣлать смѣлье при колотѣхъ, внезапномъ кровохарканіи съ труднымъ дыханіемъ, болью и жаромъ въ груди. Кровопускание изъ руки въ началѣ чахотки можно и повторять чрезъ 2—4 недѣли и даже чаще, но кровь выпускать всегда въ маломъ количествѣ и, буде можно, всегда посовѣтовавшись прежде съ врачомъ. Если лихорадка, прекратившаяся было послѣ кровопусканія, снова скоро возвращается (прежде двухъ недѣль), или при лихорадкѣ ничего особеннаго не замѣчается въ груди, если мускулы и кожа на груди похудѣли и больной моложе 14 лѣтъ, то припускъ пиявицъ нужно предпочитать кровопусканію. Пиявицы, числомъ 6—10—12, ставятся на груди подъ ключицами или противъ мѣста боли въ груди; по отпаденіи пиявицъ, не нужно обмывать крови водою, дабы не простудить больного, а на кровоточивыя мѣста сейчасъ положить корпию, губку или двойную холстинку и не снимать ихъ  $\frac{1}{2}$ —1—2 часа, а потомъ замѣнить ихъ новыми: скопившаяся подъ губкою кровь дѣйствуетъ на грудь въ родѣ припарки и способствуетъ обильному кровотеченію изъ пиявочныхъ ранокъ.

Если, послѣ незначительнаго кровопусканія изъ руки и припуска пиявицъ, грудные припадки не прекращаются, если притомъ показывается харкотина, тѣсно смѣшанная съ кровью, то нужно пригласить врача, который, вѣроятно, найдетъ нужнымъ сдѣлать значительное кровопусканіе (отъ 10 — до 14 — 16 унцій) взрослымъ юношамъ и даже чрезъ 2—3-е сутокъ повторить, буде первое кровопусканіе не прекратитъ припадковъ; но повторяемъ, что такъ пускать чахотнымъ кровь можетъ только врачъ.

Изъ внутреннихъ лекарствъ въ чахоткѣ при лихорадкѣ нужно употреблять семитру въ отварѣ просвиринаго корня, въ наливкѣ подбѣла, липоваго цвѣта, мянанныхъ сѣмянъ, вишневаго клея, съ вишневымъ, малиновымъ сиропомъ, сахаромъ, медомъ (№ 21). Если у больного нѣтъ лихорадки, то не нужно давать ему никакихъ лекарствъ, а продолжать



только втягиваніе воздуха посредствомъ снаряда и содержать его на приличной діетѣ.

Слабительныя лекарства, особенно сильно-дѣйствующія, въ чахоткѣ болѣе вредны, чѣмъ полезны; ихъ можно давать чахотному только при лихорадкѣ въ пособіе мѣстному и общему кровопусканію. Приличнѣйшее слабительное для чахотнаго можно составить изъ 5 — 10 гранъ углекислой соды, 10 гранъ жженой магнезій и 20 гранъ ревеня; этотъ порошокъ можно дать больному и въ другой разъ, если чрезъ 3—5 часовъ послѣ пріема первый не послабитъ; дѣйствіе порошка можно поддержать простымъ клистиромъ изъ ромашки, масла и мыла, сладкою сывороткою, отваромъ черносливъ, изюму.

Потогонныя средства также небезопасны для чахотныхъ тѣмъ, что возбуждаютъ волненіе крови и жаръ и усиливаютъ изнурительную лихорадку, производятъ засореніе въ лёгкихъ, а производимый ими потъ еще болѣе ослабляетъ больного. Впрочемъ, во время лихорадочнаго жара, можно кожу, посредствомъ губки, обмывать теплою водою съ уксуомъ, при ознобѣ поить больного теплымъ чаемъ изъ липоваго, бузиннаго цвѣта, сушеныхъ ягодъ малины; а когда появится обильный потъ, давать больному слабый холодный настой тысячелистника, трилистника, ромашки, розовыхъ лепестковъ, шалфея.

Кромѣ того, въ чахоткѣ употребляютъ множество другихъ лекарствъ, способствующихъ отдѣленію и изверженію лёгочной мокроты (разныя смолы и камеди), унимающихъ кашель (средства одуряющія, наркотическія — опій, бѣлену, красавицу), крѣпительныхъ, вяжущихъ (хину, свинцовый сахаръ) и пр. Польза всѣхъ этихъ средствъ въ чахоткѣ сомнительна, а вредъ при неумѣренномъ или неосторожномъ ихъ употребленіи можетъ быть очень важенъ. При сильномъ кашлѣ и бессонницѣ можно больному дать 1—2 грана салатнаго сока, или 1—2 ложки вишневой воды, получаемой перегонкою воды чрезъ столченныя вишневыя косточки; салатный же сокъ можно получать изъ огороднаго салата (см. Лекарственникъ); оба эти средства безопасны при употребленіи и успокаиваютъ чахотныхъ.



Нарывныя средства, особенно шпанская мушка, скоро и медленно дѣйствующая, полезны, когда, послѣ припу- ска пиявицы или кровопусканія, грудные припадки не со- вѣсь прекращаются; но въ высшей степени чахотки, при изнурительной лихорадкѣ, мушка также вредна; притомъ въ это время мѣсто послѣ мушки нѣрѣдко помертвѣваетъ и глубоко изъязвляется. Источники (фонтанели) на плечахъ, бокахъ, спинѣ, посредствомъ корки волчьяго лыка, горо- шинъ, мази изъ рвотнаго камня, беспокоятъ больного, не принося ему никакой явной пользы.

Диета для чахотныхъ есть очень важное пособіе, если не къ выздоровленію, то навѣрно къ замедленію развитія чахотки. Кандидаты чахотки строго и постоянно должны избѣгать всего того, что волнуешь духъ, разгорячаетъ тѣ- ло; строгій присмотръ за ними въ этомъ отношеніи тѣмъ не- обходимѣе, что они всегда и сами по себѣ раздражительны. Употребленіе вина и водки, кофе, крепкаго чернаго чаю, шеколада съ ванилью, танцы, интересныя игры въ карты, чтеніе соблазнительныхъ книгъ, разсматриваніе такихъ же картинъ и эстамповъ, вольное обращеніе половъ, плотское совокупленіе (къ которому чахотно — расположенные очень склонны) — должны быть вовсе запрещены чахотнымъ. Пи- ща для чахотныхъ должна быть легковарима и негорячи- тельна и тѣмъ менѣе питательна, чѣмъ скорѣе послѣ та- кой пищи у больныхъ замѣчается лихорадка. Лучшее до- казательство безвредности пищи есть то, когда больной по- слѣ трапезы не чувствуетъ ничего особеннаго — ни озноба, ни тяжести въ тѣлѣ, ни сонливости. Кандидаты чахотки должны рѣдко употреблять мясо, особенно говяжье и сви- ное, но баранину, телятину, курицу, легкую дичь, легко- варимую рыбу, яйца въ смятку, молоко, разные супы съ кореньями и зеленью, крупами (повторяемъ: если нѣтъ ли- хорадки), они всегда умеренно могутъ кушать и притомъ 2—3 раза въ сутки. Бѣдные люди, съ неиспорченнымъ же- лудкомъ, легко перевариваютъ даже миноги, угри, раки и рыбу трудноваримую. Пища должна быть ни переварена, ни пережарена, иначе она въ желудкѣ переваривается труд- но. Для питья употреблять воду чистую или съ малостию



блага вина, съ сокомъ лимоннымъ, клюквеннымъ, брусничную воду, сыворотку, изрядка легкое пиво, зельтерскую или известковую воду съ молокомъ ослинымъ, козьимъ, эмскія воды.

Впрочемъ, предъ назначеніемъ чахотни расположенному образа жизни, мѣстопробыванія и леченія нужно посоветоваться съ опытнымъ врачомъ, что при медленномъ развитіи болѣзни всегда можно сдѣлать своевременно.

§ 54. Гортанная, горловая чахотка. Признаки: осиплость, а часто и потеря голоса, чувство шероховатости, жженія, стрѣльбы въ гортани, или дыхательномъ горлѣ, иногда боль даже при наружномъ давленіи спереди и посрединѣ шеи; съ начала болѣзни сухой, а потомъ мокрый кашель съ гнойными и кровавыми полосками, причемъ появляется изнурительная лихорадка; всякое напряженіе голоса и раздраженіе лёгкихъ, какъ то: смѣхъ, плачь, громкій разговоръ, крикъ, пѣніе, сырой, холодный воздухъ, дымъ, газы и пр. возбуждаютъ кашель. Болѣзнь проходитъ очень медленно—нѣсколько лѣтъ, особенно у людей, перешедшихъ за 30 лѣтъ.

Причины. Гортанная чахотка всегда есть слѣдствіе воспаления слизистой перепонки гортани или дыхательнаго горла. Она происходитъ, когда это воспаление переходитъ въ нагноеніе, что наичаще замѣчается при упорномъ и часто возвращающемся сухомъ кашлѣ, у людей блѣлыхъ, нѣжнокожихъ, расположенныхъ къ чахоткѣ, у золотушныхъ, страдавшихъ любострастною болѣзнію, много и долго упражняющихся въ пѣніи, громкомъ чтеніи, декламации. Гортанная чахотка иногда бываетъ вмѣстѣ съ лёгочною, и тогда замѣчаются и припадки последней—страданіе груди.

Леченіе должно быть прежде всего направлено противъ причины—золотухи, любострастной, и потому предварительный совѣтъ съ врачомъ необходимъ. При упорной осиплости, сухомъ кашлѣ и стрѣльбѣ въ гортани или горлѣ, нужно принудить пѣвицы, сдѣлать припарки къ шее, и заставлять больного вдыхать 2—3 раза въ день мягчительные пары изъ горячаго молока, просвирнаго корня и пр., поставить на шею мушку и поддерживать ее въ на-



гноеніи долго и постоянно. Прочее леченіе то же, что и при лёгочной чахоткѣ, исключая втягиванія воздуха, которое здѣсь вовсе ненужно.

§ 55. Изнурительная лихорадка. Признаки: чувство слабости и скука по утрамъ, проходящія днемъ и къ вечеру; позывъ на ѣду, но тяжесть послѣ ѣды и склонность ко сну у непривыкшихъ спать послѣ обѣда; тяжесть и круженіе головы, слабость зрѣнія, чувствительность къ переменѣ температуры (зябкость), то блѣдность, то краснота лица, припадки истерики, ипохондріи. Послѣ продолженія такихъ припадковъ нѣсколько мѣсяцевъ, или и года, больной начинаетъ худѣть; онъ чувствуетъ послѣ обѣда ознобъ, въ вечеру томительный жаръ, особенно непріятный въ подошвахъ, ладоняхъ и глазахъ, а къ утру тѣло покрывается обильнымъ, непріятнымъ, клейкимъ, кислымъ потомъ и послѣ всякаго такого приступа лихорадки больной видимо худѣетъ. Присемъ замѣчаются припадки прежней какой-либо болѣзни.

Причины. Изнурительная лихорадка всегда есть припадокъ другой явной, или скрытной болѣзни, для излеченія которой цѣлительная сила нашего тѣла (внутренній врачъ) возбуждаетъ лихорадку, которая всегда означаетъ слабость питанія и зависящее отъ того изнеможеніе силъ, а потому происходитъ послѣ всякой другой, долго продолжавшейся, особенно перемежающейся лихорадки; также отъ чахотки, обширныхъ, сильно гноящихся язвъ и ранъ, заваровъ брюшныхъ внутренностей, послѣ значительной потери крови и соковъ,—отъ долгаго кормленія грудью, частыхъ родовъ, обильныхъ бѣлей, частыхъ ночныхъ изліяній сѣмени, рукоблудія, неумѣреннаго совокупленія, упорнаго поноса, изнурительнаго мочетеченія, кровотеченій, отъ неумѣреннаго напряженія тѣла и духа работою, заботами, умственными занятіями; отъ золотухи, любострастной болѣзни, цинги, употребленія ртути, неосторожнаго, медленнаго отравленія мышьякомъ, ртутью, свинцомъ (на заводахъ, фабрикахъ, у живописцовъ, ремесленниковъ). Посему при появленіи изнурительной лихорадки, нужно подробно вникнуть въ состояніе больного и изслѣдовать его со всею осто-



рожностію и вниманіемъ, а для этого приглашеніе врача необходимо.

Леченіе состоитъ въ удаленіи причинъ лихорадки т. е. въ леченіи болѣзни, отъ которой зависитъ лихорадка, и потомъ въ укрѣпленіи тѣла и въ поддержаніи его питанія. Но при выборѣ крѣпительныхъ средствъ нужно быть очень осторожнымъ, потому что почти всѣ эти средства укрѣпляя, вмѣстѣ и разгорячаютъ, слѣдственно возбуждаютъ и поддерживаютъ лихорадку (см. крѣпительный способъ леченія). Вообще однако при употребленіи крѣпительныхъ т. е. горькихъ, вяжущихъ, ароматныхъ средствъ въ изнурительной лихорадкѣ нужно наблюдать слѣдующее: 1) сначала давать легкія горькія средства и въ маломъ количествѣ, напр. легкую наливку, въ видѣ чая, айрнаго корня, трилистника и тысячелистника, полыни, полагая 1—2 драхмы на 4—6 унцій горячей воды, и восходя до половины и цѣлой унцій; потомъ переходить къ хинѣ, которую также сначала давать въ видѣ холодной, а послѣ и горячей наливки, а наконецъ изъ этихъ средствъ готовить и отваръ, сначала также слабый, а потомъ постепенно покрѣче; наливку и отваръ давать холодными съ прибавленіемъ вина, сахара, меду; при поносѣ всѣ эти средства вредны, а при сильномъ потѣ полезны: растиранія кожи теплымъ уксусомъ съ виномъ, холодная наливка изъ шалфея, прохладная комната. Впрочемъ, это крѣпительное леченіе изнурительной лихорадки, какъ припадка чахотки, бесполезно. 2) Строго смотрѣть, чтобы больной ежедневно имѣлъ 1—2 испражненія низомъ, а для этого къ суточной порціи крѣпительныхъ средствъ лучше всего прибавлять 1—2 унціи ревенной наливки или ставить по временамъ простыя клистиры. 3) Укрѣпляющими средствами дѣйствовать чрезъ кожу, т. е. помощь ваннъ простыхъ теплыхъ, или съ отрубями, солодомъ, бардою (при цынгѣ), съ ароматными травами—мятою, пижмою, конуферомъ, ромашкою, зорѣю или любисткомъ, укропомъ; въ кожу втирать спиртъ камфорный, муравейный, богородицкой травы (*thymus serpillum*), березовыхъ, сосновыхъ молодыхъ шишекъ. Діета и образъ жизни въ изнурительной лихорадкѣ тѣ же, что и въ чахоткѣ.



§ 56. Спинная сухотка. Признаки: исхуданіе тѣла, слабость, нетвердая и шаткая походка; въ поясницѣ и крестцѣ чувство дрожи, ползанія мурашекъ, очередующагося съ жаромъ, иногда сильныя боли. Въ такомъ положеніи болѣзни можетъ быть 10 — 20 лѣтъ; потомъ шаткость походки усиливается, появляется слабость въ ногахъ и совершенное ихъ онемѣніе, которое отъ ногъ распространяется на мочевой пузырь и причиняетъ трудное испусканіе мочи, на прямую кишку и производитъ запоръ на-низъ или неправильное испражненіе. Въ высшей степени сухотки, ослабѣваетъ зрѣніе, слухъ, тупѣютъ и помрачаются умственные способности и послѣдуетъ смерть отъ истощенія тѣла.

Причины. Обыкновеннѣйшая причина есть частое и продолжительное раздраженіе нижней части спиннаго мозга, который отъ того слабѣетъ, нѣмѣетъ и усыхаетъ. Это раздраженіе наичаще производится излишнею потерей дѣтороднаго сѣмени, а потому сухотка замѣчается у молодыхъ людей, предавшихся рукоблудію (онанію), у неумѣренныхъ въ плотскомъ совокупленіи. Спинная сухотка бываетъ также слѣдствіемъ воспаленія спиннаго мозга отъ переноса на него ревматизма, подагры, равно золотухи, любострастной болѣзни.

Леченіе. Прежде всего нужно удалить причину, и потому за молодыми людьми надобно строго смотрѣть, чтобы они не предавались своей постыдной привычкѣ — рукоблудію, и удалить ихъ отъ общества съ другимъ поломъ, и отъ всего того, что возбуждаетъ плотскую похоть (книги, картины, разговоры). Если при легкомъ прижатіи пальцами, или проведеніи губки съ горячею водою вдоль поясницы и крестца, замѣчается боль, то къ такому мѣсту приставить пиявицы и потомъ дѣлать обмыванія всей спины холодною водою, холодныя примочки къ поясницѣ, холодныя ванны (при сухоткѣ отъ онанію), или же теплыя припарки, когда болѣзнь зависитъ отъ другихъ причинъ; при боли въ спинѣ, послѣ пиявицъ, поставить мушку и долго поддерживать въ нагноеніи (фонтанель). Минеральныя воды: кавказскія, теплицкія и пирмонтскія также бываютъ полезны въ спин-



ной сухоткѣ; равно и купанье въ простой холодной рѣч-  
ной, морской водѣ.

Сюда же принадлежит и старческая сухотка, какъ неизбежное слѣдствіе изнеможенія, ослабленія умственныхъ и душевныхъ дѣйствій, долговременной или и краткой, но распутной жизни. Теперь часто случается видѣть, особенно въ большихъ городахъ, мужчинъ въ 30-ть лѣтъ со всеми знаками 60-ти лѣтнихъ стариковъ: беззубыхъ, исхудалыхъ, пившихъ, утратившихъ подвижность въ суставахъ, ослабѣвшихъ способностію ума, чувствами. Эта преждевременная искусственная старость, подобно натуральной, неизлечима. Впрочемъ, для такихъ преждевременныхъ стариковъ можно совѣтовать всё то, что сказано о спинной сухоткѣ.

§ 57 водяною болѣзнію, водянкою, называется скопленіе жидкости въ какой-либо полости, или въ клетчаткѣ подъ кожею. Скопленіе жидкости подъ кожею и въ брюшной полости открывается легко чрезъ опухоль и увеличеніе объема больного мѣста; но скопленіе воды въ грудной, головной полостяхъ узнается очень трудно — чрезъ разстройство грудныхъ органовъ, мозга.

Причины. Вода скопляется и происходитъ водянка, если оболочка, выстилающая полость, или клетчатая плева, отдѣляютъ болѣе сыворотки, чѣмъ сколько ее всасывается. Это неравновѣсіе, разлада между отдѣленіемъ и всасываніемъ сыворотки, происходитъ отъ множества причинъ, между коими главнѣйшія суть: 1) слабость общая или мѣстная. Отъ общей слабости зависитъ водянка, появляющаяся подъ конецъ несчастнаго исхода множества продолжительныхъ болѣзней, также послѣ сильныхъ кровотеченій; отъ мѣстной слабости; происходитъ водянка послѣ ушибовъ, сильныхъ потрясеній, раздавленія. 2) Раздраженіе, полнокровіе или и воспаленіе сывороточныхъ оболочекъ брюха, груди, головы, кожи. Такая водянка бываетъ слѣдствіемъ любострастной болѣзни, скарлатины, скрывшейся чесотки, пьянства, упорнаго ревматизма, упорной, продолжительной, перемежающей лихорадки. 3) Остановленіе другихъ отдѣленій и испраженій; такая водянка очень часто происходитъ отъ остановленнаго пота, также отъ



скуднаго или прекращеннаго отдѣленія мочи (у стариковъ и дѣтей), мѣсячнаго очищенія у женщинъ, почечуйнаго кровотеченія, отъ быстраго остановленія поноса, бѣлей, подагры. 4) Давленіе, прижатіе, мѣшающее свободному прохождению крови и соковъ; такъ тугая перевязка руки, беременная матка, причиняютъ отѣкъ рукъ, ногъ; такъ же дѣйствуютъ опухоли большія и твердыя (напр. ракъ въ грудяхъ), завалы внутренностей, наросты и опухоли въ брюхѣ, груди, расширенія сердца и большихъ сосудовъ, и причиняютъ скопленія воды подъ кожею и въ полостяхъ.

Леченіе состоитъ въ удаленіи причинъ водяной болѣзни и въ испражненіи накопившейся жидкости. Въ первомъ отношеніи бываетъ нужно уменьшить полнокровіе, разрѣшить воспаленіе, опухоли, завалы внутренностей, возстановить испарину—потъ; а во второмъ вывести изъ тѣла скопившуюся въ немъ воду приличными лекарствами или операціею; слѣдственно къ такимъ больнымъ нужно приглашать врачей.

§ 58. Брюшная водянка.—Признаки: увеличеніе брюха въ объемъ, напряженіе, упругость живота, примѣтное зыбленіе, колебаніе жидкости въ брюхѣ: если ладонью руки прижать брюхо съ одной стороны, а съ противной стороны, другою рукою слегка ударять въ брюхо, то можно чувствовать, какъ при всякомъ ударѣ рукою въ брюшную стѣну, жидкость волною напираетъ на ладонь руки; въ началѣ болѣзни, когда еще не вся брюшная полость наполнена жидкостію, увеличеніе объема въ брюхѣ замѣчается только при стоячемъ положеніи больного;—моча мутная, темноватая, съ хлопками, и испражняется въ маломъ количествѣ; испражненіе низомъ рѣдкое, даже запоръ, калъ жесткій, почти сухой (катышки); кожа, языкъ, полость рта также сухи, жестки; сильная жажда.—По мѣрѣ накопленія воды въ брюхѣ и прижатія желудка, вареніе въ немъ, особенно твердой пищи, происходитъ съ трудомъ; больной и послѣ умѣренной вѣды чувствуетъ тяжесть въ животѣ и тошноту; въ высшей степени накопленія жидкости въ брюхѣ прижимаются легкія, затрудняется дыханіе, появляется одышка, сухой кашель; по мѣрѣ увеличенія брюха, спина, руки и ноги худѣютъ, дѣтородныя части, а потомъ и ноги



отекаютъ; появляется изнурительная лихорадка, боли въ разныхъ мѣстахъ, пролежни. Смерть послѣдуетъ при безпамятствѣ или отъ задушенія. Впрочемъ, болѣзнь можетъ продолжиться нѣсколько лѣтъ, особенно если не давать водѣ накопляться въ большомъ количествѣ. Изъ всехъ водянокъ, брюшная случается и излечивается чаще другихъ.

У женщинъ брюшную водянку можно иногда принять за начало беременности; но здѣсь нужно обратить вниманіе на состояніе у женщины мѣсячнаго очищенія, на чувство движенія младенца въ маткѣ; еще труднѣе распознать водянку, когда она появляется у дѣйствительно беременныхъ женщинъ; здѣсь приглашеніе врача, а если можно, то акушера, необходимо.

Причины. Брюшная водянка наичаще происходитъ отъ воспаленія брюшины, отъ заваловъ брюшныхъ внутренностей, особенно печени, селезенки, брыжеечныхъ, кишечныхъ, желѣзъ, отъ продолжительной, упорной, худолеченной перемежающей лихорадки, отъ цынги, подагры, ревматизма, скарлатины, пьянства, отъ ушиба живота и пр.

Лечение вообще очень трудно и удается только при возможности удалить причину болѣзни и неизнуренномъ состояніи больного. Если при водянкѣ замѣчается постоянная боль въ животѣ, жаръ въ тѣлѣ и жажда, полный, скорый, твердый пульсъ; если больной крѣпокъ и полнокровенъ; если у него вдругъ начало пухнуть брюхо, лице, ноги; если болѣзнь произошла отъ прекратившагося кровотеченія, послѣ скарлатины, — то бываютъ полезны: пиявицы, теплыя припарки, слабительныя изъ кремортартара съ англійскою, глауберовою солью, изъ горькой воды, огуречнаго разсола, въ большихъ пріемахъ селитра 2—4 драхмы въ сутки; свѣжіе, спѣлыя арбузы, сыворотка, теплыя ванны съ отрубями; пластырь изъ мушки на больное мѣсто. Если водянка произошла послѣ заживленія застарѣлыхъ язвъ на ногахъ, остановленія вонючаго пота ножныхъ пальцевъ, — то надобно возстановить то и другое: язвы посредствомъ мушки и потомъ фонтанели, а потъ ношеніемъ на голомъ тѣлѣ шерстяныхъ чулковъ, напитанныхъ растворомъ каучука (резинки) или простой смолы.



Но если водянка есть следствие заваловъ внутренностей, застарѣлой перемежающей лихорадки, то нужно употреблять разръшающія (см. Леченіе заваловъ), слабительныя или мочегонныя средства (см. Методы леченія: слабительный и мочегонный). Здѣсь, впрочемъ, нужно смотрѣть: какой путь избираетъ натура больного для испражнения воды, и, соответственно тому, настаивать болѣе на употребленіи слабительныхъ или мочегонныхъ средствъ. Впрочемъ, въ водянкѣ брюха нужно завершенно прибѣгнуть къ совѣту врача, который можетъ прописать другія, сильнѣйшія средства. Мы особенно совѣтуемъ кремортартаръ съ селитрою, глауберову соль и наливку можжевельныхъ жженныхъ ягодъ съ уксуснокислымъ паташемъ или бурою (№ 34). Иногда слабительныя и мочегонныя средства въ соединеніи дѣйствуютъ лучше, чѣмъ отдѣльно даваемыя; въ другомъ случаѣ мочегонныя, прежде недѣйствительныя, оказываютъ хорошее дѣйствие послѣ слабительныхъ, равно послѣднія послѣ первыхъ. Слабый растворъ углекислой соды (щелочная вода), зельтерская вода, кавказскій нарзанъ; въ некоторыхъ случаяхъ коровье молоко, употребленное внутрь по нѣскольку стакановъ (отъ 2-хъ до 4—6-ти въ сутки) быстро испражняетъ воду; отваръ черныхъ таракановъ (4—10 штукъ на стаканъ воды), употребленный по получашкѣ 3—4 раза въ сутки, также сильно гонитъ мочу и испражняетъ воду; равно много способствуютъ всасыванію воды изъ брюха увиванія рукъ, ногъ и живота.

Если скопленіе воды угрожаетъ задушеніемъ, если напряженная кожа на брюхѣ лоснится, рветъ и болитъ, операція прободенія брюха необходима, а съдѣлать ее и пособіе врача. Эта операція безопасна для больного, и ее смѣло можно повторять много разъ по мѣрѣ новаго накопленія воды, притомъ и внутреннія лекарства, до операціи недействовавшія, послѣ нея иногда дѣйствуютъ очень успѣшно.

§ 59. Грудная водянка.—Признаки. Распознаваніе сей водянки, особенно въ ея началѣ, очень трудно: стѣсненіе и тяжесть въ груди, одышка при движеніи и положеніи на спинѣ, боль между лопатками, отекъ рукъ, лица, особенно вѣкъ; при быстромъ поворачиваніи съ боку на бокъ, боль-



ной, а даже иногда и посторонніе слышать въ его груди движеніе жидкости; частая перхота, сухой, короткій кашель, внезапное пробужденіе больного отъ сна при чувствѣ тоски и задушенія и при усиліи встать съ постели и дышать свѣжимъ воздухомъ; при большомъ накопленіи въ груди воды, больной не можетъ лежать на спинѣ, а дышитъ только сидя; пульсъ неправильный; тоска, по временамъ усиленное біеніе сердца, примѣтное даже снаружи чрезъ стѣны; обмороки; моча мутная, но не столько, какъ при брюшной водянкѣ.

Причины вообще тѣ же, что и всякой водянки, но сверхъ того, грудная часто есть слѣдствіе колотья въ груди (воспаленія подреберной плевры), бугорковъ въ легкихъ, грудной жабы, завала печени, продолжительнаго удушья и брюшной водянки.

Грудная водянка излечивается очень рѣдко и обыкновенно убиваетъ больного, и притомъ или чрезъ задушеніе, или чрезъ кровавый пострѣлъ въ головѣ, въ которой скопляется крови, по причинѣ труднаго для нее прохода чрезъ легкія. Самое леченіе есть то же, что и брюшной водянки; особенно же хорошо дѣйствуетъ порошокъ изъ  $\frac{1}{2}$ —1 грана наперсточной травы, 8—10—12 гранъ селитры и 20—30 гранъ кремортартара; больной принимаетъ такихъ порошковъ 4—6 въ сутки въ теченіе 2—3 недѣль, оставляетъ приемъ порошковъ на недѣлю, и потомъ опять начинаетъ ихъ принимать, когда пульсъ, сдѣлавшійся съ наперсточной травы медленнымъ, начинаетъ ударять чаще и съ приостановкою.

Примѣч. о водянкѣ въ головѣ см. дѣтскія болѣзни.

§ 60. Подкожная водянка. При сей болѣзни скопляется жидкость въ клетчатой плевѣ надъ кожею и притомъ или по всему тѣлу (общая подкожная водянка), или же только на нѣкоторыхъ частяхъ, напр. на вѣкахъ, мѣшочкѣ, рукахъ, ногахъ (мѣстная подкожная водянка, отекъ вѣкъ, рукъ и пр.).

Признаки: блѣдная, мягкая, тѣстовидная опухоль кожи, уступающая давленію, послѣ котораго остается впадина въ кожѣ, какъ на мягкомъ воскѣ, нескоро исчезающая. Если



скопленіе жидкости подъ кожею возрастаетъ до значительной степени, то кожа напрягается, расширяется, краснѣетъ и больной имѣетъ страшный видъ тучнаго челоуѣка.

**Причины.** Общая — подкожная водянка появляется или вдругъ послѣ сильной простуды, остановленія испарины въ кожѣ, сокрытія острой сыни, особенно скарлатины (см. эти болѣзни), или медленно у людей рыжихъ, сухихъ, тучныхъ, особенно у женщинъ. Мѣстная подкожная водянка, или отекъ, бываетъ припадкомъ другой, внутренней болѣзни — чахотки, расширенія сердца, грудной, брюшной водянки, цынги, или же развивается самостоятельно, отъ прижатія, давленія, простуды, воспаленія, напр. отекъ ногъ у беременныхъ женщинъ, въкъ при воспаленіи глазъ, ногъ и рукъ при опухляхъ отъ тугой повязки.

**Леченіе.** Общая подкожная водянка, происшедшая вдругъ (послѣ простуды, скарлатины), лечится противувоспалительными и мочегонными средствами. Въ ней иногда бываетъ полезно и кровопусканіе (по совѣту врача). Медленно развившаяся водянка, кромѣ внутренняго леченія средствами, приведенными при водянкѣ брюшной, уступаетъ леченію, дѣйствующему на кожу, какъ то: больного заставляютъ почаще и подольше лежать и сидѣть въ натопленной банѣ, или на печкѣ, и въ это время даютъ ему пить теплый чай изъ бузины, липы, соломы, растираютъ его щетками, суконками, втираютъ ему въ кожу спиртъ муравейный, изъ березовыхъ шишекъ, камфорный, и заставляютъ его носить на голomtъ тѣлѣ шерстяную, фланелевую рубашку, покуренную смолою, пахучими травами.

Въ этой же водянкѣ иногда хорошо дѣйствуетъ березовая припарка или ванна: собираютъ свѣжіе, сочныя березовыя листья и плотно набиваютъ ихъ въ мѣшки, гдѣ они, переночевавъ, сильно нагрѣваются, и тогда обкладываютъ ими всего больного, кромѣ головы; подъ этою припаркою онъ остается до тѣхъ поръ, пока она не пристанетъ, и все это время онъ сильно потѣетъ. Нѣсколько такихъ припарокъ иногда излечиваютъ совершенно подкожную водянку. Съ подобною же цѣлью сажаютъ больныхъ въ истопленную печь, гдѣ они сильно потѣютъ; но могутъ однако и задохнуться



если въ печи будетъ очень горячо и закрыто отверстіе печи. Леченіе мѣстной водянки, или отѣка, изложено въ другомъ мѣстѣ (см. Наружныя болѣзни).

§ 61. Пученіе живота, вѣтры.—Признаки. Чувство полноты и напряженія, но безъ тяжести, въ сторонѣ желудка т. е. подъ ложечкою и подъ лѣвыми ложными ребрами; это чувство иногда распространяется по всему животу и прекращается или ослабѣваетъ послѣ выхожденія вѣтровъ верхомъ, отрыжкою, или низомъ; но если вѣтры не выходятъ вонъ, то скопленіе ихъ въ желудкѣ и кишкахъ причиняетъ тоску, одышку, давленіе, какъ бы задушеніе, особенно во снѣ, угрюмое, сердитое расположеніе духа, ипохондрію, сильныя боли въ животѣ и подъ ложечкою отъ растяженія вѣтрами желудка и кишекъ. Эти боли особенно чувствуются въ лѣвой верхней части живота подъ ребрами и заставляютъ иногда подозрѣвать колотье въ груди. (Давленіе скопленія вѣтровъ причиняетъ непріятныя сжатія сердца и болѣзненное его движеніе, давленіе въ гортани, какъ бы ютъ остановившагося въ немъ куска хлѣба, шара; шумъ въ ушахъ, слабость зрѣнія, видѣніе предметовъ вдвойнѣ.) Въ высшей степени скопленія вѣтровъ происходитъ непрерывная отрыжка съ громкимъ звукомъ, котораго болѣе шумѣть, такъ мѣ болѣе задержатъ, не можетъ, турчаніе и шумъ въ брюхѣ; этотъ шумъ начинается отъ нижней правой стороны живота, восходитъ вверхъ, идетъ поперечно чрезъ животъ подъ желудкомъ на лѣво, и потомъ спускаясь книзу, оканчивается громкимъ или шипучимъ, тихимъ выхожденіемъ вѣтровъ. Иногда громкое движеніе вѣтровъ въ животѣ причиняетъ какъ бы пискъ животнаго, кваканье лягушекъ, что простой народъ приписываетъ чародѣйству; или же вѣтры спираются въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ живота въ видѣ звучной при удареніи опухоли, упругаго шара, либо все брюхо растягивается сильно вѣтрами, напругается, и при удареніи въ его стѣны, звучитъ какъ барабанъ.

Причины. Болѣзнь состоитъ въ излишнемъ отдѣленіи вѣтровъ, которое въ свою очередь, зависитъ отъ слабости желудка и кишекъ и замѣчается наичаще при разстройствѣ пищеваренія, въ ипохондріи, истеріи, при завахахъ въ пе-



ченіи и недостаточномъ отдѣленіи желчи. Душевное разстройство также легко причиняетъ скопленіе вѣтровъ, которые въ большомъ количествѣ отдѣляются при употребленіи въ пищу капусты, гороху, рѣпы, яблокъ, разныхъ овощей, свеклы, кислыхъ щей, квасу, сыровцу, браги, молодого пива, потъ остановленной простудой испарины въ кожѣ. Чѣмъ слабѣе пищевареніе, тѣмъ скорѣе развиваются въ брюхѣ вѣтры.

Леченіе состоитъ въ удаленіи вѣтровъ и въ предотвращеніи ихъ новаго скопленія. Вѣтры удаляются разными ароматными лекарствами, которыя возбуждаютъ движеніе въ желудкѣ и кишкахъ, какъ то: сѣмя укропа, аниса, тмина, кардамона, перца, гвоздики; масло изъ сихъ же сѣмянъ, также мятное, ромашечное, полынное; сѣмена употребляются въ порошокъ (по 10—20 гранъ), и въ наливкѣ; мята въ наливкѣ, масла (по 1—2—4 капли) съ сахаромъ, хлѣбомъ, виномъ или водкою; они же вводятся въ кишки и въ клистирахъ, которыхъ жидкость должна сколько можно долѣе оставаться въ брюхѣ. Для уничтоженія вѣтровъ въ самомъ брюхѣ, даются внутрь всасывающія средства: чистая магнезія, раковья жерновки, раковины, чистый углекислый поташъ, известковая вода, розжженный ревенъ, такой же ржаной хлѣбъ, уголь, смѣль. Все эти средства поглощаютъ вѣтры, и потомъ слегка слабятъ и изгоняютъ. Жерновки, поташъ даются по 5—10 гранъ на пріемъ, повторяемый чрезъ 1—2 часа; а для дѣтей по 1—3 грава на пріемъ. Снаружи растирать животъ суконкою, фланелью, напитанными спиртомъ изъ сказанныхъ сѣмянъ, летучею мазью, прикладывать къ животу сухія, горячія салфетки, полотенца, сукенки; особенно полезно для больныхъ пить поутру натошакъ холодный тминный чай. Присемъ непременно нужно соблюдать діету, не употреблять пищи, отдѣляющей вѣтры, не есть теплыхъ кушаньевъ, не пить воды во время ѣды.

Развитіе вѣтровъ отвращается укрѣпленіемъ желудка и кишекъ. Средства для этого суть: холодъ въ разныхъ видахъ, крѣпкія, не кислыя вина, спиртъ и горькія лекарства, питье холодной воды натошакъ по утрамъ (2—6 стакановъ), глотаніе кусочками льда, мороженое, обмываніе живота холодною водою, купанье въ холодной водѣ въ морѣ, обмываніе



такую же водою всего тела, холодные клистиры, движеніе, прогулка пышкомъ, механическія работы: садовничья, огородная, токарная; горькія настойки (водки), горькій холодный чай изъ трилистника, полыни, золототысячника, для такихъ же больныхъ, особенно полезно нынѣшнее леченіе вообще холодною водою и кавказскій нарзанъ. При сильномъ скопленіи вѣтровъ или напряженіи брюха, какъ барабанъ, помогаетъ клистиръ изъ холодной воды и потомъ вытягиваніе изъ брюха вѣтровъ тѣмъ же клистиромъ. Это дѣлается такъ: поставивъ клистиръ изъ холодной воды, и не вынимая изъ задняго прохода клистирной трубки, оттягиваютъ ея поршень къ себѣ до конца; потомъ, не вынимая костяной трубочки изъ прохода, отнимаютъ отъ нея клистирную трубку, изъ которой выгоняютъ вѣтры и воздухъ движеніемъ поршня впередъ; далѣе, прижавъ поршень къ переднему концу клистирной трубки, послѣднюю, уже пустую, переднимъ концомъ вставляютъ въ костяную трубочку и опять тѣмъ же движеніемъ поршня къ себѣ вытягиваютъ вѣтры изъ кишенъ. Въмѣсто костяной трубочки, въ задній проходъ можно вставить резиновую или кожаную трубочку и продвинуть ее далеко, въ брюхо, безъ опасности повредить кишку; а потомъ, прикинувъ къ ней клистирную трубку, вытягивать вѣтры, которые притомъ нерѣдко и сами начинаютъ выходить съ шумомъ. Эту операцію можно повторять часто, особенно при значительномъ скопленіи вѣтровъ.

§ 62. Запоръ на-низъ. — Признаки: тягость и боль въ поясницѣ, полнота въ нижней части брюха, особенно съ правой стороны, гдѣ нерѣдко замѣчается припухлость, возвышеніе, твердоватость и тупая боль; безуспѣшный позывъ къ испражненію низомъ, котораго притомъ уже не было въ теченіе 2—4 дней и болѣе.

Испражненіе низомъ есть необходимое условіе здоровья; но только число испражненій не у всѣхъ людей бываетъ одинаково: у маленькихъ дѣтей оно происходитъ 2—6 разъ, у большихъ дѣтей 2—3 раза, а у взрослыхъ 1—2 раза въ сутки; у женщинъ чаще, чѣмъ у мужчинъ; а есть люди, которые, безъ разстройства здоровья, испражняются низомъ одинъ разъ въ 2—3 дня и болѣе; посему запоръ на-низъ



есть дѣло условное. Впрочемъ, взрослый здоровый мужчина и женщина должны ежедневно одинъ разъ имѣть испраженіе низомъ; но если оно происходитъ рѣже, или и ежедневно, но въ маломъ количествѣ, то остающійся калъ скопляется въ толстыхъ кишкахъ, особенно справа и снизу въ брюхѣ, портится, густѣетъ, твердѣетъ, растягиваетъ кишки, прижимаетъ соседнія части — мочевой пузырь у мужчинъ, матку у женщинъ, препятствуетъ кровообращенію, задерживаетъ кровь въ прямой кишкѣ (почечуй), производитъ приливъ крови къ головѣ (головную боль), къ груди (одышку, кашель), разстроиваетъ состояніе духа, помрачаетъ зрѣніе и порч.

Причины запора суть: сухая, твердая (безъ супу или шей), тяжелая пища (сухари, черствый ржаной хлѣбъ, пироги, блины, малороссійская лемешка, бессарабская мамалыга, крутая каша, горохъ, чечевица, фасоль, бобы, жолуди, орѣхи, каштаны); продолжительное сидѣніе (запоръ у чиновниковъ, ученыхъ), сжатіе живота корсетомъ (запоръ у женщинъ), беременность, завалъ печени и недостатокъ желчи, расслабленіе кишекъ отъ невоздержной жизни, частаго употребленія слабительныхъ лекарствъ (привычный запоръ у пожилыхъ людей), опухоли въ брюхѣ, наросты и опухоли въ кишкахъ (упорнѣйшій запоръ).

Леченіе. Легко и скоро можно излечить запоръ, но трудно уничтожить расположеніе къ нему. Для этого должно пріучать себя ежедневно по утру ходить на стулъ, хотя бы и не было позыва, и сидя на стулѣ тереть и мять животъ пальцами въ теченіе  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа; если не было на-визъ, то продолжку эту чрезъ 1—2 часа и повторить, даже въ третій разъ; 2) держать діету, которая доставляетъ болѣе жидкаго, чѣмъ твердаго кала: кушать ежедневно супъ, щи, не очень черствый хлѣбъ, не сухари, поменьше говядины, дичи, свинины, а побольше овощей, плодовъ, особенно сливъ, яблокъ (груши лѣсныя, жесткія, часто сами производятъ запоръ; напротивъ бергамоты, апельсины, виноградъ, особенно съѣденныя по утру на тошакъ, скоро и легко слабятъ — по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ людей); по утрамъ натошакъ пить холодную воду по 2—4 стакана и послѣ каждого стакана воды ходить 10—15 минутъ; вообще пить довольно



воды, квасу, сыровцу, сыворотки, молока, огуречнаго раз-солу, изрѣдка сокъ изъ рѣпы, моркови, свѣжей свеклы; по утрамъ сѣдлатъ немного квашеной капусты, кусочекъ селедки; тереть почаще животъ просто руками или и масломъ деревяннымъ, льнянымъ; ходить, ѣздить верхомъ, работать въ саду, огородѣ, за токарнымъ станкомъ. 3) Если при такомъ образѣ жизни, заворъ все-таки случается, то надобно прибѣгать къ лекарствамъ, изъ которыхъ дѣйствительнѣйшія и безопасныя суть: промывательное простое, изъ наливки льняныхъ сѣмянъ, съ постнымъ, коноплянымъ масломъ, съ простымъ мыломъ, обыкновенною (столовою) или горькою солью; также клистиры изъ одной холодной воды или же кемпѣевы брюшные клистиры (№ 16), кремортартаръ въ растворѣ, александрійскій листъ въ пилюляхъ съ вытяжкою одуванчика (№ 35), или въ видѣ сенжерменскаго чая (№ 36), котораго 1—2 унціи наливается дятлю чашками кипятку и настаиваются въ тепломъ мѣстѣ 10 часовъ; эта чайная наливка употребляется чрезъ 1—2 часа по получашкѣ, при слабости желудка съ малагою, мадерою, простою водкою. Александрійскій листъ можно употреблять и съ кофе, особенно цикоринымъ, который для сего сваривается въ водѣ, въ которой, холодной, пролежалъ листъ цѣлую ночь. Въ упорныхъ случаяхъ нужно прибѣгнуть къ совѣту врача. Въ запорахъ при заварѣ въ печени, очень полезны кавказскія теплыя серныя и щелочныя воды и потомъ паразанъ, также карлсбадскія, тѣллицкія и вообще минеральныя воды, содержащія серу и щелочь. Это же леченіе прилично и при завадахъ внутренностей (см. выше).

§ 63. Рвота съ запоромъ. — Признаки: тошнота, рвота сначала пищею, слизью, потомъ даже каломъ; сильнѣйшія боли въ животѣ, тоска, обморокъ, холодный потъ, охладѣніе рукъ и ногъ, величайшая слабость, неутолимая жажда, судороги, забывчивость и — смерть. Во время болѣзни или вовсе не бываетъ никакого испражненія изомъ, или же въ самомъ маломъ количествѣ, и то очень рѣдко. Эта болѣзнь чрезвычайно опасна тѣмъ, что она угрожаетъ воспаленіемъ желудка, а еще болѣе кишекъ, быстро переходящемъ въ смертныя или антоновъ огонь.



Если боль въ животѣ усиливается, или животъ напряженъ, не терпитъ никакого прижатія, если притомъ у больного замѣчается жаръ во всемъ тѣлѣ, слабый, малый, скорый пульсъ: то нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ животѣ произошло воспаленіе. Но если боль въ животѣ вдругъ прекратится, животъ опадетъ, похолодѣетъ, само по себѣ появится воиющее испражненіе низомъ, охладѣютъ руки и ноги, пульсъ сдѣлается едва примѣтимымъ: то вѣроятно, что воспаленіе перешло въ помертвѣніе — и смерть неизбежна; не смотря на то, что больной иногда чувствуетъ себя лучше и какъ бы подаетъ надежду на выздоровленіе.

Причины. Болѣзнь состоитъ въ превратномъ направленіи кишечнаго движенія, которое вмѣсто того, чтобы содержащуюся въ кишкахъ жидкость прогонять книзу, гонитъ ее къверху. Это можетъ произойти отъ запруженія кишечнаго канала затвердѣніемъ скопившимся каломъ, глистами, косточками (особенно сливными, персиковыми, поперечно остановившимся въ кишкахъ), пищею худо-разжеваною, отъ переплетенія кишекъ между собою или вхожденія одной кишки въ другую, отъ суженія кишечнаго канала, заросшенія (у новорожденныхъ дѣтей) задняго прохода, отъ ущемленія грыжи, воспаленія кишекъ, острой, ѣдкой желчи, простуды ногъ и живота.

Леченіе. По причинѣ большой опасности болѣзни, самое посильнѣе приглашеніе врача къ такимъ больнымъ необходимо. При недостаткѣ врача, нужно прежде обратить вниманіе на то: не имѣла ли больной грыжи и не ущемилась ли она у него (см. Грыжа), и потому надобно осмотрѣть пупокъ, пахъ, мошонку, потомъ изслѣдовать: нѣтъ ли у больного воспаленія кишекъ, и если есть, то употребить приличныя слабительныя средства, но не проносныя, которыя могутъ убить больного (см. Воспаленіе кишекъ).

Если нѣтъ ни грыжи, ни воспаленія, то, для уничтоженія запора, больному даютъ свѣжевыжатое льняное масло чрезъ чайную ложку, а въ промежуткахъ вѣнское питье или паливку александрійскаго листа съ горькою солью (№ 7); сильнѣе льнянаго дѣйствуетъ касторовое или клещевинное масло чрезъ чайную ложку. Часто однако всѣ эти средства



извергаются рвотою, для унятія которой принимать шипучіе порошки изъ соды съ лимонною кислотою (№ 37), пить по немногу кислые щи, сельтерскую воду.

Дѣйствительныя внутреннѣе средствъ клистиры, ставимые чрезъ 2—3—4 часа; для этого клистирная жидкость готовится изъ наливки александрійскаго листа съ горькою солью и масломъ, потомъ съ 2—3 унціями уксуса; самыя дѣйствительныя клистиры изъ наливки табаку (№ 38): они сильно дѣйствуютъ на нервы, причиняютъ даже обморокъ, во время котораго часто происходитъ испражненіе нозомъ. Хорошо также дѣйствуетъ холодная вода въ видѣ питья, даже съ кусочками льда, въ видѣ примочекъ на животъ, холодныхъ клистировъ. Наконецъ ненадобно выпускать изъ виду, что при рвотѣ съ запоромъ воспаленіе, если оно и не было сначала, скоро присоединяется и тогда нужно противувоспалительное леченіе.

О запорахъ мочи см. въ Наружныхъ болѣзняхъ.

## КРОВОТЕЧЕНІЯ

§ 64. Если кровь выступаетъ изъ своихъ сосудовъ, уклоняется отъ натурального своего пути, то она или изливается въ какую-либо полость тѣла, или разливается по соседней клетчатой плевѣ, или наконецъ вытекаетъ кнаружи чрезъ разныя отверстія; во всѣхъ этихъ случаяхъ происходитъ кровотеченіе, которое зависитъ, кромѣ ранъ и ушибовъ, или отъ сильнаго напора крови къ какому-либо органу, или же отъ его слабости.

Вообще же причины кровотеченія есть: волненіе крови, усиленное ея обращеніе, какъ то бываетъ при лихорадкахъ, горячкахъ, воспаленіяхъ, при полнокровіи, разгораченіи тѣла спиртными напитками, жаромъ въ банѣ, тельжнымъ движеніемъ (бѣгомъ, танцами), при ветревоженіи человека отъ радости, гнѣва, испуга, огорченій; далѣе восплащенный проходъ крови чрезъ какое-либо мѣсто; такъ у чахотныхъ дѣтей, при несвободномъ проходѣ крови чрезъ грудь, она часто течетъ изъ носа, а потомъ изъ легкихъ; такъ почечуй, мѣсячное кровотеченіе бросаются на легкія,



желудокъ, то мочевой пузырь и производятъ кровохарканіе, кровавую рвоту, испражненіе кровавой мочи; наконецъ кровотеченіе зависитъ отъ слабости тѣла и порчи жидкости самой крови, которая просачивается чрезъ стѣнки своихъ сосудовъ какъ бы чрезъ тряпку; такъ течетъ кровь въ цынгу изъ десенъ, разливается пятнами подъ кожей.

Послѣдствіе кровотеченія зависитъ отъ быстроты и количества истекшей крови: быстрое и изобильное кровотеченіе можетъ мгновенно убить человека, какъ то случается при разрывѣ сердца, большихъ кровяныхъ сосудовъ. Умѣренное, тихое, но часто повторяющееся кровотеченіе влечетъ за собою блѣдность, слабость, водянку. Но кровотеченіе при полнокровіи, воспаленіи, въ горячкахъ и вообще при волненіи крови, бываетъ полезно и замѣняетъ кровопусканіе.

Леченіе кровотеченія болѣе или менѣе подходитъ къ противувоспалительному: совершенное спокойствіе душевное и тѣлесное, прохладное содержаніе въ комнатѣ, пріятное положеніе въ постель, тощая, почти голодная діета, молочная, но не мясная пища, холодная вода съ кислымъ сокомъ, уксусомъ, кровопусканіе, отвлекающія средства (горчичники, муш-ка и пр.) и наконецъ снаружи стягивающія, крѣпительныя холодныя примочки, механическое давленіе, прижатіе. При всякомъ кровотеченіи призывъ врача необходимъ, а тѣмъ болѣе, если оно уже повторялось неоднократно и причинило блѣдность, слабость въ тѣлѣ.

§ 65. Кровотеченіе изъ носа. Признаки кровотеченію изъ носа часто предшествуютъ: тяжесть и боль головы, шумъ въ ушахъ, потемнѣніе или искры въ глазахъ, и потомъ прекращаются послѣ кровотеченія изъ носа, которое притомъ и само по себѣ останавливается. Это кровотеченіе вообще происходитъ при полнокровіи въ голову, случается навъ чаще у дѣтей и юношей, имѣющихъ узкую, сжатую грудь, а потому подверженныхъ несвободному обращенію крови въ лёгкихъ, приливу ея къ головѣ, гдѣ она скопляется, а потомъ излишекъ ея истекаетъ чрезъ носъ. Слѣдственно здѣсь кровотеченіе изъ носа есть благотворное усиліе нашей натуры—врача, меньшимъ зломъ предотвра-



тить большое; такъ же благотворно бываетъ кровотечение изъ носа и при сильномъ судорожномъ кашлѣ у дѣтей, кори, прорѣзываніи зубовъ, воспаленіи въ головѣ; далѣе, кровотечение изъ носа бываетъ слѣдствіемъ остановленнаго почечуя, мѣсячнаго очищенія, раздраженія въ брюхѣ отъ глисть, разгоряченія тѣла, простуды и пр.

**Леченіе.** Вообще не должно торопиться остановленіемъ кровотечения изъ носа, если отъ него не замѣчается явнаго вреда—блѣдности, головокруженія, звона въ ушахъ, обморока, и если, напротивъ того, проходитъ тяжесть и боль головы: здѣсь неумѣстное остановленіе кровотечения можетъ быть причиною слѣпоты, глухоты, воспаленія въ мозгъ, пострѣла, паралича. Но когда больной начинаетъ блѣднѣть, получаетъ головокруженіе, падаетъ въ обморокъ, имѣетъ слабый, малый пульсъ, холодныя руки, страдаетъ цынгою, явственно слабъ, то кровотечение изъ носа нужно остановить. Средства для этого суть: поднятіе рукъ къверху такъ, чтобы ладонями охватить затылокъ, опрыскиваніе и обмываніе лица холодною водою, втягиваніе и впрыскиваніе въ носъ холодной воды, простой или смѣшанной съ уксусомъ, малою дозою спирта или водки, съ растворомъ квасцовъ, желѣзнаго купороса, отвара дубовой, ивовой корки, теплыя ванны съ золою и горчицею рукъ и ногъ, жеваніе куска дерева, пробки, бумаги, холодныя примочки ко всей головѣ, также къ второднымъ частямъ, горяччикъ на затылокъ, хрящовникъ на переднее плечо у кисти руки; въ крайности нужно вложить въ носъ свертокъ корпін, намоченный въ растворъ квасцовъ или желѣзнаго купороса, въ отваръ дубовой корки: внутрь больному давать кремортартаръ въ питье, селитру, воду съ уксусомъ, и во все время кровотечения вѣлѣтъ ему сидѣть наклонивъ голову къ груди, чтобы кровь не потекла въ гортань, или горло, и не причинила кашля, тошноты, рвоты.

§ 66. Кровохарканіе. Признаки: кровь извергается съ кашлемъ, или только при харканіи или плеваніи; въ первомъ случаѣ она вытекаетъ изъ легкихъ, а во второмъ изъ гортани, горла, рта, носа.

Кровохарканіе имѣетъ разныя степени. Въ легкой сте-



пени, безъ всякихъ предшедшихъ припадковъ въ груди, вдругъ при кашлѣ съ харкотиною выходитъ кровь въ небольшомъ количествѣ; а потомъ скоро кровохарканіе прекращается, не оставляя послѣ себя никакихъ припадковъ ни въ груди, ни вообще въ тѣлѣ больного. Сильнѣйшая степень отличается тѣмъ, что больной, еще до появленія кровохарканія, чувствуетъ соленый вкусъ во рту, шекотаніе въ горлѣ и груди, сухой кашель, перхоту, ознобъ, тяжесть въ груди, давленіе; потомъ появляется кашель съ кровью красною, черною, пѣнистою, густою, въ разномъ количествѣ, отъ столовой ложки, до чайной чашки и болѣе, причемъ замѣчается у больного блѣдное лице, скорый, неправильный пульсъ, несвободное дыханіе; кровохарканіе продолжается  $\frac{1}{2}$  — 1 часъ, потомъ прекращается и опять возвращается чрезъ нѣсколько часовъ; въпрочемъ, и по прекращеніи кровохарканія, остается одышка, перхота, сухой кашель, тяжесть въ груди. Въ высшей степени кровохарканія, больной чувствуетъ тоску, стѣсненіе въ груди, имѣетъ трудное дыханіе, холодныя руки, тѣло его обливается холоднымъ потомъ, съ кашлемъ извергается чистая кровь; несмотря на прекратившееся пока кровохарканіе, сильныя грудныя припадки не проходятъ; присемъ вообще замѣчается чахотное устройство груди.

Кровохарканіе вообще очень важная болѣзнь, но не сама по себѣ, а по своимъ послѣдствіямъ. Количество отхаркиваемой крови ничего особеннаго не означаетъ; главное дѣло состоитъ въ причинѣ кровохарканія: больной безопасно можетъ выхаркивать кровь чашками, если только его грудь хорошо устроена и кровохарканіе зависитъ отъ почечуя, мѣсячнаго очищенія; но при чахотномъ расположеніи тѣла и небольшое кровохарканіе можетъ причинить смерть — воспаленіемъ легкихъ, а потомъ чахоткою. Впрочемъ, изліяніе крови въ легкія въ большомъ количествѣ можетъ вдругъ задушить больного. Свѣтлоокрасный цвѣтъ жидкой крови означаетъ свѣжее, недавнее ея отдѣленіе изъ легочныхъ сосудовъ, но темная, черная, густая, спекшаяся кровь, указываетъ, что она, цзлившись изъ сосудовъ, долго оставалась въ легкихъ.



**Причины.** Самая обыкновенная и страшная причина кровохарканія есть чахотное устройство груди, или уже находящаяся чахотка. Далее, причинами кровохарканія бывают: танцы, бѣгъ или загонъ, спиртные напитки, страсти, особенно гнѣвъ, горестъ, страхъ, несчастная любовь, вѣтлн- ній зной (лѣтомъ, въ банѣ), частый крикъ, громкое чтение, декламація (кровохарканіе у актѣровъ), пѣніе, игра на ду- ховыхъ инструментахъ, сотрясенія груди отъ ударовъ, толч- ковъ, сквозныя раны груди, вдыханіе острыхъ газовъ, испорченнаго воздуха, остановившееся теченіе почечуя, мѣ- сячныхъ кровей, сокрытіе кори на лѣгкя, воспаленіе лѣг- кихъ, легочныя бугорки, цынга.

**Лечение.** Больной долженъ быть сколько возможно спо- коенъ духомъ и тѣломъ, говорить только шопотомъ, или же писать на бумагѣ и то кратко и только самое необходи- мое; въ его комнату и въ сосѣдствѣ должно быть тихо, въ комнатѣ полутемно и прохладно; даде нужны: полуси- дячее положеніе въ постель, съ наклоненіемъ головы впе- реди, для питья холодная вода съ кислымъ сокомъ, под- слащенная медомъ, сахаромъ, сиропомъ вишневымъ или малиновымъ; для пищи: жидкая, молочная каша, уха, пе- ченые яблоки; для свободнаго испражненія низомъ клисти- ры, горькая вода или соль, касторовое, льняное масло на пріемъ по ложкѣ, и наконецъ, когда не унимается кровохар- каніе въ теченіе 1—2 часовъ, то необходимо кровопусканіе изъ руки. Кровохарканіе иногда скоро останавливается отъ поваренной соли, которую въ порошокъ чрезъ каждую  $\frac{1}{4}$  часа всыпаютъ въ ротъ больному по чайной ложкѣ и за- ставляютъ его проглатывать съ водою.

Если кровохарканіе появляется у крѣпкаго, молодаго, полнокровнаго челоука, послѣ прекращенія другаго крово- теченія (изъ носа, почечуя и пр.), послѣ разгоряченія тѣла, удара въ грудь, паденія съ высоты, раздавленія груди брев- номъ, тѣлгою, кулемъ муки, овса, обрушившеюся землею и проч.; если притомъ у больного замѣчается жаръ, жажда, тоска, тяжесть въ груди, полный, твердый пульсъ: то, кромѣ сказанныхъ средствъ, кровопусканіе, даже пов- торительное, необходимо и, сверхъ того, внутрь селитра съ



кремортартаромъ (№ 5), наперсточная трава (№ 39) въ отварѣ льняныхъ сѣмянъ, просвирокъ, въ маковомъ, конопляномъ, миндальномъ молокѣ (№ 39) съ медомъ, сахаромъ, свислое положеніе ногъ, ножныя ванны, пѣвицы къ груди.

Но если больной слабкаго, рыхлаго тѣлосложенія, тученъ или чахотенъ, если у него замѣчается блѣдное лице, слабый пульсъ, холодныя руки и ноги, частый кашель и постоянная перхота, если кровохарканіе есть слѣдствіе ушиба груди: то, послѣ кровопусканія изъ руки, нужно растирать руки и ноги суконкою, щеткою, прикладывать къ нимъ горчичники, горячіе кирпичи, кувшины съ горячею водою, а грудь покрывать холодными примочками, больного держать въ прохладной комнатѣ съ обнаженною грудью, внутрь давать сыворотку съ квасцами (№ 40), отваръ хины, поватренную соль по чайной ложкѣ.

Кровохарканіе, разъ появившееся, легко возвращается, притомъ оно часто оставляетъ послѣ себя воспаленіе, которое съ своей стороны опять причиняетъ другія болѣзни — нарывъ, бугорки въ лёгкихъ. Посему, если по прекращеніи кровохарканія, продолжается боль въ груди, жаръ въ тѣлѣ, сухой кашель, то нужно продолжить сказанное содержаніе больного и противувоспалительное леченіе, — пѣвицы къ груди, мушку, внутрь селитру, слабительное изъ горькой соли съ кремортартаромъ; а когда исчезнуть все признаки страданія въ груди, то, для освобожденія лёгкихъ отъ остатковъ излившейся въ нихъ крови, больной долженъ пить сладкую сыворотку, зельтерскую воду съ молокомъ ослицы или козы.

По прошествіи трехъ недѣль послѣ кровохарканія, больного, неимѣющаго теперь ни кашля, ни перхоты, ни тяжести въ груди, дышущаго притомъ свободно, можно считать безопаснымъ отъ чахотки, но не отъ возврата кровохарканія, а потому онъ еще долго долженъ избѣгать всего того, что разгорячаетъ тѣло, ускоряетъ дыханіе, производитъ одышку.

Плеваніе кровью безопасно: здѣсь кровь, истекшая изъ десенъ, зубовъ, носа, глотки, безъ кашля; оно зависитъ отъ порчи зуба, нарыва на деснахъ, щекахъ, почечуя.



цынги; употребленія ртути; кровь, наконецъ отдѣляется по утрамъ. Здѣсь нужно удалить причину кровоизліянія, которое легко проходитъ отъ полосканія рта наливкою шампеля съ уксусомъ, отваромъ дубовой коры, съ квасцами, хрѣновымъ виномъ.

§ 67. Кровавая рвота.—Признаки: безпокойство, то-ска, опухоль и боль подъ ложечкою, чувство великой слабости, круженіе головы, обмороки, блѣдное, впалое лице, сулороги, слабый, прерывистый пульсъ, тошнота и рвота кровью свѣтлою, темною, жидкою, створожившеюся, чистою, смѣшанною съ пищею, слизью, желчью; рвота повторяется въ день 2—3 раза и продолжается нѣсколько дней подрядъ, совсѣмъ прекращается на нѣкоторое время и опять возвращается; послѣ рвоты кровью происходитъ испражненіе низомъ темною, спекшеюся кровью.

Причины. Кровавая рвота, наконецъ есть слѣдствіе остановленнаго почечуя, мѣсячнаго кровоочищенія, а потому и замѣчается у пожилыхъ людей; далѣе, она бызаетъ при ранахъ, язвахъ, отрѣдѣніи (ракъ) желудка, завалѣ печени и селезенки (послѣ продолжительныхъ перемежающихся лихорадокъ); при изліяніи въ желудокъ острой желчи; послѣ ударовъ въ животъ, поглощенія шпильки, стекла, ножа, иглы, острыхъ ядовъ, сильныхъ рвотныхъ, и слабительныхъ лекарствъ въ высшей степени цынги—при разложе-ніи крови.

Кровавая рвота вообще есть опасная болѣзнь, особенно если при ней замѣчается лихорадка и у больного и самая рвота возвращается часто: чрезъ 3—4 часа, если она зависитъ отъ ранъ, язвъ, ушиба, острыхъ ядовъ; не такъ опасна кровавая рвота, зависящая отъ остановленія почечуя, мѣсячнаго очищенія.

Леченіе. Всё то, что относительно содержанія больного сказано при кровохарканіи, полезно и при кровавой рвотѣ, исключая, что при послѣдней больной можетъ говорить громко. Сверхъ того, вначалѣ рвоты внутрь давать больному побольше пить отваръ изъ ячнхъ, овсяныхъ крупъ, корня просвиры, вишневой, аравійской камеди съ кислымъ сокомъ, кремортартаромъ, тамврандами, уксусомъ, также



по очереди съ тѣмъ питьемъ давать маковое конопляное, липдальное молоко (оршадъ); противъ желудка на ложечку класть холодныя примочки съ уксусомъ, горчичники на икры, плечи, ставить смягчительныя клистиры, дѣлать ножныя ванны. Если рвотою извергается много крови, больной падаетъ въ обморокъ, получаетъ судороги, то приглашеніе врача необходимо, а между тѣмъ больному давать, чрезъ чашу по ложкѣ, сыворотку съ квасами поочередно съ реверсеговою микстурою (№ 40, № 2), для питья холодную воду, даже кусочки льду, холодныя примочки на желудокъ, растиранія и нагрѣванія рукъ и ногъ. Если больной полнокровентъ, имѣетъ лихорадку, боль въ животѣ, то кровопусканіе, пиявицы къ сторонѣ ложечки и потомъ припарки; а когда рвота зависитъ отъ остановленія почечуя, месячнаго очищенія, то пиявицы къ заднему проходу, кружаву матки, а потомъ теплыя смягчительныя припарки къ симъ же мѣстамъ.

По прекращеніи кровавой рвоты, нужно еще 1—2 недели употреблять легкія слабительныя изъ таминаръ, черносливъ, сваренныхъ въ сывороткѣ, и клистиры для освобожденія кишекъ отъ оставшейся въ нихъ крови, и тогда не быть ничего твѣрдаго.

§ 68. Почечуй, геморрой.—Почечуй есть самая частая болѣзнь, особенно между городскими жителями, учеными, богатыми людьми, но у крестьянъ встрѣчается очень рѣдко. Онъ обозначается разными сначала внутренними припадками, а потомъ и наружными явленіями. Внутренніе припадки суть разныя страданія брюха, а наружныя—шишки около задняго прохода, теченіе изъ него крови, слизи. Почечуйное кровотеченіе есть какъ бы переломъ, рѣшеніе внутренняго почечуя, который однако хотя чрезъ то и облегчаетъ больного, но совсѣмъ не проходитъ и потому кровотеченіе опять появляется чрезъ нѣсколько времени, и притомъ нерѣдко въ правильные сроки, помѣсячно, по третямъ года, словомъ, періодически, или же и безъ всякаго порядка. Далѣе, почечуй есть самая продолжительная болѣзнь: разъ появившись, онъ остается уже на всю жизнь больного, излечивается же чрезвычайно рѣдко, и то когда



онъ ненаслѣдственъ, недавенъ и когда его причину—образъ жизни—можно удалить. Къ счастью, почечуй самъ по себѣ не опасенъ, но онъ можетъ причинить изнурительное кровотечение, броситься на благородные органы тѣла, быть причиною разныхъ другихъ хроническихъ опасныхъ болѣзней, въ которыхъ появленіе почечуйнаго кровотечения часто уничтожаетъ грозящую опасность и доставляетъ большое облегченіе больнымъ.

Почечуй, составляя причину множества другихъ болѣзней, и самъ по себѣ является въ различныхъ видахъ: какъ внутреннее страданіе, какъ недугъ прямой кишки, какъ скрывшійся, неправильный почечуй и пр.

1) Внутренній почечуй; расположеніе къ почечую; предвѣстіе почечуя. Его признаки: частая боль въ поясницѣ, крестцѣ, животѣ, затылкѣ, бедрахъ въ видѣ лома, стрѣльбы; чувство полноты, тяжести въ животѣ, полноты и давленія въ заднемъ проходѣ; рѣдкое, неправильное испражненіе жесткимъ, сухимъ каломъ въ видѣ катышковъ, или шариковъ; жжение, натугъ, жжение, зудъ въ заднемъ проходѣ; сынь около прохода, въ промежности, на втородныхъ частяхъ; опухоли и шишки у прохода; частый позывъ къ испусканію мочи, которая притомъ причиняетъ жжение въ мочево́мъ каналѣ и головкѣ уда, истекаетъ съ трудомъ и совсѣмъ задерживаются; присесть замѣчаются часто приливы крови къ лёгкимъ, (одышка, колотье), къ желудку (тошнота и боль подъ ложечкою), къ печени (боль и напряженіе подъ правымъ подреберьемъ), къ головѣ (боль особенно въ затылкѣ, тяжесть, круженіе головы, пятна предъ глазами). Всѣ эти припадки означаютъ начало развитія почечуя, который только въ этомъ періодѣ можно иногда излечить, или по крайней мѣрѣ ограничить въ дѣйствіи развитіи.

Причины. Сущность почечуя состоитъ въ излишнемъ накопленіи крови въ брюшныхъ сосудахъ и особенно въ вѣнахъ прямой кишки, въ воротной вѣнѣ и вообще въ вѣнахъ кишечныхъ. Это брюшное полнокроеіе есть слѣдствіе, съ одной стороны, большаго притока крови къ брюшнымъ внутренностямъ, а съ другой, затрудненнаго выхода крови



изъ брюшныхъ сосудовъ. Первое происходитъ отъ невоздержности въ пищу и питье, отъ острой, праной, солёной, жирной, мясной пищи, которая для сваренія требуетъ усиленной дѣятельности желудка и кишекъ; а съѣсть вмѣстѣ и большого притеченія къ нимъ крови; эта кровь по окончаніи пищеваренія не вся возвращается въ свои мѣста, а остается въ брюхѣ въ небольшомъ количествѣ, которое, при возвратѣ подобныхъ приливовъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, увеличивается до значительной степени; съ другой стороны, сидячая жизнь, согбенное положеніе тѣла при разныхъ занятіяхъ ученыхъ, канцелярскихъ, ремесленничьихъ, стѣсняя брюхо, препятствуютъ выходу крови изъ его сосудовъ. Такимъ образомъ усиленный приливъ и воспаленный отливъ крови производятъ брюшное полнокровіе или почечуй; кровь, съ трудомъ вытѣкающая въ брюшныхъ сосудахъ, распираетъ ихъ, бросается къ разнымъ органамъ и причиняетъ многія болѣзни; а именно: мѣстныя: — припухлость прямой кишки, расширение ея (почечуйныхъ) венъ, кровотеченіе изъ задняго прохода (которое, уменьшая брюшное полнокровіе, чрезъ то самое облегчаетъ и почечуйнаго страдальца), запоры на низъ, разстройство пищеваренія, поношечита, развитіе кислоты въ желудкѣ, а чрезъ то болѣи судороги въ немъ, рѣзъ въ животѣ, понось, истеченіе слизи изъ задняго прохода (слизистый почечуй), изъ мочевого пузыря. Общія болѣзни отъ почечуй суть: апнохондрія, судороги, дурнота, головокруженіе, обмороки, слабость зрѣнія, пострѣлъ, параличъ, усиленное бѣненіе сердца, удушье, кровахарканіе, кровотеченіе изъ матки, мочевого пузыря (кровавая моча), носа, кровавая рвота, бѣли, разныя упорныя сыпи, особенно лишайныя, на крестцѣ, около задняго прохода, на дѣтородныхъ частяхъ, язвы; притомъ застоившаяся въ брюхѣ кровь необходимо портится и дѣлается острою, причиняя сказанныя сыпи и нестерпимый зудъ въ заднемъ проходѣ, въ промежности и даже во всей кожѣ.

Леченіе можетъ быти двоякое: коренное — съ цѣлію со всѣмъ уничтожить почечуй, и припадочное — способствовать появленію почечуйнаго кровотеченія, которое скоро облегчаетъ больного и, такъ сказать, выводитъ съ собою мно-



жество болѣзней. Хотя почечуйное кровотеченіе есть тягостный и даже подчасъ опасный припадокъ, но оно легко превращается въ привычку, терлеть свой опасный вилтъ, а потомъ, при невозможности кореннаго излеченія почечуя, нужно прибѣгать къ открытію почечуя, особенно когда онъ, будучи закрытъ, причиняетъ опасную болѣзнь.

Брюшное полнокровіе, какъ ближайшая причина внутренняго почечуя, можетъ быть уничтожено, или по крайней мѣрѣ ограничено: 1) если человекъ перестаетъ употреблять вышесказанную пищу и горячительные напитки—водку, крепкія красныя вина, и станетъ избѣгать сидячаго положенія съ наклоненнымъ къ груди тѣломъ, положенными накрестъ ногами, и будетъ умѣрять въ удовлетвореніи плотской похоти; 2) если онъ будетъ облегчать кровообращеніе въ брюхѣ частымъ движеніемъ пѣшкомъ, верхомъ, дѣлая это постоянно ежедневно въ извѣстные часы по утру и въ вечеру; 3) если онъ, лежа на спинѣ, также въ ваннѣ, банѣ, постоянно будетъ разтирать и разминать свой животъ и 4) если, наконецъ, будетъ стараться о ежедневномъ по утрамъ свободномъ испраженіи низомъ, приличною діетою и лекарствами. О первой діетѣ сказано при почечуйномъ расположеніи (см. Гигіену). Лучшія и безвредныя лекарства въ семъ случаѣ суть: вытяжка пирея, одуванчика, цикорія, рѣпный, морковный сокъ, сыворотка, кремортартаръ съ поташемъ (№ 11), и съра; последняя есть самое дѣйствительное, единственное средство въ почечуѣ; она дѣйствуетъ на толстыя кишки и особенно на прямую, возбуждаетъ дѣятельность ея почечуйныхъ сосудовъ и разгоняетъ застоявшуюся въ нихъ кровь. Лучше всего съру въ порошокъ, въ водѣ ея цвѣтовъ, употреблять вмѣстѣ съ кремортартаромъ, магнезією, а для слабыхъ людей съ шинучимъ порошокомъ (№ 42—43); эти средства нужно употреблять постоянно и долго: вытяжки 2—3 мѣсяца, а съру 1—2 недѣли. Какъ слабительное, можно употреблять льняное, касторовое (клешевиное) масло, но отсюда не сабуръ (aloe), который усиливаетъ полискровіе въ брюхѣ и насильственно открываетъ почечуйное кровотеченіе. При слабости задняго прохода полезны: купанье въ рѣкѣ, холодныя клистиры. Сверхъ всего этого, очень по-



лезно, въ теченіе 2—3 мѣсяцовъ, пить ежедневно по утру и въ вечеру холодный чай изъ травы тысячелистника. Если при почечуѣ находятся и завалы брюшныхъ внутренностей, то особенно полезны разныя стрѣныя воды: кавказскія, сергѣевскія, карльсбадскія.

Если можно быть увѣреннымъ, что разныя припадки и упомянутыя выше болѣзни происходятъ отъ почечуя, то стараются способствовать появленію почечуйнаго кровотеченія чрезъ задній проходъ. Это леченіе рѣдко достигаетъ своей цѣли и его всегда нужно предоставить врачу, подъ надзоромъ котораго можно, впрочемъ, для сего употреблять слѣдующія средства: теплыя пожныя ванны и полуванны, теплыя припарки и примочки къ заднему проходу, смягчительныя клистиры, масляныя втиранія въ нижнюю часть живота, въ срамную промежность, около прохода, пиявы и рожки вокругъ прохода. Внутреннія средства, способствующія открытію почечуйнаго кровотеченія, по причинѣ слабнаго ихъ дѣйствія, мы предоставляемъ врачу. Мѣстное леченіе почечуя, какъ закрытаго въ видѣ шишечки, опухлей около прохода, такъ и открытаго въ видѣ кровотеченія, изложено въ отдѣлѣ. О наружныхъ болѣзняхъ въ особенности.

§ 69. Неправильный почечуй — Почечуй, какъ слѣдствіе брюшнаго полнокровія, происходитъ въ кровяныхъ сосудахъ прямой заднепроходной кишки т. е. отворяющійся въ задній проходъ; эти сосуды проходной кишки отъ того и называются почечуйными. Но брюшное полнокровіе можетъ переходить съ одного мѣста на другое — броситься, какъ говорятъ, на мочевою пузырь, матку, желудокъ, другія кишки, на печень, легкія, въ голову и пр. и причинять множество болѣзней, которыхъ распознаваніе, а слѣдственно и леченіе очень затруднительно, и мы его предоставляемъ опытному врачу.

Самый частый изъ такихъ неправильныхъ почечуевъ есть почечуй мочеваго пузыря, гдѣ онъ бываетъ также внутреннимъ — закрытымъ и наружнымъ — текущимъ. Внутренній почечуй мочеваго пузыря обозначается чувствомъ тяжести въ нижней и передней части брюха, частымъ позывомъ къ испражненію мочи, зудомъ и жаромъ въ мочевоомъ каналѣ и въ головкѣ уда; потомъ появляются сильныя боли



въ мочевомъ пузырьѣ съ труднымъ испражненіемъ и даже задержаніемъ мочи.

При текущемъ почечуѣ, посатъ припадковъ страданія мочевого пузыря, испражняемая моча бываетъ смѣшана съ кровью, то жидкою, то створоженною. Текущій почечуѣ опасенъ тѣмъ, что комки крови могутъ запрудить мочевый каналъ, мочеточники, запереть мочу и служить основаніемъ мочевыхъ камней.

Мочевой пузырь при почечуѣ подвергается такому же измѣненію, какъ и прямая кишка, т. е. его сосуды слишкомъ наполняются кровью, расширяются, сжимаются, отверзтіе пузыря, раскрываются въ его полость или производятъ нарывы въ промежности. Распознать внутренній почечуѣ пузыря очень трудно: его легко можно смѣшать съ каменною, любовою (особенно при переломѣ) болѣзнию пузыря. Здѣсь призываетъ врача также необходимо, а между тѣмъ, нужно обращать вниманіе: не страдалъ ли больной прежде настоящимъ почечуемъ, не возвращаются ли его припадки периодически.

Все, что мы можемъ совѣтовать при леченіи сего почечуя, состоитъ въ припускѣ пиявицъ къ заднему проходу, къ промежности, лобковой сторонѣ, въ промываніи сихъ мѣстъ холодною водою, въ прикладываніи къ нимъ смягчительныхъ припарокъ, въ втираніи въ нихъ масла, въ достаточномъ питъѣ слизистаго отвара изъ перловыхъ, ячневыхъ, овсяныхъ крупъ, корня просвиры, вишневой камеди, коноплянаго, маковаго, миндалянаго молока, въ направленіи смягчительныхъ паровъ на нижнюю часть живота, въ теплыхъ ваннахъ съ отрубями. Запоръ мочи требуетъ постановленія клистира и приглашеніе врача дѣлаетъ необходимымъ. Присесть вообще нужно замѣтить, что во всѣхъ видахъ неправильнаго почечуя припускъ пиявицъ къ заднему проходу дѣйствительно кровопусканіе.

Далѣе, почечуѣ бываетъ неправильный тѣмъ, что, вмѣсто крови, изъ задняго прохода вытекаетъ слизь, которая можетъ испражняться и съ мочою и вытекать въ видѣ бѣлей изъ маточнаго рукава. Этотъ слизистый почечуѣ причиняетъ жаръ, зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ, въ мо-



челомъ пузырь, каналъ, частый позывъ къ испражненію мочи и кака, при которомъ чувствуется жжение въ проходѣ и рѣзъ въ каналѣ. Слизистый почечуй рѣдко бываетъ самостоятеленъ, но оцъ или предшествуетъ появленію почечуйнаго кровотеченія, или есть слѣдствіе послѣдняго, и въ такомъ случаѣ много способствуетъ разрѣшенію опухшей прямой кишки. Впрочемъ, у людей тучныхъ, рыхлыхъ, блѣдныхъ, флегматиковъ, слизистый почечуй можетъ быть и самостоятеленъ, безъ кроваваго почечуя, или какъ припадокъ внутренней, застарѣлой, любострастной болѣзни.

Леченіе слизистаго почечуя должно состоять въ употребленіи нашатырной микстуры (№ 11), холодной наливки изъ травы тысячелистника, какъ сказано выше, въ обмываніи нижней части живота холодною водою, въ купаніи въ рѣкъ, въ морь и въ употребленіи холодныхъ минеральныхъ водъ.

§ 70. Кровавая моча, кровотеченіе. — Признаки: съ мочею испражняется кровь, которая притомъ, если очень тѣсно смѣшана съ мочею, сообщаетъ ей темный цвѣтъ, при стоянн моча отъ нея не отдѣляется и означаетъ кровотеченіе изъ почекъ; или же кровь въ мочѣ раздѣлена неравномерно и при стоянн мочи легко и скоро осѣдаетъ на дно сосуда и показываетъ кровотеченіе изъ мочеваго пузыря, либо, наконецъ, кровь отдѣляется изъ мочеваго канала, почти не смѣшивается съ мочею и течетъ по окончаніи мочеиспусканія. Каждое изъ этихъ кровотеченій опасно тѣмъ, что угрожаетъ воспаленіемъ кровоточиваго мѣста, можетъ закупорить кровяными свѣтками мочевые протоки, задержать мочу, подать поводъ къ происхожденію мочевыхъ камней.

Причины. Кровотеченіе изъ почекъ можетъ происходить отъ почечныхъ камней, нарывовъ въ почкахъ, ушибовъ въ почечную сторону, сотрясеній поясницы верховой ѣздою, отъ поднятія большихъ тяжестей, неумѣреннаго совокупленія, неосторожнаго употребленія мочегонныхъ средствъ — испанскихъ мушекъ, скипидара, мочегоннаго янтарнаго масла, отъ цынготнаго разрѣшенія крови, старости, отъ остановившагося почечуя и пр. Пузырное кровотеченіе бываетъ



припадкомъ неправильнаго почечуя, бросившагося на пузырь, мочевыхъ камней, нарывовъ и язвъ въ пузырь; мочеканальное кровотеченіе зависитъ отъ тѣхъ причинъ, что и пузырьное, и сверхъ того оно часто случается при любострастномъ переломѣ.

Леченіе почти то же, что и при почечуѣ мочевого пузыря. При кровотеченіи изъ почекъ съ болью, жаромъ, послѣ ушиба поясницы, сотрясенія брюха—появицы къ сторонамъ почекъ, т. е. къ поясницѣ подъ ребрами близъ спины, примочки, селитра, конопляное, миндальное, маковое молоко. При кровотеченіи отъ шпанскихъ мушекъ—то же молоко, особенно маковое съ камфорою (№ 44), питье изъ отвара льняныхъ сѣмянъ, овсяныхъ, ячменныхъ крупъ, порошки изъ селитры съ кремортартаромъ. При цынготномъ кровотеченіи—холодное, кислое питье, свѣжій воздухъ, противуцынготная діета и пр. Вообще же при всякомъ кровотеченіи полезно принимать поутру и въ вечеру по столовой ложкѣ миндальнаго, льнянаго или маковаго масла.

Кромѣ кровотеченія, тѣло наше подвергается болѣзненной потерѣ и другихъ соковъ, которыхъ утрата хотя и не такъ важна, по крайней мѣрѣ не такъ скоро опасна, какъ крови, но тѣмъ не менѣе и она имѣетъ вліяніе на здоровье и можетъ причинить смерть. Сюда относятся болѣзненный потъ, слинотеченіе, поносъ, мочеизнуреніе, задержаніе мочи, перелой, бѣли и пр.

§ 71. Болѣзненный потъ рѣдко бываетъ самостоятельной болѣзнью, а обыкновенно онъ составляетъ припадокъ другихъ болѣзней. Онъ замѣчается въ послѣднемъ періодѣ чахотки, въ изнурительной лихорадкѣ, въ высшей степени цынгы, перемежающейся лихорадки, и вообще въ болѣзняхъ, произведшихъ общую слабость въ тѣлѣ и изнуреніе: въ просовидной сипи, также у женщинъ въ первый годъ послѣ прекращенія мѣсячныхъ кровей, у людей нѣжныхъ, чувствительныхъ, рыхлыхъ, тучныхъ, тяжелыхъ въ движеніи; у такихъ людей противной потъ выступаетъ при малѣйшемъ движеніи, тепломъ питьѣ, въ постель, въ теплой комнатѣ. Болѣзненный потъ бываетъ холодный, клейкій и часто такъ обилень, что проникаетъ все платье и



постель больного, красить его бѣлье, распространяетъ особенный, непріятный, кислый запахъ. Онъ сильно ослабляетъ тѣло, особенно неполносочное, худощавое, и влечетъ за собою изнуреніе. — Причина пота состоитъ въ слабости тѣла вообще и кожи въ особенности, въ усиленномъ приливѣ соковъ къ кожѣ, въ раздраженіи, растворѣ крови и соковъ.

Леченіе болѣзненнаго пота зависитъ отъ излеченія той болѣзни, которой онъ есть припадокъ; поэтому, сильнопотѣющіе люди должны прибѣгать къ совѣту врача. Впрочемъ, собственно противъ потѣнія похваляются: соляная, серная, кислота и квасцы; употреблять эти средства нужно по назначенію врача. Холодная наливка въ водѣ или настойка въ винѣ шалфея считаются особенно дѣйствительнымъ средствомъ въ потѣ. Омовеніе тѣла холодною водою съ уксусомъ, соляною кислотою (2—3 унціи кислоты на ведро воды), купанье въ рѣкѣ, морѣ, холодныя ванны простыя и девыя, кислыя; желѣзныя минеральныя воды (кавказскій нарзанъ) также очень дѣйствительны въ умѣреніи пота, нужно только ихъ употреблять тогда, когда тѣло не разгорачено и не потѣетъ.

Чаще случается мѣстный потъ на ногахъ, рукахъ, подъ мышками, на дѣтородныхъ частяхъ. Онъ отличается непріятнымъ запахомъ и причиняетъ погрѣлость; его легко остановить холодною водою съ уксусомъ, квасцами, но это часто можетъ быть опасно тѣмъ, что послѣ такой остановки пота появляется слѣпота, глухота, параличъ, чахотка, одышка и пр. Гораздо безопаснѣе сильнопотѣющія мѣста обмывать слегка холодною наливкою изъ ромашки, шалфея, а для уничтоженія непріятнаго запаха, обмывать ихъ хлориною водою; для безопаснаго уничтоженія ночнаго пота совѣтуютъ носить чулки, напитанные спиртнымъ растворомъ резинки и потомъ высушенные.

§ 72. Слюнотеченіе. — Признаки: припухлость десенъ, подъязычныхъ желѣзъ, чувство полноты во рту, трудное жеваніе, обильное отдѣленіе густой, вязкой, клейкой, то свѣтлой, то мутной слины, съ трудомъ отплевываемой, гнущейся длинными нитями, непріятный запахъ изо рта,



шаткость зубовъ, кровоточивость десенъ. Такъ-какъ слюна необходима для раствора сухой пищи при жеваніи, а чрезъ то и для пищеваренія и питанія, то обильное и продолжительное отдѣленіе слюны вообще вредить здоровью и можетъ быть причиною изнуренія.

Слюнотеченіе чаще всего есть припадокъ неумѣреннаго внутренняго и наружнаго (посредствомъ втиранія ртутной мази) употребленія ртути; также оно замѣчается въ высшей степени цынги, водобоязни, при заваляхъ брюшныхъ внутренностей, въ некоторыхъ горячкахъ, какъ ихъ переломъ, зависитъ отъ раздраженія слюнныхъ желѣзъ куреніемъ, жеваніемъ табаку, отъ дурной привычки часто плевать.

Ртутное слюнотеченіе излечивается повторительнымъ употребленіемъ слабительныхъ (изъ сыры съ кремортартаромъ и ревенемъ), теплыми ваннами простыми и сърыми (съ сърыною печенкою), отрубями; при боли и опухоли во рту—теплымъ полосканьемъ изъ наливки льнянаго сѣмени, корня просвиры съ медомъ, а потомъ отваромъ дубовой, хинной, ивовой коры съ квасцами и хвѣновымъ виномъ, спиртомъ ложечной травы (*M* 45); последнее полосканье также дѣйствительно и при цынготномъ слюнотеченіи, равно какъ и зависящемъ отъ брюшныхъ заваловъ.

§ 73. Недержаніе мочи.—Признаки: моча истекаетъ произвольно и притомъ или безпрестанно по каплямъ (совершенное недержаніе мочи), или же только при побужденіи мочиться, которое, впрочемъ, происходитъ вдругъ и бываетъ такъ сильно, что больной не можетъ его остановить и принужденъ мочиться въ постель, въ комнату, въ бѣль (несовершенное недержаніе мочи), или, наконецъ, больной мочится во снѣ въ постель.

Причины. Безпрерывное истеченіе мочи по каплямъ зависитъ отъ раскрытія отверстія мочевого пузыря и есть признакъ его паралича, который можетъ быть слѣдствіемъ трудныхъ родовъ у женщинъ, ушибовъ нижней части брюха, спины, крестца, спинной сухотки, расширенія мочевого пузыря отъ частаго и продолжительнаго задержанія мочи; также остается послѣ вырѣзыванія мочевого камня, и появляется у стариковъ отъ слабости, а у молодыхъ людей



отъ распутной жизни, любострастной болѣзни, мочевыхъ камней. Временное, произвольное (несовершенное) истечение мочи зависитъ отъ раздраженія пузыря мочевымъ камнемъ, пескомъ, острою мочою, глистами, особенно мелкими, гнѣздящимися у дѣтей въ прямой кишкѣ, приливомъ къ пузырю почечуйной, мѣсячной крови; оно также происходитъ отъ окръпlosti стѣнокъ пузыря, отвердѣній и опухолей прямой кишки, отъ наклоненія матки впередъ или опаденія ея книзу, отъ язвъ и свищей въ пузырь, равно какъ и отъ прижатія пузыря беременною маткою, опухолями въ животѣ, отъ привычки часто мочиться, слѣдствіемъ которой бываетъ суженіе пузыря и неспособность удерживать большое количество мочи.

Леченіе рѣдко удается, особенно у пожилыхъ людей. Впрочемъ, для сего употребляютъ разныя кровеостанавливающія средства внутри и снаружи: хинная, дубовая, ивовая корка, желѣзный купоросъ, квасцы въ видѣ отвара, примочки, холодныя ванны, простыя, дождевыя, съ направлениемъ дождевой струи на промежность, а сверху на лобокъ, холодныя, желѣзныя минеральныя воды. Для опрятности, больной долженъ посѣть мышечекъ изъ кожи, или пузыря, въ которомъ бы собиралась истекающая моча; для чего въ отверстіи такого мышечка слегка укрѣпляется головка ствoda, а мышокъ помѣщается между бедеръ близъ мошонки и тесемкою привязывается къ пахамъ.

Несовершенное недержаніе мочи излечивается чрезъ удаленіе его причинъ: неправильнаго почечуя, мѣсячныхъ кровей, глисть, завазовъ внутренностей; но самое леченіе нужно производить подъ надзоромъ врача. При мочево́мъ нескѣ, какъ причинъ недержанія мочи, полезенъ шипучій порошокъ.

Недержаніе мочи у дѣтей во снѣ, какъ слѣдствіе дурной привычки, лѣни, холодной квартиры, худой постели, привычки спать скорчивъ ноги, уничтожается тѣмъ, что дѣтямъ не даютъ пить на ночь, приучаютъ ихъ спать на бокахъ, а не на спинѣ, или брюхѣ, пробуждаютъ ихъ 2—3 раза ночью для испражненія мочи, страшаютъ ихъ словами, наказаніемъ, дѣтскую комнату содержать и дитя укрыва-



ють потеплѣе, дѣтскую постель дѣлають покойною; иногда помогаетъ и покрытіе головки уда плёнкою изъ личнаго бѣлка.

§ 74. Мочеизнуреніе. Мочевой поносъ, сахарная моча. — Признаки: отдѣленіе и испражненіе мочи въ большемъ количествѣ, которая сначала не измѣняется въ своемъ видѣ и составѣ, но потомъ дѣлается мутною, зеленоватою, теряетъ солёный вкусъ и острый запахъ, дѣлается приторно-сладкою и вмѣсто мочевого начала содержитъ сахаръ по испареніи мочи, остающійся на днѣ горшка въ видѣ патоки. Присемь замѣчается во всемъ тѣлѣ больного: изнуреніе, слабость, блѣдность, одутлость въ лицѣ, сухая кожа, жаръ, жажда, боль въ поясницѣ и бедрахъ, отѣкъ ногъ, водянка, чувство жженія подъ ложечкою.

Эта болѣзнь встрѣчается чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ; поэтому нужно принять за правило: у всякаго больного, худющаго безъ явныхъ грудныхъ или другихъ припадковъ, нужно изслѣдовать мочу, въ которой нѣрѣдко можно замѣтить мутную зеленоватость, приторную сладость, недостатокъ мочевого запаха и осадокъ въ видѣ патоки. Это изслѣдованіе мочи тѣмъ необходимѣе, что о мочево́мъ изнуреніи не всегда можно судить по количеству мочи, которой иногда отдѣляется въ сей болѣзни болѣе обыкновеннаго.

Причины. Мочевое изнуреніе состоитъ по видимому въ порочномъ дѣйствіи почекъ, а можетъ быть и въ неправильномъ кровото́вореніи, отъ чего питательный сокъ не превращается въ кровь, а выводится изъ тѣла мочею въ видѣ животнаго сахара. Вообще однако сущность мочеизнуренія мало извѣстна. Поводомъ къ происхожденію сей болѣзни бывають: медленное, непримѣтное остановленіе испарины въ кожѣ (которая посему и замѣчается сухою, жесткою); ушибы спины вообще и живота въ сторонѣ почекъ, неумѣренность въ соитіи, распутство, пьянство, приливы къ почкамъ почечуя, мѣсячныхъ кровей, ипохондрія, истерика, комки въ почкахъ и пр.

Леченіе очень трудно, а еще менѣе успѣшно. Большая часть этихъ больныхъ умираетъ отъ изнуренія; поэтому мы



совѣтуемъ, при безпричинномъ худѣніи больного, котораго притомъ моча имѣетъ вышесказанныя качества, искать помощи у опытнаго врача, а между тѣмъ стараться произвести у больного испарину въ кожѣ теплыми ваннами, пареніемъ въ банѣ, растираніями кожи спиртами, пошепиемъ на голомъ тѣлѣ шерстяной рубашки, фуфайки, кормить его болѣе животною, чѣмъ растительною пищею, давать ему по временамъ въ пилюляхъ бычачью желчь, горькую водку, старое, крѣпкое, хорошее вино.

§ 75. Истечение слизи изъ мочевого пузыря; катарръ пузыря. — Признаки: мутная моча, въ которой плаваютъ охлопки слизи, рѣзь въ пузырь и въ мочевомъ каналѣ предъ началомъ, во время и послѣ испусченія мочи, которой теченіе иногда на время запружается комками слизи, вдругъ потомъ выходящими съ мочею.

Причины. Эта болѣзнь чаще бываетъ припадкомъ мочевыхъ камней, мочевого песка, простуды мочевого пузыря, окрѣпости его стѣнокъ, неосторожнаго употребленія мочегонныхъ лекарствъ, особенно шпанскихъ мушекъ, продолжительнаго лежанія въ мочевомъ каналѣ и пузырь катетера, свѣчекъ, переноса на пузырь чесотки, подагры, ревматизма, любострастной болѣзни, а всего чаще почечуиныхъ приливовъ крови къ пузырю; также она бываетъ слѣдствіемъ слабости пузыря отъ задержанія мочи, распутной жизни, неумѣренности въ снѣдѣніи, отъ глеть, заваловъ въ брюхѣ и вообще разстройства пищеваренія, при которомъ очень часто замѣчается мутная слизистая моча, безъ особеннаго страданія пузыря, и проходитъ съ поправленіемъ пищеваренія.

Леченіе. Такъ-какъ эта болѣзнь по своимъ причинамъ опредѣляется довольно трудно, то прежде всего нужно посоветоваться съ врачомъ, который, вѣроятно, сочтетъ нужнымъ изслѣдовать пузырь для познанія нѣтъ ли въ немъ мочевого камня, и потомъ обратить вниманіе на другія причины болѣзни. Вообще однако здѣсь полезны: при почечуиномъ приливѣ—сѣра съ кремортартаромъ (№ 42), при слабости толокнянки (*uva ursi*), извѣстковая вода, щелочная каваказская вода. Притомъ не должно употреблять молодого,



кислаго пива, кислыхъ шей, не пить водки, быть умѣреннымъ въ удовлетвореніи плотской похоти.

О бѣлахъ у женщинъ п переломъ см. ниже: Любострастную и Женскія болѣзни.

§ 76. Течение мужскаго сѣмени. Признаки: частое, непроизвольное истеченіе мужскаго сѣмени во спѣ, при сладострастныхъ грезахъ, или и на яву днемъ при малѣйшемъ къ тому поводѣ, какъ то: во время верховой ѣзды, испражнения низомъ, чтеніи романовъ, смотрѣніи на пзвѣстныя картины, на сладострастные представленія.

Причины. Чаше всего начальною причиною истеченія сѣмени бываетъ рукоблудіе, или онанизмъ, — преступная и гибельная привычка, стоившая не одному молодому человѣку невозвратной потери здоровья, разсудка или остановки въ развитіи умственныхъ способностей, и самой жизни. Эта страшная привычка у обоихъ половъ до того усиливается, что она совершенно поработщаетъ себѣ молодыхъ людей, которые, не смотря ни на что, не могутъ отъ нея воздержаться, обманываютъ самый строгій надъ ними присмотръ и до того расслабляютъ свои дѣтородныя части, что сѣмя истекаетъ противъ ихъ воли, даже безъ всякаго повода днемъ и ночью сочится, накапливается въ видѣ прозрачной жидкой слизи. Вообще же истеченіе сѣмени есть слѣдствіе частаго раздраженія, а потомъ слабости дѣтородныхъ частей; къ этому способствуетъ горячая, мясная и рыбная пища, яйца, разныя пряности (особенно ваниль и гвоздика), глисты, скопленіе нечистотъ въ кишкахъ, запоры низомъ, полнокровіе въ брюхѣ, сидячая, роскошная жизнь, чтеніе соблазнительныхъ книгъ, смотрѣніе на любострастные картины, развратныя общества людей, вольное обращеніе половъ, частое посѣщеніе театровъ, на которыхъ играютъ вольныя пьесы, балеты.

Лечение. Благоразумныя мѣры надзора за молодыми людьми предотвращаютъ и излечиваютъ болѣзнь вѣрнѣе всѣхъ лекарствъ: не подавая больному, если можно, никакаго подозрѣнія, что намъ пзвѣстна его несчастная слабость, пужно отъ него удалять всё, что можетъ распалить его воображеніе, и не спускать, такъ сказать, съ него глазъ ни днемъ,



ни, особенно, ночью, не оставлять его наединѣ, надсматривать за нимъ, когда онъ выходитъ въ нужное мѣсто, ежедневно осматривать его рубашку, исподнее платье, постельное бѣлье, даже чулки, платки, полъ и мебель въ комнатѣ и пр. Если же привычка больного сделалась уже гласною, то развить ему всю картину ужаса, какъ необходимое слѣдствіе его слабости: разстройство здоровья, потерю зрѣнія, памяти, разсудка, робость, трусость, жепоподобный характеръ, онемѣніе рукъ, ногъ, униженіе человека до скота, преступность его дѣйствій въ физическомъ, нравственномъ и религіозномъ отношеніи (см. Гигіену II, III, IV, V).

Если больной не подверженъ рукоблудію, то нужно обратить вниманіе на вышеисчисленныя причины истеченія семени, и по возможности стараться ихъ удалить, или по крайней мѣрѣ ослабить; здѣсь необходимъ совѣтъ опытнаго врача. Вообще же избѣгать сидячей жизни, излишнихъ ученыхъ занятій, теплой комнаты, теплаго подъянія, упражнять тѣло на свободномъ воздухѣ движеніемъ, работою въ саду, огородѣ, полѣ; точить, рубить, колоть дрова, носить тяжести до усталости, рѣдко бѣсть мясо, яйца, (вообще не употреблять пряностей, кофе, горячаго чаю, вина, водки, шекелада, пива, портера; бѣсть больше овощи, плоды, пищу твердую, не ужинать, особенно горячаго и жидкаго, жить въ прохладной комнатѣ, спать на стѣлюжкѣ, а не на перинахъ, покрываться легкимъ полотнянымъ подъяломъ, но не шелковымъ, не шерстянымъ или бумажнымъ; ложась спать, пить холодную воду; ложиться на бокахъ, а не на спинѣ и не на брюхѣ; предъ засыпаніемъ читать нравственныхъ, историческихъ, физическихъ книги, а не романы; просыпаться по утрамъ рано и сейчасъ вставать, а не ѣздить въ постель.

Самое леченіе должно имѣть цѣлю утишить раздражительность дѣтородныхъ органовъ и ихъ укрѣпить. Лучшее для этого средство есть холодная вода простая, съ солью, морская, желѣзная, минеральная, употребляемая въ видѣ обмыванія дѣтородныхъ частей, обливанія ихъ и всего больного струею, дождекомъ, примочекъ, ваннъ, купанья въ рѣчкѣ, въ морѣ. Употребляя холодную воду въ разныхъ видахъ



2—3 раза въ день снаружи и внутри поутру и въ вечеру по 2—4—6 стакановъ, можно обойтись безъ настоящихъ лекарствъ, изъ которыхъ особенно похваляется кислый Галлеровъ эликсиръ, хина, корень коломбо и желъзо. Эликсиръ дается три раза въ день по 10 капель въ отваръ, или студени исландскаго моха, въ отваръ ячнхъ, рисовыхъ крупъ, льнянаго сѣмени, или просто въ водѣ; съ уменьшеніемъ раздражительности, эликсиръ дается съ настойкою хины, потомъ съ корнемъ коломбо, горько-желъзныя пилюли. Если при употребленіи сихъ средствъ раздражительность возбуждается, то давать больному по утру и въ вечеру по 1—2 грана камфоры съ 5—10 гранами селитры и велѣть ему носить комфору въ мышечкѣ около дѣтородныхъ частей. Въ высшей степени болъзни, когда сѣмя истекаетъ и днемъ, нужно употреблять стягивающія крѣпительныя средства: хину, дубовую кору, квасцы, желъзный купоросъ, Бестужевскія капли. Средства сии снаружи употребляются въ видѣ примочки (отваръ дубовой коры съ квасцами), ваннъ (желъзный купоросъ) и капель—(настойка хины, Бестужевскія капли). Впрочемъ, при назначеніи сихъ средствъ нужно посоветоваться съ врачомъ.

§ 77. Поносъ простой. — Признаки: частое, жидкое испражненіе низомъ кишечныхъ нечистотъ, слизи, желчи, крови, гнойной матеріи. Здѣсь однако нужно точно опредѣлить, что и когда нужно назвать поносомъ: 2—3 жидковатыя испражненія у дѣтей не возсталяютъ поноса, но и у взрослыхъ, это не поносъ, особенно если такіа испражненія продолжаются немного дней, не ослабляютъ больнаго, но еще освѣжаютъ его голову, мысли, если притомъ у него поправляется аппетитъ, проходитъ тяжесть въ животѣ, усталость въ ногахъ, отвращенія отъ занятій. Если испражняемое низомъ имѣетъ непріятный запахъ, темный, зеленый цвѣтъ и пр., такой поносъ есть усиліе цѣлительной силы нашего тѣла и его останавливать не нужно, особенно когда онъ произошелъ послѣ явной невоздержности въ пищѣ, питьѣ, послѣ простуды, огорченія и пр. Но если испражненія низомъ происходятъ 5—10—20 разъ въ день съ сильными болями въ животѣ, если такъ частыя испражненія низомъ продолжаются



5—10 дней; если больной слабѣетъ, худѣетъ, теряетъ аппетитъ, получаетъ жажду, во время испражненія мѣетъ и падаетъ въ обморокъ, лице и ноги у него отекаютъ; если испражняемое состоитъ изъ плевистой слизи, питательнаго сока, какъ бы свернушагося бѣлка, — то такой поносъ нужно почитать болѣзнію и стараться остановить его приличными средствами.

**Причины.** Поносъ вообще состоитъ въ раздраженіи кишекъ и въ усиленномъ ихъ движеніи, которымъ кишки извергаютъ остатокъ пищи. Это раздраженіе можетъ зависѣть или отъ причинъ, находящихся въ самыхъ кишкахъ, или во всемъ тѣлѣ. Перваго рода причины суть: невоздержность, обремененіе желудка, худая, острая, трудноваримая пища, скопленіе въ кишкахъ слизи, излітіе въ кишки въ большомъ количествѣ желчи, острой, ѣдкой, черной, зеленой, глисты, язвы въ кишкахъ, ихъ воспаленіе, нагноеніе, помертвѣніе. Причины поноса общія, внѣ кишекъ, находящіяся во всемъ тѣлѣ, суть: возмущеніе духа, гнѣвъ, испугъ, страхъ, тоска, боли, остановленіе испарины, общія изнурительныя болѣзни — чахотка, сухотка, водянка, желчныя и желудочныя лихорадки, цынга. Кромѣ того, простой поносъ составляетъ начало и окончаніе наружнаго или кроваваго поноса; притомъ простой поносъ некоторыхъ людей происходитъ очень легко, при малѣйшемъ поводѣ; лѣтомъ, въ жаркихъ климатахъ поносъ есть очень частая болѣзнь и зависѣть отъ остановленія испарины, въ холодную, сырую ночь послѣ дневнаго зноя, отъ умноженнаго отдѣленія желчи.

**Леченіе.** Не приступая къ леченію, нужно прежде опредѣлить по вышеизложеннымъ признакамъ: вреденъ ли, или полезенъ для больного поносъ? Признавъ поносъ вреднымъ, нужно стараться его остановить: утишеніемъ раздраженія въ кишкахъ и удаленіемъ причинъ поноса.

Поносъ, случающійся въ лѣтнее время, особенно въ Іюль и Августъ, зависѣть отъ остановленія испарины, остроты желчи; здѣсь нужно произвести потъ пареніемъ въ банѣ, теплымъ чаемъ изъ бузины, соломы, потомъ дать жженный ревенъ (въ порошокъ по 2—3 грана 3 раза въ сутки) съ отваромъ льняныхъ сѣмянъ, корня просвиры, ячменныхъ, овся-



ныхъ крупъ, не пить холодной воды или квасу, а отваръ изъ тѣхъ же крупъ, не ѣсть щей, борщу, овощей, плодовъ, а кашицу, бульонъ. Если испражненія низомъ водянисты и языкъ нечистъ, то давать больному нашатырь съ ревенемъ въ отваръ просвирокъ (№ 46), потомъ рвотное изъ ипеакауаны, а наконецъ опять жженный ремень въ порошокъ по 2—4 на приемъ съ жженнымъ хлѣбомъ. Если водянистый поносъ соединенъ съ болями въ животъ, то полезна масляная смѣсь съ нашатыремъ (№ 47), втираніе въ животъ масла бѣлены, теплыя припарки къ животу, клистаръ изъ крахмала съ масломъ (№ 48). Такъ же лечится поносъ, происшедшій отъ разстройства пищеваренія обремененіемъ желудка, худою пищею, нечистою водою; здѣсь притомъ главное средство есть воздержность въ пищу, почти до голода.

Если водянистый поносъ упорствуетъ и ослабляетъ больного, то нужно его остановить. Лучшія здѣсь средства суть: привлеченіе соковъ къ кожѣ ношеніемъ на животъ шерстянаго набрюшника, на голомъ тѣлѣ фланелевой рубашки, ремень съ ипеакауаною въ порошокъ (№ 49), порошокъ изъ березоваго, хлѣбнаго угля, изъ раковинъ, раковыхъ жерновокъ, глины, магнезій, также аравійская, вишневая камедь, корень салепы, крѣпкій отваръ крахмала, крупъ овсяныхъ. Опіи вѣрно останавливаетъ всякій поносъ, но его можно давать только по предписанію врача въ видѣ Доверова порошка, или капель (№ 50). Мы совѣтуемъ опіи замѣнить зелеными маковыми головками, которыхъ 1—2 наливаютъ стаканомъ горячей воды и этой наливки даютъ больному по ложкѣ чрезъ часъ; также маковое сѣмя и молоко изъ него здѣсь полезны.

Привычный, продолжительный поносъ, непрерывно продолжающійся, или легко возвращающійся при малѣйшемъ къ тому поводѣ, если притомъ нѣтъ другой какой-либо болѣзни, зависитъ отъ слабости желудка и кишекъ и лечится горькими, вяжущими, ароматными средствами: квассїею, хипою, корнемъ коломбо, аниса, или пра (лепешника), померанцовою корою, дубовыми желудками въ видѣ кофе, краснымъ французскимъ виномъ, портвейномъ, бисофомъ. Въ семъ поносѣ также нужно приглашеніе врача и особенная разборчивость



въ пищу, которая должна быть питательна, легковарима, не жирна, не солёна, не кисла и непронизводящая вѣтровъ. Этотъ поносъ можетъ зависть отъ скрытныхъ причинъ (глисты, ревматизма, почечуя, подагры и пр.), раскрытіе которыхъ нужно представить врачу, котораго должно также пригласить при поносѣ изнурительномъ, гнойномъ, какъ припадкѣ чахотки, сухотки, водянки, нагноенія въ печени, кишкахъ и вообще въ брюхѣ, хотя въ семъ поносѣ и врачъ рѣдко можетъ подать какую-либо больному помощь.

Поносъ гнилостный, какъ припадокъ высшей степени цыгги, отличающійся темными, земляными, смрадными испражнениями, кромѣ леченія цыгги, требуетъ употребленія свѣжей сыворотки и горькихъ, вяжущихъ средствъ, упомянутыхъ выше. Непроизвольный поносъ въ горячкахъ, воспаленияхъ обыкновенно смертеленъ, но не требуетъ особеннаго леченія.

§ 78. Поносъ кровавый, натужный. — Признаки: частый позывъ къ испражненію низомъ, причемъ однако, не смотря на усиліе больного, жилие и натуги ничего не выходитъ, кромѣ малости слизи, иногда съ полосками, каплями крови; сильныя боли въ животѣ, особенно въ крестцѣ и заднемъ проходѣ, т. е. по направленію прямой кишки; лихорадка со всеми своими припадками—ознобомъ, жаромъ, жаждою, но безъ пота, который появляется не прежде, какъ при послабленіи болѣзни. Въ высшей степени поноса происходитъ настоящій запоръ: несмотря на безпрестанное понужденіе и натуги, больной ничего не можетъ испражнить низомъ.

Кровавый поносъ начинается простымъ съ тупою болью и ломомъ въ проходѣ; боль усиливается и поднимается вверхъ къ животу, позывы на-низъ дѣлаются очень частыми (до 50—100 разъ въ сутки), а испражненія уменьшаются въ количествѣ, издають непріятный запахъ, какъ бы отъ сыраго мяса; лихорадка усиливается; животъ напрягается и болитъ при давленіи рукою его нижней части къ крестцу. Это ожесточеніе болѣзни происходитъ или отъ распространенія воспаления отъ прямой на другія толстыя кишки, или отъ скопленія въ кишкахъ желчно-слизистыхъ нечистотъ, запертыхъ тамъ распухшею прямою кишкою. Смерть послѣдуетъ или отъ



изнеможенія, какъ слѣдствіа непрерывныхъ побужденій къ испражненію низомъ, или отъ воспаленія и помертвѣнія кишекъ. Признаки близкой смерти: прекращеніе болей въ животъ, впалое лице, холодный потъ, охладѣніе рукъ и ногъ, слабый, дрожащій, перемежающійся пульсъ, войючія непроизвольныя испражненія низомъ. У выздоровѣвшихъ послѣ сильнаго кроваваго поноса иногда остается продолжительный простой поносъ, параличъ, изнуреніе, упорные запоры, и всё это какъ слѣдствіе разстройства кишекъ.

Причины. Сущность кроваваго поноса состоитъ въ раздраженіи прямой кишки, въ которой притомъ скопляется кровь, распухаютъ стѣнки и наконецъ происходитъ воспаление, распространяющееся потомъ на другія толстыя кишки. Отъ такого переполненія прямой кишки кровью, стѣны ея, опухая и толстая, прижимаются другъ къ другу и возбуждаютъ безпрестанный позывъ къ испражненію, причемъ однако выходитъ только немного слизи и крови, какъ слѣдствіе натуговъ больного и полнокровія, но нечистоты изъ верхняго конца кишекъ не могутъ пройти чрезъ опухшую прямую кишку, которой каналъ стѣсненъ опухшими ея оболочками. Главная причина есть простуда, остановка испарины въ кожѣ; поэтому кровавый поносъ появляется чаще, и притомъ повально, въ разныхъ мѣстахъ и на многихъ людяхъ, тогда, когда происходитъ быстрая и частая перемѣна температуры въ воздухъ и притомъ между тѣмъ классомъ людей, который, по роду жизни и занятію, наиболее подвергается этой перемѣнѣ температуры, т. е. въ концѣ Іюля, въ Августѣ и Сентябрѣ, когда жаркіе дни сменяются сырыми, холодными ночами и когда рабочій классъ людей большую часть времени проводитъ въ полѣ: въ это время часто случается видѣть, что цѣлыя семейства и деревни поселянъ занемогаютъ кровавымъ поносомъ и останавливаются полевые работы. По сей же причинѣ кровавый поносъ бываетъ чаще ревматическій и желчный, ибо дневной жаръ дѣйствуетъ на печень, а ночной холодъ на кожу. Въ высшей степени болѣзни, особенно при множествѣ больныхъ въ одномъ мѣстѣ, этотъ поносъ дѣлается заразительнымъ чрезъ кишечныя испражненія. Въ деревняхъ, распо-



ложенныхъ на низкихъ мѣстахъ, около болотъ, у стоячихъ водъ, поносъ появляется постоянно каждое лѣто вмѣстѣ съ перемежающею лихорадкою—отъ болотныхъ земныхъ испареній. Кромѣ того, острая, испорченная пища (сырая, испорченная бѣлужина, копченныя колбасы, сыръ), разныя ягоды, почечуйный приливъ крови, разлитіе желчи отъ огорченій, испуга; трудное прорѣзываніе зубовъ также могутъ быть причиною кроваваго поноса.

Леченіе. Весьма важно для помѣщиковъ и сельскихъ хозяевъ знать, какъ можно предотвратить появленіе кроваваго поноса въ лѣтнее время между рабочими людьми. Этого можно достигнуть только тѣмъ, чтобы защитить людей отъ двухъ крайностей температуры: дневнаго зноя и ночнаго холода. Для этого ненадобно днемъ работать до изнеможенія и до проливнаго пота, работать въ бѣлой, а не цвѣтной рубашкѣ, покрывъ голову соломенною шапкою, бѣлымъ платкомъ; вѣть три раза въ день, но не объѣдаться; при разгоряченномъ тѣлѣ и проливномъ потѣ не пить воды, особенно ключевой, холодной, а дать водѣ постоять въ сосудѣ на солнцѣ; послѣ работы отдыхать въ тѣни, подъ кустами, возами, сѣномъ, снопами, наметомъ изъ одѣянія, растянутаго на кольяхъ; работать дружно, но равномерно, не усиленно, не торопливо, какъ то иногда дѣлаютъ работники, стараясь догнать или опередить другъ друга. Еще болѣе нужно быть осторожнымъ ночью: защищаться отъ сырости и холода. Здѣсь надобно соблюдать слѣдующія предосторожности: ночуя въ полѣ, особенно при рѣкѣ, болотѣ, надобно развести огонь для всей ночи и ложиться спать вокругъ костра, ногами къ огню; на животъ надѣвать широкій шерстяной поясъ, шерстяной набрюшникъ, или какъ иначе окутывать животъ; ложиться, если можно, не на голой землѣ, но на соломѣ, сѣнѣ, возѣ; если же того сдѣлать нельзя, то для ночлега на землѣ нужно избирать пригорокъ, песчаное мѣсто, постилать на немъ солому, сухое сѣно, войлоки, рогожки, цыновки; умѣренно поужинавъ, ложиться спать не на спинѣ, а еще менѣе на брюхѣ, но на боку и притомъ сначала лѣвомъ, а потомъ уже поворачиваться и на правый бокъ, укрываться плотно чѣмъ либо суконнымъ, шерстянымъ, тулупомъ; если случится



ночью продрогнуть, то надобно встать, походить скоро до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ ознобъ и не нагреется тѣло, выпить кружку, или стаканъ, теплой воды, настоянной на соломѣ, сѣнѣ; для чего на огонь должно имѣть въ запасъ горшокъ, котѣль съ водою и соломою, либо свѣжимъ отборнымъ сѣномъ.

Въ началѣ поноса, когда нѣтъ еще признаковъ воспаленія, а одно раздраженіе въ брюхѣ и когда притомъ замѣчаются желчные припадки (горечь, тошнота, желтизна, тоска и пр.), надобно дать рвотное изъ ипекакуаны, а потомъ слабительное изъ манны, тамаранды, черносливу, касторового, льнянаго масла, а для питья назначить слизистый отваръ изъ ячнхъ, овсяныхъ и другихъ крупъ, изъ корня просвиры, салепа, камеди вишневой и проч., либо маковое молоко. Если при этомъ леченіи въ 3—7 дней болѣзнь не прекращается, то надобно полагать, что къ ней присоединилось воспаленіе прямой кишки или нечистоты въ кишкахъ. Въ первомъ случаѣ замѣчается постоянная боль около крестца и вообще въ нижней части живота, нетерпящая никакого прижатія, животъ напряженъ, пульсъ полный, твердый и лихорадка усиливается; здѣсь взрослому и полнокровному больному нужно пустить кровь изъ руки, а несовершеннолѣтнему и слабому—приставить пиявицы на животъ къ мѣсту боли; но тому и другому втирать въ животъ простое или съ бѣзеною вскипяченное льняное, деревянное масло и дѣлать смягчительныя припарки на животъ, намазавъ обвертку припарокъ саломъ, жиромъ, масломъ, а внутрь давать то же слизистое питье, маковое молоко. Если послѣ кровопусканія боль не совсѣмъ прошла, то мушка на крестецъ, или на животъ, очень полезна.

При нечистотѣ, обыкновенно желчной, въ желудкѣ и кишкахъ, нечистомъ языкѣ, горечи во рту, тошнотѣ и пр., если притомъ испраженія низомъ бываютъ густоваты, нужно повторить рвотное изъ ипекакуаны и потомъ давать отваръ тамариндъ, черносливъ съ кремортартаромъ; молоко (эмульсію) изъ миндаля, макового, льнянаго сѣмени и продолжать до тѣхъ поръ, пока испраженія низомъ не сдѣлаются водянистыми; но когда не при нечистотѣ въ



желудкъ, испражненія бываютъ жидки, то нужно повторить рвотное изъ ипекакуаны, послѣ чего они дѣлаются гуще; но когда это не помогаетъ, то давать больному ревенъ (№ 51) простой, или поджаренный.

Если при такомъ леченіи поносъ не унимается, а больной видимо слабѣетъ, то, оставивъ его при употребленіи слизи-стаго питья, смягчительныхъ припаркахъ и масляныхъ втираніяхъ въ животъ, нужно пригласить врача, котораго присутствіе необходимо и въ началѣ поноса, если разомъ занемогаетъ имъ много людей.

Если кровавый поносъ долго продолжается, не угрожая опасностію, то очень полезенъ корень бараньей травы (*rad. agnissae*) чрезъ 2—3 часа по скрупулу съ порошкомъ сахара, или камеди, салепа; здѣсь также полезенъ и отваръ салепа въ питьѣ, клистиры изъ крахмала съ масломъ.

§ 79. Холера.—Признаки: поносъ и рвота, непрерывные или повторяющіеся чрезъ  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  — 1 часъ, боли въ животѣ и особенно подъ ложечкою, жиленье, тоска, изнеможеніе, слабый, едва примѣтный пульсъ, пискливый, дѣтскій голосъ, тихое, слабое дыханіе, холодный выдыхаемый воздухъ, обмороки, охлажденіе тѣла, особенно рукъ и ногъ, жестокія корчи, наипаче въ икрахъ,—и смерть. Извергаемое верхомъ и низомъ сначала состоитъ изъ остатковъ пищи, слизи и желчи, потомъ изъ водянистой жидкости, наконецъ, не смотря на безпрестанные позывы на рвоту и поносъ, ничего не выходитъ ни верхомъ ни низомъ.

Ходъ холеры бываетъ различенъ: иногда ей предшествуютъ признаки разстройства пищеваренія: давленіе подъ ложечкою, потеря аппетита, горечь во рту; а иногда болѣзнь начинается вдругъ поносомъ и рвотою, бываетъ то легка, то въ нѣсколько часовъ оканчивается смертію отъ воспаленія или истощенія. Черныя, густыя, какъ бы смолистыя испражненія низомъ суть вѣрный признакъ выздоровленія.

Причины. Холера, повидимому, состоитъ въ сильномъ судорожномъ раздраженіи желудка и кишекъ, въ которомъ участвуетъ и печень. Это раздраженіе можетъ произойти отъ поглощенія ядовъ (при отравленіи), употребленія испорченной пищи (сыра, колбасы, соленой бѣлужины), отъ обре-



мененія желудка, желчныхъ камней, трудныхъ родовъ, прорѣзыванія зубовъ. Чаше всего холера бываетъ повальной и мѣстная. Первая проходитъ иногда огромныя пространства земли и поражаетъ безчисленное множество людей, показывается въ безконечно разнообразномъ видѣ: поносомъ, рвотою, судорогами, либо одною рвотою, однимъ поносомъ и даже одними судорогами въ ногахъ и рукахъ, безъ поноса и рвоты, какъ это было замѣчено при повальной холерѣ въ 1830 и 1831 годахъ. Мѣстная холера появляется въ сырыхъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ знойное время, и обнаруживается наичаще ночью при холодномъ и сыромъ воздухѣ. Частная же, спорадическая холера наичаще зависитъ отъ погрѣшности въ пищу и простуды тѣла, также отъ ядовитой пищи (грибовъ, колбасъ, сыра), быстрого охлажденія желудка холодною водою при разгоряченномъ тѣлѣ. Вообще однако холера не заразительна; если же при повальной холерѣ вдругъ занемогають ею многіе люди, то это зависитъ отъ общей и повсемѣстной ея причины, которая разомъ дѣйствуетъ на цѣлыя семейства, селенія, города и провинціи. Эта причина состоитъ въ какомъ-то особомъ измѣненіи воздуха, и потому ея движенія не останавливають никакія карантинныя мѣры, какъ это доказалъ опытъ при повальной холерѣ въ 1830 и 1831 годахъ.

Леченіе должно быть дѣятельное, ибо холера въ высшей степени своего развитія — съ рвотою, поносомъ и судорогами, — убиваетъ въ 24 — 12 часовъ. Главное дѣло при семъ состоитъ въ успокоеніи раздраженія въ желудкѣ и кишкахъ. Лучшія для этого средства суть: слизистое питье изъ отвара овсяныхъ, ячневыхъ, рисовыхъ крупъ, изъ корня просвиры, салепы, изъ аравійской, вышневой камеди, жидкаго куриного, телячьяго супа, мяснаго бульона; это питье дается какъ можно чаще, но по немногу; шипучіе порошки (№ 37), риверіева смѣсь (№ 2), клистиры изъ отвара крахмала, льняныхъ сѣмянъ съ деревяннымъ, льнянымъ масломъ, смягчительныя припарки ко всему животу изъ отрубей, свиной трухи, льняныхъ сѣмянъ съ листьями бѣлены и жиромъ, сухіе рожки (банки) на сторону желудка, втираніе въ животъ летучей мази, масла, настояннаго на листь-



яхъ бѣлены; треніе частей, одержимыхъ судорогами, щеткою, суконкою, спиртомъ камфорнымъ, муравейнымъ, березовымъ и пр. Въ обыкновенныхъ случаяхъ это леченіе бываетъ достаточно. Но если боли въ животѣ усиливаются и дѣлаются постоянными въ одномъ какомъ мѣстѣ, то нужно опасаться тутъ воспаленія и немедленно пригласить врача, при недостаткѣ котораго, людямъ молодымъ и полнокровнымъ нужно пустить кровь изъ руки, приставить къ больному мѣсту пиявицы и дѣлать теплыя припарки, продолжая давать внутрь слизистое питье, а остальное предоставить натурѣ больного. Правда, въ такихъ случаяхъ бываетъ дѣйствителенъ оій въ видѣ настойки (tinctur opii) по 2 — 3 капли чрезъ каждые полчаса; но употребленіе опія мы вообще предоставляемъ врачамъ.



## НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

§ 80. Подъ именемъ нервныхъ болѣзней мы опишемъ тѣ недуги, которые состоятъ въ страданіи нашихъ умственныхъ способностей чувствованія или движенія, безъ особенныхъ явныхъ измѣненій въ нашемъ тѣлѣ. Эти болѣзни гнѣздятся въ мозгѣ и нервахъ, въ началѣ своемъ не производятъ явныхъ измѣненій въ тѣлѣ и выражаются или усиленною (бѣшенство, судорога), или уменьшенною (параличъ, глупость, слѣпота), или, наконецъ, измѣненною дѣятельностію мозга и нервовъ. Теченіе ихъ очень непостоянно: одни изъ нихъ угрожаютъ скорою смертію (пострѣлъ, столбнякъ), другія продолжаются цѣлую жизнь безъ перемѣны (глупость), еще другія то прекращаются на-время, то опять возобновляются, или же появляются въ иномъ видѣ, и часто находятся въ связи съ періодомъ развитія тѣла—съ нимъ появляются и съ нимъ проходятъ (судорога восторженія, спохожденіе и пр.). Также счастливо оканчиваются эти болѣзни по удаленіи ихъ другихъ причинъ (глисть, рукоблудія), или чрезъ появленіе другой болѣзни—сыпи, язвъ, опухолей и пр.

Причины. Сущность нервныхъ болѣзней неизвѣстна и мы знаемъ ихъ только по наружнымъ примѣтамъ усиленнымъ, ослабленнымъ превратнымъ дѣйствіямъ нервовъ—корчамъ, онѣмѣнію, боли, безчувствію. Причины случайныя нервныхъ болѣзней суть:

1) Тѣлосложеніе наслѣдственное, слабое, дѣтскій возрастъ во время прорѣзыванія зубовъ, женскій полъ, особенно въ періодъ возмужалости (пора любви и мечтаній), изнѣженное воспитаніе, городская жизнь, разныя общества и примѣры, сильно возбуждающіе юное воображеніе, сужденіе, чувство (театры, романы, картины, вольныя обращенія половъ), затворническая жизнь, спертый, комнатный воздухъ, особенное состояніе атмосферы.

2) Ослабленіе тѣла отъ недостатка хорошей пищи, или отъ потери крови и другихъ соковъ, особенно дѣтороднаго сѣмени, отъ испорченнаго воздуха, холода, отъ частыхъ ро-



довъ, продолжительнаго кормленія грудью, упорнаго поноса, бѣлей, изнурительнаго пота, слинотеченія, неумѣрнаго напряженія ума при занятіяхъ, изнуреніе тѣлесныхъ силъ тяжкими работами, болѣзнями, отъ неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ, чая, кофе; отъ недостаточнаго, вовсе пренебреженнаго или, напротивъ, усиленнаго упражненія какой-либо душевной или тѣлесной способности (очень частыя причины нервныхъ болѣзней); отъ разныхъ ослабляющихъ вліяній: заботъ, гнѣва, печали, зависти, любви, скуки, тоски по родинѣ, страха, умственнаго бездѣйствія, чувственныхъ наслажденій, употребленія одуряющихъ ядовъ, особенно опія въ пилюляхъ, какъ Турки, или въ куреніи, подобно Китайцамъ.

3) Тѣлесныя болѣзни: полнокровіе, бездѣйствіе мышцъ, недостатокъ или остановленіе испарины, запоры, поносъ, рѣдкое удовлетвореніе похоти въ молодыхъ лѣтахъ, неправильное мѣсячное очищеніе, остановившійся почечуй, приливы и застои крови въ брюхъ и головъ, разстройство и засореніе желудка и кишекъ, глисты, завалы въ печени; переносъ ревматической, подагренной, золотушной, любовнаго остроты на мозгъ или нервы; занозы, раны, особенно сухихъ жилъ, суставовъ, затвердѣнія, наросты вблизи мозга, нервовъ, накопленіе воды, костоѣда и пр.

Всякая нервная болѣзнь продолжительная легко дѣлается привычною и тѣмъ самымъ обращается какъ бы въ необходимую потребность больнаго. Нервная болѣзнь, изъ постоянной или неправильной сдѣлавшаяся временною и періодически возвращающеюся, излечивается рѣдко, особенно если это періодическое появленіе болѣзни совпадаетъ съ вещественными дѣйствіями тѣла, а потому судороги, совмѣстныя съ появленіемъ мѣсячныхъ кровей, падучая болѣзнь, которой приступы появляются ночью во снѣ—неизлечимы.

Леченіе бываетъ двоякое: коренное—радикальное, и припадочное—палліативное. Коренное леченіе имѣетъ цѣлію прежде всего удалить матеріальныя причины нервныхъ болѣзней. Людей ослабленныхъ (см. выше причины подъ цифрою 2) нужно укрѣпить хорошою пищею, добрымъ ви-



номъ, прогулкою, свѣжимъ воздухомъ, купаньемъ въ холодной водѣ и пр. Для удаленія причинъ подъ цифрою 3, нужно бываетъ то общее и мѣстное кровопусканіе, движеніе, отвлекающій способъ леченія, то средства слабительныя, разрѣшающія, потогонныя и пр. (см. завалы, почечуй, мѣсячное очищеніе, подагру, ревматизмъ, чесотку, лишай, любострастную). Во всѣхъ этихъ случаяхъ предварительное совѣщаніе съ врачомъ необходимо.

Если удалены причины, или ихъ и совсѣмъ нельзя открыть, то, по совѣту врача, употребляются слѣдующія лекарства: летучія, ароматныя, эфирныя, одуряющія, балзамическія, вонючія камеди, минеральныя кислоты, щелочи, электричество, гальанизмъ, минеральный и животный магнетизмъ. Употребленіе всѣхъ этихъ средствъ должно быть производимо подъ надзоромъ и руководствомъ опытнаго врача.

При употребленіи сихъ средствъ, нужно снаружи производить раздраженіе и отвлеченіе соковъ теплыми ваннами простыми и щелочными, мушкою, горчичниками, фонтанелями, движеніемъ; укрѣплять больного горькими, вяжущими, желѣзными средствами, чистымъ воздухомъ, купаньемъ въ морѣ, рѣкѣ, холоднымъ обливаніемъ, дождевою ванною, пребываніемъ въ деревнѣ, путешествіемъ, пріятными занятіями, разговорами, чтеніемъ; заставить больного перемѣнить родъ жизни, климатъ, жилище, переселиться въ сухое, возвышенное, открытое мѣсто.

Если болѣзнь возвращается правильно, періодически, наприм. чрезъ —7—15—30 дней, чрезъ 2—3—4 мѣсяца, и появляется всегда въ тѣ же часы дня или ночи, то можно ожидать пользы отъ хины и ея соли, какъ лекарствъ противъ всякой періодической болѣзни.

Припадочное леченіе доставляетъ облегченіе больному, умѣряетъ опасныя припадки, отвращаетъ видимую опасность отъ поврежденія тѣла въ приступѣ, сокращаетъ приступы болѣзни, замедляетъ ихъ появленіе и проч. Надежнѣйшія для этого средства состоятъ въ бдительномъ надзорѣ за больнымъ, особенно во время приступа, и въ употреб-



леніи средствъ отвлекающихъ, противусудорожныхъ, болеутолительныхъ.

§ 81. Болѣзнь ума, умопомѣшательство, бѣшенство, задумчивость (меланхолія), слабоуміе, глупость, снохожденіе. Признаки: разстройство умственныхъ способностей, дѣйствія разсудка и воли, несообразныя здравому смыслу и общепринятому порядку вещей; бѣшенство: буйство въ словахъ, движеніи, поступкахъ, съ сильнымъ напряженіемъ мышцъ, такъ — что слабого больного едва могутъ держать нѣсколько крѣпкихъ людей; меланхолія — противное состояніе духа: молчаливость, робость, страхъ, недовѣрчивость, печаль, уныніе, плачь, страсть къ уединенію; то и другая иногда переходятъ другъ въ друга: бѣшенный дѣлается тихимъ и задумчивымъ, а меланхоликъ — бѣшеннымъ. Слабоуміе до совершенной глупости представляется въ разныхъ степеняхъ, какъ то: въ видѣ простоты, тупости ума, глупости и совершеннаго безумія.

Простота, не составляя болѣзни ума, замѣчается у людей необразованныхъ, деревенскихъ, крестьянъ. Тупость обозначается неспособностью человѣка обнять разомъ въ умѣ нѣсколько особенно новыхъ, непривычныхъ для него предметовъ, при сужденіи о коихъ онъ теряется и становится, какъ говорятъ, въ-тупикъ; тупой бываетъ робокъ, застенчивъ и недовѣрчивъ, или же безусловно довѣряетъ своимъ избраннымъ любимцамъ. Глупость выражается суевѣріемъ, боязнью, безусловною довѣрчивостью къ кому-либо, нерѣшительностью, или же опрометчивостью, непостоянствомъ въ дѣйствіяхъ и предпріятіяхъ, разговоромъ съ самимъ собою, пристрастіемъ къ спиртнымъ напиткамъ, къ острой пищѣ (хрѣну, луку, горчицѣ), обидчивостью, вспыльчивостью до ярости и бѣшенства. Безсмысліе, или безуміе, обозначается совершеннымъ бездѣйствіемъ всѣхъ умственныхъ способностей: безумецъ не имѣетъ никакихъ страстей, не знаетъ стыда, опрятности, не чувствуетъ ни холода, ни жажды, ни даже тѣлесныхъ страданій, и унижается до степени скота. Снохожденіе отличается дѣйствіемъ во снѣ ума, воображенія и воли: человѣкъ во снѣ дѣйствуетъ какъ на яву—



ходить, видеть, читать, сочинять, но проспавшись ничего о томъ не помнить.

Распознаваніе всѣхъ этихъ видовъ помѣшательства ума то легко, то очень трудно, ибо умопомѣшательство часто бываетъ однопредметное: человекъ судитъ неправильно только объ одномъ предметѣ: о религіи, государствѣ, самомъ себѣ (\*), о всемъ же другомъ онъ судитъ основательно. Трудно также распознать слабоуміе въ легкой степени, равно умопомѣшательство, появляющееся періодически и потомъ проходящее. Впрочемъ, надобно отличать умопомѣшательство отъ кратковременнаго разстройства ума—бреда, замѣчаемаго въ горячкахъ, воспаленіяхъ, въ ипохондріи, истерикѣ, у человека, сильно взволнованнаго страстью, которая дѣлаетъ его на время помѣшаннымъ. Вообще помѣшательство ума бываетъ или постоянное, наичаше слабоуміе, или же временное, проходящее—бѣшенство, меланхолія, снохожденіе. Оно излѣчивается очень трудно, выздоровленіе послѣ него не надежное и оно легко возвращается въ прежнемъ видѣ, или же переходитъ въ другія болѣзни: столбнякъ, падучую, параличъ, подагру, накожные сыпи, язвы, почечуи, чахотку. Сумасшедшіе умиряются отъ пострѣла, сухотки, водянки.

Причины. Умъ, какъ безсмертный Божій даръ, самъ по себѣ не подлежитъ болѣзнямъ, которыя однако появляются въ органахъ, мѣстопробываніи ума—мозгѣ и нервахъ. Притомъ мозгъ и нервы, дѣйствуя на весь тѣло, и сами подчиняются вліянію разныхъ его органовъ и приходятъ въ разладъ и нестройно подчиняются дѣйствіямъ, подобно разстроенному музыкальному инструменту: такъ голодный желудокъ, дѣлаетъ насъ безразсудно-сердитыми; рукоблудіе ослабляетъ и притупляетъ умственные способности, проказа унижаетъ человека до степени скота; такъ раны, ушибы печени, живота, разстраиваютъ мозгъ и разсудокъ, а такія же поврежденія мозга, отражаются въ печени воспаленіемъ,

(\*) Больной почитаетъ себя какимъ-то важнымъ начальникомъ, праведникомъ; увѣряетъ, что у него стеклянныя ноги, вмѣсто рукъ, крылья, что лице обращено къ спинѣ, что у него въ желудкѣ разные гады, возъ съ сѣномъ и пр.



нарывами. Наконецъ, и чистое вначалѣ умопомѣшательство въ послѣдствіи разстроиваетъ весь составъ тѣла и причиняетъ водянку, чахотку, сухотку.

Посему причины умопомѣшательства бываютъ двоякія: дѣйствующія прямо на умъ, душевныя—психическія, и тѣлесныя—матеріальныя. Душевыя причины суть: разныя страсти: радость, страхъ, испугъ, гнѣвъ, заботы, досада, ревность, несчастная любовь, честолюбіе, гордость, несбывшіяся надежды, огорченія, напряженія ума, особенно ограниченного, разсужденіемъ о предметахъ высокихъ, многостороннихъ, таинственныхъ, отвлеченныхъ, также принужденное занятіе ума, возбуждаемое виномъ, кофе; угрызеніе совѣсти, превратныя понятія о религіи, политикѣ, разгоряченное воображеніе романами, театрами, пристрастіе и постоянное занятіе извѣстными идеями, мыслями, сужденіями.

Тѣлесныя причины умопомѣшательства суть преимущественно тѣ, которыя прямо или косвенно дѣйствуютъ на мозгъ, возбуждаютъ его и ослабляютъ, какъ то пьянство—обыкновеннѣйшая причина сумасшествія между простолюдинами; опій, красавица, бѣлена, дурманъ, болиголовъ и вообще одуряющія средства, неосторожно употребленныя, особенно дѣтьми; завалы въ брюхѣ, напаче печени, брюшное полнокровіе, остановленное теченіе крови изъ носа, почечунаго, мѣсячнаго очищенія, раздраженіе отъ глисть и происшедшій отъ того напоръ крови къ головѣ, воспаленіе мозга, рукоблудіе, неумѣренное удовлетвореніе плотской похоти; переносы на мозгъ подагры, ревматизма, чесотки, паршей, ковтуна; удары, раны головы, проломы черепа, сотрясенія мозга, изліянія крови и пасоки въ полость черепа, вдавленіе черепныхъ костей, постороннія тѣла, попавшія въ мозгъ—пули, дробь, шомполь и пр.; наросты костные и мясные въ полости черепа, опухоли, мозговой грибокъ, водяные пузырьки, размягченіе, нагноеніе, сухотка, водянка мозга. Часто нѣсколько изъ этихъ причинъ разомъ участвуютъ въ произведеніи умопомѣшательства, которое, съ другой стороны, бываетъ наследственное, отъ родителей переходитъ къ дѣтямъ, особенно у холериковъ и меланхоликовъ. Чѣмъ лег-



че кто предается порыву страстей, тѣмъ удобнѣе въ послѣдствіи онъ сходитъ съ ума. Сидячая, однообразная жизнь также располагаетъ къ сумасшествію, которое посему замѣчается у ткачей, сапожниковъ, портныхъ; господствующій духъ образованности въ народѣ, ложныя понятія о нравственности, религіи, политикѣ, свободѣ и пр.; посему сумасшедшіе чаще замѣчаются между просвѣщенными людьми (въ Англіи, Франціи) въ большихъ городахъ при революціи націй, чѣмъ въ необразованномъ, дикомъ народѣ и въ селеніяхъ.

Леченіе имѣетъ цѣлю открытіе и уничтоженіе причинъ умопомѣшательства, употребленіе лекарствъ, дѣйствующихъ на мозгъ и нервы и нравственное дѣйствіе на сумасшедшаго. Выполненіе первыхъ двухъ условій мы рѣшительно оставляемъ врачу, котораго къ такимъ больнымъ и нужно всегда приглашать, хотя, къ сожалѣнію, самые искусные и опытные врачи рѣдко бываютъ счастливы въ излеченіи умопомѣшательства.

Съ помѣшаннымъ въ умѣ нужно обращаться какъ съ воспитываемымъ дитятею, у котораго стараются пробудить дремлющій умъ и развить его способность. Нравственное леченіе сумасшедшихъ есть то же, что и нравственное воспитаніе дѣтей; для этого необходимо выполнять слѣдующія условія.

1) Послушаніе со стороны сумасшедшаго, котораго волю надобно стараться подчинить нашей волѣ такъ, чтобы больной дѣйствовалъ всегда, вездѣ и во всемъ по нашему усмотрѣнію, нашей волѣ; съ нимъ надобно обходиться какъ съ упрямымъ ребенкомъ, но исправлять его мѣрами кроткими, убѣжденіями простыми, доказательствами чувственными, обещаніями занимательными, угрозами убѣдительными.

2) Трудъ, занятіе болѣе физическое, чѣмъ нравственное; работа на открытомъ воздухѣ, въ саду, въ огородѣ, въ полѣ, чтеніе простыхъ повѣстей, занимательные рассказы. Умъ челоѣка требуетъ безпрестанной дѣятельности; праздность есть спутница и пища глупости. Помѣшанный, занятый фи-



зическою работою; чувственнымъ разсказомъ, необходимо за-  
ставляетъ дѣйствовать и своей умъ, мыслить, разсуждаетъ.

3) Строгій порядокъ въ образъ жизни, ложиться спать,  
вставать съ постели, бѣть, работать, отдыхать въ извѣстные  
часы и въ определенное время.

4) Приятныя занятія, разные игры, прогулки, веселые  
разсказы, пѣніе, музыка; послѣдняя, искусно направленная,  
особенно сильное имѣетъ вліяніе на умопомѣшанныхъ.

5) Наказаніе и награда должны быть назначаемы въ  
той же мѣрѣ и въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и для дѣтей;  
но тѣлесное наказаніе употреблять только въ крайнихъ слу-  
чаяхъ, и то умеренное.

6) Довѣріе. Человѣкъ, ухаживающій за больнымъ, дол-  
женъ имѣть полную его довѣренность, которую у него такъ  
же легко можно пріобрѣсти, какъ и у дитяти — ласкою, вни-  
маніемъ, заботливостію, участіемъ.

7) Пробужденіе въ больномъ нравственнаго и религіоз-  
наго чувства; въ семъ отношеніи можно прибѣгнуть къ со-  
вѣтамъ и поученію священника.

8) Перемѣна мѣстопробыванія, жилища, удаленіе отъ  
вычужденныхъ предметовъ, воспоминаніе происшествій прежнихъ  
лѣтъ до болѣзни, путешествіе, посѣщеніе родины.

9) Бѣшеныхъ больныхъ содержать въ темной комнатѣ,  
обитой войлокомъ, коврами, плетеною соломою; надѣвать  
на нихъ рубашку изъ крѣпкаго холста; безъ рукавовъ; при-  
вязывать къ постель, удалять всё то, чѣмъ они могутъ при-  
чинить вредъ себѣ или другимъ, или же помѣщать въ домъ  
умалишенныхъ.

10) Соображаться съ характеромъ помѣшательства и ему  
противодѣйствовать: гордаго смирать, робкаго ободрять, без-  
надежнаго утѣшать, мономана разувѣрять въ его понятіяхъ  
о предметѣ его помѣшательства (см. выше).

11) Наконецъ, нужно смотрѣть за этими больными, иногда  
очень обжорливыми и страстными охотниками до крѣпкихъ  
напитковъ, чтобъ они не объѣдались и не упивались перь-  
важно до-пьяна.

Впрочемъ, для выполненія съ надлежащею точностію всѣхъ  
этихъ правилъ смотрѣнія за сумасшедшими, требуется особъ



бренная способность, навыкъ, терпѣніе, опытность, а потому надзоръ за больными можно поручать не всякому, а только известнымъ людямъ.

§ 82. Ипохондрія, истерика. — Признаки: частое появленіе разныхъ нервныхъ припадковъ безъ особенной явной причины; тоски, грусти, тошноты, головокруженія, плача, смѣха, судорогъ, боли въ животѣ; странное, особенное желаніе чего-либо необыкновеннаго — есть глину, уголь, нюхать вонючіе запахи, или же, напротивъ, не терпѣть обыкновенной пищи, пріятнаго запаха; страсть, то къ уединенію, то къ разсыланной жизни; расстройство пищеваренія — то обжорство, то воздержаніе; отрыжка съ громкимъ звукомъ, при отдѣленіи вѣтровъ; запоръ на-пизъ, испражненіе съ болью до обморока; непрестанное занятіе своею болѣзнію и своею личностію; странная и страшная фантазія, изобрѣтающая небывалую болѣзнь, отъ которой больной безпрестанно лечится; блѣдная, водянистая моча съ частымъ побужденіемъ къ испражненію мочи (признакъ появленія судорогъ); давленіе въ горлѣ, какъ бы засѣвъ въ немъ шаръ; сверлящая, какъ бы гвоздѣмъ боль въ теменіи, боль половины головы (мигрень). Всѣ эти припадки продолжаются неопредѣленное время и потомъ оканчиваются плачемъ на-взырь, всхлипываніемъ, громкою отрыжкою, выходженіемъ вѣтровъ низомъ, самозабвеніемъ, сномъ. Обыкновенно приступъ ипохондріи и истерики не опасенъ, но въ сильной степени въ нихъ появляются столбнякъ, давленіе въ горлѣ до задушенія, боль до бѣшенства, бредъ до сумасшествія, водобоязнь, падучая, снохожденіе, магнитное ясновидѣніе. Больные вообще бываютъ худощавы, блѣдны, желтоваты въ лицѣ.

Ипохондрія и истерика есть одна и та же болѣзнь, только въ двухъ полахъ: первая у мужчинъ, а вторая у женщинъ; онѣ очень продолжительны и обыкновенно остаются во всю жизнь, по временамъ усилываясь послѣ какихъ-нибудь (причинъ нравственныхъ (огорченія, испуга), или физическихъ (наичаще отъ пищи)) до приступа, и потомъ послабляются такъ, что въ больномъ не замѣчается никакихъ признаковъ болѣзни, кромѣ худобы тѣла, блѣдности и желтизны въ лицѣ, и то не у всѣхъ, одержимыхъ этою болѣзнію.



**Причины.** Ипохондрія и истерика зависят отъ болѣзненной чувствительности и слабости нервовъ желудочныхъ и кишечныхъ, а у женщинъ, сверхъ того, и маточныхъ нервовъ; а чувствительность и слабость нервовъ производятся распутствомъ и неумѣренностію въ удовлетвореніи плотской похоти, напряженіемъ умственныхъ способностей, размышленіемъ о высокихъ отвлеченныхъ предметахъ, продолжительнымъ нравственнымъ и физическимъ страданіемъ, печалью, огорченіемъ, заботами, тягостною работою, значительною потерей крови чрезъ частыя кровопусканія, почечуя, мѣсячныя очищенія, продолжительнымъ проносомъ, неумѣреннымъ употребленіемъ слабительныхъ, переломъ у мужчинъ, бѣлами у женщинъ, завалами, скопленіемъ нечистотъ и полнокровіемъ въ брюхѣ, неправильнымъ появленіемъ почечуя, мѣсячныхъ кровей, подагры, неудовлетворенною похотью, у молодыхъ женщинъ (вдовъ, пожилыхъ дѣвицъ), разгорячающихъ свое воображеніе чтеніемъ романовъ, переносомъ на брюшныя нервы чесоточной, ревматической, подагренной, любострастной остроты. Нерѣдко многія изъ сихъ причинъ дѣйствовали, или еще дѣйствуютъ вмѣстѣ и дѣлаютъ болѣзнь сложною, а потому къ такимъ больнымъ нужно всегда приглашать врача: это тѣмъ удобнѣе сдѣлать, что обрѣти болѣзни появляются у достаточныхъ городскихъ жителей и допускаютъ медленность въ пособіи безъ вреда для больного.

**Лѣченіе.** Здѣсь, какъ почти и во всякой болѣзни, главное дѣло состоитъ въ открытіи и удаленіи причины болѣзни, которая, какъ результатъ многихъ другихъ причинъ чаще состоитъ въ завалѣ брюшныхъ внутренностей, особенно же печени и селезенки (лежащихъ въ подвздохахъ *hypo-chondria*, отъ чего и болѣзнь названа ипохондріею), въ накопленіи нечистотъ, обрюшномъ полнокровіи отъ почечуя, мѣсячныхъ очищеній.

Сидячая жизнь, стягиваніе живота шнуровками у женщинъ, перетяжками у мужчинъ; нравственное безпокойство; трудноваримая, нездоровая пища; желтизна глазъ, рта и носа; блѣдно-желтое лице; худощавое тѣло; вздутое, напряженное, увеличенное въ объемъ брюхо, въ которомъ, при опускываніи



его, можно замѣтить твердость, неровность, желваки; слабый или неравный позывъ на ѣду—то отвращеніе отъ пищи, то обжорство; давленіе, напряженіе и тяжесть подъ ложечкою послѣ обѣда, также тяжесть во всемъ тѣлѣ, лѣнь и брюзгливость послѣ обѣда; неодинаковое испражненіе низомъ, проявляющееся не въ одни часы дня—то запоръ, то вдругъ поносъ, то облегченіе отъ поноса и ухудшеніе больного при запорахъ:—всѣ эти припадки показываютъ, что ипохондрія и истерика въ данныхъ случаяхъ зависятъ отъ матеріальныхъ причинъ въ брюхѣ и требуютъ продолжительнаго употребленія, такъ называемыхъ, разрыхляющихъ средствъ, изъ которыхъ дѣйствительнѣйшія суть: свѣже-выжатые соки изъ одуванчика (*taraxacum*), пырея (*gramen*), тысячелистника (*mellifolium*), дымчатки (*fumaria*), цикорія, золототысячника (*centaureum*), волчца-жудраваго (*carduus benedictus*), чистоспѣла (*chelidonium*); молочная свѣжая сыворотка, укусуcoкислый поташъ (*terra foliata tartari*), составы изъ кремортартара (*tartarus taritarsatus, solubilis, natronatus, boraxatus*), бычачья желчь, врачебное мыло, известковая вода, сѣра (ея цвѣты и молоко), аммоніачная камедь (*gummi ammoniacum*), дурной духъ (*assa foetida*), питье холодной воды въ большомъ количествѣ; кавказскія минеральныя воды: щелочныя, горькія и нардзанъ, зельтерская, зеллицкая, карлсбадская, маріенбадская, теплицкая, разрыхляющіе клистиры (№ 16); ванны мыльныя, щелочныя, соляныя, морскія купанья. Коренья и соли даются въ смѣси; мыло, желчь, камедь въ клистирахъ и пелюдахъ; ихъ нужно принимать въ такой мѣрѣ, чтобы они слабили низомъ 1—2 раза въ день. Употребленіе сихъ средствъ подъ надзоромъ врача должно продолжаться 2—3 мѣсяца, съ перемежками 2—3 дней для отдыха. отъ это

Причина ипохондріи и истерики состоитъ, вѣроятно, въ слабости тѣла;—нервная причина ипохондріи и истерики,—если онѣ появились послѣ упорнаго, продолжительнаго поноса, блѣей, потери крови чрезъ мѣсячное очиненіе, дѣтороднаго сѣмени, послѣ перелоя, частаго употребленія слабительныхъ; если у больного замѣчаются признаки общей слабости: скорая усталость, блѣдность, вялость, малая теплота,



слабый пульсъ. Здѣсь нужно прежде лѣчить поносъ, бывающій перелой, мѣсячное очищеніе, частое изліяніе сѣмени, которое иначе бываютъ причиною ипохондріи и притомъ излечивается очень трудно; впрочемъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ главное средство есть діета негорячительная и легкo-питательная, прогулка, движеніе, тѣлесный трудъ, свѣжій воздухъ и холодная вода, въ питьѣ, ваннахъ, купаньи, обливаньи.

Для успокоенія разныхъ припадковъ истеріки и ипохондріи, особенно въ животъ и груди, полезны слѣдующія средства, въ видѣ чая, капель, клистировъ: корень мауна, цвѣты и корка померанцовъ, корень правилата (*radix caryophyllatae*), бобровая струя (касторовыя капли), гофманскія капли, дурной духъ, запахъ горящаго пера, спиртъ нашта-тырный, оленьяго рога, ароматныя теплыя ванны; особенно полезны, продолжительное питье холодной наливки изъ померанцовыхъ листьевъ, также чай изъ сихъ листьевъ, мауна, мелиссы, правилата (№ 52).

Такъ называемыя крѣпительныя средства, какъ то: горькія, вязущія — хина, желѣзо, квасцы, желѣзныя воды и проч. тѣмъ менѣе полезны въ ипохондріи и истерикѣ, чѣмъ раздражительнѣе больные. Свѣжій воздухъ и купанье въ рѣкѣ и въ морѣ легче всего укрѣпляютъ такихъ больныхъ, съ которыми притомъ нужно обращаться, какъ съ дѣтьми и отстранять отъ нихъ все то, что имъ не нравится, поселить ихъ въ деревнѣ; дать имъ свѣжую, хорошую пищу — изъ молока, яицъ, яицъ, для питья ключевую воду, старое пиво, хорошій квасъ, и вовсе не давать ничего такого, что разстраиваетъ пищевареніе, развиваетъ вѣтры, какъ то: солонина, ветчина, сыръ, колбасы, солѣная рыба, горохъ, бобы, чечевица, капуста, лукъ, чеснокъ, молодое пиво, кислыя щи и вообще шипучіе напитки. Позволенную пищу нужно употреблять умеренно и лучше ѣсть почаще — 3—4 раза въ день, но по немногу, безъ обремененія желудка.

Впрочемъ, ипохондрію и истерику излечить очень трудно и почти никогда не удастся; нужно только удалить всё, что, какъ сказано выше, препятствуетъ усиленію болѣзни и дѣлаетъ положеніе больныхъ сноснымъ для нихъ, самихъ и



родственниковъ ихъ; посему припадочное леченіе сихъ болѣзней также необходимо. Оно состоитъ въ повременномъ употребленіи средствъ: слабительныхъ, противосудорожныхъ, уничтожающихъ кислоту и вѣтры. Изъ слабительныхъ средствъ, лучшія для сихъ больныхъ суть: магнезія съ кремортартаромъ, вѣнское питье, ревень, горькая вода и соль; касторовое, деревянное, льняное масла; каждому ипохондрику полезно всегда имѣть дома: порошокъ изъ правныхъ частей магнезіи, сѣрнокислаго поташа, ревеня, мауна и сѣмянъ укропа, и принимать его по чайной ложкѣ 1—3 раза въ день, по мѣрѣ надобности, до послабленія низомъ. Противосудорожныя средства суть: гофманскія капли, настойка мауна, сепиртъ изъ оленьяго рога, касторовая эссенція, дурной духъ. Первыя средства употребляются въ видѣ капель (по 10—15—20), а послѣдній, стертый съ яичнымъ желткомъ, въ клистирахъ (20—30—40 гранъ на клистиръ). Особенно полезны истерическимъ дамамъ клистиры съ дурнымъ духомъ, теплыя ванны, напѣаче ногъ, втираніе подъ лопатки и въ спину летучей съ камforoю мази, масла, настояннаго на листьяхъ бѣлены; въ обморокъ—опрыскиваніе лица и обтираніе лба и висковъ холодною водою, поднесеніе къ носу крѣпкаго уксусу, нашатырнаго спирту, тертаго хрѣну, луку, жженныхъ перьевъ.

Истерическіе и ипохондрическіе припадки въ высшей степени для неопытнаго могутъ показаться очень страшными, хотя они почти никогда не бываютъ опасны. Таковыя припадки суть: обморокъ, даже мертвенное обмираніе, продолжающееся нѣсколько часовъ и даже дней; чувство задушенія, при которомъ больной боится совсѣмъ задохнуться, дышать съ трудомъ, рѣдко и прерывисто, жалуются на сжатіе гортани какъ бы кулакомъ, шаромъ; судороги, похожія на падучую болѣзнь; дикій смѣхъ, крикъ и плачъ; сильныя боли въ груди и животѣ, какъ бы при воспаленіи. Здѣсь главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы всѣхъ этихъ нервныхъ припадковъ не признавать за воспалительные и происходящіе отъ полнокровія, а для того нужно обращать вниманіе на слѣдующія явленія: если у больного замѣчается частое побужденіе мочиться, причемъ испражняется блѣдная,



свѣтлая моча, давленіе въ глоткѣ какъ бы шаромъ, наклонность къ плачу, смѣху; если больная уже и прежде имѣла истерическіе припадки; даѣе, если она теперь запермгла отъ незначительной причины (огорченія, радости, испуга); если она не имѣетъ лихорадки, боли въ животѣ отъ прижатія, не усиливаются, — при такихъ явленіяхъ не должно опасаться истерическихъ припадковъ, употреблять вышеприведенныя средства и не торопиться кровопусканіемъ, которое въ истерику и ипохондрію вообще вредно и можетъ быть допущено только у молодыхъ, полнокровныхъ особъ, у которыхъ прекратилось бывшее кровотеченіе изъ носа, легкихъ, почечуиное, мѣсячное очищеніе; и у которыхъ не можно опасаться пострѣла (удара), кровохарканія или воспаления легкихъ, мозга, желудка; но и въ такихъ случаяхъ, прежде нежели рѣшиться пустить кровь, нужно, если можно, посоветоваться въ врачемъ.

§ 83. Падучая болѣзнь, падучка. — Признаки: судорожныя движенія и безпамятство; больной вдругъ съ крикомъ падаетъ на землю тамъ, гдѣ его застала болѣзнь, теряетъ память и получаетъ судороги: руки и ноги то сгибаются, то разгибаются, кромѣ большого пальца на рукѣ, который скорченъ и прижатъ къ ладони; грудь и брюхо страшно вздымаются и опадають; прервистое со стономъ дыханіе, подергиваніе личныхъ мышцъ, появленіе пѣны у рта, страшное вращеніе глазъ и закатъ ихъ подъ лобъ.

Потеря памяти, совмѣстно съ судорогами, суть главные припадки болѣзни; но одиъ судороги (въ пляскѣ св. Витта) и одно безпамятство (въ пострѣлѣ) не составляютъ падучей болѣзни, которая притомъ временно появляется приступами, пароксизмами. Самый приступъ состоитъ изъ двухъ періодовъ: судорожнаго и безчувственного. Чаше всего приступъ возвышается тоскою, головною болью, тошнотою, чувствомъ легкаго вѣтерка, начинающагося отъ ножныхъ, ручныхъ пальцевъ, или дрожи по спинѣ, животу; вѣтерокъ и дрожь восходятъ вверхъ къ головѣ и въ это время больной падаетъ и теряетъ память, или же онъ вдругъ вскрикиваетъ и падаетъ въ безчувствіе, какъ бы молніею пораженный. Иногда вѣтерокъ начально появляется въ носу, во рту,



въ глазахъ и производить въ сихъ частяхъ тѣла странный запахъ, вкусъ, свѣтъ, цвѣтъ на видимомъ предметѣ.

Настоящій приступъ состоитъ изъ судорогъ и безчувствія: больного бьетъ 2—5—10 минутъ, потомъ судороги поне-многу утихаютъ и совсѣмъ перестаютъ, но больной остается въ безпамятствѣ, какъ бы въ сонѣ, изъ котораго наконецъ онъ приходитъ въ себя, ничего не помнитъ что съ нимъ случилось, чувствуетъ небольшую слабость, скоро, впрочемъ, проходящую.

Причины. Падучая болѣзнь видимо состоитъ въ страданіи мозга и мышцъ, — самосвѣдѣнія и движенія. Ея причины суть: наследственное расположеніе, ослабленіе тѣла распутствомъ, рукоблудіемъ; сильный испугъ (у дѣтей, женщннъ), глисты, особенно плоскія; нечистоты въ брюхѣ, завады внутренностей; переносъ на нервы или мозгъ остроты чесоточной, лишайной, золотушной; раны черепа и мозга, костида черепа, позвонковъ при горбѣ; остановленіе кровоточенія изъ носа. Неожиданный взглядъ на больного во время приступа сообщалъ иногда болѣзнь здоровымъ людямъ.

Падучая болѣзнь хотя и редко сама по себѣ бываетъ смертельна, но зато излечивается очень трудно: изъ 20 больныхъ едва ли выздоравливаетъ одинъ, и тѣмъ менѣе надежды на излеченіе, чѣмъ долѣе она уже продолжалась. Сверхъ того, она переходитъ въ слабоуміе, водянку, изнуреніе тѣла; да и самое положеніе больного во время приступа составляетъ ужасное и горестное зрѣлище для его родныхъ и близкихъ.

Леченіе можетъ быть двойное: предохранительное—отъ приступа, и коренное—болѣзни. Предохранительное леченіе возможно, если появленію приступа предшествуютъ сказанные признаки: вътерокъ, запахъ, вкусъ, свѣтъ. Здѣсь какъ можно скорѣе надобно дать больному рвотное изъ 10 гранъ свѣрнокислаго цинка, или 40—60 капель спирта изъ оленьяго рога, либо драхму чернобыльника (*artemisia vulgaris*) въ порошокъ съ теплымъ пивомъ, и потомъ положить его въ теплую постель для возбужденія пота. При появленіи вътерка на рукѣ или ногѣ, нужно у больного довольно плотно



перевязать ту или другую; такъ иногда удается прервать переходъ раздраженія на мозгъ и предотвратить приступъ; съ этою цѣлью больной долженъ всегда съ собою носить тесемку или ремешокъ съ пряжкой, либо турникетомъ. Если время появленія приступа извѣстно, то нужно стараться, чтобы онъ засталъ больного не на улицѣ, на камнѣ, въ водѣ, на лѣстницѣ, а въ постель, на мягкой землѣ; смотрѣть, чтобы во время судорогъ онъ не ушибъ головы, не прикусилъ языка; послѣднее можно предотвратить положеніемъ между зубовъ больного куска пробочнаго дерева.

Настоящее лечение падучей болѣзни, вообще весьма рѣдко удачное, мы предоставляемъ врачу. Впрочемъ, здѣсь можно замѣтить слѣдующее: 1) нужно удалить причину болѣзни: а) нечистоты въ брюхѣ, глисты, завалы внутреннихъ; здѣсь полезно продолжительное употребленіе разрѣшающихъ средствъ, чрезъ каждые восемь дней рвотное, а потомъ слабительное, разрѣшающіе клистиры, противуглистные средства; б) ослабленіе тѣла чрезъ потерю дѣтороднаго сѣмени любострастнымъ распутствомъ, рукоблудіемъ; здѣсь полезны: увѣщаніе больного, тщательный надзоръ за нимъ, холодная вода въ разныхъ видахъ, хина, желѣзо (см. Спинную сухотку); в) чесоточная, лишайная острота, бросившаяся на нервы; тутъ нужны: сбра внутрь и снаружи, кровочистительный отваръ изъ сассапарели, баккаута, сладкогорькаго паслёна, сѣрные минеральныя воды, Фонтанели; г) полнокровіе или остановившееся привычное кровоточеніе: почечуйное, мѣсячное, изъ носа, волненіе крови, головныя боли; здѣсь необходимы: тощая діета, болѣе растительная, молочная пища, умеренный сонъ, движеніе до легкой усталости 2—3 раза въ день, чрезъ 1—2 дня слабительное изъ горькой соли, воды, чрезъ 2—4—8 недѣль кровопусканіе изъ руки, или припускъ пиявицъ къ головѣ, къ спинѣ, гдѣ замѣчалась или и теперь чувствуется боль. 2) Если это лечение окажется безуспѣшнымъ, или неумѣстнымъ, то употребляютъ, такъ называемыя, специфическія противъ падучей болѣзни лекарства, изъ которыхъ главныя суть: цинкъ (цвѣты), мѣдь (синій купоросъ *sulfurum ammoniacale*), адскій камень, корень мауна, померанцовые цвѣ-



ты, чернобымьникъ обыкновенный, хина, обливанія холодною водою, морское купанье. Употребленіе первыхъ трехъ средствъ мы предоставляемъ врачу. Корень мауна въ порошокъ и съ мауннымъ масломъ (по 2—3 капли) нужно употреблять 3—4 раза въ день по полудрагмѣ зеленые; померанцовые цвѣты даются также по золотнику въ порошокъ 2—3 раза въ день въ чаѣ изъ сихъ же листьевъ; чернобымьникъ дается въ порошокъ по драгмѣ; приемъ порошка больной запиваетъ теплымъ пивомъ и ложится въ постель для произведенія пота. Главное правило при леченіи падучей болѣзни состоитъ въ долговременномъ употребленіи избраннаго лекарства—въ теченіе половины и цѣлаго года; даже и по прекращеніи приступовъ, еще нѣсколько лѣтъ, нужно 1—2 раза въ день всякіе полмѣсяца, принимать то лекарство, которое прекратило пароксизмы. Впрочемъ, повторяемъ, что все это нужно дѣлать подъ надзоромъ врача и съ его совѣта.

§ 84. Пляска св. Витта. — Признаки: судороги во всемъ тѣлѣ или только въ нѣкоторыхъ его частяхъ; судороги не бываютъ такъ сильны, какъ въ падучей болѣзни, не сопровождаются безчувствіемъ, но за то продолжительны. Форма и степень судорогъ очень различны: въ лицѣ онѣ выражаются кривляньемъ, улыбкою, угрозою, въ языкѣ заиканьемъ, въ шеѣ—качаніемъ головы, въ рукахъ и ногахъ—разными тѣлодвиженіями, похожими на танцы до упада отъ усталости, бѣганьемъ, круженіемъ, вертѣніемъ на одной ногѣ, приганьемъ; все эти судороги продолжаются или непрерывно, прекращаясь только во время сна, или же онѣ появляются періодически, въ извѣстные часы дня, чрезъ недѣлю, мѣсяцъ и пр. Пляска появляется наичае между 10 и 16 годомъ, чаще у дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ, и притомъ живущихъ въ низменныхъ, прибрежныхъ мѣстахъ: иногда обнаруживается она повально разомъ на многихъ юношахъ и сообщается взглядомъ на больныхъ людей. Впрочемъ, она не опасна, удобно излечивается и проходитъ съ лѣтами безъ леченія, хотя мѣстные судороги, напр. въ лицѣ, заиканье и пр. могутъ остаться на всю жизнь.

Причины тѣ же, что и падучей болѣзни, съ тою разио-



стію, что при пляскѣ страдаетъ не черепный, а только позвоночный мозгъ. Лечение то же, что и падучей болѣзни.

§ 85. Хожденіе во снѣ, лунатизмъ. — Признаки: больной во снѣ слышитъ, говоритъ, ходитъ и занимается дѣлами (читаетъ, пишетъ, шьетъ, прядётъ и пр.), но, пробудившись отъ сна, ничего о томъ не помнитъ. Лунатизмъ имѣетъ разныя степени, какъ-то: больной грезитъ во снѣ, разговариваетъ, слышитъ разговоръ другихъ и отвѣчаетъ на вопросы, исполняетъ разныя дѣла, лазитъ по крышѣ дома и наконецъ впадаетъ въ ясновидѣніе, въ которомъ видитъ внутренность своего и другихъ тѣла, описываетъ свою и другихъ болѣзнь, видитъ отсутствующихъ своихъ родныхъ и знакомыхъ, описываетъ ихъ положеніе и занятіе, предсказываетъ будущія происшествія, особенно до него лично относящіяся, даже указываетъ, гдѣ въ землѣ протекаютъ ключи воды, пролегаютъ металлическія жилы и пр.

Причины. Хожденіе во снѣ зависитъ отъ усиленнаго развитія внутреннихъ чувствъ: памяти, воображенія, сужденія; оно чаще появляется въ періодъ развитія тѣла, когда эти чувства и безъ того находятся въ сильномъ дѣйствіи, — у юношей и особенно дѣвицъ, у которыхъ воображеніе и мечты принимаютъ еще обширнѣйшіе полеты, чѣмъ у мальчиковъ съ наступленіемъ періода возмужалости. Оно проходитъ само по себѣ и рѣдко продолжается во всю жизнь. На развитіе болѣзни имѣетъ вліяніе полная луна, а потому и больныхъ называютъ лунатиками. Она сама по себѣ безопасна, но больной, ходя во снѣ, и особенно лазя по крышамъ, деревьямъ, можетъ причинить себѣ вредъ, также онъ можетъ быть опасенъ и для другихъ: имъ безсознательно нанесены раны, ушибы, даже смерть.

Ясновидѣніе во снѣ, съ закрытыми глазами, производится иногда искусственно, при леченіи, особенно женщинъ, посредствомъ животнаго магнетизма.

Лечение. Болѣзнь не требуетъ никогда леченія, кромѣ тщательнаго надзора за больнымъ, чтобы онъ, ходя во снѣ, не нанесъ себѣ или другимъ какого вреда; а для этого надобно его помѣщать въ комнату, изъ которой удалить всё то, чѣмъ можно кого-либо ушибить, ранить, обжечь, об-



лечь и проч., изъ которой онъ не могъ бы ни выйти въ дверь, ни вылезть въ окошко. На полу у кровати такихъ больныхъ на ночь можно ставить тазъ, или другой какой сосудъ, съ водою: больной, вставая для хождения, попадаетъ ногами въ воду и пробуждается. Кромѣ сего, такихъ больныхъ нужно помѣщать на ночь въ комнату, въ которую не проникаетъ свѣтъ луны.

**Оцѣпенѣніе, catalepsia.** Признаки: прекращеніе вліянія души на тѣло и тѣла на душу; безчувственность ко внешнимъ впечатлѣніямъ и неподвижность; однако присемъ мышцы не деревѣютъ, не кочевѣютъ, какъ въ корчахъ (столбнякъ), но бываютъ гибки, и потому рукамы и ногамы больного можно дать произвольное положеніе, которое онъ потомъ и удерживаютъ. Въ оцѣпенѣніи произвольныя дѣйствія души и тѣла останавливаются въ томъ положеніи, въ какомъ ихъ засталъ приступъ: шедшій больной—цѣпенѣтъ съ поднятою ногою, говорящій—съ раскрытымъ ртомъ, работающій—съ перомъ, иглою; кивгою въ рукахъ и проч. Приступъ продолжается нѣсколько минутъ, часовъ и даже дней, послѣ чего больной приходитъ въ себя, какъ бы пробуждаясь отъ глубокаго сна и ничего не поминуть отъ приключившемся съ нимъ припадкѣ.

**Причины.** Сущность болѣзни состоитъ, кажется, въ особенномъ положеніи души, похожемъ на сонъ, и въ которомъ дѣйствіе ея на тѣло прекращается. Болѣзнь появляется при тѣхъ же условіяхъ развитія юношескаго тѣла, какъ и хожденіе во снѣ, которое иногда въ нѣмъ появляется и вмѣстѣ: больная, ходящая во снѣ вдругъ дѣлается неподвижною, какъ статуя. Постороннія причины тѣ же, что и падучей болѣзни и пляски, особенно же разгоряченное воображеніе, изнѣженность, рукоблудіе, несчастная любовь, неудовлетворенная плотская похоть, уединенная, монастырская жизнь, глисты, неправильное, трудное мѣсячное очищеніе.

**Леченіе** то же, что и въ другихъ нервныхъ болѣзняхъ; впрочемъ оцѣпенѣніе такъ же легко проходитъ и безъ всякаго леченія, какъ и снохожденіе.

§ 86. Давленіе во снѣ, навалъ, кошмаръ.—**Признаки.** Во снѣ человекъ чувствуетъ необыкновенную на себя



тяжесть; приче́мъ ему снится, что его давятъ люди, звѣри, скотъ, что на него навалился кулювеа, муки, бревно, глыба земли, камень и пр.; спящій тщетно старается избавиться отъ давленія, хочетъ встать, подвинуться, но не можетъ; наконецъ онъ вскрикиваетъ и просыпается съ радостію, что избавился отъ задушенія. Навальъ появляется въ первые часы сна, у однихъ людей довольно рѣдко, безъ всякаго вреда для ихъ здоровья, у другихъ же почти каждую ночь и частымъ нарушеніемъ сна, а равно и самъ по себѣ разстроиваетъ наконецъ здоровье.

Причины. Болѣзнь состоитъ въ прижатіи, стѣсненіи брюшныхъ и грудныхъ нервовъ. Это прижатіе производится 1) пищею, когда человекъ плотно поужинаетъ и скоро потомъ ложится спать; 2) полнокроемъ общимъ во всемъ тѣлѣ, или мѣстнымъ скопленіемъ крови въ животъ, груди и; 3) положеніе во снѣ на спинѣ безъ возвышенія головы; приче́мъ пища, кровь и вѣтры напараютъ на желудокъ, подъ ложечку.

Лечение состоитъ въ удаленіи причинъ: людямъ полнокроемъ, ведущимъ сидячую жизнь, по совѣту врача, нужно пустить кровь, вовсе не ужинать, или же есть немного и притомъ легкую пищу, непроизводящую вѣтровъ—сухъ, кусокъ мяса, яица, молоко; не есть на ночь плодовъ; ложась спать, выпивать стаканъ холодной воды; засыпать на боку, а не на спинѣ, и давать головѣ возвышенное положеніе; стараться имѣть ежедневно свободное испражненіе низомъ; при частой отрыжкѣ и вѣтрахъ, принять на ночь порошокъ изъ магнезій, въ укропной водѣ, раковыхъ жерновокъ, жженого хлѣба въ порошокъ.

§ 87. Трясеніе тѣла. — Признаки. Трясеніе во всемъ тѣлѣ, или въ нѣкоторыхъ его частяхъ, и притомъ въ разной степени: отъ легкаго дрожанія до сильнаго трясенія, рывкаго подергиванія, толчковъ, потрясеній; человекъ дрожитъ, какъ въ лихорадочномъ ознобѣ, кривляется, шатается какъ пьяный, переваливается съ боку на бокъ, какъ бы плашеть.

Причины: слабость мышцъ и нервовъ, происходящая отъ пьянства, полнокроедія, переноса подагры; чаще однако трясеніе тѣла есть слѣдствіе пострѣла, сильной горячки, упо-



требленія ртути, поглощенія ртутныхъ, мышьяковыхъ, свинцовыхъ паровъ; по сему оно замѣчается у заводскихъ, фабричныхъ работниковъ, золотарей, серебрянниковъ, живописцевъ; послѣ куреній коноварью. Вообще трясеніе тѣла излѣчивается очень трудно, особенно когда зависить отъ ослабленія нервовъ и мышцъ.

Леченіе нужно предоставить врачу, и притомъ искусному. При трясеніи отъ отравленія ртутью, мышьякомъ, свинцомъ, полезны частое хожденіе въ баню, теплыя ванны съ сѣрною печенкою, сѣрныя минеральныя воды, кровочистительныя декокты, легкія слабительныя съ сѣрою, пиявцы къ спинѣ при постоянной въ ней боли; холодныя ванны, обливанья холодною водою, дождевыя ванны, желѣзныя воды — кавказскій нардзанъ, воды пирмонтскія, егерскія.

§ 88. Злая корча, рафанія. — Признаки. Чувство нездоровья, лихорадочное состояніе, боль головы, тошнота; часто и рвота, боль подъ ложечкою, горечь во рту, бѣлый, нечистый языкъ, жажда, то недостатокъ аппетита, то обжорливость, то запоръ, то чаще поносъ, чувство ползанія мурашекъ по рукамъ, ногамъ и особенно по спинѣ (отличительный признакъ); наконецъ появляется корча въ мышцахъ, которая сводитъ руки, ноги, причиняетъ нестерпимыя боли; больной впадаетъ въ безпамятство, которое вмѣстѣ съ корчею продолжается 5—10—30 минутъ; послѣ чего больной приходитъ въ себя, чувствуетъ слабость, а чрезъ нѣсколько времени опять впадаетъ въ то же состояніе. Въ послѣдствіи на рукахъ и ногахъ, чаще на пальцахъ, появляется рожа, переходящая въ помертвѣніе, которое причиняетъ потерю пальцевъ, даже рукъ и ногъ и дѣлаетъ человека навсегда калѣкою, или же большою выздоравливаетъ отъ корчи, но теряетъ разсудокъ, получаетъ изнуреніе тѣла, водянку и пр.

Причины. Болѣзнь состоитъ изъ лихорадки, корчи и приливовъ крови къ головѣ. Она почти исключительно происходитъ отъ употребленія въ пищу ржаного и пшеничнаго хлѣба, испеченнаго изъ муки, которая приготовлена изъ ржи, или пшеницы, содержащихъ въ себѣ черныя болѣзие



рожки (спорынья), изгарь, куколы. Почти ежегодно она появляется у насъ въ разныхъ губерніяхъ осенью, когда крестьяне начнутъ печь хлѣбъ изъ новой ржи, неочищенной отъ рожковъ; самые же рожки зараждаются во ржи, посаженной въ низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ, на нивахъ, находящихся въ лѣсу и неосвѣщаемыхъ достаточно солнцемъ, также въ сырое дождливое лѣто (см. Гигіену: пища, хлѣбъ, рожь).

**Лечение двойное: предохранительное и дѣйствительное.** Первое состоитъ въ очищеніи ржи отъ рожковъ, пшеницы, отъ головни, изгари и куколы и въ доставленіи людямъ хорошаго хлѣба. Рожь и пшеницу, содержащія въ себѣ очень много рожковъ, головни, изгари, нужно или очистить отъ нихъ, или же и совсѣмъ не употреблять въ пищу, а назначить ее на гонку водки; безъ этой мѣры самое искусное лечение останется безъ успѣха. Люди, уже заболѣвшіе, не выздоравлиють, а здоровые непременно заболѣють при употребленіи въ пищу такого хлѣба. Способъ очищенія ржи и пшеницы отъ этой порчи знаетъ всякій помѣщикъ и сельскій хозяинъ.

**Дѣйствительное лечение,** при употребленіи въ пищу хорошаго хлѣба, нетрудно; прежде всего нужно очистить желудокъ и кишки отъ остатковъ прежней пищи, а для этого больнымъ надобно давать рвотное изъ раствора рвотнаго камня (№ 10 6.), а потомъ черезъ 4—5 часовъ послѣ рвотнаго, давать слабительное изъ какой-либо соли съ нашатыремъ (№ 6, 33); последнее лекарство продолжать до прекращенія желудочныхъ припадковъ—до очищенія языка и появленія правильнаго аппетита; больного должно слабить 2—3 раза ежедневно. Головные боли унимать холодными примочками головы; боли, корчи и сведеніе рукъ и ногъ лучше всего облегчаются довольно плотнымъ увиваніемъ рукъ и ногъ, также трепіемъ и припарками, теплыми ваннами съ отрубями, сѣною трухою и проч.

§ 89. Сжатіе, смыканіе челюстей, столбнякъ.—  
**Признаки.** Трудное поворачиваніе головы, а потомъ и раскрытіе рта; боль въ шѣхъ и челюстяхъ, которая наконецъ смыкаются такъ, что ни больной, ни посторонніе люди, да-



же клинкомъ не могутъ ихъ раздвинуть; судороги отъ лица и шеи простираются на бока груди, руки и ноги, и больного скорчивается впереди въ крючекъ, такъ-что голова и руки прислоняются къ груди, а ноги къ брюху или къ задѣ, выгибается его въ дугу; при чемъ голова закатывается къ затылку, руки и ноги выправляются, какъ палки; или, наконецъ, искривляется человѣкъ на правый, либо на лѣвый бокъ. Корча простирается на языкъ и дѣлаетъ его неподвижнымъ,—на пищевое горло, желудокъ, кишки и останавливаетъ глотаніе, пищевареніе, испражненіе низомъ,—на грудныя мышцы, лѣгкія и сердце, затрудняетъ дыханіе, кровообращеніе и такъ причиняетъ смерть задушеніемъ. Больной видимо сильно страдаетъ, но не можетъ говорить и не теряетъ памяти.

Смыканіе челюстей и столбнякъ бываетъ острый, постоянный, продолжается 3—7 дней безъ ослабленія и оканчивается смертію; или же хроническій, продолжается нѣсколько недѣль, по временамъ ослабляетъ и позволяетъ больному говорить, глотать и также оканчивается смертію, либо выздоровленіемъ, или остается на всю жизнь (\*). Посему острый столбнякъ опаснѣе хроническаго, хотя и послѣдній излечивается очень рѣдко. Самостоятельный столбнякъ напр. при ранахъ, у новорожденныхъ дѣтей опаснѣе, чѣмъ припадочный, особенно если онъ появляется въ первой болѣзни; такъ столбнякъ въ истерикѣ вовсе не опасенъ.

Причины. Столбнякъ состоитъ въ сильномъ скорченіи, сжатіи мышцъ. Если это скорченіе происходитъ на передней части тѣла, въ мышцахъ сгибающихъ, то больной скорчивается въ кольцо, если же на задней, то онъ вытягивается, какъ говорятъ, въ струнку, или даже выгибается въ дугу назадъ къ спинѣ или на бока. Причина этого скорченія мышцъ есть сильное раздраженіе нервовъ и оно замѣчается при изліяніи острой желчи и желчной горячкѣ, при гнистахъ, отравленіяхъ, ревматизмѣ, подагрѣ, оспѣ, скарлатинѣ (когда эти сыпи скрываются), въ истерикѣ, у ново-

(\*) Удивительный примѣръ столбняка представляетъ въ Олонейской губерніи дочь священника, которая уже 33 лѣтъ лежитъ въ постелѣ въ такомъ положеніи, что ея одна нога прижата къ виску, а прочіе члены также страшно искривлены.



рожденныхъ дѣтей во время прорыванія зубовъ и особенно часто при рапахъ, и наипаче колотыхъ сухихъ жилъ (на пальцахъ), при загнояхъ, сильныхъ ущемленіяхъ пальцевъ. Въ жаркихъ странахъ столбнякъ при рапахъ встрѣчается очень часто. Лечение должно предоставлять исключительно врачу, до прибытія котораго, или при его недостаткѣ, нужно поступать такъ: если больной начинаетъ дѣлаться тугрымъ, безпокойнымъ, жаловаться на стягивающую боль въ шее, трудное раскрытіе рта, то нужно обратить вниманіе на его начальную бользнь: при желчиой горячкѣ полезенъ рвотное, а потомъ слабительное; при ревматизмѣ — камфора и теплыя ванны; при боли въ шее и спинѣ — іюдицы, кровопусканіе и теплыя припарки; осмотрѣть рану, извлечь изъ нея загнозы, разрѣзать натянутыя въ ней сухія жилы въ видѣ бѣлыхъ струнъ; въ ранѣ прикладывать теплыя припарки съ быленомъ; если рана находится на рукѣ или ногѣ, то выше раны перевязать руку или ногу такъ плотно тесмою, что былой онѣмъли; эту перевязку снять чрезъ 10—20 минутъ, а потомъ опять наложить, особенно если послѣ первой перевязки корчи ослабѣваютъ, больной начинаетъ говорить, глотать, хотя и съ трудомъ; далѣе, больного нужно посадить въ теплую ванну съ листьями былены, табаку, съ золою и потомъ внутрь давать рвотный камень, по  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  грана на пріемъ до произведенія рвоты, появленіе которой означаетъ ослабленіе бользни. При столбнякѣ потыранъ внутрь дають опій въ настойкѣ по 10—15—20 капель чрезъ  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, пока больной не уснетъ или не забудется; — это также есть хорошій знакъ. Впрочемъ, надобно замѣтить, что при столбнякѣ внутрь давать лекарство очень трудно: больной такъ стискиваетъ зубы, что ничего нельзя впустить въ ротъ; если же это удастся сдѣлать чрезъ отверстіе выпавшаго зуба, то лекарство изъ рта вытекаетъ назадъ, потому что больной его проглотить не можетъ; по этому опійной рвотный камень нужно давать въ клистирахъ, ваннахъ, припаркахъ, въ мазяхъ. Въ столбнякѣ отъ раны помогаетъ иногда отнятіе раненой руки, ноги и потому приглашеніе оператора вдвойнѣ необходимо.



§ 90. Удушье, одышка. — Признаки: трудное дыханіе, то послѣ движенія, то и при спокойствіи тѣла, даже во снѣ; но при этомъ у больного нѣтъ никакой лихорадки, какъ спутника одышки, зависящей отъ воспаления въ груди; отъ чахотки. При удушьи всегда бываетъ и кашель, онъ притомъ сухой или съ мокротою; самое удушье то замѣчается постоянно, то поддается временно; проходитъ и опять возвращается; постоянное удушье опаснѣе проходящаго. Вообще продолжительное удушье затрудняетъ проходъ крови чрезъ легкія, причиняетъ въ нихъ скопленіе крови, слизи, производитъ бугорки, превращаетъ ихъ въ твердую массу, какъ печень, мѣшаетъ кровотоверенію, всасыванію и отъ этого опять происходитъ худосочіе, и отѣкъ лица, ногъ, а потомъ водянка въ груди, брюхѣ и проч.; иногда мѣшаетъ и

Причины. Удушье состоитъ въ затрудненномъ дѣйствіи лёгкихъ, въ несвободномъ дыханіи и особенно въ трудномъ вдыханіи; причины этого труднаго дыханія находятся или въ самыхъ лёгкихъ, либо въ грудной полости, или же во всемъ тѣлѣ; онѣ очень разнообразны, отъ чего и самое удушье бываетъ различное, а именно:

1) Нервное удушье зависитъ отъ судорожнаго состоянія грудныхъ нервовъ и появляется при волненіи духа — отъ гнѣва, радости, испуга, также въ истерикѣ; оно неопасно, хотя по видимому и какъ бы угрожаетъ задушеніемъ; также оно появляется періодически, и особенно ночью.

2) Удушье отъ полнокровія замѣчается у людей полнокровныхъ, плотныхъ, тучныхъ, послѣ движенія, работы, восхода на гору, на лѣстницу, послѣ остановившагося кровотоčenія изъ носа, почечуйнаго, мѣсячнаго очищенія.

3) Брюшное удушье зависитъ отъ скопленія въ желудкѣ и кишкахъ вѣтровъ, нечистотъ, кислоты, глисть, воды, жира, увеличенія печени, отвердѣнія желѣзъ, отъ запоровъ на низѣ.

4) Удушье отъ переноса на лёгкія подагренной, золотушной, чесоточной, лишайной, любострастной, острой матеріи, отъ остановившейся испарины (при сухой шероховатой кожѣ), отъ уменьшеннаго отдѣленія и испражненія мочи (при запахѣ мочи въ выдыхаемомъ воздухѣ).



5) Удушье отъ общей слабости послѣ кровотеченій, кровопусканій, въ цынги, въ дѣвической немощи.

6) Удушье отъ разнѣхъ болѣзней шеи, лёгкихъ, грудныхъ органовъ. Сюда относится удушье металлическое, отъ вдыханія на фабрикахъ мышьяковыхъ, ртутныхъ, свинцовыхъ паровъ, пыли при обработкѣ камней, очисткѣ шерсти, тряпья, пуха, молоты муки на мельницахъ, метеніи улицъ, отъ проникнутія въ лёгкія воздуха, при разрывѣ лёгочныхъ кѣлочекъ, во время сильнаго кашля (коклюша), при сквозныхъ ранахъ груди, отъ скопленія въ груди и въ лёгкихъ воды (удушье при грудной водянкѣ), слизи (старческое удушье), крови (удушье при сквозныхъ ранахъ въ груди), гноя (удушье послѣ воспаленія лёгкихъ), отъ бугорковъ въ лёгкихъ; удушье при чахоткѣ, отъ окостенѣнія сердечныхъ и лёгочныхъ сосудовъ (грудная жаба), отъ расширенія сердца и большихъ сосудовъ (удушье при сердцебіеніи), отъ искривленія позвонковъ, грудной кости, реберъ (удушье у горбатыхъ), отъ окостенѣнія реберныхъ хрящей и неподвижности реберъ (удушье у стариковъ).

Изъ всего этого видно, что распознаваніе удушья очень трудно, а еще труднѣе его леченіе, и потому приглашеніе врача къ такимъ больнымъ необходимо.

Леченіе удушья есть двоякое: общее и особенное. Общее леченіе полезно при всякомъ удушьи; оно состоитъ: а) въ способствованіи свободному отдѣленію мокроты изъ лёгкихъ и испражненію нечистотъ изъ брюха; для этого полезны средства: вытяжка пырея, одуванчика, цикорія, свѣжіе соки растений, разные составы изъ виннаго камня (*tartarus tartarisatus, solubilis—terra foliata tartari*), горькая, англійская соль, и особенно сѣра; б) въ усиленіи отдѣленія и испражненія мочи и испаринны въ кожѣ, для предотвращенія грудной водянки, которая, при всякомъ продолжительномъ удушьи, наконецъ развивается; здѣсь полезны: ношеніе на голомъ тѣлѣ шерстяной, фланеловой рубашки, растираніе всего тѣла, мочегонныя и патогонныя средства, (см. эти способы леченія).

Особенное леченіе разнится по видамъ: 1) первіе удушья проходятъ съ душевнымъ успокоеніемъ и притомъ въ немъ



полезны средства против истерики, гипохондрии; въ почномъ, періодическомъ удушѣ — чашка чернаго кофе безъ сливокъ, это можно и повторить, а въ свободное отъ удушья время — хина или ея соль. 2) Удушье отъ полнокровія требуетъ голодной, тощей діеты, пищи растительной, молочной, движенія, кратковременнаго сна, внутрь селитры, наперсточной травы съ крамортартаромъ (№ 53), пиявицъ къ заднему проходу, къ пахамъ, къ ноздрямъ для возстановленія почечнаго теченія, мѣсячнаго очищенія, кровотеченія изъ носа. 3) При брюшномъ удушѣ: рвотное, слабительное, при вътрахѣ — укропъ, перечная мята, магнезія, древесный уголь, порошокъ изъ жженнаго хлѣба, леченіе отъ глисть; а при удушѣ отъ брюшныхъ заваловъ — минеральныя воды: кавказская, карльсбадская, эсская, зельтерская, ахенская; 4) въ удушье до переноса на легкія матеріи — леченіе главной болѣзни и фонтанель на рукѣ, на боку; 5) въ удушьи отъ общей слабости — питательное, крѣпительное содержаніе больного, леченіе цыги, двѣичей немочи; 6) удушье отъ металлическихъ паровъ особенно уступаетъ сырѣ внутрь и снаружки въ сырыхъ ваннахъ; удушье отъ пыли уступаетъ вдыханію теплыхъ смягчительныхъ паровъ изъ молока, просвинокъ, льнянаго сѣмени, а при боли и стѣсненіи въ груди — пиявкамъ, кровопусканію. Удушье отъ зоба, отъ горбовъ, отъ болѣзней сердца, окаменѣнія сосудовъ въ груди (грудная жаба) можетъ лечить только врачъ, и то рѣдко съ успѣхомъ.

§ 91. Кашель. — Признаки: сильное, быстрое, выдыханіе, соединенное съ шумомъ и звукомъ; онъ бываетъ сухой и мокрый, съ изверженіемъ харкотины; продолжается неопредѣленное время: нѣсколькими днями, недѣль и даже мѣсяцовъ; самъ по себѣ не опасенъ, но важенъ по своимъ послѣдствіямъ: воспаленію легкихъ, кровохарканію, чахоткѣ, расширенію сердца, большихъ сосудовъ и проч. Здѣсь впрочемъ разумѣется кашель безъ лихорадки и безъ особенныхъ другихъ грудныхъ припадковъ.

Причины. Кашель всегда означаетъ раздраженіе въ легкихъ, которыя отъ того сильно и судорожно сжимаются, быстро и съ шумомъ выгоняютъ воздухъ и такъ производятъ



кашель. Это раздраженіе легкихъ можетъ зависѣть отъ скопленія въ нихъ крови и воспаленія, отъ простуды (катарра), ревматизма, отъ вѣтровъ и нечистотъ въ желудкѣ, отъ заваловъ въ брюхѣ, особенно печени, отъ переноса на легкія чесоточной, золотушной, злобострастной, подагренной остроты, отъ бугорковъ и язвъ въ легкихъ, отъ накопленія воды въ грудной полости. По этому кашель бываетъ простудный, желудочный, воспалительный, нервный, переносный, припадочный.

Лечение бываетъ различное, сообразно видамъ кашля: 1) Кашель простудный, ревматическій, вследствие простуды: остановленія испарины въ кожѣ, промоченія ногъ, неосторожнаго глубокаго вдыханія холоднаго воздуха, послѣ бани, ванны, вспотѣнія и выхода изъ жаркой, душной комнаты на свѣжій, холодный воздухъ. Здѣсь прежде всего нужно возстановить испарину (см. Простудную лихорадку). Если кашель произошел недавно, то дѣйствительныя натиранія груди и шеи свинымъ саломъ, какимъ-либо жиромъ, льнянымъ, деревяннымъ масломъ, прикладываніе на ночь на грудь бумаги съ тертымъ мыломъ, грудной чай (№ 53), отвары ячменныхъ, овсяныхъ крупъ, льняныхъ семянъ съ медомъ, солодковымъ корнемъ, внутрь въ порошокъ нашатырь съ сырою и макричникомъ (№ 21, 55); мушка на верхнюю и переднюю часть груди. Если кашель упоренъ и продолжается уже нѣсколько недѣль, то полезны: ношеніе на голыта тѣль шерстяной, фланеловой рубашки, продолжительной мушки или корки змѣяго лыка, въ видѣ фонтанели на подножь, или на обоихъ плечахъ, внутрь отваръ сладко-горькаго паслена съ макричникомъ, нашатыремъ, исландскимъ мохомъ, сыворотка, зельтерская вода съ молокомъ, сокъ изъ пареной рѣпки, рѣпы, моркови, свежловиды. Упорный простудный кашель всегда угрожаетъ переходомъ въ чахотку; посему если онъ въ теченіе 2—3 недѣль не проходитъ, то припашеніе врача необходимо.

2) Желудочный кашель существенно отличается отъ легочнаго и припадками и леченіемъ, а именно: дыханіе свободно, кашель не появляется во время разговора, ходьбы, бѣга, глубокаго вдыханія, но онъ усиливается во время



жажды, послѣдны, во время пищеваренія, которое притомъ совершается съ трудомъ, больной послѣ употребленія пищи въ маломъ количествѣ чувствуетъ тягость и давленіе подъ ложечкою. Здѣсь полезны: сначала нашатырь съ виннымъ камнемъ, даваемый въ теченіе 2—3 дней (№ 11), а потомъ рвотное изъ рвотнаго камня, а наконецъ опять нашатырь съ горькою солью, манною и александрійскимъ листомъ (№ 33). Для поправленія желудка, очень полезенъ холодный чай изъ тысячелистника, трилистника, поутру и въ вечеру, по чашкѣ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Желудочный кашель часто зависитъ отъ гниль, которыя посему нужно удалить приличными лекарствами.

3) Воспалительный кашель. Его признаки: молодость больного, полнокрое, тяжесть, одышка и боль въ груди, скорое и трудное дыханіе, усиленіе кашля отъ движенія, разговора, изверженіе съ мокротою и кровяныхъ полосокъ, полный, твердый, скорый пульсъ, жаръ во всемъ тѣлѣ. Этотъ кашель легко переходитъ въ кровохарканіе и воспаленіе лёгкихъ. Лечение здѣсь тоже, что и при воспаленіи лёгкихъ: кровопусканіе изъ руки, пиявицы къ груди, внутри селитра съ отваромъ просвиры и солодовымъ корнемъ, тощая, молочная растительная діета; снаружи: масляныя втиранія въ грудь и шею, мушка на грудь. Этотъ кашель часто бываетъ слѣдствіемъ неправильнаго появленія почечуя и мѣсячныхъ кровей, которыя, вмѣсто настоящаго своего пути, устремляются на легкія; онъ можетъ зависѣть отъ сихъ двухъ причинъ, даже у молодыхъ людей, не имѣвшихъ еще ни почечуя, ни мѣсячнаго очищенія. Посему при упорности кашля съ болями въ груди, нужно обращать вниманіе на эти двѣ причины и посоветоваться съ врачомъ.

4) Нервный кашель замѣчается у людей нѣжнаго, слабаго сложенія, подобно желудочному, и онъ не только не усиливается отъ бѣга, разговора и другихъ разгоряченій тѣла, но еще утихаетъ; за то его легко возбуждаютъ страсти: радость, испугъ, гнѣвъ и проч. Этотъ кашель очень склоненъ къ переходу въ чахотку, и лечение его есть то, какое назначено при расположеніи къ чахоткѣ (см. Чахотку). Особенный также нервный кашель замѣчается у привыч-



ныхъ пьйницъ, по утрамъ, съ перхотою, тошнотою, даже рвотою, чаще сухой, но иногда и съ мокротою. Здѣсь главное средство воздержаніе отъ спиртовыхъ напитковъ по утрамъ и въ вечеру холодной чай изъ тысяче-и трилистника, горечавки, полыни, употребляемый постоянно и долго, жизнь въ деревнѣ, занятія въ саду, полѣ, огородѣ, вода, перегнанная изъ вишневыхъ, персиковыхъ косточекъ, листьевъ вишневаго лавра, корки черемухи, принимаемая по 20—40 и болѣе капель. 2—3 раза въ день.

5. Переносный кашель, отъ переноса чесоточной, лишайной, подагренной, любострастной, ревматической матеріи на легкія и дыхательное горло. Онъ замѣчается у людей, страдавшихъ имъ, можетъ быть, страдающихъ этими болезнями; онъ упоренъ и такъ же легко переходитъ въ чахотку, особенно гортанную или горовую. Лечение этого кашля надобно предоставить врачу. Здѣсь особенно полезны ванны простыя и серныя, повторительно прикладываемая мушка на грудь, ношеніе на голомъ тѣлѣ шерстяной рубашки, горчичники, искусственныя язвы или фонтанели на плечахъ.

6. Сверхъ сихъ видовъ кашля, онъ зависитъ отъ страданія самыхъ легкихъ: при легочной чахоткѣ, бугоркахъ въ легкихъ, воспаленіи, парывѣ въ легкихъ. Наконецъ сухой кашель иногда зависитъ отъ слабости, припухлости, удлинненія и обвислости язычка, небной занавѣски, легко распознаваемыхъ зрѣніемъ, отъ чего язычекъ, касаясь надгортаннаго хряща и глотки, ихъ раздражаетъ и причиняетъ кашель. Здѣсь леченіе состоитъ въ укороченіи или отрѣзаніи язычка, операціи очень легкой и безопасной даже для фельдшера, посредствомъ приличнаго инструмента.

§ 92. Судорожный кашель, коклюшъ. Признаки. Приступы сильнаго кашля, состоящіе изъ рѣдкихъ, глубокихъ выдыханій, соединенныхъ со свистомъ, пронзительнымъ, громкимъ визгомъ, и изъ короткихъ, но частыхъ и скорыхъ выдыханій, такъ-что за однимъ глубокимъ выдыханіемъ слѣдуетъ 5—10 короткихъ выдыханій; въ сильной степени во время приступа, лице краснѣетъ и синѣетъ, кровь приливаетъ къ головѣ, прорывается изъ носа, горла, дыханіе затрудняется, даже прерывается на время



до обморока. Приступъ продолжается 5—10—15 минутъ, возвращается опять чрезъ  $1\frac{1}{2}$ —1—2—4 часа, особенно когда дитя начинаетъ плакать, кричать, бѣгать, смѣяться; онъ бываетъ сильнее ночью и нерѣдко оканчивается рвотою; по окончаніи приступа больной кажется здоровымъ, но бѣденъ, съ припухшимъ лицомъ и слезящими, красными глазами.

Коклюшъ есть дѣтская болѣзнь и случается разъ въ жизни. Въ немъ различаютъ три періода: первый лихорадочный періодъ, похожій на простой простудный кашель съ лихорадкою, со свѣтлою, жидкою мокротою; въ этомъ періодѣ можетъ появиться воспаленіе легкихъ; второй—судорожный періодъ; здѣсь кашель бываетъ явно судорожный, безъ лихорадки, достигаетъ высокой степени и такъ тянется нѣсколько недель; въ этомъ періодѣ начинаетъ извергаться мокрота густая, желтобѣлая, иногда огромными кусками и съ полосками крови; въ третьемъ періодѣ кашель начинаетъ постепенно ослабѣвать въ числѣ и степени приступовъ. Вообще, во всѣхъ этихъ періодахъ коклюшъ продолжается три, четыре мѣсяца. Отъ сильного и продолжительнаго коклюша, дитя худѣетъ, получаетъ изнуреніе, чахотку, грыжу, зобъ, искривленіе тѣла, расширеніе большихъ сосудовъ, водянку, завалы въ брюшкѣ, воспаленіе легкихъ. Посему коклюшъ опасенъ по своимъ послѣдствіямъ; но во время приступовъ, даже повидимому страшныхъ, нѣтъ опасности для жизни дитяти.

Причины. Коклюшъ явно состоитъ въ сильномъ раздраженіи легкихъ, производимомъ особенною заразою, которая первоначально происходитъ въ воздухѣ, а потомъ сообщается и отъ больныхъ здоровымъ; посему коклюшъ сообщается отъ дѣтей родителямъ, нянькамъ и замѣчается повально (въ 1843 году въ С. Петербургѣ), т. е. разомъ оказывается на многихъ дѣтяхъ и, появившись въ какомъ-либо домѣ, перебираетъ всѣхъ дѣтей и распространяется на дѣтей сосѣднихъ домовъ, цѣлаго города, селеній, обнаруживается въ разныхъ уѣздахъ и губерніяхъ. Дѣйствіе этой заразы производитъ какое-то судорожное движеніе въ легкихъ, увеличиваетъ отдѣленіе слизи въ нихъ и въ же-



лудкѣ, въ печени, желчи, а въ сильной степени производить воспаленіе легкихъ. Коклюшъ, подобно кори, оспѣ, скарлатинѣ, свойственъ дѣтскому возрасту, появляется разъ въ жизни дитяти, продолжается определенное время, прежде котораго ни какое леченіе его не можетъ уничтожить.

Леченіе можетъ быть только наблюдательное за ходомъ болѣзни и ея припадками; въ первомъ періодѣ нужно дать рвотное изъ раствора рвотнаго камня. Если лихорадка усиливается, затрудняется дыханіе и появляется боль въ груди, то надобно пригласить врача, который найдетъ нужнымъ приставить пиявицы къ груди, сдѣлать смягчительныя припарки и поставить на грудь мушку. Во время приступовъ кашля нужно смотрѣть, чтобы дитя не упало и не ушиблось (оно по инстинкту, при началѣ кашля, и само старается ухватиться за стулъ, столъ, опереться о стѣну и пр.), поддерживать ему головку, заставлять выплёвывать мокроту, взять его на руки и дать ему время отдохнуть отъ усталости. Грудь, шею, подмышками натирать теплымъ свинымъ саломъ, взятымъ изъ брюха свиньи, и смѣшаннымъ съ толченымъ чеснокомъ.

Во второмъ періодѣ нужно утишить судороги противосудорожными лекарствами: перегнанною водою изъ вишне-выхъ, персиковыхъ косточекъ, съ аравійскою, вишневою слизью и сахаромъ, каплями изъ сурмянаго вина съ плав-ровишневою водою (№ 56); втирать подъ мышечку переч-ную настойку, въ грудь масло, настоянное на бѣленѣ, и при жестокости приступовъ, и похудѣніи дитяти, также при-гласить врача.

Въ третьемъ періодѣ не нужно ни какого леченія; но если кашель протянется очень долго — за три мѣсяца, если при-томъ его приступы періодически ожесточаются, напр. чрезъ день, то можно дать дитятѣ хинную соль по  $\frac{1}{4}$ , по  $\frac{1}{2}$  гра-на 2—3 раза въ сутки, съ сахаромъ. Если въ семь періо-дѣ выхаркивается много слизи, то надобно давать студень изъ исландскаго моха съ козьимъ, ослинымъ молокомъ, ко-фе изъ дубовыхъ жолудей; непременно перевести дитя въ другое жилище, или по крайней мѣрѣ почаще и подольше



доставлять ему случай гулять на открытомъ воздухѣ, гористомъ, сухомъ мѣстѣ.

§ 93. Бѣненіе, трепетаніе сердца. Признаки: 1) въ лѣвой, верхней части груди чувство дрожанія, какъ бы трепетанія, соединенное съ сжатіемъ, тягостью тоскою, и съ усиленіемъ произвести глубокое вдыханіе, послѣ котораго и трепетаніе сердца проходитъ; это трепетаніе сердца продолжается нѣсколько секундъ, рѣдко полминуты, потомъ перестаетъ и опять возвращается въ неопредѣленное время. 2) Усиленное бѣненіе сердца, чувствуемое особенно при положеніи на спинѣ, даже видимое глазами, соединенное съ явнымъ дрожаніемъ груди, со стукомъ, потрясеніемъ всего тѣла, особенно по направленію большихъ сосудовъ; присоединяется скорое дыханіе, твердый, полный пульсъ, одышка, обмороки. — Усиленное бѣненіе замѣчается иногда и въ животѣ, особенно у худощавыхъ людей, тифохондриковъ, истерическихъ женщинъ; но оно не составляетъ болѣзни и происходитъ отъ тонкости брюшныхъ стѣнъ и недостатка жара въ брюхѣ.

Причины. Трепетаніе сердца зависитъ отъ несвободнаго прохода крови чрезъ сердечныя пазухи (преддверія сердца); а бѣненіе сердца отъ усиленнаго прилива къ нему крови, сильныхъ сжатій и расширеній сердца. Трепетаніе и бѣненіе сердца по большей части есть припадокъ другихъ болѣзней: истерики, ипохондрии, скопленія вѣтровъ въ животѣ, разстроеннаго пищеваренія, завазовъ и опухолей печени и селезенки, запоровъ на низѣ, глисть, почечуя, полнокровія, переноса на грудь подагры, чесотки. Гораздо рѣже усиленное бѣненіе сердца зависитъ отъ болѣзни самаго сердца, скопленія воды въ его оболочкѣ и груди, расширенія сердца и большихъ сосудовъ, отъ истонченія, отолстѣнія стѣнокъ сердца, окостенѣнія сердечныхъ сосудовъ, измѣненія сердечныхъ заслонокъ; во всѣхъ этихъ случаяхъ бѣненіе сердца бываетъ безпрестанное. Очень трудно на самомъ дѣлѣ различить отъ какой изъ сихъ причинъ зависитъ бѣ-

(\*) Больной говоритъ, что у него въ груди что-то трепещетъ, какъ птичка.



ніе сердца, и потому приглашеніе врача къ такимъ больнымъ необходимо, хотя и самый опытный врачъ очень часто ошибается въ такихъ случаяхъ.

**Леченіе.** Почувствовавъ трепетаніе въ груди, нужно, если мы идёмъ, остановиться и не сдѣлать нѣскольکو глубокихъ вдыханій, отъ чего лёгкія расширятся и кровь свободно подѣтся изъ сердца въ лёгкія, а изъ лёгкихъ въ сердце; глубокія вдыханія нужно повторять и оставаться на мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не перестанетъ трепетать сердце.

При біеніи сердца нужно обращать вниманіе на сказанныя его причины и стараться ихъ удалить; особенно часто эти причины находятся въ брюхѣ, и потому біеніе сердца ослабѣваетъ и даже проходитъ на время отъ употребленія разръшающихъ, слабительныхъ лекарствъ, отъ умѣренности въ ѣдѣ и осторожности въ пищѣ и питьѣ, послѣ выхода глѣвъ, вѣтровъ, отъ употребленія внутрь сыры съ кремортартаромъ и приставленія пиявицъ къ заднему проходу (при почечу) отъ приличнаго леченія ипохондріи, истерики, появленія на кожѣ сыпи. Если же нельзя открыть причинъ біенія сердца, или оно продолжается и послѣ видимаго ихъ удаленія, то надобно давать больному селитру съ наперсточною травою (№ 53), по 3—4 порошка въ сутки и продолжать это леченіе 1—2 недѣли, пока не ослабѣетъ біеніе сердца и не сдѣлается пульсъ медленнымъ, или же не появятся у больного темныя пятна предъ глазами; дѣйствіе наперсточной травы продолжается нѣсколько дней и послѣ прекращенія пріемовъ ея внутрь; при новомъ усиленіи біеній сердца это же леченіе нужно возобновлять и даже многократно повторять, по мѣрѣ надобности. При біеніи сердца не нужно употреблять мяса, дичи, кофе, горячаго и крѣпкаго чаю, вина, водки, не бѣгать, не танцовать, не гнѣваться и вообще надобно соблюдать спокойствіе тѣла и духа.

§ 94. Икота состоитъ въ судорожномъ движеніи желудка и грудобрюшной преграды; обыкновенно она зависитъ отъ переполненія желудка, отъ кислоты въ нёмъ, отъ простуды и озябленія; распеленанная дѣти, озябнувъ, очень часто икаютъ; такая икота не важна, но она опасна, когда за-



виситъ отъ судороги желудка и устерицекъ и похондриковъ, и продолжается долго, также когда появляется въ лихорадкѣ или при воспаленіи. Лечение простой икоты нетрудно: она проходитъ отъ питья холодной воды, отъ держанія во рту и сосанія сахара, меда и т. п., отъ спеленанія и нагрѣтія дѣтей. Судорожная, продолжительная икота, куступаетъ ароматнымъ припаркамъ живота, сухимъ банкамъ, втиранію въ ложечку масла съ бѣленою и особенно теплой ваннъ; — икота при лихорадкѣ, воспаленіи, проходитъ съ главною болѣзнію.

§ 95. Жажда. Признаки: сухость во рту, шероховатый языкъ, непрерывный позывъ къ холодной водѣ, кислому питію; больные иногда выпиваютъ огромное количество воды (40—60 стакановъ въ сутки) безъ обремененія желудка, но за то притомъ много испускаютъ свѣтлой мочи, или же сильно потѣютъ, или имѣютъ водянистый поносъ.

Причины. Сильная жажда есть обыкновенный припадокъ разныхъ горячекъ, лихорадокъ, воспаленій, кори, оспы, scarlatины, похондрии, истерики, заваловъ и затвердѣній печени, поджелудочной желѣзы, слинныхъ желѣзъ, изнурительнаго испражненія мочи, пьянства; также она есть слѣдствіе усталости въ знойное время, проливнаго пота, водянистаго поноса. Вообще жажда въ болѣзняхъ (кромя изнурительнаго испражненія мочи) есть хорошій припадокъ, и древніе говорили, что тѣ больные, кои много пьютъ воды, выздоравливаютъ.

Лечение. Жажда проходитъ вмѣстѣ съ болѣзнію, которой она есть припадокъ. Дабы не обременить желудка, то больному нужно давать пить часто (черезъ 10—15—30 минутъ) но по немногу, или позволить ему сосать апельсинъ, лимонъ, виноградъ. Если нѣтъ особенной причины жажды, то нужно обращать вниманіе на мочу: изнурительное испражненіе мочи въ своемъ началѣ часто обозначается только жаждою. Въ жаждѣ истерицекъ и похондриковъ полезно морское купанье, или холодныя ванны съ поваренною солью. Жажда, какъ припадокъ пьянства, упорна и опасна; такому пьянице угрожаетъ водянка, пьянственный бредъ (бѣлая



горячка), размягченіе желудка, рвота, изнуреніе тѣла. Въ этой жаждѣ полезны: постепенное уменьшеніе испиваемой водки, чрезъ накапаніе сургуча на дно рюмки, которой вмѣстительность чрезъ то уменьшается; замѣна водки настойкою полыни, прибавленіе къ водкѣ рвотнаго камня по  $\frac{1}{4}$  грана на пріемъ, до произведенія тошноты, кислый галлеровъ эликсиръ 10—20 капель по 2—3 раза въ день; вмѣсто водки, давать пить больному холодную наливку квасу, горечавки, полыни, трилистника.

§ 96. Недостатокъ жажды, а еще болѣе, отвращеніе отъ всякихъ жидкостей появляется въ опасныхъ горячкахъ, при переходѣ воспаленій въ помертвѣніе; въ водобоязни, послѣ укушенія бѣшеными животными; въ параличѣ, послѣ пострѣлы; и во всѣхъ этихъ болѣзняхъ есть очень опасный припадокъ: такіе больные рѣдко выздоравливаютъ; но этотъ же припадокъ у истеричекъ и ипохондрикѣ такъ же при воспаленіи горла, желудка, кишекъ—не опасенъ. Въ первыхъ случаяхъ недостатокъ жажды, какъ опасный припадокъ, оканчивается, вмѣстѣ съ своею болѣзнію, смертію. Въ послѣднихъ случаяхъ водобоязнь, при воспаленіи горла и желудка, проходитъ отъ мушки, приложенной къ затылку, шеѣ, ложечкѣ, отъ смягчительныхъ припарокъ съ бѣленою; водобоязнь въ истерикѣ и ипохондріи, проходитъ отъ приличнаго леченія сихъ болѣзней, и особенно отъ клистировъ съ дурнымъ духомъ.

§ 97. Сильный аппетитъ, обжорство. Признаки: часто возвращающійся позывъ на ѣду; большой позывъ за часъ назадъ довольно плотно, опять хотеть ѣсть; онъ каждый разъ съѣдаетъ болѣе здороваго, и притомъ или съ явною для себя пользою — полнѣетъ, вѣтѣетъ и крѣпнеть въ силахъ, — или же, напротивъ, ѣстъ много и часто и, не смотря на то, по прежнему остается худымъ и слабымъ.

Причины. Перваго рода сильный аппетитъ замѣчается у всѣхъ почти больныхъ, выздоравливающихъ послѣ тяжкихъ болѣзней: горячекъ, перемежныхъ лихорадокъ, гнилеченныхъ хинною содою, послѣ воспаленій и ушибовъ, требовавшихъ частыхъ кровопусканій, послѣ поноса, обширныхъ ранъ, соединенныхъ съ обильнымъ пагносіемъ. Эти люди, съдѣ-



много, видимо поправляются, и сильный аппетитъ у нихъ есть: благотворное усиліе ихъ врача-натуры вознаграждаетъ потерю соковъ и укрѣпляетъ силы. Этотъ аппетитъ постепенно уменьшается, и съ поправленіемъ больного онъ дѣлается обычнымъ. Второго рода сильный, позывъ на блудъ бываетъ у ипохондрикковъ, истеричекъ, беременныхъ и сумасшедшихъ, также иногда природнымъ. (Здѣсь, напротивъ, человекъ, съѣдая много, остается по прежнему слабымъ и тошнитъ и сильный аппетитъ есть только болѣзненное раздраженіе желудка, кишокъ, печени. Этотъ аппетитъ безполезенъ, а неосторожное его удовлетвореніе можетъ быть и вреднымъ).

Леченіе. Сильный аппетитъ у выздоравливающихъ послѣ трудныхъ болѣзней не требуетъ никакого леченія; только не нужно его еще болѣе возбуждать движеніемъ, виномъ, соленою, пряною приправою пищи, и надобно смотрѣть, чтобы не объеая больной, давая ему есть часто, но по немногу и назначая легковаримую пищу; при несоблюденіи сего правила такіе больные получаютъ или прежнюю болѣзнь (особенно перемежную лихорадку) или же новую — понось, желудочную лихорадку, расстройство пищеваренія. Аппетитъ у ипохондрикковъ, истеричекъ, беременныхъ, безумныхъ и сумасшедшихъ, при умѣренной воздержности и леченіи главной болѣзни, скоро проходитъ самъ по себѣ; сильный аппетитъ можно ослабить молочною, слизистою, растительною пищею, произведеніемъ у больного тошноты посредствомъ куренія табаку, употребленіемъ внутрь раствора рвотнаго камня по  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$  грана на пріемъ чрезъ 2—3 часа въ ложкѣ воды.

§ 98. Потеря аппетита, недостатокъ позыва на блудъ. Признаки: во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ, въ которыхъ появляется сильная жажда, пропадаетъ аппетитъ, который возвращается по мѣрѣ уменьшенія жажды, и есть одинъ изъ надежнѣйшихъ признаковъ выздоровленія, такъ какъ жажда—признакъ болѣзни. Аппетитъ пропадаетъ и появляется отвращеніе отъ пищи, особенно мясной, твердой, жирной, какъ наиболѣе вредной, во всѣхъ лихорадкахъ, горячкахъ, воспаленіяхъ, острыхъ сыпяхъ: во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ



пища бываетъ вредна, и на этотъ вредъ пищи указываетъ сама натура. Нашъ врачъ, лишая насъ позыва на ѣду; а желудокъ, будучи даже самъ здоровъ, но сочувствуя общему страданію тѣла, какъ добрый семьянинъ общему горю семейства, отказывается отъ сваренія пищи; за то онъ (желудокъ) сильно чувствуетъ жажду, которой удовлетвореніе въ сказанныхъ болѣзняхъ, по недостатку жидкихъ частей и по густотѣ крови, бываетъ очень полезно: посему этотъ недостатокъ аппетита благодѣтеленъ. Далѣе, аппетитъ пропадаетъ при болѣзняхъ самаго желудка: накопленіи въ немъ слизи, послѣ его обремененія пищею, при разстройствѣ пищеваренія, при завалахъ брюшныхъ внутренностей, при водянкахъ, ипохондріи, истерикѣ, отъ продолжительныхъ умственныхъ занятій, сидячей жизни, отъ продолжительнаго вдыханія пыли, сыраго воздуха, у рабочихъ на разныхъ фабрикахъ, заводахъ, отъ пьянства, неожиданныхъ и сильныхъ душевныхъ возмущеній — радости, страха, испуга, огорченія и проч. Важность недостатка аппетита во всѣхъ сихъ случаяхъ зависитъ отъ главной болѣзни, или ея причины.

Леченіе. Надобно принять за правило, что никогда не должно много хлопотать о возбужденіи аппетита тамъ, гдѣ его нѣтъ: внутренней врачъ нашего тѣла лучше насъ знаетъ, гдѣ нужно возбудить позывъ на ѣду, и гдѣ надобно его уничтожить. Заставляя ѣсть больного, когда онъ не хочетъ, мы кормимъ, поддерживаемъ его болѣзнь и еще болѣе ослабляемъ самого больного. Посему надобно лечить настоящую болѣзнь — лихорадку, горячку, воспаленіе, — и вовсе не безпокоиться о томъ, что больной уже нѣсколько дней сряду ничего не ѣлъ: съ прохожденіемъ болѣзни аппетитъ явится самъ по себѣ, въ свое время; но при появленіи пропадашаго аппетита, нужно удовлетворять его съ осторожностью, о которой сказано при обжорствѣ.

Потеря аппетита отъ засоренія желудка уничтожается рвотнымъ, слабительнымъ, воздержаніемъ отъ пищи, особенно твердой, острой, мясной; въ продолжительныхъ болѣзняхъ аппетитъ возбуждается движеніемъ на открытомъ воздухѣ, по гористымъ мѣстамъ, занятіями въ саду, огородѣ, полѣ, механическою работою (точеріемъ, рубкою дровъ,



толченіемъ ржи, пшеницы), купаніемъ въ рѣкѣ, въ морѣ, ваннахъ съ поваренною солью, растираніемъ всего тѣла, веселымъ расположеніемъ духа, пріятными разговорами и употребленіемъ для привычныхъ къ тому людей, горькой настойки изъ полыни, квасей, горечавки, трилистника, водки Трофимовскаго, лу. Подотоп. удивленіе, аттестация, онъ и др. (чл. 100)

**Примѣчаніе.** Въ некоторыхъ случаяхъ аппетитъ измѣняется страннымъ образомъ: у выздоравливающихъ раждается вкусъ къ разной пищѣ, по видимому трудноваримой, но которую они употребляютъ съ явною пользою; больные горячечные, цинготные получаютъ вкусъ къ кислой, острой пищѣ, вину, даже водкѣ; страдающіе дѣвическою блѣдностію, истерикою, меланхоліею, глистами, страстно любятъ глину, известь, магнезію, соленую, пріятную пищу. Вообще странный вкусъ къ разнымъ вещамъ, какъ указаніе внутренняго врача больного, будучи удовлетворяемъ съ благоразуміемъ и осторожностію, т. е. умеренно и не до пресыщенія, всегда оказываетъ благотворное дѣйствіе на ходъ болѣзни.

§ 99. Потеря вкуса, обонянія. Оба эти чувства пропадаютъ при простудѣ (катаррѣ) и насморкѣ и возвращаются съ прохожденіемъ болѣзни. Самостоятельная потеря обонянія бываетъ по степени носовыхъ оболочекъ, и паростовъ въ носу, язвъ, кистейды; а вкусъ теряется при онѣмѣніи языка, разныхъ болѣзняхъ рта и разстройствѣ пищеваренія; во многихъ случаяхъ потеря этихъ чувствъ не возвратима. Искусство не имѣетъ никакихъ вѣрныхъ средствъ къ скорѣйшему возвращенію потери этихъ чувствъ. — (чл. 100)

§ 100. Потеря осязанія и ощущенія, или нечувствительность пальцевъ и всей кожи, есть слѣдствіе паралича, онѣмѣнія, которое распространяется на движимую и чувствующую способность нервовъ. Такая нечувствительность замѣчается у пожилыхъ людей, подагриковъ, прокаженныхъ. Она неизлечима. Нечувствительность кожи, происшедшая вдругъ, особенно послѣ купанья въ холодной водѣ, заставитъ отъ судороги кожи и скоро пройдетъ отъ движенія, теплоты, тренія. (чл. 101)

**Примѣчаніе.** О потерѣ зрѣнія — слѣпотѣ, и слуха — глухотѣ, сказано въ отдѣлѣ наружныхъ болѣзней. (чл. 102)



§ 101. Трудное глотаніе.—Признаки: трудное, даже вовсе невозможное глотаніе безъ боли (\*) и безъ признаковъ воспаленія; иногда больной не можетъ глотать только жидкихъ (при водобоязни), но чаще и твердыхъ вещей.

Причины: 1) судороги глотки и пищевого горла, припадокъ обыкновенный у истеричекъ, ипохондриковъ, гдѣ онъ появляется періодически подъ видомъ сжатія горла, какъ бы клубкомъ; 2) опуханіе, параличъ глотки и пищевого горла, какъ слѣдствіе удара (пострѣла) и припадокъ общаго паралича; 3) переносъ на пищевое горло любовнаго, подагреннаго, золотушнаго остроумія; 4) большія опухоли миндалинъ, желтъ, — зобъ, окръпость пищевого горла, сжатіе, суженіе или расширеніе его въ видъ мышца, въ которомъ пища скопляется, прижимаетъ остальную часть горла и затрудняетъ глотаніе.—Причины этой болѣзни въ частности открываются очень трудно, потому, что онѣ дѣйствуютъ медленно и непримѣтно. Впрочемъ, сырой, влажный климатъ, излишнее употребленіе теплаго нѣтъ, обжорство, глотаніе пищи большими, нехорошо разжеванными кусками, тѣсно-повязанный шейный платокъ во время ѣды — наиболѣе располагаютъ къ этой болѣзни, которая очень часто случается въ Голландіи.

Леченіе располагается по причинамъ труднаго глотанія: трудное глотаніе отъ судорогъ уничтожается треніемъ, или летучею мазью, теплыми припарками съ бѣлею; внутрь даются средства, упомянутыя при истерикѣ; особенно похваляютъ каяпутное масло, котораго капля на кусокъ сахара дается больному медленно сосать. Во всѣхъ другихъ случаяхъ труднаго глотанія необходимо пригласить врача, которому и предоставить все леченіе, къ несчастію однако, рѣдко успѣшное. Впрочемъ при параличномъ трудномъ глотаніи можно испытать (и безъ врача) каяпутное, перечной мяты масло, мушку на шею, затылокъ.

§ 102. Безгласіе нѣмота.—Безгласіе: Голосъ или со-

(\*) Трудное глотаніе съ болью зависитъ отъ воспаленія остановившейся въ горлѣ косточки, особенно рыбьей, и проходитъ съ окончаніемъ воспаленія, изверженіемъ косточки, прорывомъ нарыва.



всѣмъ, пропадаетъ, или же онъ дѣлается слабымъ, охриплымъ. Это зависитъ отъ страданія слизистой оболочки, выстилающей гортань и одѣвающей гортанныя связки (голосныя струны), происходитъ отъ простуды горла, гортани (при катаррѣ), отъ золотухи, любострастной болѣзни. Простудное безгласіе лечится снаружи втираніемъ въ шею лещучей мази, теплыми приварками, ношеніемъ на шею бумаги съ мыломъ, внутрь груднымъ чаемъ, гогольмогелемъ, сырнымъ пивомъ. Золотушное и любострастное безгласіе требуетъ приглашенія врача. Далѣе, безгласіе бываетъ припадкомъ гортанной или горловой чахотки, паралича, какъ слѣдствія пострѣла или удара, расширенія сердца, бугорковъ въ лёгкихъ, грудной водянки, и пр. Здѣсь также нужно пригласить врача; впрочемъ похваляютъ въ параличномъ безгласіи жеваніе горчичы, перцу, корня жигуица (*rad. pyrethri*), иибиря, накапываніе на языкъ каяпутнаго масла, электричество, гальанизмъ. Преходящее безгласіе бываетъ у дѣтей отъ глистъ, въ истерикѣ, умопомѣшательствѣ, оцѣпенѣніи, и лечится сообразно симъ болѣзнямъ.

2) Нѣмота бываетъ чаще врожденная и притомъ вмѣстѣ съ глухотою, отъ которой она и зависитъ; ибо, при недостаткѣ слуха, въ человѣкѣ не можетъ родиться никакого понятія о звукѣ, а слѣдственно о голосѣ и рѣчи. Сверхъ сего, нѣмота происходитъ отъ тѣхъ же причинъ, что и безгласіе. Затруднительная, несвободная рѣчь можетъ зависѣть отъ забывчивости нужныхъ словъ, или произношенія однихъ словъ вмѣсто другихъ; это опять можетъ зависѣть отъ слабости памяти, разсѣянности, отъ несвободнаго произношенія нѣкоторыхъ буквъ, словъ, отъ заиканія. Здѣсь иногда помогаетъ операція; гораздо чаще однако помогаютъ: приученіе себя говорить медленно, слова выговаривать правильно, совершенно, съ усиліемъ и вниманіемъ читать почаще въ слухъ, съ напряженіемъ. При застарѣлой болѣзни можно прибѣгнуть къ леченію заиканія машинкою по способу Колomba, Лея, Лагузена.

§ 103. Трудное пищевареніе. — Признаки: неправильный позывъ на ѣду, — то сильный голодъ, то отвращеніе отъ пищи, послѣ употребленія которой, даже умѣренно,



появляется давленіе и тяжесть въ сторонѣ желудка, подложечкою; отрыжка несварившеюся пищею, вѣтры, дурное состояніе духа—угрюмость, пѣвливость, оскомины на зубахъ, чувство кислоты во рту, вязкій, слизистый вкусъ, заставляющій часто харкать. Все эти припадки особенно усиливаются послѣ ѣды и продолжаются 4—8 часовъ, по причинѣ медленности пищеваренія въ желудкѣ.

Причины: несвѣжая, грубая, жирная, протухлая, мучная, окисшая пища; невоздержность въ ѣдѣ, неумѣренность въ питьѣ, особенно тепломъ чаѣ, распутство, сидячая жизнь, спертый, сырой, удушливый воздухъ въ рабочихъ комнатахъ, продолжительныя умственные занятія, печаль, огорченіе, досада, неумѣренность въ удовлетвореніи любовной похоти, пьянство, глисты, почечуй, завалы въ печени, селезѣнкѣ, разлитіе желчи, разныя другія болѣзни. Болѣзнь хотя и не опасна, но не пріятна, причиняетъ сухотку и ведетъ къ другимъ, важнымъ болѣзнямъ.

Леченіе. Прежде всего нужно удалить причины: доставить больному хорошую, свѣжую, легковаримую пищу, но не молочную, не производящую вѣтры, каковы капуста, горохъ, сыръ, жиръ, блины, пироги, слобное тѣсто, пирожное; избрать чистое и здоровое жилище, заставить его вести правильный, дѣятельный образъ жизни, поменьше заниматься науками и пить теплаго чая, порѣже удовлетворять плотскую похоть, меньше предаваться печали, воздерживаться отъ пьянства; далѣе, надобно удалить изъ желудка слизи, притупить кислоту (смот. Леченіе желудочныхъ нечистотъ), возстановить теченіе почечуйной крови, изгнать глисты.

Если и по удаленіи причинъ, пища сваривается въ желудкѣ трудно и долго, то полезны горькія (желудочныя) лекарства: корень айры или лепешника, коломбо, полынь, горечавка, квасся, трилистникъ въ видѣ холоднаго питья, водочной настойки, горькое пиво, портеръ; зѣрна бѣлой горчицы по 6—9 штукъ, проглатываемыя по утрамъ, померанцовая корка, ивбиръ, мускатный орѣхъ, старое, хорошее вино: мадера, портвейнъ, малага; по утрамъ холодная простая, также кавказская вода, нардзанъ; снаружи холодныя ванны, втираніе въ сторону желудка спирта ромашечнаго,



розмариноваго, муравейнаго, березовыхъ шишекъ, богородицкой травы (hb. serpyllae), пошеніе на животъ мѣшечка съ ароматными травами и свободное ежедневное испражненіе низомъ, посредствомъ клистировъ, ревеня, всякаго питья.

§ 104. Изжога, изгága, печія. — Признаки: непріятное чувство подъ ложечкою, откуда оно восходитъ вверхъ въ ротъ, гдѣ причиняетъ жженіе, оскомину, кислую отрыжку. Это чувство появляется послѣ жирной, сочной пищи и притомъ чаще у молодыхъ, чѣмъ пожилыхъ людей. Изжога зависитъ отъ скопленія въ желудкѣ кислоты, отъ слишкомъ кислаго желудочнаго сока, и уничтожается противукислотными средствами, порошкомъ изъ мѣла, магнезій, раковинъ, жернововъ, раковинъ, березоваго угля, жженого хлѣба; но при этомъ на долго надобно отказаться отъ употребленія жирной пищи.

§ 105. Рвота. — Признаки: боль, давленіе, урчаніе подъ ложечкою, отрыжка вѣтрами, пищею, пѣною, водою, тошнота и наконецъ рвота, которая появляется или по временамъ, поутру на тошакъ, или послѣ всякаго употребленія пищи, притомъ у больного незамѣчается ни лихорадки, ни особенной боли при давленіи въ стороны желудка. Впрочемъ рвота, по ея значенію, бываетъ различная: рвота, появляющаяся всякій разъ послѣ употребленія пищи и питья, даже лекарства, соединенная съ мучительною болью, означаетъ порчу желудка: его отвердѣніе, язвы, ракъ. Если рвота причиняетъ боль въ желудкѣ и во всемъ животѣ, если при продолженіи рвоты больной худѣетъ и желтѣетъ, то рвота указываетъ на желчные камни; если при рвотѣ боли быззуютъ сильны съ боковъ и поясницы, то рвота вѣроятно зависитъ отъ камней въ почкахъ. Рвота у дѣтей, когда они поднимаютъ головку вставая съ постельки и сидятъ, безъ явнаго повода, легкая и короткая, но частая, означаетъ начало воспаленія въ мозгѣ и острую водянку мозга, особенно если притомъ дитя не весело, сонливо, искошаетъ глаза, подвержено запору низъ. Рвота у дѣтей на тошакъ съ тошнотой и быстрымъ, неожиданнымъ потокомъ слюны показываетъ глистную болѣзнь. Упорная, продолжительная рвота у дѣтей, съ постоянною жаждою, поносомъ, напряженіемъ и тяжестью подъ



ложечкою, измѣненіемъ лица, охладѣніемъ рукъ и ногъ, притягиваніемъ пожекъ къ животу, изнуреніемъ всего тѣла, показываетъ размягченіе желудка.

Причины. Рвота происходитъ отъ сильнаго судорожнаго сжатія желудка и сосѣднихъ мышцъ; а самое сжатіе желудка возбуждается какимъ либо его раздраженіемъ, при которомъ даже пища и вода причиняють рвоту. Причины рвоты находятся или въ самомъ желудкѣ, какъ то: пища, желчь, слизь, кислота, глисты, лекарства, яды, затвердѣнія, размягченія, язвы стѣнъ желудка, переносъ подагры, почечуа, ревматизма, чесотки; или внѣ желудка: опухоли и отвердѣніе печени, селезенки, почекъ, жолчные, почечные камни, наросты въ животѣ, беременность, брюшная водянка, коклюшъ, сильная боль головы, жаръ, пьянство, ушибы головы, сотрашенія мозга, душевное отвращеніе и взглядъ на непріятные предметы.

Лечение состоитъ въ удаленіи причинъ рвоты, въ остановленіи самой рвоты и въ леченіи особенныхъ ея видовъ.

(1) При скопленіи нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ (см. Разстройство пищеваренія, потерю аппетита), лучшее средство противъ рвоты есть рвотное, а потомъ слабительныя.

(2) Рвота отъ переноса на желудокъ подагры, ревматизма, чесотки, катарра, отъ залеченныхъ язвъ на ногахъ, узнается изъ того, что больной прежде былъ подверженъ какой либо изъ этихъ болѣзней, которая потомъ вдругъ пропала и въ слѣдъ за тѣмъ появились разстройство пищеваренія, а потомъ и рвота, и изъ боли въ сторонѣ желудка, и мутной, красной мочи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ рвотѣ предшествуетъ воспаленіе желудка, леченіемъ котораго должно начинаться леченіе и рвоты. Здѣсь нужно пригласить врача, при недостаткѣ котораго поступать какъ при воспаленіи желудка (см. эту болѣзнь): положить мушку на ложечку; при скрывшейся подагрѣ — горчичники къ ногамъ, сѣдлать ножную ванну съ золою и горчицею; при зажившихъ язвахъ — поставить фонтанель на томъ мѣстѣ, гдѣ были язвы.

(3) Рвота отъ полнокровія, медленнаго воспаленія въ брюхѣ, узнается изъ тяжести въ животѣ, красноты языка,



сухости во рту, особенно по утрамъ, жара и жажды, изъ остановившагося почечуйнаго, мѣсячнаго кровоточенія, изъ боли въ животъ и особенно около печени, желудка. Здѣсь также нужно противувоспалительное леченіе, — пѣвки къ ложечкѣ, припарки на животъ, внутрь слизистое питье, молоко миндальное, конопляное, маковое, ореховое, соршать мушку на животъ, частыя клистиры.

4) Рвота нервная, появляется натошакъ по утрамъ у нѣжныхъ, слабыхъ людей, истеричекъ, отъ возмущенія душевнаго, при боли половины головы, лица, продолжающейся и послѣ прекращенія приступа рвоты. Здѣсь употребляются противусудорожныя средства, вычисленные при истерикѣ, боли желудка; особенно похваляются капли изъ померанцовой, касторовой настойки, по 10—20—40 и болѣе капель чрезъ 1—2 часа.

5) Рвота отъ отвердѣнія скисра, рака, язвы желудка, отъ завазовъ въ брюхѣ, водянки, узнается трудно, а еще труднѣе вылечивается; здѣсь можно только унимать рвоту, но излечить ее нельзя. Унятіе рвоты: для этого похваляются упомянутое слизистое питье, молоко миндальное, конопляное, приверсева смѣсь (№ 2), шипучіе порошки, кислыя щи, зельтерская вода, шампанское (при нервной рвотѣ); снаружи легкія, теплыя припарки на животъ, втираніе въ ложечку ромашечнаго спирту съ настойкою топія (№ 57), настояннаго на листьяхъ бѣлены масла, горчичникъ и сухія банки на животъ (очень действительное средство противъ рвоты), клистиры, кусочки льда, глетаемые чрезъ  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  часа, мороженое, холодная вода. У дѣтей при рвотѣ нужно обращать вниманіе: нѣтъ ли гнисть, размягченія желудка, водянки въ головѣ, и потому надобно посоветоваться съ врачомъ.

§ 106. Особенныя виды рвоты. Продолжительная упорная рвота: чрезъ 2—3 часа послѣ обѣда, большаго рвѣтъ несварившеюся пищею; отъ чего онъ постоянно голоденъ, подверженъ запору, при давленіи подъ ложечкою чувствуетъ боль, при изслѣдованіи въ животѣ замѣчаются отвердѣнія; страдалецъ худѣетъ, рвотою извергаетъ темную, зеленоватую, кофейную жидкость, и умираетъ при истоще-



ній тѣла. Эта рвота неизлечима. Для облегченія страданій больного нужно употреблять общія противурвотныя средства: миндальное, коровье молоко, риверіеву смѣсь, шприпки, пѣйвы, клистиры, ванны, мушку, фонтанели, и по временамъ совѣтоваться съ врачомъ. Упорная рвота часто зависитъ отъ скопленія нечистотъ въ толстыхъ кишкахъ (въ слѣпой кишкѣ, въ правой и нижней части живота) и излечивается продолжительно употребляемыми клистирами и слабительными.

Рвота пьяницъ: по утру, послѣ глубокаго, глухаго, почти сухаго кашля, появляется рвота, извергающая много вязкой, промозглой слизи; она обнаруживается у запивающихъ пьяницъ, разстроившихъ пьянствомъ желудокъ и печень. Средства противъ сей рвоты суть: воздержаніе отъ пьянства, легковаримая жидкая пища, кислыя щи, холодная вода по утру, огуречный разсолъ, риверіева смѣсь, шипучіе порошки, магнезія съ ревенемъ — холодная наливка три-четыре чайныя ложки, коломбо, горечавки, полыни, квасинъ.

Рвота во время плаванія на корабль, морская болѣзнь: слабость, совершенное изнеможеніе тѣла, обморокъ, тошнота, рвота. Болѣзнь появляется у непривыкшихъ къ морскимъ плаваніямъ, во время качки судна, продолжается 2—4 дня, и прекращается скоро, когда мореплаватели выходятъ на твердую землю. Подобная же рвота, только въ легкой степени, появляется у непривыкшихъ ѣздить въ каретѣ, сидя спиною къ лошадямъ, во время санной ѣзды, когда ѣдущій смотритъ на убѣгающую отъ него, какъ бы движущуюся свѣжнюю поверхность. Средства противъ корабельной рвоты: положеніе въ койкѣ на спясть, нахожденіе на палубѣ около мачты, легкая, жидкая пища, или тишесъ, совершенный голодъ, шипучіе порошки, зельтерская вода. При тошнотѣ и рвотѣ отъ качки въ каретѣ и саняхъ помогаютъ: сидѣніе лицомъ къ лошадямъ, смотрѣніе впередъ на неподвижные предметы, на небо, питье холодной воды и, наконецъ, остановленія поѣздки на 2—3 часа. О рвотѣ при каменной болѣзни и у беременныхъ женщинъ сказано въ своихъ мѣстахъ.

Наконецъ нужно замѣтить, что при всякой рвотѣ вообще



лучшія лекарства суть молоко, миндальное, конопляное, маковое, коровье. слизистое питье съ сахаромъ, холодная вода, кусочки льда; средства эти нужно употреблять часто чрезъ  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 часть, по понемногу—по рюмкѣ, полчащкѣ. — Отъ рвоты надобно отличить отрыжку съ изверженіемъ пищи, еще непереварившейся: эта отрыжка происходитъ отъ переполненія желудка пищею, скопленія въ немъ вѣтровъ, расширения пищевого горла въ слѣпой мѣшокъ, въ которомъ пища задерживается и потомъ извергается съ отрыжкой.

§ 107. Нервные боли.—Признаки: продолжительная, постоянная или преходящая, періодическая боль. Она можетъ появиться во всѣхъ частяхъ тѣла, но чаще оказывается въ головѣ, лицѣ, зубахъ, груди и животѣ. Нервная боль отличается отъ воспалительной тѣмъ, что при ней нѣтъ трехъ другихъ признаковъ воспаления: жара, опухоли и красноты; нервноболящее мѣсто не горитъ, не пухнетъ и не краснѣетъ; сверхъ того нервная боль отъ прижатія болящаго мѣста утихаетъ, а воспалительная усиливается и дѣлаетъ прижатіе нестерпимымъ. Это различіе нервной боли отъ воспалительной очень важно; ибо на немъ основывается лечение, также совершенно различное при нервной и воспалительной боли. Впрочемъ, надобно также замѣтить, что продолжительная нервная боль можетъ вызвать воспаление, которое, въ свою очередь, можетъ оставить послѣ себя нервныя боли, которыя притомъ оказываются въ разныхъ видахъ по чувству боли, какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ видовъ боли.

Зудъ, свербѣжъ.—Зудъ въ кожѣ есть раздраженіе кожныхъ нервовъ, своего рода нервная боль; онъ обыкновенно есть припадокъ сыпей — кожныхъ болѣзней, но иногда появляется и самостоятельно и притомъ въ такой сильной степени, что не даетъ больному покоя ни днёмъ, ни ночью и даже угрожаетъ опасностію, доводитъ до отчаянія и причиняетъ изнуреніе.

Причины. Зудъ чаще замѣчается у людей изъ холоднаго переселившихся въ жаркій климатъ, у Европейцевъ, живущихъ въ Индіи, Африкѣ, въ Южной Америкѣ; такіе



переселенцы въ первые годы своего житія въ жаркомъ климатѣ подвергаются зуду, который впоследствии проходитъ по привычкѣ ихъ къ жаркому климату. Въ жаркое лѣто зудъ замѣчается у полевыхъ, молодыхъ, полнокровныхъ работниковъ, особенно у Малороссовъ, неимѣющихъ обыкновенія мыться въ банѣ. Далѣе, зудъ замѣчается у людей, подверженныхъ заваламъ въ печени, разлитію желчи, запорамъ на-низъ, почечую (почечуйный зудъ около задняго прохода), задержанію мочевыхъ началъ въ тѣлѣ при испражненіи свѣтлой водянистой мочи въ маломъ количествѣ.

Леченіе. Надобно открыть и удалить причины зуда: въ жаркое время нужно избѣгать зноя, почаще купаться въ рѣкѣ, париться въ банѣ, мыться въ теплой ваннѣ, закрывать голову, шею и грудь отъ солнца; обмывать тѣло растворомъ двухъ драхмъ буры въ фунтѣ простой, розовой воды; по совѣту врача, испражнять скопившуюся желчь и испортившуюся острую слизь изъ кишекъ слабительнымъ изъ ревеня съ англійскою солью, усилить отдѣленіе мочи мочегонными средствами.

Почечуйный зудъ у мужчинъ и зудъ дѣтородныхъ частей у женщинъ, особенно у вдовъ и пожилыхъ дѣвицъ, излечивается очень трудно. Здѣсь также нужно пригласить врача для уничтоженія почечуйнаго мѣсячнаго полнокрвія, для выведенія мелкихъ глистъ, которыя изъ задняго прохода заползаютъ иногда въ маточный рукавъ. Вообще же въ семъ зудѣ полезны: припускъ пиявицъ къ заднему проходу и къ дѣтороднымъ частямъ, обмываніе прохода и маточнаго рукава холодною водою съ мыломъ, растворомъ буры въ водѣ, растираніе ихъ свѣжимъ масломъ, сальмомъ, впрыскиваніе въ маточный рукавъ холодной воды съ нѣсколькими каплями настойки опиѧ, смягчительные клистиры изъ ромашки, льнянаго сѣмени, съ масломъ и мыломъ; купанье въ рѣкѣ, холодныя обмыванія зудящихъ мѣстъ.

§ 108. Боль головы. Признаки: боль головы есть обыкновеннѣйшая болѣзнь и появляется самостоятельно и какъ припадокъ другихъ болѣзней; она занимаетъ разныя мѣста: лобъ, затылокъ, темя, виски, полголовы и части головы: покровы, оболочки мозга и самый мозгъ. По чувству, боль



головы обнаруживается тяжестью, ломомъ, біеніемъ, сверленіемъ, сжатіемъ головы какъ бы въ тискахъ, жженіемъ, щемленіемъ и пр.; въ высшей степени къ головной боли присоединяется тошнота, рвота, сонливость и пр. Боль во лбу и въ затылкѣ бываетъ чаще давящая, сверлящая, и первая зависитъ отъ насморка, лома въ лобныхъ костяхъ, а послѣдняя есть припадокъ почечуя. Боль въ темени бываетъ сверлящая, какъ бы гвоздѣмъ, въ половинѣ головы давящая, щемлящая и обѣ замѣчаются у истеричекъ, ипохондриковъ. Боль въ наружныхъ покровахъ головы бываетъ ревматическая, а въ покровахъ мозга и въ самомъ мозгѣ происходитъ отъ прилива крови, наростовъ, нагноеній, изліяній крови и проч. Боль отъ прилива крови къ головѣ наичаще бываетъ припадкомъ другихъ общихъ болѣзней: разныхъ лихорадокъ и горячекъ, воспаленій, острыхъ сыпей, разстройства пищеваренія, угара, похмѣлья, разныхъ болѣзней въ груди и брюхѣ.

Самостоятельная боль головы происходитъ отъ простуды, угара, похмѣлья, отъ продолжительнаго наклоненія головы во время жатвы въ полѣ, на сѣнокосѣ, въ огородѣ, отъ дѣйствія солнечнаго свѣта на открытую или покрытую чернымъ платкомъ голову, отъ жара въ комнатѣ, продолжительныхъ умственныхъ занятій, отъ долговременнаго бдѣнія ночью и безсонницы, отъ сильнаго движенія въ жаркое время и усталости, отъ ушибовъ головы, отъ сотрясеній мозга чрезъ паденіе на голову сноповъ, вязанокъ сѣна, отъ паденія въ воду головою внизъ съ высокаго мѣста и пр.

Леченіе. При леченіи боли въ головѣ нужно различить ея слѣдующіе виды: боль отъ прилива крови къ головѣ, боль желудочная, нервная, отъ переноса, матеріи на голову и боль отъ поврежденія головныхъ частей: наростами, нарывами, костьюдою, язвами и свищами, ушибами, переломами, вдавленіями черепныхъ костей (боль органическая).

1) Боль отъ прилива крови къ головѣ обозначается чувствомъ тягости, біенія въ головѣ, особенно въ вискахъ, (послѣ угара, похмѣлья), краснотой и припухlostію въ лицѣ, красными, блестящими глазами, нетерпѣніемъ свѣта,



громкаго звука, звономъ и шумомъ въ ушахъ, чувствомъ полноты, жара и свѣта въ глазахъ. Кромѣ означенныхъ выше причинъ, она происходитъ при расположеніи къ чахоткѣ у молодыхъ людей и разрѣшается кровотеченіемъ изъ носа, при расположеніи къ пострѣлу, остановленіи почечунаго, мѣсячнаго кровотеченія, запорѣ на низѣ, глустахъ, отъ промоченія ногъ, остановленія пожнаго пота, прекращенія испаринны въ кожѣ, отъ коштуна, воспаленія глазъ и ушей, отъ зубной боли, простуды лица (флюсъ) и пр. Она проходитъ скоро, бываетъ рѣдко продолжительна и опасна, но за то часто и легко возвращается.

Эта боль проходитъ съ главною болѣзнью, но иногда и сама превращается въ воспаление мозга; посему, когда она очень упорна или жестока, либо появляется самостоятелно, то нужно больного содержать прохладнѣе, положить его голову возвышенно, обтирать ее почаще намоченнымъ въ уксусъ полотенцемъ, къ вискамъ и ко лбу прикладывать свѣжіе или квашеные листы капусты, пластинки квашеной свѣклы, лимоновъ (при головной боли съ похмѣльемъ или угара), холстинки, намоченныя въ холодной водѣ, снѣгу, завернутый въ полотенце, ледъ въ бычачьемъ пузырь. Эти средства сначала производятъ пріятное впечатлѣніе на больного; употребленіе ихъ нужно продолжать до тѣхъ поръ, пока они не причинятъ озноба, дрожи или щемленіе въ голову; въ послѣднемъ случаѣ они снимаются съ головы и опять къ ней прикладываются, при появленіи въ ней жара, тягости, біенія и пр. Но когда холодъ не помогаетъ, то нужно приставить пиявки къ вискамъ, за ушами, поставить ноги въ горячую воду съ золою, горчицею, къ икрамъ, плечамъ, затылку, приложить горчичники, мушку на затылокъ. Внутри давать больному холодную воду съ селитрою (драхму селитры на штофъ воды), квасъ, лимонадъ, огуречный разсолъ (при похмѣльи, угарѣ), кислыя щи, шапучіе порошки (при тошнотѣ и рвотѣ); при запорѣ на низѣ, слабительное изъ простокваси, сыворотки, горькой воды, соли, обыкновенный клистиръ съ уксусомъ. Работники лѣтомъ въ полѣ, въ огородѣ, могутъ предотвратить головную боль, покрывая голову бѣлымъ платкомъ, бѣлою фуражною



шапкою изъ полотна, простой соломѣ, сѣна, опачивая почаще голову холодною водою и не наклоняясь низко во время работы. Если боль головы дѣлается нестерпимою, постоянною, къ ней присоединяется безпамятство, бредъ—признаки воспаления мозга,—то надобно послать за врачомъ, при недостаткѣ котораго, пустить больному кровь и поступать какъ при воспаленіи мозга, пострѣлъ.

2) Желудочная боль головы отличается бѣлымъ, нечистымъ языкомъ, желтизною лица, особенно глазъ, горечью во рту, тяжестью и напряженіемъ во лбу, біеніемъ, стукомъ во всей головѣ, отрыжкою, тошнотою и рвотою. Здѣсь полезны: содержаніе головы и примочки какъ и при боли головы отъ прилива крови, и нужно лечить настоящую болѣзнь приличными средствами, особенно слабительными (см. Желудочную лихорадку, Растройство пищеваренія, Рвоту, Запоръ и пр.).

3) Нервная боль головы появляется чаще у истеричекъ, ипохондрикковъ; занимаетъ тѣмъ, полголовы (мигрень), виски, чувствуется какъ сверленіе, сжатіе головы; при ней замѣчается блѣдное лице, мутные глаза, холодныя руки и ноги. Здѣсь полезны: растиранія рукъ и ногъ суконками, щетками, спиртомъ, горячіе кувшины или кирпичи къ ногамъ, накапываніе на мѣсто боли гофманскихъ капель, eau de Cologne, крѣпкаго виннаго спирта, обыкновенный клистиръ съ дурнымъ духомъ (30—60 гранъ на клистиръ); при рвотѣ—шипучіе порошки; по прекращеніи боли, для предотвращенія ея возврата—холодная наливка тысячелистника, квасца, хина или хинная соль съ желѣзнымъ купоросомъ въ порошокъ (№ 58). Нервная боль продолжительная производитъ приливъ крови къ головѣ, обозначающійся біеніемъ и припухlostью кровяныхъ жилъ на лбу, вискахъ, и тогда нужны холодныя примочки и припускъ пиявицъ за ушами, какъ при боли отъ прилива крови къ головѣ.

4) Боль головы отъ переноса на голову любострастной, золотушной матеріи, узнается чрезъ подробный разспросъ больного и требуетъ леченія сихъ болѣзней и приглашенія врача. Главнѣйшія средства противъ сей болѣзни суть: мушка на затылокъ, повторительно ставимая и под-



держиваемая въ нагноеніи, фонтанеди за ушами, на плечахъ, ножныя ванны съ горчицею и золою. Вообще отъ какой бы причины ни зависѣла головная боль, при ней необходимо соблюдать простое, но важное правило: голову держать въ холодъ, ноги въ тепло, а желудокъ въ голодъ.

5) Боль головы органическая—отъ поврежденій головы, опухолей, наростовъ внутри черепа, грыжи мозга, кистозы, язвъ, свищей, и пр.—непретѣнно требуетъ призыва врача-оператора, который однако также рѣдко бываетъ счастливъ при излеченіи сей боли, потому именно, что причина боли скрывается глубоко и недоступно—въ черепъ.

§ 109. Личная боль (*tic douloureux*). Признаки: боль по срединѣ щеки, подъ скулою въ верхней челюсти; эта боль занимаетъ личное сплетеніе нервовъ, которое отсюда простирается, въ видѣ гусиной ноги, по всей щекѣ, а потому и боль отъ скулы распространяется по всѣмъ направленіямъ; она бываетъ колючая, жгучая, стрѣляющая, сверлящая, въ сильной степени походить на электрическіе удары или на жженіе раскаленною иглою; причиняетъ жестокія мученія и доводитъ больного до отчаянія, не давая ему покоя ни днемъ, ни ночью. Въ началѣ личная боль бываетъ умѣренна, непродолжительна и возвращается рѣдко: чрезъ мѣсяцъ, недѣлю; но потомъ она усиливается и возвращается ежедневно, по нѣскольку разъ въ день, или же оставляетъ больного только на нѣсколько часовъ; она сильно ослабляетъ больного, часто повергаетъ его въ обморокъ, причиняетъ судороги въ личныхъ мышцахъ и даже во всѣмъ тѣлѣ.

Причины. Личная боль чаще замѣчается у слабыхъ, нѣжныхъ, раздражительныхъ лицъ, особенно у женщинъ истерическихъ, пераждавшихъ и перешедшихъ за 30 лѣтъ жизни. Она, по своей натурѣ, сходствуетъ съ болью, чувствуемою пожилыми людьми въ разныхъ частяхъ тѣла, особенно въ ногахъ, бокахъ, плечахъ, предъ перемѣною погоды—ведра, на ненастье; у людей, уже имѣющихъ личную боль, она возбуждается прежде настоящаго времени своего появленія, всякимъ сильнымъ душевнымъ возмущеніемъ:



гнѣвомъ, испугомъ, страхомъ, неожиданною радостью; также обремененіемъ желудка, простудою, сквознымъ вѣтромъ, появленіемъ мѣсячныхъ кровей, запоромъ на низъ; подагренна, ревматическая, золотушная, любострастная острота также причиняетъ личную боль, которая хотя сама по себѣ и не смертельна, но своими терзаніями изнуряетъ больного и приводитъ его въ отчаяніе.

**Леченіе.** Въ началѣ болѣзни, ея приступы сокращаются отъ простаго растиранія щеки рукою, суконкою, съ лещучею мазью, муравьинымъ, березовымъ спиртомъ, отъ припарокъ смягчительныхъ простыхъ, или съ листьями бѣлены, отъ мушки на затылокъ, за ухо; мушка поддерживается въ нагноеніи мазью, на драхму которой прибавляется 2 — 5 гранъ вытяжки бѣлены, белладоны; также полезны: обмываніе щеки лавровишневою, свинцовою и розовою водою (№ 59); поливаніе на щеку струи холодной воды до тѣхъ поръ, пока не одеревенѣетъ щека или не прекратится въ ней боль. Когда приступы боли начнутъ усиливаться и появляться чаще, то надобно пригласить врача, которому предоставить все леченіе въ случаѣ подозрѣнія, что боль зависитъ отъ какой-либо остроты. Иногда помогаетъ извлеченіе гнилаго зуба, а иногда элктиризованіе, магнетированіе животное (руками) или минеральное искусственнымъ магнетомъ. Также надобно пригласить врача и тогда, когда боль дѣлается невыносимою, и когда необходимо унять ее опиумъ, уксусокислымъ морфіемъ или вытяжкою белладоны, которыя употребляются снаружи послѣ мушки, приложенной за угломъ нижней челюсти, подъ ухомъ болящей стороны лица.

**Примѣч.** Боль ушная и зубная описаны при наружныхъ болѣзняхъ въ особенностяхъ.

§ 110. Боль въ желудкѣ. Признаки: въ сторонѣ желудка подъ ложечкою и влѣво подъ ребрами тягостное чувство боли шемящей, давящей, грызущей; боль бываетъ постоянная, но чаще временная и возвращается послѣ употребленія пищи; вначалѣ ограничивается мѣстомъ желудка, а впослѣдствіи распространяется на грудь, спину и брюхо, причиняетъ тошноту, рвоту, обмороки, охладѣніе



рукъ и ногъ, легко дѣлается продолжительною и упорною; замѣчается особенно у женщинъ, во время прекращенія или неправильнаго появленія мѣсячныхъ кровей, и тогда легко переходитъ въ кровавую рвоту. Эта боль отличается отъ воспаления желудка тѣмъ, что она отъ прижатія не усиливается, а напротивъ даже утихаетъ, и что при ней не бываетъ лихорадки. Впрочемъ, жестокая боль всегда угрожаетъ воспаленіемъ желудка.

Причины: кромѣ общихъ причинъ, производящихъ первныя болѣзни, боль желудка чаще есть припадокъ истерики, или же происходитъ отъ простуды при легкомъ одѣяніи, въ сырой квартирѣ, во время полосканья бѣлья, паркъ, отъ безпорядка въ мѣсячномъ кровотеченіи, и потому замѣчается у женщинъ взрослыхъ, получившихъ или уже теряющихъ мѣсячное очищеніе, т. е. между 16 и 45 годами.

Лечение. При скопленіи нечистотъ въ желудкѣ (тошнотъ, горечи, рвотъ, отрыжкѣ), рвотное весьма скоро облегчаетъ больного; далѣе полезны: втираніе въ ложечку противусудорожной мази (№ 60), теплыя припарки съ бѣшеною и ромашкою на животъ, горячія салфетки, зола, овесъ, отруби, магрѣтыя и въ мышкѣ положенныя на животъ; внутрь: висмутъ съ сахаромъ по 1—2 грана на пріемъ, три раза въ день, углекислая магнезія, шипучій порошокъ, каяпутное масло по 1 капль. Если въ сторонѣ желудка, отъ сильной боли, замѣчается жаръ, тяжесть и боль отъ прижатія усиливается, то, для предотвращенія воспаления, нужно противъ мѣста боли приставить пиявицы, а потомъ употреблять теплыя припарки. Если эта боль происходитъ предъ появленіемъ мѣсячныхъ кровей и замѣчается тягость, давленіе вѣду живота, въ поясницѣ, то пиявицы нужно приставить къ верхней и внутренней сторонѣ ляшекъ, къ дѣтороднымъ губамъ, а потомъ припарки на животъ, смягчительные клистиры; послѣдніе даже сами по себѣ бываютъ очень дѣйствительны и способствуютъ появленію мѣсячныхъ кровей, особенно когда женщина подвержена запорамъ на низъ испражняется катышками и въ маломъ количествѣ.

Если боль въ желудкѣ не уступаетъ продолжительному употребленію сихъ средствъ, бываетъ постоянна и послѣ



употребленія пищи появляется рвота, то приглашеніе врача необходимо. Къ сожалѣнію, въ такихъ случаяхъ боль чаще зависитъ отъ порчи желудка, и всякое врачебное по-  
собіе бываетъ безуспѣшно.

§ 111. Боль въ кишкахъ, въ животѣ, колика. — При-  
знаки: колючая, жгучая, щемлящая, давящая боль, посто-  
янная или чаще переходящая съ мѣста на мѣсто; въ выс-  
шей степени она соединяется въ быстромъ упадкомъ силъ,  
матніемъ, головокруженіемъ, обморокомъ, холоднымъ по-  
томъ, тошнотою, рвотою, поносомъ или запоромъ. Пере-  
ходящая боль чаще начинается около пупка и стран-  
ствуетъ въ животѣ по направленію кишекъ сначала гори-  
зонтально, потомъ восходитъ къ желудку и идетъ попереч-  
но чрезъ животъ и опускается книзу вдоль поясицы; по-  
стоянная боль обыкновенно засѣдаетъ въ нижней части  
живота надъ правымъ пахомъ (въ слѣпой кишкѣ), или же  
чувствуется противъ крестца, ниже поясицы (въ прямой  
кишкѣ). Постоянная боль опаснѣе переходящей тѣмъ, что  
она удобно причиняетъ воспаленіе кишекъ.

Причины. Боль въ кишкахъ происходитъ отъ множества  
причинъ, которыя впрочемъ всѣ состоятъ или въ накопленіи  
въ кишкахъ нечистотъ (пищи, желчи, слизи, глисть), или  
въ раздраженіи кишекъ и въ приливъ къ нимъ крови, или  
въ судорогахъ, или же въ поврежденіи самыхъ кишекъ (ихъ  
язвахъ, отвердѣніи, суженіи, переплетеніи, зивиткѣ, ущем-  
леніи и пр.). Боль въ кишкахъ, особенно сильная и про-  
должительная, всегда опасна тѣмъ, что переходитъ еще въ  
опаснѣйшее—воспаленіе кишекъ.

Леченіе боли въ животѣ состоитъ вообще въ тепломъ  
держаніи живота и ногъ, въ употребленіи внутри слизистыхъ,  
масляныхъ средствъ, а потомъ слабительныхъ. Въ особенности  
при всякой боли въ животѣ нужно поступать такъ: больному  
давать слизистое питье изъ отвара ячневыхъ, овсяныхъ, рисо-  
выхъ крупъ, аравійской, выпневой камеди, льняныхъ сѣмянъ,  
конопляное, маковое, миндальное молоко, также молоко,  
приготовленное изъ макового, миндальнаго масла, соединяя  
эти средства и вмѣстѣ (№ 42). Такъ какъ при каждой боли  
въ животѣ бываютъ и нечистоты въ кишкахъ, то при на-



часть болѣзни нужно давать слабительное изъ кастороваго, деревяннаго, коноплянаго масла (1—2) ложки столовыя на приемъ, поставить одинъ, два масляные клистира, къ животу прикладывать теплыя, смягчительныя припарки, горячія салфетки, мѣшки съ нагрѣтыми отрубями, золою, овсомъ; къ ногамъ теплые кирпичи, кувшины съ горячею водою, и вообще все тѣло больного, исключая головы, держать въ теплѣ. При всякой сильной боли въ животѣ, особенно съ тошнотой и запоромъ, нужно тщательно осмотрѣть животъ и разспросить больного: нѣтъ ли, или не было ли у него грыжи? Если боль въ животѣ дѣлается постоянною на одномъ мѣстѣ, отъ прижатія котораго она усиливается, бываетъ жгучая, или животъ напрягается и вздувается, у больного развивается жаръ, — то къ больному мѣсту нужно приставить нѣсколько пиявицъ, и даже пустить кровь молодому, полнокровному человѣку, а потомъ продолжать припарки и внутрь давать слабительное изъ сказаннаго масла. Слабительное необходимо и послѣ всякой боли въ животѣ для испражненія нечистотъ, накапливающихся въ кишкахъ во время боли.

Леченіе боли въ животѣ измѣняется по ея причинамъ. Боль въ животѣ отъ полнокровія, кровяная, воспалительная колика (см. выше) происходитъ у молодыхъ, полнокровныхъ людей, послѣ неумѣренности въ употребленіи пищи прѣной, соленой, спиртныхъ напитковъ, послѣ оставившагося почечуйнаго, мѣсячнаго кровотеченія. Эта боль бываетъ жгучая, давящая, чувствуется постоянно въ одномъ мѣстѣ, которое не терпитъ никакого прижатія. Леченіе: кровопусканіе, припускъ пиявицъ къ мѣсту боли, къ заднему проходу, вокругъ отверстія предматочника, припарки, слабительное изъ горькой, англійской соли, горькой воды, сыворотки, кастороваго, коноплянаго масла, а при почечуи съра съ кремортартаромъ и мѣломъ, или магнезіею.

2) Нервная боль въ животѣ, нервная, судорожная колика. Признаки: нервное, слабое, нѣжное тѣлосложеніе, худощавость, блѣдность, истерическіе припадки, склонность къ обмороку, летучая, переходящая боль, отъ прижатія неусиливающаяся. Леченіе: миндальное, маковое молоко, масляная эмульсія (№ 22), втираніе въ животъ льнянаго



масла, отвареннаго съ листьями бѣлены; мягчительныя припарки къ животу, теплыя ванны съ отрубями, клистиры съ дурнымъ духомъ, котораго  $\frac{1}{2}$ —1 драхма, стертая съ масломъ, смѣшивается со стаканомъ ромашковой наливки и льнянымъ масломъ.

Боль въ животѣ, колика желудочная, желчная, глистная, вѣтренная. Признаки: нечистый языкъ—желтый, бѣлый; горечь во рту, отрыжка гнилыми яицами, тошнота, урчаніе въ животѣ, жгучая, шемаящая, переходящая боль, предшествовавшая невоздержность въ пищу, питьѣ; гнѣвъ, испугъ; знойное время; сонъ ночью на сырой землѣ и пр.; больной уже нѣсколько времени имѣетъ запоръ, или же незначительное испражненіе низомъ, отъ чего въ кишкахъ скопляется и портится слизь, твердый калъ, который иногда ощупывается въ видѣ твердаго желвака въ правой и нижней части живота.

Леченіе: сперва питье изъ миндальнаго, коноплянаго молока, потомъ риверіева смѣсь, кремортарторъ, клюквенный, лимонный сокъ, а наконецъ слабительное изъ манны, тамаринда, чернослива, кремортартара съ поташемъ (*tartarus tartarisatus*), изъ горькой соли масляные клистиры.

При отвердѣломъ калѣ, испражняемомъ въ видѣ катышковъ, надобно долго и часто употреблять клистиры съ масломъ, мыломъ и солью поваренною или англійскою. При коликѣ отъ глистъ—масляная эмульсія, а потомъ противуглистные средства; вѣтренная колика лечится, какъ скопленіе вѣтровъ въ животѣ (см. Вѣтры).

Боль металлическая; колика у живописцовъ, маляровъ, плавильщиковъ. Эта боль происходитъ отъ поглощенія мышьяка въ парахъ, свинца въ краскахъ, ртути въ парахъ и лекарствахъ; наипаче случается колика свинцовая. Кромѣ общихъ признаковъ колики, въ ней замѣчается твердый, стянутый животъ, почти прильнувшій къ спинѣ, онѣмѣніе рукъ и ногъ, запоръ мочи и кала. Леченіе. Главное средство есть сыра въ порошокъ внутрь, въ мази и ваннахъ снаружи, слабительное изъ сыры же, кастороваго, льнянаго масла, припарки живота, простые клистиры, масляныя вѣ-



равія въ животъ. Впрочемъ, къ такимъ больнымъ нужно пригласить и врача.

Кромѣ сихъ видовъ боли въ животъ или колики, она можетъ происходить отъ переноса на кишки ревматической, подагренной, любострастной остроты, отъ желчныхъ и почечныхъ камней, отъ заваловъ печени, селезенки (см. эти болѣзни и ипохондрию); отъ отвердѣній, суженій, язвъ кишекъ. Эта колика узнается очень трудно, и потому, если она не уступаетъ обыкновеннымъ средствамъ, то нужно къ такимъ больнымъ пригласить врача, котораго дѣйствія, къ сожалѣнію, въ подобныхъ случаяхъ также рѣдко бываютъ успѣшны.

§ 112. Бессонница.—Признаки. Человѣкъ проводитъ ночи и дни безъ всякаго сна, и это можетъ продолжаться недѣли, мѣсяцы и даже годы, и притомъ или непрерывно во все это время онъ не спитъ, или же бессонница на некоторое время проходитъ, а потомъ опять возвращается періодически. Слѣдствіемъ продолжительной бессонницы бываетъ слабость силъ, истощеніе тѣла, расстройство умственныхъ способностей.

Причины. Бессонница зависитъ отъ тревожнаго, раздраженнаго состоянія мозга или нервовъ; производится продолжительнымъ вліаніемъ солнечнаго свѣта, вѣшнымъ знаніемъ (бессонница у Европейцевъ—переселенцевъ въ жаркія страны), нервными горячками, тревожнымъ состояніемъ духа, занятаго какою-либо заботою, тайною тоскою, ожиданіемъ чего либо особеннаго, слишкомъ встревоженнаго какою либо происшествіемъ—радостнымъ, печальнымъ, страшнымъ; далѣе, она причиняется раздраженіемъ брюшныхъ нервовъ, отъ скопленія желчи въ брюхѣ, заваловъ брюшныхъ внутренностей, отъ брюшнаго подлюкрвія.

Леченіе. Пребываніе въ полутемной, прохладной комнатѣ, обмываніе головы холодною водою, простая, тепловатая ванна ввечеру при отходѣ ко сну и питье холодной воды, успокоеніе духа чтеніемъ занимательныхъ, убѣждающихъ книгъ, утѣшительною бесѣдою. Если все это не помогаетъ, то чашка чаю изъ маковыхъ цвѣтовъ, или головокъ, предъ отходомъ ко сну



доставляет иногда покойный сонъ (\*). Люди полнокровные, слабые, иногда хорошо засыпаютъ отъ рюмки малаги, выпитой на ночь: сонъ у нихъ также появляется отъ положенныхъ подъ ихъ подушку листьевъ бѣлены, травы мелиссы. Если все это въ теченіе нѣсколькихъ дней не доставляетъ сна, то надобно пригласить врача, безъ совѣта котораго отнюдь не давать сонныхъ капель, порошка бѣлены (1—2 грана предъ сномъ), сока или вытяжки салата (*extract. lactusae*). Бессонные должны не ужинать; предъ отходомъ ко сну прогуливаться на открытомъ воздухѣ, даже до усталости; ложиться на матрацъ, покрываться не тепло; днемъ заниматься механическою работою въ саду, огородѣ, въ комнатахъ точеніемъ, пиленіемъ, игрою на билліардѣ и избѣгать умственныхъ занятій, дабы въ послѣднемъ случаѣ не раздражить еще болѣе мозга, а въ первомъ—привести его и нервы въ усталость, которая всякаго надѣляетъ сномъ.

§ 113. Сонливость, спячка. — Признаки: глубокій, крѣпкій, долговременный, словомъ необыкновенный сонъ, продолжающійся цѣлые дни, мѣсяцы и даже годы; такой сонъ бываетъ или непрерывный, или же сонливецъ пробуждается на время для удовлетворенія естественныхъ нуждъ, и потомъ опять засыпаетъ. Иногда сонливость прекращается на короткое время, или же она возвращается правильно періодически въ началѣ каждаго мѣсяца, продолжается нѣсколько дней, прекращается и опять появляется въ слѣдующемъ мѣсяцѣ. Этотъ сонъ, особенно у молодыхъ женщинъ, сопровождается иногда магнитнымъ ясновидѣніемъ, въ которомъ спящая прописываетъ себѣ лекарства и лечитъ другихъ больныхъ. Вообще однако и въ продолжительномъ, безпробудномъ снѣ, вещественныя дѣйствія тѣла сонливца—дыханіе, кровообращеніе, бѣеніе сердца—продолжаются своимъ порядкомъ, но испражненія (мочи, кала, испарина) и питаніе бываютъ очень скудны.

Причины. Сонливость чаще всего бываетъ припадкомъ

(\*) Лѣнныя няньки и кормилицы часто больныхъ младенцевъ усыпляютъ чаемъ маковыхъ цвѣтовъ, и притомъ иногда такъ неосторожно, что бѣдныя малютки засыпаютъ навѣкъ. Такъ въ Парижѣ няньки усыпили девятирѣхъ дѣтей, изъ коихъ меньшее умерло.



опасныхъ горячекъ, воспаленія и водянки мозга, кровяного пострѣла (удара), разныхъ поврежденій головы, и всегда есть опасный признакъ; но сонливость, какъ самостоятельная болѣзнь мозга и нервовъ, безъ совмѣстія другихъ болѣзней, не только не опасна, но даже полезна, ибо она оказывала благотворное вліяніе на здоровье, и даже на умственные способности бывшаго сонливца. Первая сонливость бываетъ кратковременная—скоро оканчивается смертію или выздоровленіемъ сонливца; послѣдняя продолжительна, появляется у женщинъ въ періодъ ихъ возмужалости, зависитъ наичаще отъ разстройства мѣсячнаго очищенія, отъ разныхъ нервныхъ болѣзней, душевныхъ потрясеній, несчастій любви и пр. и соединяется, какъ сказано выше, съ ясновидѣніемъ. Сонливость у дѣтей есть предвѣстникъ и припадокъ острой водянки въ мозгъ, а у пожилыхъ людей и истериковъ—кровяного пострѣла.

Леченіе. Сонливость, какъ припадокъ другой болѣзни, проходитъ вмѣстѣ съ послѣднею. Впрочемъ, противъ самой сонливости, которая здѣсь оказывается подъ видомъ прерывистаго, или глубокаго непрерывнаго сна, съ бредомъ и храпѣніемъ, употребляются средства, вычисленныя при приливѣ крови къ головѣ, отъ котораго зависитъ и сонливость. Сонливость, какъ самостоятельная болѣзнь развитія женскаго тѣла, не требуетъ никакого леченія, кромѣ надзора за больною во время сна, особенно если она говорить, ходить во снѣ и лечитъ сама себя.

§ 114. Похотливость. Признаки: жаръ и напряженіе въ дѣтородныхъ частяхъ, безпрестанное побужденіе къ удовлетворенію плотской похоти, иногда такъ сильное, что самыя благонравныя больныя забываютъ приличіе въ обществѣ, обнаруживаютъ свою похотливость словами, движеніями, обращеніемъ, и для удовлетворенія ея прибѣгаютъ къ противуестественнымъ способамъ (рукоблудію—онанисму). У женщинъ похотливость бываетъ чаще и сильнѣе, чѣмъ у мужчинъ, совершенно заглушаетъ стыдъ и разсудокъ и доводитъ ихъ до любострастнаго умопомѣшательства. У женщинъ похотливость обозначается: жженіемъ, колющемъ, зудомъ въ предматочникѣ, въ мочевоомъ пузырь, судорож-



нымъ, мгновеннымъ задержаніемъ мочи, истеченіемъ слизи, частымъ позывомъ къ испусканію мочи, безпричинными обмороками, судорогами и разными истерическими припадками, въ которыхъ появляется сладострастіе.

Причины бываютъ душевныя и физическія, именно: разгоряченное воображеніе любострастными зрѣлищами, картинами, вольнымъ обращеніемъ половъ, чтеніемъ романовъ, воздержаніе послѣ привычки къ частому удовлетворенію похоти, частое раздраженіе дѣтородныхъ частей безъ удовлетворенія похоти, неудачная, безуспѣшная любовь у незамужнихъ женщинъ, вдовъ; но болѣе всего располагаетъ къ похотливости праздная, беззаботная, сидячая жизнь, сочная, мясная, пріятная пища, спиртные напитки, особенно сладкіе ликеры; всѣ эти условія преждевременно пробуждаютъ дѣтородную похоть, и по этому похотливость замѣчается у богатыхъ городскихъ жителей и рѣдко у бѣдныхъ и поселянъ; иногда похотливость происходитъ у женщинъ отъ заплззанія мелкихъ глистъ въ предматочникъ, отъ труднаго появленія мѣсячныхъ кровей, у мужчинъ отъ почечуя; у тѣхъ и другихъ отъ отвердѣній въ животѣ, брюшнаго полнокровія, неопрытнаго содержанія дѣтородныхъ частей.

Леченіе. Главное средство противъ похотливости есть воздержаніе и трудъ; постъ въ строгомъ смыслѣ, т. е. воздержаніе отъ мясной, пріятной, сочной, и умѣренное употребленіе молочной, рыбной, растительной пищи. Воздержаніе отъ вина, водки, кофе и другихъ горячительныхъ напитковъ, уничтожая раздражающее свойство крови, умѣряя обращеніе, унимая волненіе крови, тѣмъ самымъ въ корнѣ уничтожаетъ причину похотливости; а тѣлесные труды до усталости и умственные занятія важными, отвлеченными предметами, издерживая кровь и утомляя силы, также подавляютъ похотливость. У голоднаго хлѣбъ на умъ; усталый думаетъ объ отдохновеніи, а не объ удовлетвореніи плотской похоти. Сверхъ того, для умѣренія горячительнаго дѣйствія крови полезны: прохладная комната, жесткая, соломенная, матрацная постель, обыкновеніе спать на боку, а не на спинѣ, не ужинать, а пить при отходѣ ко сну холодную воду, окачиваніе тѣла холодною водою, холодныя



ванны, купанье въ рѣкѣ, повторительные приемы слабительнаго изъ горькой воды, англійской соли, кремортартара, обмываніе дѣтородныхъ частей холодною водою, внутреннее и наружное употребленіе камфоры; но послѣднія два средства сильно подавляютъ плотскую похоть, особенно камфора, которая, при долговременномъ и неосторожномъ ея употребленіи, даже совсѣмъ можетъ уничтожить способность къ совокупленію и у мужчинъ произвести сухотку яичекъ. Камфора дается внутрь въ порошокъ съ сахаромъ по 1—2 грана 2—3 раза въ день въ теченіе 3—4 дней, по прошествіи коихъ приемы камфоры прекращаются, если замѣчено будетъ уменьшеніе похотливости; въ противномъ случаѣ она употребляется еще 2—3 дня съ тою же предосторожностью. Для наружнаго употребленія драхма камфоры растворяется въ унціи деревяннаго, льнянаго, маковаго масла, которымъ намазываются 1—2 раза въ день дѣтородныя части; съ этою же цѣлью можно употреблять и масло бѣлены. Сильное болѣзненное напряженіе дѣтороднаго уда проходить отъ погруженія его въ холодную воду и масляно-мягчительныхъ припарокъ съ бѣленою; а такое же напряженіе полочки (клитора) у женщинъ проходить отъ прижиганія ея адскимъ камнемъ.

§ 115. Мужское безсиліе.—Признаки: слабый, вялый, морщиноватый стволъ, или совсѣмъ невозстающій отъ извѣстныхъ возбужденій, или же подымающійся, но слабо и притомъ скоро опять опадающій. Эти возбужденія ствола бываютъ или безъ всякаго изверженія сѣмени, или же сѣмя скоро извергается, но слабо, едва истекаетъ, бываетъ жидко, водянисто, а не густомасляно, и не имѣетъ собственнаго, пронизательнаго запаха.

Причины безсилія или въ самыхъ дѣтородныхъ частяхъ, или же оны дѣйствовали на все тѣло. Первыя причины суть: опухоли, наросты, язвы, свищи ствола, яичекъ, мочеваго пузыря; сухотка и потеря яичекъ; суженіе, наросты въ мочевомъ каналѣ и ненатуральное его отверзтіе подъ головкою ствола; слишкомъ длинная и узкая крайняя плоть, слабость мышцъ и нервъ, напрягающихъ стволъ; скудное, жидкое, водянистое сѣмя и частая его растрата; худое питаніе тѣла,



старость, тяжкія болѣзни, чрезмѣрные труды и умственныя занятія, заботы, печаль, частыя огорченія, распутство, рукоблудіе; послѣдніе два порока составляютъ въ городахъ обыкновенную причину безсилія, которое, впрочемъ, хотя и рѣдко, зависитъ отъ непомѣрнаго напряженія ствола, препятствующаго свободному изверженію сѣмени.

Самое безсиліе можетъ быть случайное и зависитъ отъ ненависти, отвращенія отъ женщины, отъ разности темпераментовъ—слишкомъ жаркаго и холоднаго,—и потому мужчина безсильный и бесплодный съ одною женщиною, бываетъ исправленъ съ другою и плодитъ дѣтей.

Леченіе. Здѣсь прежде всего пужно осмотрѣть дѣтородныя части и найденныя въ нихъ мѣстныя болѣзни лечить по правиламъ искусства, и для того посовѣтоваться съ врачомъ. Безсиліе отъ сухотки, потери яичекъ и бесплодіе отъ несовмѣстнаго отверзтія мочевого канала, неизлечимы. Безсиліе отъ общихъ, внутреннихъ причинъ, при неслишкомъ преклонныхъ лѣтахъ больнаго и незначительной степени изнуренія всего тѣла, можетъ быть исправлено. Для этого надобно доставить больному все, что пріятно, живительно дѣйствуетъ на его душу и тѣло, а именно: свѣжій, чистый, горный воздухъ, частая прогулка, спокойная, веселая жизнь, пріятныя и легкія занятія ума и тѣла, сочная, питательная, легковаримая пища: мясо, дичь, яйца, студень, бульонъ, свѣжая рыба, устрицы, шоколадъ, желе изъ оленьяго рога, обливанія тѣла и обмываніе дѣтородныхъ частей, спины и поясицы холодною водою, холодныя ванны съ поваренною солью, купанье въ морь, въ рѣкъ, хорошее старое вино, наливка, отваръ, настойка изъ кваси, корня коломбо, бестужевскія капли (по 10—15—20 капель), ванны съ желѣзомъ, желѣзныя, минеральныя воды: пирмонтская, кавказская. Но мы отнюдь не советуемъ употреблять какія либо средства, особенно секретныя, которыя будто бы имѣютъ силу возбуждать дѣтородныя части, какъ то: разные болзамы — копайскій, меккскій, перувіанскій, скипидаръ, морской лукъ, масло яитарное, донскаго можжевельника, ваниль, корица, сабуръ и наконецъ, главное между ними, шпанскія мушки: всѣ эти



средства если и пробуждаютъ способность къ совокупленію, то на нѣкоторое время, по прошествіи котораго мужское безсиліе бываетъ еще значительнѣе. Но, кромѣ того, за неосторожное употребленіе этихъ средствъ, особенно янтарнаго, можжевельоваго масла и мушекъ, можно поплатиться жизнью, а уже навѣрное — разстройствомъ здоровья.

Примѣч. О женскомъ безплодіи будетъ сказано при женскихъ болѣзняхъ.

§ 116. Онѣмѣніе, параличъ. Такъ называется ослабленіе или и совершенное уничтоженіе движенія и чувствованія и притомъ обоихъ вмѣстѣ, или же одного какого либо, чаще однако чувствованія. Сущность онѣмѣнія, или паралича, состоитъ въ уничтоженіи дѣятельности нервовъ или мозга, зависящемъ или отъ ослабленія, ихъ истощенія, или отъ подавленія, ихъ прижатія, угнетенія полнокровіемъ, измѣненіемъ крови, посторонними тѣлами: пулею въ черепъ, — опухолями, паростами, вывихами позвонковъ, прижатіемъ, перевязкою нервовъ или, наконецъ, отъ судорожнаго состоянія нервовъ, въ слѣдствіе пероса на нихъ какой-либо машеріи, сочувственнаго, брюшнаго раздраженія, глисть, ипохондріи, истерики. Онѣмѣніе можетъ быть попеременно съ болями и судорогами, т. е. въ онѣмѣлыхъ частяхъ по временамъ можетъ появляться болѣзненное чувствованіе и движеніе. Вообще, онѣмѣніе можетъ начинаться отъ мозга, а потомъ распространяется на происходящіе отъ него нервы, или же оно отъ нервовъ восходитъ къ мозгу; первый родъ онѣмѣнія бываетъ чаще послѣдняго.

§ 117. Кровяной, апоплексическій пострѣлъ, ударъ мозга. — Признаки. Такъ называется болѣзнь, поражающая какъ бы выстрѣломъ, тяжелымъ ударомъ, молніею, человека, который притомъ обыкновенно шатается и упадаетъ, лежитъ безъ памяти, безъ чувствованія и движенія, но у котораго продолжается бѣненіе пульса и дыханіе, часто съ храпѣніемъ.

Пострѣлъ имѣетъ отчасти сходство съ падучею болѣзнію, обморокомъ, опьяненіемъ и угаромъ, но отличается отъ нихъ тѣмъ, что въ падучей болѣзни бываютъ судороги, въ обморокѣ — слабый, едва примѣтный пульсъ и такое же



дыханіе, а въ опьянѣніи, угарѣ—не уничтожается движеніе и замѣчается винный запахъ изъ рта. Впрочемъ, повстанъ этихъ болѣзняхъ (кромѣ обморока) такъ же, какъ и въ пострѣлѣ, бываетъ приливъ крови къ мозгу, и въ высшей степени онѣ переходятъ въ пострѣлѣ.

Пострѣлѣ обнаруживается различно: иногда онѣ поражаетъ подобно молніи и убиваетъ въ нѣсколько минутъ; чаще однако пораженный пострѣломъ остается живымъ, но лежитъ въ глубокомъ усыпленіи, съ храплымъ, рѣдкимъ дыханіемъ, медленнымъ, крѣпкимъ, полнымъ, неправильнымъ пульсомъ, безъ памяти, безъ чувствъ и безъ всякаго движенія, кромѣ иногда нѣкоторыхъ подергиваній въ лицѣ, рукахъ, съ пѣною у рта, расширенными зрачками, опавшими вѣками, отвисшею нижнею челюстью, труднымъ и невозможнымъ глотаніемъ, произвольнымъ испражненіемъ кала и мочи, — это пострѣлѣ совершенный. Въ другихъ случаяхъ пострѣлѣ бываетъ слабѣе: больной не теряетъ памяти, а только у него замѣчается онѣмѣніе нѣкоторыхъ частей: языка (несвободная рѣчь, заиканіе), одной половины тѣла; или же уничтожается одно чувство, либо одно движеніе: человекъ не чувствуетъ укола иглою въ онѣмѣющую часть тѣла, не движетъ ею. Еще иногда пострѣлѣ обозначается только тѣмъ, что одинъ глазъ бываетъ болѣе другаго, что ротъ немного искривляется въ сторону, замѣчается по временамъ косноязычіе, заиканіе, происходитъ кратковременное онѣмѣніе въ рукахъ, ногахъ, обморокъ; это есть болѣе намѣкъ къ будущему пострѣлу, чѣмъ самый пострѣлѣ.

Ходъ пострѣла бываетъ различенъ, смотря по его степени. Въ сильномъ пострѣлѣ больной или умираетъ, не придя въ память, или приходитъ въ себя и получаетъ послѣдующую лихорадку, которая на 3—6 день ожесточается и оканчивается новымъ смертельнымъ пострѣломъ, или же она на 7—14 день рѣшается переломомъ, наичаще посредствомъ поноса. Гораздо чаще послѣ пострѣла остается онѣмѣніе какой либо части тѣла—руки, ноги, потеря памяти, рѣчи, трудное глотаніе (весьма худое слѣдствіе пострѣла), неправильный, прерывистый пульсъ (признакъ не-



избѣжнаго другаго приступа пострѣла). Выше было сказано, что злокачественная перемежающая лихорадка также принимаетъ видъ пострѣла.

Пострѣлъ или вдругъ поражаетъ безъ всякихъ предвѣстій, подобно какъ иногда въ природѣ въ ясный день вдругъ наступаетъ страшная гроза; или же появленію пострѣла предшествуютъ разныя болѣзненные явленія, какъ то: склонность ко сну и глубокой сонъ, головокруженіе со рвотою, безпричинные обмороки, шумъ въ головѣ, забвеніе извѣстныхъ обстоятельствъ жизни, именъ, словъ, паденіе вѣкъ, отвислость нижней губы и челюсти, истеченіе изо рта слины во снѣ, выпаденіе пищи изо рта во время жеванія, искошеніе глазъ, искривленіе рта, искаженіе чертъ лица, обрюзглость лица, шатаніе тѣла на походкѣ и подгибаніе коленокъ, временное онемѣніе рукъ или ногъ, старость или по крайней мѣрѣ возрастъ свыше 40 лѣтъ, а также извѣстное тѣлосложеніе; посему если человекъ замѣчаетъ въ себѣ подобные припадки, то онъ долженъ опасаться пострѣла.

Причины. Пострѣлъ состоитъ въ подавленіи, временномъ остановленіи, прекращеніи дѣйствій мозга. Это можетъ произойти отъ различныхъ причинъ и при различномъ состояніи тѣла, а именно: 1) отъ напора крови къ головѣ, (при общемъ полнокровіи и при затруднительномъ низтеченіи крови отъ головы въ грудь, по причинѣ сжатія шейныхъ сосудовъ галстухомъ, веревкою, полотенцемъ (при повѣшеніи), отъ расширенія и отолстѣнія сердца, грудной жабы, воспаленія легкихъ, переполненія желудка пищею, низкаго положенія головы во время сна. Сильные же приливы крови къ головѣ, причиняющіе пострѣлъ, происходятъ: отъ тѣлеснаго движенія, ношенія на головѣ большихъ тяжестей, отъ сильныхъ душевныхъ возмущеній (гнѣва, страха, радости); отъ вѣшняго зноя, паденія солнечныхъ лучей на открытую голову, отъ воспаленія и сотрясенія мозга, отъ ушибовъ и поврежденій головы, отъ пьянства, угара. Такимъ образомъ пострѣлъ проходитъ у тѣсно повязывающихъ шею платкомъ для сообщенія лицу полноты и свѣжести, у повѣсившихся, удавленныхъ, утопленныхъ, у бѣ-



жавшихъ долго и скоро, у разнощиковъ, у разсердившихся, испуганныхъ, неожиданно обрадованныхъ, у полевыхъ работниковъ (особенно жнецовъ) лѣтомъ съ открытою головою, у людей, упавшихъ съ высокаго мѣста головою внизъ на землю, въ воду, у получившихъ ударъ въ голову подушкою, вязанкою сѣна, снопами соломы, ушибенныхъ камнемъ, бревномъ, выстрѣломъ въ голову, у безчувственно пьяныхъ, въ жаркой банѣ, особенно, когда люди парятся скоро послѣ обѣда, при полнотѣ желудка, у угорѣвшихъ отъ чада, у задыхающихся отъ спертaго воздуха, удушливыхъ газовъ; во всѣхъ этихъ случаяхъ происходитъ кровяной пострѣлъ, т. е. въ сосудахъ мозга скопляется кровь, прижимаетъ его, останавливаетъ въ дѣйствіи, прорываетъ мозговые сосуды и изливается въ существо, а болѣе на поверхность мозга. Этотъ кровяной пострѣлъ легко и быстро происходитъ у людей, имѣющихъ особое устройство тѣла, которое состоитъ въ большой головѣ, толстой, короткой шеѣ, объемистомъ, короткомъ туловищѣ, полусогбенной, какъ бы горбатой спинѣ, широкихъ плечахъ и груди; у такихъ людей чрезъ толстые и короткіе сосуды кровь толстою струею легко и скоро проливается къ мозгу и его прижимаетъ, подавляетъ.

2) Отъ слабости, раздражительности нервовъ, истощенія тѣла, у вѣжливыхъ, чувствительныхъ, малокровныхъ, худошавыхъ людей, легко подчиняющихся вліанію страстей, подверженныхъ судорогамъ, столбняку, падучей болѣзни, предававшихся распутству (плотской похоти, рукоблудію, пьянству), вытерпѣвшихъ опасныя нервныя горячки, понесшихъ значительную потерю крови, достигшихъ глубокой старости. Во всѣхъ этихъ случаяхъ происходитъ сывороточный пострѣлъ т. е. въ мозгъ, вмѣсто крови, скопляется безцвѣтная или кровянистая желтая жидкость—сыворотка, которая, подобно крови, угнетаетъ мозгъ и прекращаетъ его дѣйствія.

Эти оба пострѣла, кромѣ сказанныхъ причинъ, происходятъ также отъ переноса на мозгъ подагры, скарлатины, отъ сочувственнаго раздраженія мозга, возникающаго изъ брюха при глистахъ, развитіи желчи: желчный пострѣлъ



замѣчается лѣтомъ въ видѣ повальной болѣзни. Время равноденствія также располагаетъ къ пострѣлу, который посему часто замѣчается въ Мартѣ и Августѣ: въ это время особенно должны опасаться возврата пострѣла тѣ люди, у которыхъ онъ уже былъ прежде, и при малѣйшемъ поводѣ прибѣгать къ кровопусканію, котораго народная польза въ это время основана имѣнно на семъ обстоятельстве. Впрочемъ, пострѣлъ, разъ посѣтившій больного, обыкновенно возвращается къ нему и въ другое время, при малѣйшемъ поводѣ и наконецъ прекращаетъ жизнь. Послѣдующіе приступы пострѣла бываютъ сильнѣе и опаснѣе первыхъ, излечиваются труднѣе и часто оставляютъ послѣ себя неизлечимые параличи. Пострѣлъ, бывшій въ первомъ приступѣ слабымъ и несовершеннымъ, въ послѣдующемъ дѣлается сильнымъ и часто оканчивается смертью.

Лечение имѣетъ цѣлю возстановить дѣйствіе мозга, освободить его отъ давленія, прижатія. При этомъ нужно помнить, что гораздо чаще это прижатіе происходитъ отъ скопленія и изліянія крови, чѣмъ отъ слабости. Сообразно двумъ выше описаннымъ видамъ пострѣла, нужно прежде всего изслѣдовать: какой пострѣлъ предстоитъ намъ лечить: кровяной—отъ полнокровія, или сывороточный, нервный—отъ слабости.

1) Въ кровяномъ пострѣлѣ замѣчаются слѣдующія явленія: красное, вздутое, опухшее лице, красноватые глаза, расширенныя, неподвижныя зрачки, полный, твердый, иногда прерывистый пульсъ, медленное, глубокое, часто храпливое дыханіе, сначала умноженная теплота въ тѣлѣ, а потомъ охладѣніе рукъ и ногъ, и другіе вышесказанные припадки; въ это положеніе впалъ человекъ полнокровный, бывшій до того по видимому совершенно здоровымъ, но жаловавшійся на тяжесть въ тѣлѣ, частыя головныя боли, имѣющій вышесказанное тѣлосложеніе, сгорбленную спину, почечуйное кровотеченіе, пропустившій срокъ привычнаго кровопусканія, подвергшійся сильному вліянію какой либо страсти, предавшійся пьянству, подверженный запорамъ на-низъ. Въ этомъ пострѣлѣ въ ту же минуту больному нужно непременно пустить кровь изъ руки посредствомъ широ-



каго разреза вены, для того, чтобы кровь потекла быстро и непрерывною, ровною, толстою струею; кровь должна течь изъ жилы до тѣхъ поръ, пока пульсъ не сдѣлается мягкимъ, слабымъ и ровнымъ (безъ перерывовъ), а дыханіе тихимъ, и пока больной хотя—сколько—нибудь непрідетъ въ себя—воздохнетъ, поворотится, откроетъ на время глаза. Если кровь перестанетъ течь изъ одной руки безъ всякой перемѣны въ положеніи больного, то нужно пустить кровь изъ другой руки или изъ той же самой, но изъ другой ея жилы. Если пульсъ дѣлается слабымъ, малымъ, и въ положеніи больного не происходитъ никакой перемѣны къ лучшему, то къ вискамъ, за ушами, къ шеѣ надобно приставить 20—40 большихъ, лучшихъ, голодныхъ пиявицъ, на затылкѣ поставить нѣсколько кровососныхъ банокъ. При остановленіи почечуйнаго или мѣсячнаго кровотечения, пиявицы припускаются вокругъ задняго прохода, отверстія предматочника. Если послѣ кровопусканія не послѣдовало облегченіе, а пульсъ опять сдѣлался полнымъ и крѣпкимъ, то чрезъ 6—8 часовъ, надобно повторить кровопусканіе. Въ слѣдъ за кровопусканіемъ нужно употреблять отвлекающія средства къ кишкамъ и кожѣ: клистиры чрезъ каждые полчаса, изъ наливки ромашки съ полустаканомъ уксусу, двумя столовыми ложками соли и полложкою горчицы; когда больной придеть въ себя и можетъ глотать, то дать ему слабительное (№ 17); снаружи: на голову класть холодныя примочки со льдомъ, снѣгомъ, селитрою, обливать голову, лице и грудь холодною водою, на плечи, икры) горчичники, мушку на затылокъ. Притомъ снять съ больного тѣсное одѣяніе, дать головѣ его возвышенное положеніе, охладить его комнату, растирать его руки и ноги щетками, но не подносить подъ носъ никакого остраго спирта, уксусу, дыму жженого пера, которые теперь вредны, ибо усиливаютъ приливъ крови къ головѣ; также не надобно давать и рвотнаго. Если при такомъ леченіи въ теченіе сутокъ не послѣдуетъ улучшенія въ положеніи больного, то мало надежды на дальнѣйшій успѣхъ леченія: обыкновенно на 3—6 день усиливается приступъ пострѣла и убиваетъ больного; но когда замѣтимъ въ больномъ перемѣну къ лучшему, то сказанное



лечение, кроме кровопусканія, нужно продолжать безъ перемѣны; и особенно налегать на употребленіе слабительнаго и холодныхъ примочекъ къ головѣ, поддерживать мушки и повторять горчичники. Поправляющійся больной еще долго долженъ быть остороженъ въ употребленіи пищи: не ѣсть мяса, не пить ни вина, ни кофе, сохранять сколько можно душевное и тѣлесное спокойствіе, избѣгать жару, дѣйствія солнечныхъ лучей на голову, тѣсной одежды и проч.

2) Нервный, сывороточный пострѣлъ узнается по тому, что у больного нѣтъ признаковъ кровянаго пострѣла и лихорадки, а, напротивъ, замѣчается: блѣдность лица, истощенность тѣла, охладѣніе рукъ, ногъ, слабый, едва примѣтный пульсъ, тихое, прерывистое дыханіе; больной былъ подверженъ вліянію вышесказанныхъ ослабляющихъ причинъ, горячекъ, дожилъ до глубокой старости. Въ нервномъ пострѣлѣ употребляютъ врачи возбуждающее и отвлекающее лечение, но рѣдко съ успѣхомъ. Мы советуемъ съ подобными больными поступать такъ: къ вискамъ, за ушами поставить 10—20 пиявицъ, голову обмывать холодною водою съ уксусомъ, руки и ноги растирать щетками, прикладывать къ нимъ горячую золу въ мыскахъ, кувшины съ горячею водою, повторительные горчичники, мушку на затылокъ, ставить чрезъ 1—2 часа сказанные клистиры съ уксусомъ, солью и горчицею. Когда больной придетъ въ память и будетъ жаловаться на шумъ и звонъ въ ушахъ, головокруженіе, неясное зрѣніе (пятна предъ глазами), то можно ему сначала по чайной, а потомъ по столовой ложкѣ, давать хорошаго стараго вина (магаги), наливку изъ корня и цвѣтовъ бараньей травы съ гофманскими каплями, мятымъ (по 2—5 капель), каяпутнымъ масломъ (по 1—2 капли), къ носу подносить нашатырный спиртъ, крѣпкій уксусъ, которыми также растирать виски, ладони, подъ ложечкою.

Въ кровяномъ и нервномъ пострѣлѣ немедленное приглашеніе врача необходимо, даже и по прошествіи приступа.

3) Желудочный, желчный пострѣлъ происходитъ послѣ обремененія желудка, огорченій, гнѣва, при повально-свирипствующихъ желчныхъ горячкахъ, воспаленіяхъ печени (лѣтомъ и осенью). При этомъ пострѣлѣ замѣчается у боль-



наго отрыжка, тошнота, нечистый желтобѣлый языкъ, морщины на лицѣ, желтизна глазъ, вздутіе живота около желудка; больной въ безпамятствѣ часто кладетъ руку на животъ; кромѣ того бываютъ припадки кроваваго пострѣла. Этотъ пострѣлъ замѣчается часто у простаго народа, работающаго лѣтомъ въ полѣ, или скоро послѣ обѣда отправляющагося въ жаркую баню. Здѣсь полезны прежде всего кровопусканіе, холодныя примочки головы, а потомъ рвотное изъ рвотнаго камня (№ 10 б.); послѣ рвоты, которою извергается множество непереваренной пищи, желчи и газовъ, полезны клистиры и слабительное, приведенные при кровавомъ пострѣлѣ. Если больной поправляется медленно, или остается въ прежнемъ положеніи, то здѣсь нужно пригласить врача, который можетъ найти нужнымъ повторить кровопусканіе, рвотное.

4) Пострѣлъ отъ бросившейся на мозгъ подагры, распознается по бывшей и теперь исчезнувшей подагрѣ; присемъ однако надобно стараться возстановить подагру на прежнемъ ея мѣстѣ, къ которому для сего прикладываются горчичники, мушка, ставятся ноги въ горячую воду съ золою, горчицею; по прошествіи приступа пострѣла, такимъ больнымъ, по совѣту врача, надобно давать отваръ изъ баккаута, вытяжку бореца (*aconitum*).

О леченіи пострѣла, какъ припадка злокачественной перемежающей лихорадки, и поврежденіи головы, сказано въ своихъ мѣстахъ (см. эту лихорадку и наружныя болѣзни въ особенности), а о леченіи онѣмѣнія, паралича, остающагося послѣ пострѣла, будетъ сказано ниже.

—Человѣкъ, разъ подвергшійся пострѣлу, долженъ беречься его возврата. Предохранительныя мѣры для сего суть: держать ноги въ теплѣ, голову въ холодѣ, а желудокъ въ голодѣ; спать съ возвышенною головою, не кутать ее подъ одѣяло, а по утрамъ обливать ее холодною водою, купаться въ рѣкѣ, быть умереннымъ въ пищѣ, какъ можно рѣже есть говядину, воздерживаться отъ употребленія вина, водки, кофе, не ужинать, а пить на ночь стаканъ холодной воды, не терпѣть запоровъ на-низъ, и употреблять по временамъ селитру съ кремортаромъ, слабительное изъ горькой



соли или такой же воды, огуречного рассола, избѣгать вліянія сильныхъ страстей, заниматься легкою работою на открытомъ воздухѣ, но не до усталости или разгоряченія тѣла, прогуливаться ежедневно пѣшкомъ; носить на голыхъ ногахъ шерстяные чулки; весною, предъ осенью и во всякое другое время, при замѣчаніи тягости въ тѣлѣ, лѣнности, сонливости, головной боли—дѣлать умеренное кровопусканіе изъ руки—2—3 чайныя чашки или глубокую тарелку, смотря по тѣлосложенію.

§ 118. Кровяной пострѣлъ, апоплексія легкихъ. Признаки: припадки труднаго дыханія, появляющіеся вдругъ, быстро усиливающіеся до задушенія; скорое, короткое, тягостное дыханіе, быстрый упадокъ силъ (больной надаетъ), смертельная тоска, сильное бѣненіе сердца, головокруженіе, потемнѣніе въ глазахъ, шумъ и звонъ въ ушахъ, холодный потъ на лбу, шеѣ, груди, охлажденіе рукъ и ногъ; больной сильно страдаетъ, но не теряетъ памяти. Болѣзнь оканчивается скоро: въ 24—48 часовъ смертію, или выздоровленіемъ.

Причины. При легочномъ пострѣлѣ, то же происходитъ въ легкихъ, что при мозговомъ—въ мозгѣ, т. е. легкія заливаются, подавляются прилившеюся къ нимъ въ немнѣрномъ количествѣ кровью, отъ быстрого ея къ нимъ напора, или отъ несвободнаго прохода крови чрезъ легкія. Почти тѣ же причины, какія исчислены при мозговомъ пострѣлѣ, производятъ и легочный пострѣлъ, который сверхъ того часто бываетъ слѣдствіемъ продолжительнаго бѣга (загона), танцовъ, ношенія непосильныхъ тяжестей на плечахъ, удушенія при утопленіи, чрезъ зажатіе рта и носа, сдавленія шеи, груди веревкою, кольѣнками, вдыханія разныхъ удушливыхъ газовъ въ хлѣбныхъ, отхожихъ ямахъ, погребахъ, колодцахъ, большихъ винныхъ бочкахъ, угольныхъ копахъ, при сквозныхъ ранахъ груди и легкихъ, отъ изліанія крови, гноя послѣ лопнувшаго нарыва, сыворотки, отъ скопленія въ легкихъ слизи.

Леченіе. Прежде всего надобно освободить легкія отъ залившей ихъ крови, а потомъ отъ скопившейся въ нихъ слизи; а для этого немедленно нужно больному пустить кровь, которая должна течь до тѣхъ поръ, пока не облег-



чится дыханіе, что послѣдуетъ по наполненіи 1— $\frac{1}{2}$  и даже 2-хъ глубокихъ тарелокъ. Когда дыханіе сдѣлается свободнѣе, но больного давить мокрота и мучить кашель, тогда нужно ему дать рвотное, которое ускоритъ отхаркиваніе мокроты; послѣ сего стараться отвлечь кровь отъ лёгкихъ, растирая руки и ноги шетками, суконками, прикладывая къ ногамъ горячіе кирпичи, кувшины, горчичники на плечи и грудь, мушку между лопатокъ; напоить больного чаемъ изъ мелиссы съ гофманскими каплями, или виномъ. При дѣятельномъ и успѣшномъ леченіи больной поправляется быстро; но если на 2—3 день развивается жаръ, усиливается кашель, особенно сухой, появляется трудное дыханіе, колѣтье, тяжесть въ груди, то нужно взять мѣры, какъ противъ воспаленія лёгкихъ, и пригласить врача.

§ 119. Обморокъ.—Признаки: отсутствіе самосвѣдѣнія (памяти), чувствованія и движенія, слабое или совсѣмъ остановившееся дыханіе и бѣеніе сердца и артерій. Появленію сихъ признаковъ часто предшествуютъ: внезапная блѣдность лица, круженіе головы, шумъ и звонъ въ ушахъ, помраченіе въ глазахъ. Обморокъ появляется въ разной степени: въ легкой его степени, дыханіе и бѣеніе пульса ослаблены, но происходятъ явственно; въ высшей степени то и другое едва примѣтны, а въ самой высокой степени вовсе незамѣтны. Вообще же обморокъ продолжается нѣсколько минутъ, часовъ, и даже сутокъ; больной приходитъ въ память при глубокихъ вздохахъ.

Признаки. Обморокъ состоитъ въ значительномъ замедленіи, или въ совершенномъ остановленіи кровообращенія, а слѣдственно въ прекращеніи дѣйствій сердца и лёгкихъ, какъ главныхъ органовъ обращенія крови; но дѣйствія чувствъ, нервовъ и мозга присемъ еще не прекращаются, и потому находящіеся въ обморокъ слышать происходящее около нихъ, чувствуютъ боли отъ укола ихъ иглою, но не имѣютъ силы произвести движеніе—открыть глаза, заговорить, пошевелить рукою; слѣдственно при обморокѣ происходитъ въ тѣлѣ больного противное тому, что дѣлается при пострѣлѣ мозга, гдѣ сначала подавляются дѣйствія мозга, а потомъ и нервовъ, и потому пораженный пострѣломъ чело-



вѣкъ прежде всего теряетъ память, чувства, но имѣетъ явное дыханіе и бѣіеніе пульса, даже явственнѣе натуральнаго (храпливое дыханіе, крѣпкій пульсъ), а находящійся въ обморокъ едва дышетъ, пульсъ у него бьется слабо, или и совсѣмъ непримѣтно, но онъ слышитъ и помнитъ, что происходило съ нимъ въ обморокъ; впрочемъ, это замѣчается особенно въ обморокахъ глубокихъ и продолжительныхъ при истерикѣ. Обморокъ происходитъ отъ сильнаго и неожиданнаго душевнаго потрясенія—радостію, испугомъ, послѣ первой горячки, въ истерикѣ, отъ вышшняго жара, спершагося, душнаго воздуха (въ церкви, театрѣ), отъ испареній сильнопахучихъ растений (туберозъ), отъ одуряющихъ наркотическихъ ядовъ (былены, дурмана, опіумъ, конопля, маку), отъ глѣзъ, отъ полнокровія въ юности, стѣсняющаго дыханіе и бѣіеніе сердца послѣ бѣга, танцовъ и при наступленіи и прекращеніи мѣсячнаго очищенія, при стягиваніи тѣла пнуировками, перетяжками, при болѣзни сердца; отъ слабости послѣ продолжительныхъ трудовъ и работы, значительной потери крови и во время кровотеченія отъ изнурительнаго поноса, послѣ вышущенія воды изъ брюха, въ чахоткѣ, истерикѣ, у выздоравливающихъ отъ тяжкихъ болѣзней, при сильной боли, особенно въ кишкахъ при поносѣ.

Опасность обморока зависитъ отъ его степени и причины: обыкновенный обморокъ, происшедшій отъ духоты, спертаго воздуха, растительныхъ испареній, испуга, радости, усталости, голода, въ истерикѣ, поносѣ—легко и скоро проходитъ самъ по себѣ или по удаленіи его причинъ; опаснѣе обморокъ отъ изнуренія тѣла, отъ болѣзни сердца, препятствующій кровообращенію, отъ потери крови; опасенъ обморокъ, которымъ начинается лихорадка; наконецъ, всякій продолжительный обморокъ опасенъ тѣмъ, что остающаяся долго безъ движенія кровь створаживается своими свѣртками запруждаетъ сосуды кровяные, какъ пробкою.

Леченіе. Остановившееся кровообращеніе надобно привести въ движеніе, и для того нужно возбудить дѣйствіе сердца, кровяныхъ сосудовъ и легкихъ. Средства для этого, смотря по причинамъ обморока, различны; обыкновеннѣйшія же изъ нихъ и лучшія суть: опрыскиваніе лица, груди



холодною водою, прохладный, свѣжій, чистый воздухъ, прохладный вѣтерокъ, развязка тѣснаго платья, положенія съ возвышенною головою, треніе висковъ, шеи, груди, подъ лопаткою, спины, рукъ и ногъ суконками, фланелью, съ муравейнымъ, березовымъ, розмариновымъ спиртомъ; при обморокѣ у людей изнуренныхъ, слабыхъ, истерическихъ поднесеніе къ носу разрезанной, красной, свѣжей луковицы, жженого пера, крепкаго, ароматнаго уксуса, летучаго (амміачнаго) спирта, кѣльнской воды и пр.; на икры, лопатку положить горчичники, и если больной можетъ глотать, то дать ему ложку винограднаго вина, или водки, 10—15 гофманскихъ капель съ сахаромъ или холодною водою. Если обморокъ появился у молодыхъ, полнокровныхъ особъ, послѣ танцовъ, если у больного замѣчается краснабагровое, припухшее лице, посинѣвшія губы, трудное дыханіе, то нужно пустить кровь. Продолжительный, глубокий обморокъ лечится какъ обмираніе или мнимая смерть; о чемъ говорится въ отдѣлѣ о «сохраненіи здоровья».

§ 120. Круженіе головы, головокруженіе. Признаки: больному кажется, будто бы всѣ вещи, даже его тѣло, вокругъ него кружатся, присемъ онъ идетъ не твердо, шатко, колѣна у него подгибаются, онъ старается ухватиться за столъ, стулъ, стѣну и сѣсть; при недостаткѣ такой опоры, онъ падаетъ в притомъ или совсѣмъ теряетъ память, или же помнитъ себя, чувствуетъ шумъ и звонъ въ ушахъ, помраченіе зрѣнія и продолженіе головокруженія.

Причины головокруженія почти всѣ тѣ же, что и кроваваго пострѣла мозга, особенно же: полнокровіе, приливы крови къ головѣ, обремененіе желудка, пьянство, глисты, почечуи, завалы внутренностей, истощеніе тѣла, разныя болѣзни мозга. Головокруженіе и обморокъ замѣчаются также въ началѣ опасныхъ горячекъ, перемежающихся лихорадокъ и проч. Въ молодыхъ лѣтахъ головокруженіе не опасно, но у взрослыхъ оно угрожаетъ пострѣломъ.

Леченіе головокруженія должно быть сообразно его причинамъ; вообще однако полезны: обмываніе и окачиваніе по утрамъ головы холодною водою, частое и продолжительное треніе висковъ, лба, позади ушей, затылка — льдомъ, снѣ-



гомъ, какимъ либо ароматнымъ спиртомъ, припускъ къ вискамъ пѣявицъ, постановленіе рожковъ на затылокъ, между лопатокъ, шерстяные чулки на голыхъ ногахъ, ножныя ванны съ горчицею, продолжительное употребленіе горькой воды, огуречнаго рассола, бураковаго квасу (при запояхъ); при боли и тяжести въ головѣ послѣ круженія — селитра съ кремортартаромъ. Если круженіе головы соединяется съ обморокомъ и безпамятствомъ, то, для предовращенія пострѣла мозга, нужно пустить кровь или по крайней мѣрѣ посовѣтоваться съ врачомъ. Кромѣ того, нужно обратить вниманіе, не подвержены ли больные другимъ какимъ либо болѣзнямъ: разстройству въ брюхѣ, почечую, трудному появленію мѣсячнаго очищенія, глистамъ и проч. и, сообразно тому, по совѣту врача, расположить лечение. Собственно противъ головокруженія похваляется баккаутъ съ кремортартаромъ (№ 61).

§ 121. Онѣмѣніе, параличъ. — Признаки: уменьшеніе или и совершенное уничтоженіе чувствованія и движенія въ какой-либо части тѣла. Онѣмѣніе, подобно пострѣлу, появляется въ разной степени: въ легкой, слабой степени, чувствованіе и произвольное движеніе только ослабѣваютъ, во второй они совсѣмъ прекращаются, а въ третьей, высшей степени, онѣмѣніе простирается на кровообращеніе и питаніе: въ онѣмѣлой части тѣла ослабѣваетъ бѣненіе пульса и уменьшается теплота, самая часть бываетъ холодна, худѣетъ, сохнетъ, мертвѣетъ и превращается въ мумію. Сверхъ того, онѣмѣніе можетъ появляться во всѣхъ частяхъ тѣла и такъ причиняетъ множество болѣзней подъ разными названіями: въ мозгѣ — безуміе, глупость, въ глазахъ — слѣпоту, въ ушахъ — глухоту, въ груди — одышку, въ пищевомъ, дыхательномъ горлѣ — трудное глотаніе и безгласіе, въ языкѣ — нѣмоту, въ желудкѣ — невареніе пищи, въ кишкахъ — запоръ, въ дѣтородныхъ частяхъ — безсиліе и бесплодіе; невладеніе руками, ногами; параличъ половины и всего тѣла.

Причины. Онѣмѣніе или параличъ состоитъ въ страданіи мозга или нервовъ, затрудняющемъ ихъ дѣйствіе. Это страданіе находится или въ самомъ нервѣ параличной ча-



сти, или же при началѣ нерва, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ выходитъ изъ черепного, спинного мозга, изъ нервныхъ узловъ и сплетеній; открыть это начальное мѣсто страданія нервовъ очень трудно. Страданіе нервовъ въ параличъ происходитъ или отъ слабости, изнеможенія, или отъ угнетенія, прижатія нервовъ; послѣдняя причина паралича бываетъ даже чаще первой, особенно въ параличъ, какъ слѣдствіи кровяного пострѣла. Параличъ отъ слабости, изнеможенія нервовъ, принадлежащихъ онѣмълому мѣсту, происходитъ отъ вліянія мѣстныхъ причинъ, и притомъ рѣдко вдругъ, а чаще постепенно (слѣпота, глухота, мужское безсиліе, параличное задержаніе мочи и пр.). Въ параличной части могутъ по временамъ появляться боли и судороги, слѣдственно какъ бы возвращается чувство и движеніе. Въ особенноти причины паралича отъ угнетенія нервовъ суть: мѣстные приливы крови, или общее полнокровіе, угнетающее дѣятельность нервовъ; переносъ на нервы болезненной матеріи; разныя болѣзни брюха; прижатіе нервовъ перевязкою, опухолью, наростомъ, вывихомъ, переломомъ, изліяніемъ крови въ мозгъ. Параличъ, какъ слѣдствіе изнеможенія нервовъ, происходитъ отъ душевныхъ потрясеній — испуга, радости, отъ продолжительныхъ умственныхъ и тѣлесныхъ занятій, отъ распутства, неумѣренности въ любовныхъ наслажденіяхъ, невоздержности въ пищѣ и напиткахъ, отъ громоваго удара, отъ рѣзкаго упражненія какого-либо органа.

Параличъ излечивается очень трудно; впрочемъ, излечимость его зависитъ: 1) отъ продолжительности: чѣмъ застарѣлѣе параличъ, тѣмъ труднѣе онъ излечивается; 2) отъ мѣста: слѣпота, глухота, трудное глотаніе, задержаніе мочи — параличные излечиваются очень трудно; 3) отъ причины: параличъ отъ переноса матеріи на нервы излечивается легче, чѣмъ отъ слабости нерва, отъ его прижатія опухолью, костнымъ наростомъ; 4) отъ степени: параличъ одного чувствованія или движенія легче излечивается, чѣмъ потеря того и другаго вмѣстѣ; появленіе въ параличномъ мѣстѣ боли, судорогъ благопріятно; параличъ съ увяданіемъ, сухоткою онѣмълой части — неизлечимъ; 5) отъ возраста больного:



параличъ удобнѣе излечивается въ молодыхъ и среднихъ, чѣмъ въ преклонныхъ лѣтахъ.

Леченіе онѣмнія, или паралича, нужно предоставить врачу, который прежде всего старается опредѣлить: отъ чего зависитъ параличъ: отъ угнетенія или ослабленія нервовъ; ибо въ двухъ этихъ видахъ паралича леченіе бываетъ противное, — полезное въ одномъ и вредное въ другомъ. Параличъ отъ угнетенія, прижатія нервовъ, нужно лечить удаленіемъ его причины. Если параличъ произошелъ вмѣстѣ съ пострѣломъ, у челоѣка среднихъ лѣтъ, полнокровнаго, если прежде была, или и теперь есть боль выше или въ самомъ параличномъ членѣ, если она замѣчается гдѣ-либо въ спинѣ и дѣлается явственною отъ прижатія рукою какого либо мѣста въ спинѣ выше паралича, проведенія по немъ губки съ холодною водою или горячею водою; если больной предъ тѣмъ страдалъ ревматизмомъ, подагрой, любо-страстною болѣзнію, то вѣроятно, что параличъ зависитъ отъ прижатія нервовъ кровію переносомъ матеріи. Здѣсь полезны: сначала пиявицы, кровососныя банки, потомъ магнителныя припарки, нарывный пластырь, фонтанели и лекарства противъ болѣзненной матеріи. Если угнетеніе нервовъ происходитъ изъ брюха: отъ заваловъ, глисть, то надобно прибѣгать къ разрѣшающимъ, слабительнымъ, рвотнымъ средствамъ. Механическое давленіе уничтожается удаленіемъ опухоли, желвака, нароста.

Если послѣ употребленія всѣхъ сихъ средствъ, параличъ продолжается, или появился у истощеннаго, ослабленнаго челоѣка, то, вѣроятно, онъ зависитъ отъ изнеможенія, и тогда нужно прибѣгнуть къ употребленію возбуждающихъ, противупараличныхъ средствъ, хорошему питанію тѣла. При употребленіи возбуждающихъ средствъ, нужно наблюдать слѣдующее: эти средства въ приемахъ то увеличивать, то уменьшать, то перемѣнять, и даже на нѣкоторое время употребленіе ихъ совсѣмъ прекращать, дабы предоставить время дѣйствовать и цѣлительной силѣ природы больного; при неудачѣ леченія въ теченіе 2—3 мѣсяцевъ, непадобно терять терпѣнія и продолжать леченіе 5—8 мѣсяцевъ, и даже годы.



Противупараличныя, возбуждающія средства суть: рвотныя, проносныя, разные эиры, бальзамы, соль и спирт оленьяго рога, баранья трава, маунъ, испанскія мушки, муравьи, каяпутное, мятное масло, и особенно челибуха или рвотный орехъ; внутреннее употребленіе этихъ средствъ мы предоставляемъ врачу; снаружи они употребляются въ видъ спирта, обмываній, мазей, примочекъ. Далѣе, сюда же принадлежатъ: треніе кожи, ежедневное жаленіе крапивою, горчичники, мушки, горячія припарки, ванны съ золою, горчицею, пивомъ, водкою, солодомъ, муравьинымъ гнѣздомъ, ношеніе на голомъ тѣлѣ платья, почевавшаго въ муравьиномъ гнѣздѣ и напитаннаго муравьинымъ запахомъ; погруженіе онѣмълаго члена въ гнѣздо живыхъ муравьевъ, тряская ѣзда; яркій свѣтъ для глазъ; громкій звукъ для ушей, острия, пряныя вещи для языка. — Горячія минеральныя воды: кавказскія, александровскія, сергіевскія, карльсбадскія, тѣплицкія, ахенскія, пирмонтскія, дрибургскія; теплота, особенно животная, доставляемая параличному посредствомъ покрытія его кожею, кишками свѣжезарѣзаннаго барана, телянка, быка (животная ванна), также наши русскія бани, горячія грязи (крымскія); электричество и гальанизмъ въ различныхъ видахъ—отъ вѣтерка до ударовъ. Въ семъ параличѣ съ успѣхомъ употребляютъ и накожную методу: отдѣливъ кожу чрезъ приложеніе мушки, на обнаженную кожу кладутъ въ видъ мази вытяжку челибухи, белладонны (красавицы) или морфія; выборъ мѣста (начало параличнаго нерва) и способъ приложенія этихъ средствъ нужно предоставить врачу. Много способствуютъ успѣху леченія: твердая воля больного, увѣренность въ излечимости болѣзни, вѣра, усиліе владѣть параличнымъ членомъ.

Это общее леченіе всякаго паралича, гдѣ бы онъ ни находился. Желая показать примѣръ примѣненія этого леченія въ особенности, мы опишемъ здѣсь параличъ ногъ, какъ наичаще случающійся.

**Признаки.** Больной замѣчаетъ сначала шемящую, грызущую боль и слабость въ одной или и обѣихъ рукахъ, переходящія потомъ въ ноги; иногда боль, давленіе, ползаніе мурашекъ чувствуется и въ спинѣ; въ походкѣ больного замѣчаетъ



ся особенная поступь: онъ переваливается съ боку на бокъ, шатается, оступается, по временамъ даже какъ бы волочить ноги по землѣ, на походкѣ скоро устаетъ и легко падаетъ.

Въ этомъ положеніи болѣзнь можетъ оставаться нѣсколько лѣтъ, и потомъ переходитъ въ совершенное невладѣніе ногами; наконецъ параличъ сообщается кишкамъ (упорный запоръ на низъ), мочевому пузырю (задержаніе или запоръ мочи), лёгкимъ (удушье), глазамъ (слѣпота, темная вода), ушамъ (глухота), языку (нѣмота) и мозгу (нервный пострѣлъ).

**Причины.** Сей параличъ почти всегда зависитъ отъ страданія спиннаго мозга, что можно узнать, проводя вдоль спины губку, намоченную въ горячей водѣ, причемъ въ какомъ либо мѣстѣ спины больной замѣчаетъ что-то особенное, непріятное, или просто боль. Это страданіе спиннаго мозга наичаще есть воспалительное, и начально происходитъ отъ повихнутія шеи у дѣтей при поднятіи ихъ за голову, или ушиба при паденіи спиною на что-либо выстоящее (на уголъ камня, край таза, порогъ и пр.), отъ искривленія спины у золотушныхъ, одержимыхъ англійскою болѣзнію дѣтей; особенно часто сей параличъ есть слѣдствіе излишней растраты въ молодыхъ лѣтахъ мужскаго сѣмени, также отъ переноса на позвонки и спинной мозгъ ревматизма, подагры, любострастной болѣзни.

**Леченіе.** Прежде всего надобно обратить все вниманіе на спину, и тамъ, гдѣ отъ проведенія по спинѣ губки съ горячею водою, будетъ замѣчена боль или просто чувствительность, нужно приставить пиявицы и притомъ не однократно, и прикладывать холодныя примочки до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ боль; послѣ сего на самомъ мѣстѣ боли нужно поставить мушку и поддерживать ее въ нагноеніи сколько можно долѣе; немного ниже и съ боковъ мушки на мѣста, обнаженные отъ кожицы мушкою, класть мазь съ вытяжкою челибухи, красавицы, морфія; внутрь даютъ съ успѣхомъ скипидарное масло по 20—30 капель взрослымъ четыре раза въ день въ теченіе 3—5 недѣль, но предъ началомъ леченія нужно посоветоваться съ врачомъ (см. «Спину сухотку»).



## ХУДОСОЧІЯ

Подъ симъ названіемъ разумѣются всѣ тѣ болѣзни, которыя происходятъ отъ порчи питательнаго сока, пасоки и крови, какъ главныхъ матеріаловъ для удовлетворенія разныхъ потребностей и дѣйствій нашего тѣла. Въ чемъ состоитъ эта порча, острота соковъ, относительно ихъ смѣшенія, мы не знаемъ точно такъ, какъ не знаемъ, какая перемѣна происходитъ въ воздухѣ, когда она причиняетъ повальныя болѣзни; холеру, оспу, корь, поносъ и пр., но что оно дѣйствительно находится въ сокахъ, это доказывается, во-первыхъ, самыми соками, а во-вторыхъ, припадками, замѣчаемыми у худосочныхъ больныхъ. Испорченные соки бываютъ: кровь—блѣдною, зелено-фіолетовою, жидкою, водянистою, клейкою; при разложеніи на составныя части, она даетъ много сыворотки и мало свертка, скоро приходитъ въ гніеніе; питательный сокъ и пасока представляются то густыми, клейкими, вязкими, мутными, клочковатыми, то слишкомъ жидкими, водянистыми, измѣненными въ цвѣтъ, запахъ, вкусъ.

Припадки, замѣчаемые у худосочныхъ больныхъ, суть измѣненное питаніе тѣла, которое присемъ дѣлается или тощимъ, худымъ, или же толстымъ, обрюзглымъ, рыхлымъ; измѣненіе кожи въ ея качества и цвѣтъ: кожа дѣлается слишкомъ блѣдою, тонкою, нѣжною, какъ бы полупрозрачною, гладкою, блестящею, полною, или же—желтою, темною, грязною, шероховатою, морщинистою, складчатою, либо плотною какъ пергаментъ, и твердою какъ кора; на-кожныя сыпи въ видѣ прыщей, угрей, желваковъ, пятенъ, лишаевъ, чесотки, разныхъ язвъ; ненатуральное качество испражненій: клейкій, вязкій потъ, красящій рубаху; непріятный запахъ изо рта, густая, тягущая, мутная слина; зеленыя, черныя или бѣлыя, какъ бы съ яичнымъ бѣлкомъ перемѣшанныя испражненія (назомъ; мутная, темная, клочковатая моча; раздраженное состояніе нервовъ и кровяныхъ сосудовъ, обнаруживающееся скукою, вспыльчивостію, болями и судорогами въ разныхъ частяхъ тѣла, летучимъ ознобомъ и жаромъ, скорымъ пульсомъ, склонностью къ вос-



паленіямъ глазъ, носа, ушей, горла, лёгкихъ и пр. Вся эти припадки худосочія бывають то незначительны, то очень важны, и продолжительны, — иногда во всю жизнь, или переходятъ въ другія болѣзни — воспаленія, водянку, изнуреніе, чахотку, и т. д.

Причины. Здоровость, чистота, правильное смѣшеніе соковъ, а равно надлежащій составъ плотныхъ частей нашего тѣла зависятъ отъ здоровости пищи, питья и воздуха, отъ надлежащаго ихъ превращенія въ питательный сокъ и кровь, отъ достаточнаго отдѣленія и испражненія изъ тѣла всего того, что для него сдѣлалось ненужнымъ, бесполезнымъ или вреднымъ, и наконецъ отъ умѣреннаго упражненія разныхъ дѣйствій нашего тѣла: дыханія, кровообращенія, движенія, мышленія, удовлетворенія плотской похоти. Посему порча, острота соковъ, или худосочныя болѣзни происходятъ: 1) отъ пищи и питья, вредящихъ своимъ качествомъ или количествомъ: пища трудноваримая, жирная, клейко, мучная, пряная, острая, соленая, пища и напитки нечистые, испортившіеся, гнилые доставляютъ и худой питательный сокъ; пища и питье хорошія, но употребленныя въ излишество, обременяють желудокъ, который ихъ надлежаще не можетъ переварить, и отъ сего съ одной стороны происходитъ нехорошо выработанный питательный сокъ, а съ другой, пища, оставшаяся въ кишкахъ несваренною, портится и сама портитъ кишечный сокъ, скопляется въ кишкахъ и частью также всасывается, доставляя тѣлу худой сокъ; пища и питье хорошія, но скудныя, развивають худосочіе и причиняють слабость тѣмъ, что недостаточно вознаграждаютъ соки и кровь, издерживаемыя на разныя операціи нашего тѣла; 2) отъ воздуха сыраго, спертаго, напиканнаго вредными испареніями животныхъ (въ тюрьмахъ, казармахъ, тѣсныхъ жилищахъ) и растений (въ прибрежныхъ, низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ); 3) отъ теплоты слишкомъ возвышенной (жара), или очень низкой (холода), нарушающей правильность и единообразіе въ кровообращеніи, то ускоря (жаръ), то ослабляя (холодъ) теченіе крови въ сосудахъ, то неправильно ее распредѣляя по разнымъ частямъ тѣла, напр. холодъ



скопляетъ кровь во внутренностяхъ, а жаръ прогоняетъ ее къ кожѣ и головѣ; 4) отъ ядовъ, продолжительно поглощаемыхъ въ такомъ количествѣ: ртути при леченіи болѣзней, ртути же и мышьяка, свинца, серебра на заводахъ, фабрикахъ; 5) отъ неопрятности въ жилищахъ, одѣяніяхъ, отъ нечистоплотности; изъ сего источника почти исключительно происходитъ худосочіе въ низшемъ классѣ народа; 6) отъ разныхъ заразъ, особенно любострастной и чесоточной.

Острота соковъ, худосочіе развивается въ тѣлѣ отъ не надлежащаго вырабатыванія соковъ и крови и изъ хорошихъ матеріаловъ, когда пищевареніе въ желудкѣ и кишкахъ бываетъ неполное, недостаточное; по причинѣ слабости и болѣзней этихъ и другихъ пищеварительныхъ органовъ (заболѣлы печени и селезенки, отвердѣнія брыжеечныхъ желѣзъ), причемъ въ желудкѣ и кишкахъ скопляется кислота и слизь, переходящая въ кровь, которая отъ того и сама дѣлается водянистою, блѣдною, острою; когда кровотовереніе бываетъ недовольно сильно для превращенія питательнаго сока и пасоки въ настоящую, густую, яркочерную кровь, достаточно возбуждающую всѣ дѣйствія тѣла. Это неполное кровотовереніе въ свою очередь зависитъ отъ сказаннаго воздуха, сидячей жизни, отъ болѣзней легкихъ (продолжительнаго кашля, одышки, бугорковъ, грудной водянки, искривленія спины и груди) и отъ болѣзней сердца (расширенія, окостенѣнія его заслоночекъ и кровяныхъ сосудовъ, незарошенія дѣтскаго отверзтія въ сердцѣ). Отъ всѣхъ сихъ причинъ кровь недостаточно окисляется, перегараетъ въ легкихъ, дѣлается вязкою, водянистою, неживляющею.

Острота соковъ и крови, худосочіе, развивается въ тѣлѣ отъ невыведенія изъ него, неиспражненія тѣхъ матеріаловъ, которые сдѣлались уже негодными къ употребленію. Такъ возникаетъ худосочіе отъ продолжительнаго, непримѣтнаго прекращенія испарины кожи холодомъ, сыростью, неопрятностью и нечистоплотностью; отъ прекращенія или уменьшенія, измѣненія отдѣленія желчи, мочи, кала, которыя, оставаясь въ тѣлѣ, всасываются, переходятъ въ кровь,



и ее портятъ; такъ же дѣйствуетъ всосанный гной при язвахъ, ранахъ, костоедѣ, чесоткѣ, лишаяхъ, ракѣ, нарывахъ.

По множеству причинъ худосочія и по всеюднему, безпрерывному ихъ на насъ вліянію, нѣтъ человека, котораго бы соки и кровь не были болѣе или менѣе испорчены; однако эта порча незначительна и мы ее терпимъ безъ разстройства здоровья; но когда она достигаетъ высшей степени, то причиняетъ настоящую худосочную болѣзнь. Впрочемъ, худосочіе нерѣдко остается и послѣ другихъ болѣзней, особенно послѣ продолжительныхъ, упорныхъ, перемежающихся лихорадокъ, послѣ оспы, скарлатины, послѣ трудныхъ горячекъ и воспаленій, не полно разрѣшившихся, но оставившихъ послѣ себя какое-либо разстройство въ страдавшихъ органахъ, или когда выздоравливающіе не были довольно осторожны въ своемъ образѣ жизни, и подвергались вредному вліянію со стороны пищи, питья, жилища, воздуха и пр.

Леченіе. Худосочіе имѣетъ цѣлью удалить его причины и очистить, исправить, оживить соки. Въ первомъ отношеніи надобно переменить образъ жизни, употреблять пищу свѣжую, здоровую, въ достаточномъ количествѣ, безъ обремененія желудка; ни заниматься ни чѣмъ сейчасъ послѣ обѣда и дать время желудку переварить съѣденное; дышать чистымъ, свѣжимъ, сухимъ воздухомъ; наблюдать опрятность въ жилищѣ и чистоплотность; по возможности избѣгать крайностей въ теплотѣ — жара и холода; оставить вредныя занятія, работы на фабрикахъ, заводахъ; уничтожить кроющуюся въ тѣлѣ заразу любострастную, чесоточную, медленное отравленіе металлами; по предъ приведеніемъ всѣхъ этихъ мѣръ въ исполненіе, надобно посоветоваться съ врачомъ и сличить сказанное въ отдѣлѣ о «Сохраненіи здоровья».

Очистить соки усиленіемъ разныхъ отдѣленій и испражнений — испарины, мочи и кала. Главнѣйшее для этого средство есть чистая, ключевая вода, употребляемая ежедневно внутрь натошакъ по нѣсколькимъ стакановъ, и снаружи въ видѣ ваннъ, купанья въ рѣкѣ и морѣ, обмыванія и обливанія тѣла. Леченіе холодною водою, такъ значительно



распространившееся въ послѣдніе годы, основано именно на очистительномъ дѣйствіи воды, которая вымываетъ, такъ сказать, грязныя внутренности и нечистые соки и кровь, и освѣжаетъ, крѣпитъ тѣло. Далѣе соки и кровь очищаются усиленными испражненіями: испарицу усиливать частымъ пареніемъ въ банѣ, теплыми ваннами, движеніемъ до пота, треніемъ кожи суконою, пошеніемъ на голомъ тѣлѣ шерстяной рубашки. Испражненія низомъ надобно усилить свѣжими соками разрыхляющихъ растений (см. «Завалы внутренностей, иноходрию» и пр.), и слабительными—сырою, кремортартаромъ, горькою солью, сывороткою и особенно александрийскимъ листомъ, даваемымъ въ видѣ простой наливки 1—1½ драхмы на чашку горячей воды, выпиваемую разомъ), или вѣскаго питья; количество листа нужно увеличивать по мѣрѣ того, какъ онъ начинаетъ дѣйствовать слабѣе и прибавлять къ нему толченыхъ семянъ укропа, чтобы онъ не причинялъ рѣзы въ животъ (№ 1); отдѣленіе мочи умножить мочегонными ередствами. Оба послѣднія испражненія хорошо умножаются отъ продолжительнаго употребленія кровочистительныхъ отваровъ древеснаго, Поллинова (№ 62).

Освѣжить, возобновить соки. Лучшія для этого ередства суть: молоко ослиное, козье, коровье, кобылье, кумысъ, самая свѣжая пища, мясо молодыхъ животныхъ—теленка, барана, цыпленка, дичь; свѣжіе, сочные плоды, овощи; для питья: чистая, ключевая вода или сладкая сыворотка изъ молока. Такъ-какъ для превращенія въ кровь и лучшаго питательнаго сока необходимо достаточное кровотовереніе, совершающееся преимущественно въ лёгкихъ при дыханіи посредствомъ воздуха, то для худосочныхъ больныхъ необходимое условіе ихъ выздоровленія есть чистый, сельскій, сухой, горный воздухъ, частая и продолжительная прогулка на открытомъ мѣстѣ, работа въ саду, огородѣ, полъ до испарины и умѣреннаго пота, и употребленіе свѣжей пищи въ умѣренномъ количествѣ: больные должны вставать изъ-за стола не только безъ пресыщенія, но даже почти полуголодными. Умѣренность и выборъ въ пищу, свѣжій воздухъ, движеніе при леченіи худосочія важнѣе всѣхъ ап-



текарскихъ лекарствъ: они помогали и тогда, когда самое дѣятельное леченіе оказывалось безуспѣшнымъ.

Худосочіе иногда есть слѣдствіе недостатка соковъ и крови. Такое худосочіе замѣчается послѣ неурожая хлѣба и огородныхъ овощей, во время дороговизны, у бѣдныхъ, голодавшихъ, долгопостившихся, измученныхъ тяжкою работою при худомъ и недостаточномъ кормѣ, у потерявшихъ много крови, перенесшихъ тяжкія болѣзни (горячки, поносы), или подвергавшихся сильному леченію — проносными средствами, кровопусканіями. Во всѣхъ этихъ видахъ худосочія, главное леченіе состоитъ въ доставленіи больнымъ свѣжей, хорошей пищи, въ употребленіи ея безъ обремененія желудка, особенно въ началѣ леченія, когда больные имѣютъ большой аппетитъ и легко объѣдаются; чистая вода, хорошее вино, прогулка, свѣжій воздухъ, опрятность жилища и чистоплотность суть также важныя условія при леченіи этого худосочія.

Болѣзни худосочныя, т. е. по преимуществу, состоящія въ порчѣ, остротѣ, непадлежащемъ смѣшеніи соковъ и крови, суть слѣдующія: дѣвичья немочь, цынга, желтуха, глисты, золотуха, англійская, каменная, подагра.

§ 122. Дѣвичья немочь, блѣдность дѣвицы. — Признакъ: слишкомъ бѣлый, блѣдный, блѣдножелтый, мертвенный, даже синеватый цвѣтъ кожи и особенно щекъ и губъ; тонкая, нѣжная, но притомъ сухая, неупругая, морщиноватая кожа; низкая теплотѣ тела, которое на ощупь кажется какъ бы холоднымъ; больная при малѣйшемъ поводѣ зябнетъ, скоро устаетъ, имѣетъ отвращеніе отъ занятій, особенно требующихъ движенія, тѣлесныхъ трудовъ; отъ незначительнаго движенія легко и скоро задыхается и получаетъ сильное бѣшеніе сердца; дыханіе медленное, тихое, выдыхаемый воздухъ холоденъ, пульсъ малый, слабый, медленный; ноги, особенно къ вечеру, отекаютъ; позывъ на еду слабый, или же больная хочетъ есть глину, мѣлъ, уголь; кровь у такихъ больныхъ бываетъ жидкая, водянистая, слабо окрашенная, скоро створаживается, мало даетъ печенки (творогу), а много сыворотки. Дѣвичья немочь, усиливаясь,



причиняетъ разные нервные припадки и переходитъ въ брюшную водянку, сухотку, чахотку.

Причины. Болѣзнъ состоитъ въ неправильномъ смѣшеніи крови, въ которой изъ ея составныхъ частей мало содержится бѣлаго и волокнистаго (фибрины) началъ, а много сыворотки; такая кровь не можетъ достаточно возбуждать и оживлять тѣлесныхъ дѣйствій, и отъ того происходятъ все вышесказанные припадки болѣзни, доказывающіе слабость и безсиліе тѣла. Болѣзнъ появляется у дѣвицъ, и почти исключительно надобно начать осторожнымъ употребленіемъ слабительнаго, которое бы дѣйствовало на-низъ легко и не болѣе 2—3 раза въ сутки (№ 6); это слабительное употребляется 2—3 дня и потомъ приступаютъ къ настоящему леченію немочи, состоящему въ употребленіи желѣза внутрь и снаружи. Желѣзо есть единственное средство, которое скоро и вѣрно исправляетъ и оживляетъ блѣдную, жидкую, холодную кровь, сообщая ей теплоту, красноту и густоту. Внутри желѣзо даютъ въ порошокъ въ видѣ цвѣтовъ желѣзистаго напатыря (№ 63), бестужевскихъ желѣзныхъ капель, по 20 — 40 капель, желѣзнаго зеленаго купороса. Если при употребленіи желѣза замѣчаются запоры на-низъ, то его нужно соединять съ ревенемъ, магнезіею, или давать слабительное, ставить промывательное. Снаружи желѣзо употреблять въ видѣ ваннъ; для чего 6—8 унцій желѣзныхъ шариковъ (смѣсь порошка изъ равныхъ частей желѣза и кремортарта съ аравійскою или вишневою камедью, превращенная въ катышки и потомъ высушиваемая) превращаются въ порошокъ, растворяемый въ кипяткѣ и потомъ вливаемый въ ванну; вмѣсто шариковъ, можно употреблять прямо желѣзный купоросъ, полагая его  $\frac{1}{2}$  и болѣе фунта на ванну, и ту же ванну для блѣдныхъ людей можно употреблять два-три раза, подогревая воду погруженіемъ въ нее раскаленныхъ голышей, чугуновыхъ ядеръ, разныхъ кусковъ желѣза—изъ негодныхъ шинъ, желѣзныхъ осей, дрогъ, лошадиныхъ подковъ, пугъ, плуга, топора и проч. Внутри и снаружи можно употреблять желѣзо въ видѣ натуральныхъ и искусственныхъ минеральныхъ водъ: кавказскихъ, желѣзныхъ и кисловодскихъ (нардзанъ), пирмонтскихъ, дри-



бургскихъ. При леченіи дѣвчьею немощю нужно обращать вниманіе на состояніе мѣсячнаго очищенія (см. «Женскія болѣзни») и совѣтоваться по временамъ съ врачомъ. Здѣсь же прекрасно дѣйствуютъ воздушныя и солнечныя ванны, т. е. пребываніе больныхъ, лежа на раздѣтыхъ, въ теплое время, на воздухѣ и солнышкѣ въ теченіи  $\frac{1}{2}$ —1—2 часовъ; чернобыльникъ въ видѣ чая, также горькія средства, ваниль, ежедневныя трастиранія всего тѣла, и особенно живота и ногъ, т. е.

§ 123. Цында, скорбута. — При знаки: блѣдныя, синеватыя, грязныя, припухшія, рыхлыя десна, которыя зудятъ, отъ легкаго прижатія течетъ кровь; присемъ замѣчается тяжелейшій, вонючій запахъ изо рта, шаткость и выпаденіе зубовъ, слабый, медленный пульсъ, блѣдное и одутое лице, синія пятна на ногахъ (голеняхъ) и отѣкъ, въ которомъ, какъ въ тѣстѣ, отъ вдавленія пальцемъ, остается впадина, медленная исчезающая; ломотная боль въ суставахъ, особенно въ коленныхъ и ступняхъ; усталость и одышка, даже послѣ легкаго движенія; лѣнность и отвращеніе отъ всякихъ занятій; грустное расположеніе духа; вонючая испарина; густая, вонючая, мутная моча, скоро переходящая въ гніеніе. Въ дѣльнѣшемъ теченіи цынги и въ высшей ея степени появляются частыя кровотеченія изо рта, носа, горла; кровь присемъ бываетъ жидкая, темная, трудно створаживается, даетъ мало створогу и много сыворотки, легко переходитъ въ гніеніе; слабость возрастаетъ до того, что больной, при легкомъ движеніи и даже стоя, падаетъ въ обморокъ; синія, даже черныя пятна отъ ногъ разливаются по всему тѣлу, сообщая больному страшный видъ; на разныхъ частяхъ тѣла, и особенно на голенихъ, развивается отвердѣніе кожи и открываются часто обширныя, кровоточивыя, синія, губчатые, рыхлыя, вонючія язвы, переходящія, безъ особенной явной причины, въ помертвѣніе, которымъ уничтожаются цѣлые члены.

Причины. Сущность болѣзни состоитъ въ жидкой, водянистой крови, которая утратила свою жизненность, свои плотныя, составныя части, и чрезъ то получила склонность къ гніенію. Это состояніе крови производится: сырымъ, холоднымъ или теплымъ, нечистымъ, спертымъ воздухомъ, напитаннымъ людскою испариною, дыханіемъ, мрачною, ту-



манною атмосферою, болотными, водянистыми парами, продолжительнымъ недостаткомъ солнечнаго свѣта, свѣжей пищи, огородныхъ овощей, тѣснаго движенія и продолжительнымъ употребленіемъ соленнаго, копченнаго, испортившагося мяса и такой же рыбы, гнилой, мутной, соленой воды, разными душевными огорченіями и особенно печалью. Отъ сихъ причинъ цынга появляется на корабляхъ при продолжительныхъ мореплаваніяхъ, въ приморскихъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ тюрьмахъ, больницахъ, казармахъ, разныхъ многолюдныхъ воспитательныхъ и учебныхъ заведеніяхъ (\*), у крестьянъ, живущихъ въ тѣсныхъ, сырыхъ, холодныхъ избахъ, въ которыхъ вмѣстѣ съ хозяевами помѣщаются телата, барашки, поросята и пр. Если притомъ такіе крестьяне, послѣ неурожая, въ теченіе зимы терпятъ недостатокъ въ хорошемъ, здоровомъ хлѣбѣ, квашеной капустѣ, буракахъ, огурцахъ, — то съ приближеніемъ весны, въ Мартѣ, Февралѣ и даже ранѣе, развивается цынга, сначала между бѣднѣйшими и наиболее нуждающимися поселянами, а потомъ между достаточными жителями, принимая видъ повальной болѣзни, такъ что не только всѣ члены семейства, всѣ жители селенія занемогаютъ цынгою въ разной степени, но болѣзнь распространяется или, лучше сказать, открывается разомъ во многихъ уѣздахъ и губерніяхъ. Такъ послѣ неурожая хлѣба и огородныхъ овощей, къ веснѣ 1842 года цынга открылась въ разныхъ губерніяхъ Россіи въ огромномъ размѣрѣ и была причиною значительной смертности между крестьянами. Впрочемъ, съ наступленіемъ теплаго, яснаго, весенняго времени, эта болѣзнь быстро ослабѣваетъ и заболѣвшіе скоро выздоравливаютъ. Нужно однако, помнить, что цынготные весною легко подвергаются перемежающимся лихорадкамъ, которыя у нихъ бываютъ

(\*) Въ бытность мою въ семинаріи, между воспитанниками, помѣщавшимися въ казенномъ домѣ, къ веснѣ открылась цынга, именно прежде всего въ тѣхъ комнатахъ, которыя были расположены окнами на сѣверъ къ каменной оградѣ, сдѣланной во всю зиму не были освѣщаемы солнечнымъ свѣтомъ; а какъ притомъ въ этихъ комнатахъ была особенная нечистота и спертый воздухъ отъ множества воспитанниковъ, то цынга обнаружилась почти на всѣхъ дѣтяхъ въ сѣверныхъ комнатахъ и многіе изъ нихъ пали жертвою этой болѣзни.



особенно упорны, принимаютъ опасный видъ (т. е. соединяются съ обмороками, больные обмираютъ, по выраженію крестьянъ) и оставляютъ послѣ себя завалы въ брюхъ, брюшную водлику, отѣкъ ногъ и проч. Лечение. Всякій помѣщикъ предъ наступленіемъ весны, особенно когда крестьяне терпѣли недостатокъ въ хорошей пищѣ, приваркъ, чистомъ и просторномъ помѣщеніи и пр., долженъ приказать, а еще лучше — самъ осмотрѣть и разспросить (\*) своихъ крестьянъ, а не довольствоваться показаніемъ управителей или самыхъ мужиковъ. Если при такомъ осмотрѣ будутъ найдены люди, у которыхъ распухли и посинѣли десны, дурно пахнетъ изо рта, изъ десенъ легко течетъ кровь, даже при жеваніи хлѣбной корки; если они, противъ своего обыкновенія, лѣнивы, все лежатъ, жалятся на ломоту въ ногахъ, имѣютъ блѣдное, обрюзглое лице, отѣкшія ноги, синія пятна и язвы на ногахъ, либо слишкомъ отвердѣлыя части (особенно икры); если такіе люди, навъаче дѣти, стоя въ церквѣ падаютъ въ обморокъ, имѣютъ большой позывъ на мукъ, хрѣвъ, рѣдку, кислую капусту, квасъ и пр., то всѣхъ ихъ нужно отдѣлить, помѣстить въ свѣтлыхъ, чистыхъ, просторныхъ избахъ, окнами расположенныхъ на югъ или востокъ, но не на сѣверъ или западъ; назначить имъ такъ называемую противуцынготную діету и такое же леченіе.

Противуцынготная діета. Кромѣ сказаннаго помѣщенія, нужно смотрѣть, чтобы въ избахъ больныхъ не было никакой сырости (а для этого не мочить пола, не разливать воды и не держать ее въ ушатахъ, ведрахъ); чтобы больные просыпались рано, не лежали долго въ постеляхъ, сейчасъ бы вставали по восходѣ солнца, если позволяетъ время года и погода, выходили бы на свѣжій воздухъ и проводили значительную часть времени на открытомъ воздухѣ и на солнышкѣ. Воздухъ и солнечный свѣтъ суть лучшія противуцынготныя средства: первый возбуждаетъ дыханіе (боль-

(\*) Мы говоримъ о небогатыхъ владѣльцахъ въсюльскихъ сотъ душъ, которые легко осмотрѣть въ недѣлю; богатые помѣщики по большей части при своихъ имѣніяхъ содержатъ врачей, для которыхъ мы не пишемъ здѣсь наставленій.



ные, сами не замѣчая, на открытомъ воздухѣ невольно часто и глубоко вдыхаютъ), съ дыханіемъ же ускорятъ и кровообращеніе, а послѣдній оживляетъ всѣ дѣйствія на землѣ, поему и нашу кровь, вливаетъ такъ сказать въ нее новую жизнь. Цынготные больные, по внутреннему побужденію, сами хотятъ оставаться подолѣе на солнышкѣ, сладко засыпаютъ и пробуждаются съ бодростью и свѣжестью въ тѣлѣ.

Противуцынготныя средства суть: лукъ, чеснокъ, горчица, сырой тертой картофель, редька, квашеная капуста, свекловица (бураки), соленые огурцы, разная свѣжая огородная зелень, кислые плоды, лимоны, квасъ, сыровецъ, брага, пиво, пивные дрожжи. Всѣ эти вещи употребляются цынготными больными сами по себѣ и въ приваркѣ въ видѣ окрошки для завтрака, шей, борщу; особенно дѣйствительны лимонный сокъ и пивныя дрожжи, употребляемые въ питье съ водою, и пиво, настоящее, на хрѣнѣ. Для питья цынготнымъ также полезны: уксусъ съ водою, квасъ, сыровецъ, вода съ хрѣновымъ сокомъ, простой и бурачный квасъ, березовый сокъ, свѣжій и окисшій, отваръ молодыхъ сосновыхъ шишекъ, настойка или отваръ корня ира (aira, менешника, ира); послѣднія два средства лучше всего настаиваются въ водкѣ, которой цынготнымъ даютъ два раза въ день по рюмкѣ или и болѣе. Отличное противуцынготное средство также морошка (ягода) и ложечная трава (листы); ягода употребляется моченою, а трава въ настойкѣ съ водкою, приваркѣ, салатѣ. Этихъ трехъ средствъ: свѣжаго воздуха, солнышка и противуцынготной діеты, достаточно для излеченія обыкновенной цынги.

Непріятный запахъ изо рта, рыхлость и кровоточивость десенъ, шаткость зубовъ проходятъ отъ жеванія табаку и противуцынготнаго полосканья изъ дубоваго, айрнаго отвара съ квасцами и водкою, настоянною на хрѣнѣ или ложечной травѣ (№ 64); боли въ суставахъ и синія вятна уступаютъ тренію муравейнымъ, березовымъ спиртомъ, виномъ, настоящимъ на хрѣнѣ, ложечной травѣ. Кровотеченіе изъ носа останавливается впрыскиваніемъ въ носъ холодной воды, отвара дубовой, ивовой коры, съ уксусомъ, квасцами; кровотеченіе изъ задняго прохода — холодными клистирами



изъ сихъ же средствъ; но кровохарканіе требуетъ иногда кровопусканія изъ руки и приглашенія врача. Онъ вътѣсненъ

Затвердѣлая припухлость, обыкновенно въ послѣдствіи переходящая въ цынготныя язвы, проходитъ отъ припарокъ изъ сынной трухи, отрубей съ дрожжами, уксусомъ, а еще лучше отъ барды, изъ которой можно дѣлать цынготнымъ и теплыя ванны особенно при ломотныхъ боляхъ въ суставахъ. Леченіе цынготныхъ язвъ излагается въ другомъ мѣстѣ—при «Наружныхъ болезняхъ.»

Цынготный обморокъ лечится какъ и всякій другой обморокъ; больные скоро приходятъ въ чувство отъ свѣжаго воздуха, опрыскиванія холодною водою и поднесенія къ носу нашатырнаго спирта.

Переменяющаяся лихорадка съ обморокомъ цынготныхъ больныхъ, по прошествіи приступа, требуетъ свѣжаго и частаго употребленія хинной соли 2—4 грама на приемъ чрезъ 1—2 часа, такъ, чтобы остановить или хотя ослабить будущій приступъ. Цынга у больныхъ, зараженныхъ любовью страстною болезнью, требуетъ приглашенія врача; здѣсь нужно прежде лечить цынготную, а потомъ уже и любово-страстную) болѣзнь, и то не ртутью, а кровочистительными отварами (Поллины), древеснымъ (№ 29, 62).

§ 124. Желтуха. — Признаки: желтый цвѣтъ сначала на глазныхъ бѣлкахъ, на языкѣ, а потомъ и на всемъ тѣлѣ; цвѣтъ представляется въ разной степени густоты: свѣтло-желтый (лимонный), яркожелтый (шафранный), темножелтый и даже черный; слюна, харкотина и особенно моча и потъ также желты, окрашиваютъ бѣлье; но испраженія низомъ сыры и даже бѣлы, по недостатку въ нихъ желчи; при емѣ замѣчается подъ ложечкою въправо, въ сторону печени, напряженіе, тягость и тупая боль, даже припухлость и твердоватость печени; отвращеніе отъ пищи, отрыжка, рвоты, бурчаніе и урчаніе въ животѣ отъ вѣтровъ, горечь, вязкость во рту или кислый вкусъ, тошнота, головная боль; предметы кажутся все желтыми.

Причины. Желтуха происходитъ отъ того, что отдаленная печенью желчь не изливается въ кишки, а всасывается и входитъ въ кровь; или желчь въ печени и совѣсть не от-



дѣляется, а желчныя начала поступаютъ въ массу крови и разносятся по всему тѣлу, сообщая ему желтый цвѣтъ. Въ желтухѣ желчь бываетъ вездѣ, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она должна быть, т. е. кишки и кака, который по сему и бываетъ бѣлый, сѣрый. Не отдѣляется желчь при раздраженіи или воспаленіи печени, а отдѣленная желчь не изливается въ кишки по причинѣ сжатія желчныхъ протоковъ судорогами, или механическаго ихъ запиранія. Раздраженіе печени можетъ произойти отъ ея воспаления и сосѣднихъ частей (желудка, селезенки), отъ гнѣва, испуга, огорченія, простуды, отъ скопленія нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ, отъ употребленія сильныхъ рвотныхъ и слабительныхъ, отъ судорогъ у ипохондриковъ и истеричекъ, отъ желчныхъ камней; механически задерживается желчь въ желчномъ пузырькѣ желчными камнями, глистами, заползшими въ желчный каналъ, отвердѣніемъ печени.

Желтуха сама по себѣ (отъ простуды, гнѣва) не опасна, но она упорна и даже смертельна по своимъ другимъ причинамъ (воспаленіе, отвердѣніе, камни) и послѣдствіямъ (худосожіе, брюшная водянка, изнуреніе тѣла). Первый признакъ разрѣшенія желтухи есть тотъ, когда испражненія низомъ дѣлаются желтыми, а моча даетъ плотный желтый осадокъ.

Леченіе состоитъ въ утишеніи раздраженія печени и въ доставленіи желчи свободнаго изліянія въ кишки. Это достигается различно: если желтуха есть слѣдствіе воспаленія печени, то она проходитъ отъ леченія послѣдняго (см. «Воспаленіе печени»). Если желтуха произошла отъ простуды, отъ гнѣва, испуга и пр., то полезны потогонныя средства, теплыя ванны, смягчительныя къ печени припарки, втираніе льнянаго масла, вскипаченнаго съ листьями бѣлены; внутририверіева смѣсь (№ 2), шипучіе порошки (№ 3), лимоналъ, кислое питье съ кремортартаромъ. Если желтухѣ предшествовали невоздержность въ пищѣ, запоры на низъ, то леченіе нужно начинать слабительнымъ, и въ семъ отношеніи ревенъ особенно хорошо дѣйствуетъ и на низъ и на отдѣленіе желчи; дѣйствіе ревеня поддерживается клистирами. Если желтуха есть слѣдствіе завазовъ въ печени, то назна-



чается продолжительное употребленіе свѣжихъ соковъ растений (см. «Завалы»), сыворотки, меду, простой холодной воды по утрамъ, зельтерская, карльсбадская, кавказская серная и кислая, горькая, маріенбадская и другія серныя и щелочныя воды; движеніе, купанье въ морской водѣ, ванны съ поваренною солью, ежедневныя тренія живота, ножныя ванны съ соляно-селитряною кислотою (2 — 4 унціи кислоты на ушатъ воды); яичныя желтки въ смѣтку, наливка пыжмы также полезны. Желтуха, продолжающаяся 1 — 2 мѣсяца, угрожаетъ худосочиємъ, водянкою и настоятельно требуетъ приглашенія врача.

§ 125. Золотуха появляется въ двухъ видахъ: какъ золотушное расположеніе, и какъ дѣйствительная золотуха. О расположеніи къ золотухѣ и предохраненіи отъ оной, сказано въ отдѣлѣ «О сохраненіи здоровья»; здѣсь будетъ изложена собственно золотуха, какъ уже развившаяся болѣзнь.

Признаки золотухи: опухоли и окръпlosti желѣзъ суть постоянный признакъ золотухи. Онѣ появляются прежде всего на шеѣ, подъ подбородкомъ, на затылкѣ въ видѣ узловъ, подвижныхъ шариковъ съ горошину или лѣсной орѣхъ, иногда какъ бы на нитку нанизанныхъ, — такъ онѣ располагаются въ линію; потомъ такія же опухоли появляются и въ другихъ частяхъ тѣла: въ брюхѣ, пахахъ, подмышками и наконецъ вездѣ. Въ началѣ онѣ мягки, по крайней мѣрѣ не жестки, подвижны, не болятъ, остаются нѣсколько мѣтъ безъ переменъ, или же постепенно растутъ, твердѣютъ, болятъ; надъ ними измѣняется цвѣтъ кожи, краснѣетъ, синеетъ, темнѣетъ, сама опухоль смягчается и прорывается на верхушкѣ или снизу; изъ отверстія истекаетъ густой гной или жидкая сукровица и такъ происходятъ золотушные язвы, которыя, кромѣ сказанныхъ мѣстъ, могутъ быть и во внутренностяхъ, особенно въ брыжейкѣ кишекъ, въ лёгкихъ и печени. О леченіи наружныхъ золотушныхъ язвъ, сказано въ отдѣлѣ «Наружныхъ болѣзней». Дамъе, золотуха обнаруживается: 1) золотушнымъ воспаленіемъ глазныхъ желѣзъ, частымъ появленіемъ ячменя, 2) частымъ и упорнымъ слизетеченіемъ изъ носа (насморкъ), изъ ушей, кашлемъ, бѣлями (у дѣвицъ), 3) пакожными



сыпями: шолудами или паршами на голову, молочнымъ струпомъ на лицо, 4) вздутымъ, полнымъ, твердымъ животомъ, какъ признакомъ заваловъ въ брыжеечныхъ желткахъ кишекъ, 5) лимфатическими опухолями, зобомъ на шее, и наконецъ 6) наростами, опухолями и искривлениями костей. Все эти виды золотухи, по причине ихъ особенной важности и самостоятельности, изложены и въ другихъ отдѣлахъ наружныхъ и внутреннихъ болезней; а здѣсь объ нихъ упомянуто потому, что они требуютъ противузолотушнаго леченія, о которомъ именно будетъ здѣсь говорено.

Въ высшей степени золотуха оказывается сухоткою (сочаею, старостью, удѣтей), бугорковою чахоткою, водяною въ головѣ или брюхѣ, ракомъ на губахъ и лицѣ, костою. Въ этихъ видахъ золотуха дѣлается смертельною; но въ прежде вычисленныхъ формахъ она проходитъ съ молодыми лѣтами, или же продолжается во всю жизнь, дѣлаясь привычною болѣзнію.

Причины. Золотуха состоитъ въ усиленномъ дѣйствіи органовъ пищеваренія и питанія желудка и кишекъ, пасочныхъ сосудовъ и желѣзъ, и въ слабомъ дѣйствіи дыханія и кровообращенія, въ слабомъ кровотовереніи; поему золотушный больной бываетъ такъ сказать заваленъ питательнымъ сокомъ, пасокою, слизью, и терпитъ недостатокъ въ хорошо-выработанной, оживляющей крови, которая, напротивъ, бываетъ блѣдна, вязка, слизиста. Этотъ сокъ, слизь и пасока, скопляясь, застаиваются, портятся, густѣютъ и засоряютъ свои сосуды и желѣзы, а потомъ и другіе органы, причиняя различныя, сказанныя болѣзни въ наружныхъ и во внутреннихъ частяхъ тѣла, изъ коихъ послѣднія всегда опаснѣе первыхъ, т. е. наружныхъ.

Этого скопленія сока, пасоки и слизи и неживляющаго качества крови бываютъ причиною: золотушные отъ природы родители, или ослабленные возрастомъ, распутствомъ, любострастною болѣзью; больная кормилица; искусственное кормленіе дитяти; нечистый, смертый, сырой воздухъ дѣтскаго жилища; худая, несвѣжая, трудноваримая, мучная, вязкая пища, особенно въ первые годы младенца (сырой



хлѣбъ, пироги, блины, картофель и пр.); употребленіе дѣтьми водки; недостатокъ движенія на открытомъ воздухѣ; неопріятное содержаніе дѣтей, когда съ нихъ не снимаютъ замараиваго, мокраго бѣлья, не кобыраютъ тѣла, рѣдко купаютъ въ ваннѣ; раннее занятіе умственныхъ способностей науками; скопленіе слизи, кислоты въ желудкѣ, глисты, частыя запоры на низѣ; разныя дѣтскія болѣзни, несовершенно разрѣшившіяся, какъ то: оспа, корь, скарлатина, кокалюшъ; употребленіе сонныхъ капель, чаю, изъ маковыхъ цвѣтѣвъ и головокъ для усыпленія беспокойныхъ дѣтей. Золотуха есть дѣтская болѣзнь; она проходитъ съ дѣтскимъ возрастомъ, хотя и не всегда; начинается же она рѣдко на первомъ, но чаще на второмъ или третьемъ году. Впрочемъ, у дѣтей до 12 лѣтъ многія и другія болѣзни принимаютъ золотушное свойство или ускоряютъ развитіе золотухи; такъ ушибъ тѣла, особенно сины, прорѣзываніе зубовъ, сказанныя дѣтскія болѣзни, прививаніе предохранительной оспы—рѣдко оканчиваются развитіемъ золотухи. У нѣкоторыхъ людей въ дѣтскія лѣта золотуха какъ бы скрывается, и развивается въ періодъ возмужалости или зрѣлаго возраста; отъ 20 до 50 лѣтъ золотуха почти непримѣтна у бывшихъ золотушными въ дѣтствѣ людей; но у женщинъ во время прекращенія мѣсячныхъ, кровей (между 45 и 50 годами) золотуха опять появляется въ видѣ окрѣпыхъ желѣзъ. Впрочемъ, и ежегодно съ оживленіемъ природы, весной, золотуха, подобно цынѣ, любострастной болѣзни, и стрѣлу, подаетъ еще другимъ болѣзнямъ, зависящимъ отъ крови и соковъ, также усиливается, и равночл при полномъ и неполномъ лѣтѣ.

Леченіе золотухи очень затруднительно и должно быть весьма продолжительно—мѣсяцы и годы; ибо здѣсь нужно, съ одной стороны, удалить изъ тѣла скопившуюся слизь и пасоку, предотвратить ихъ новое скопленіе, а съ другой, усилить кровотовереніе для превращенія питательнаго сока, слизи и пасоки въ настрающую кровь. Для этого служатъ: приличная діета, о которой сказано (при золотушномъ расположеніи въ отдѣлѣ «О сохраненіи здоровья») и такъ называемыя противузолотушные лекарства, а именно: амидотолъ



Вообще при леченіи золотухи нужно наблюдать слѣдую-

щія правила: 1) Прежде всего больному и врачу надобно запастись особымъ терпѣніемъ и продолжать леченіе мѣсяцы и даже годы; 2) спокойно наблюдать за ходомъ болѣзни и дѣйствіемъ лекарствъ; не отчаиваться при мнимомъ бездѣйствіи послѣднихъ и не пугаться появленія новыхъ припадковъ; 3) обращать вниманіе на возрастъ—періодъ тѣлеснаго развитія; лекарства, употребленныя прежде безъ пользы, съ приближеніемъ времени возмужалости вдругъ начинаютъ дѣйствовать съ видимымъ успѣхомъ; 4) разъ назначенныя лекарства употреблять долго, и потомъ перемѣнять ихъ другими; 5) по прекращеніи употребленія одного лекарства, прежде чѣмъ приступить къ другому, нужно оставлять больного на 1—2 недѣли безъ всякихъ лекарствъ, но ни въ какомъ случаѣ не прекращать діеты; 6) особенно весною нужно начинать и усиливать леченіе.

Противузолотушные средства суть: ртуть, барить и известъ солянокислая, а также хлориновая известъ, болиголовъ (*conium*), наперстникъ (*digitalis purp.*), составы іодина (жженая морская губка); назначеніе этихъ средствъ мы предоставляемъ врачу. Рвотныя и слабительныя назначаются для удаленія слизи, кислоты, нечистоты. Слабительныя нужно давать разъ въ 1—2 недѣли и избирать для этого ревень, ялаппу (10—20 гранъ) съ магнезіею; дерево сассарасъ, трехцвѣтная фіалка (иванъ да марья, *hba. jaseae*), череда (*bidenstripartita*) и сассепарель; послѣднія два средства даются и въ отваръ, а первыя при золотушныхъ сыпяхъ, въ видѣ чая. Весьма дѣйствительны весною свѣжевыжатые соки растений: подуванчика, пырея, дымчатки, цикорія, подбѣл; соки ежедневно по утрамъ даются дѣтямъ по 2—4 унцій въ жидкомъ бульонѣ или супѣ. При оскоми-нѣ на зубахъ, кислому запаху изо рта, молочницѣ — порошокъ изъ раковыхъ жерновокъ, раковинъ, магнезіи, известковая вода; въ упорныхъ и застарѣлыхъ случаяхъ Пиллиновъ отваръ (№ 62); въ этихъ же случаяхъ полезны купанье въ морѣ, паренье въ горячемъ на солышкѣ пескѣ, которымъ лѣтомъ ежедневно голыхъ дѣтей обсыпаютъ по



шею и такъ оставляютъ ихъ на солнцѣ почти презъ весь день; ароматныя, муравейныя ванны, особенно съ корнемъ аира (*calamus*), донскимъ можжевельникомъ (*juniperus sabina*) вязовою, дубовою, вербовою корою, ежедневное треніе тѣла суконками, спиртами. Недавно начали употреблять съ успѣхомъ въ золотухъ жиръ трески рыбы; его даютъ дѣтямъ ежедневно 2—3 раза въ день по чайной или десертной ложкѣ, а взрослымъ по столовой.

Снаружи золотушные опухоли можно покрывать бѣлилами, заячьимъ мѣхомъ, хлопчатую бумагою, обмывать растворомъ въ фунтѣ воды полуунціи хлориновой извести; два 1—2 недѣли покрывать мыльнымъ пластыремъ. Впрочемъ, опухоли проходятъ сами при внутреннемъ леченіи золотухи; и если будетъ замѣчено, что кожа надъ ними, начинаетъ измѣняться въ цвѣтъ и утолщаться переходомъ опухолей въ нарывы и въ язвы, то надобно оставить всѣ наружныя средства; опухоли покрывать только заячьимъ мѣхомъ, ибо золотушныя язвы всегда хуже для больного, чѣмъ опухоли.

О леченіи золотушнаго воспаленія глазъ, шолудей, молочнаго струпа и пр. сказано въ другихъ мѣстахъ (см. «Наружныя и дѣтскія болѣзни»). Леченіе собачьей старости, золотушной сухотки, задаловъ брыжеечныхъ желѣзъ (больнаго твердаго брюха), костныхъ опухолей и костябды нужно предоставить врачу, или по крайней мѣрѣ лечить подъ его надзоромъ.

§ 126. Англійская болѣзнь.—Признаки. Дитя растетъ медленно, бываетъ блѣдное, вялое, олутое, явнотолушное; часто хвораетъ насморкомъ, кашлемъ, глазами; поздно начинаетъ ходить и стоять, стоитъ нетвердо, ходитъ шатко, переваливается съ боку на бокъ и легко падаетъ; на концахъ костей, около суставовъ, особенно у ладоней, замѣчаются костныя опухоли, какъ бы отростки костей. При дальнѣйшемъ теченіи болѣзни бедра, голени, ребра, грудины, позвонки искривляются и такъ происходятъ кривыя ноги, горбы спереди и сзади, и разныя безобразія, между тѣмъ какъ умственныя способности преждевременно развиваются, и въ значительной степени.



**Причины.** Английская болѣзнь есть, такъ сказать, меньшая сестра золотухи, съ тою разностью, что неправильныя дѣйствія тѣла въ золотухѣ, ограничивавшіяся мягкими частями, въ английской болѣзни простерлись на кости, которыя не получаютъ достаточнаго количества извести, долго не твердѣютъ, а остаются мягкими, гибкими, не могутъ поддерживать тяжести тѣла, пухнуть, искривляются, а костная известь, съ одной стороны, извергается мочею, въ которой она зараждаетъ камни, а съ другой, излишняя кислота извести остается въ сокахъ и крови дитяти; посему: такіа дѣти бываютъ подвержены и каменной болѣзни, и издають кислый запахъ и по инстинкту ѣдятъ съ жадностью глину, уголь, магнезію, даже землю!

**Лечение** английской болѣзни вообще сходствуетъ съ леченіемъ золотухи какъ въ отношеніи діеты, такъ и самыхъ средствъ. Но какъ въ сей болѣзни замѣчается еще и избытокъ въ тѣлѣ кислоты, то полезны: ванны съ золою или щелокомъ; внутрь армянская или и простая чистая глина, порошокъ изъ раковинъ или раковыхъ жернововъ, чистый мѣлъ, известковая вода, хлѣбный или березовый уголь, магнезія и желѣзо, которое дѣти очень легко переносятъ въ порошокъ (№ 65); если желѣзо причиняетъ запоръ, то къ нему прибавляется нѣсколько гранъ ревеня или магнезіи; также оказались полезными майорана (rad. rub. tinctor.) и айръ, употребляемые въ порошокъ, наливкѣ и ваннахъ. О послѣдствіяхъ английской болѣзни: хромотѣ, искривленіи рукъ и ногъ, горбахъ, см. въ отдѣлѣ «Наружныхъ болѣзней».

§ 127. Подагра, хирагра, ломота въ суставахъ. — **Признаки.** Боль въ суставахъ съ горячею, красною (воспалительною) или съ холодною, блѣдною (хроническою) опухолью, которая переходитъ въ особенную, подагренную окрыплость, состоящую изъ костныхъ (известковыхъ) отложеній; расстройство пищеваренія, урчаніе въ животѣ, вѣтры, вязкій, кислый вкусъ, оскомины на зубахъ, бѣлый языкъ, тяжесть въ животѣ, запоры на низъ, завалы въ брюхѣ, мутная, темная моча.

Однако подагра не всегда появляется въ такомъ видѣ; напротивъ, многихъ изъ сихъ признаковъ у подагрика не замѣ-



чается, вовсе, и самая подагра появляется совсѣмъ въ другомъ видѣ. Въ семъ отношеніи врачи различаютъ слѣдующіе виды подагры.

1) Подагра явная, правильная, острая, появляется въ видѣ приступа, пароксизма, который состоитъ изъ боли, жара и красноты въ одномъ или въ нѣсколькихъ суставахъ рукъ, ногъ и изъ лихорадки. Эти приступы подагры обыкновенно наступаютъ въ Февраль и Мартѣ, постепенно усиливаются и потомъ ослабѣваютъ, продолжаются 3—4 недѣли и потомъ оканчиваются переломомъ, кислымъ потомъ, густою, мутною мочою съ бѣлымъ, мылоподобнымъ, известковымъ или красноватымъ осадкомъ; послѣ приступа болѣзнь свободнѣе отъ подагры въ теченіе половины и даже цѣлаго года. Подагрная боль занимаетъ разные суставы: чаще ступню (собственно подагра) и колено (гонагра), кости руки (хирагра), плечи, локтя. Иногда она переходитъ отъ одного сустава на другой, съ ногъ на руки, или же бросается на внутреннія части, что очень опасно. Случается однако, что весь приступ подагры состоитъ въ томъ, что въ извѣстное время у подагрика появляется сильный потъ, отдѣляется мутная моча съ густымъ осадкомъ, какая либо на тѣлѣ сыпь, даже слинотеченіе, и все это продолжается нѣсколько недѣль и потомъ прекращается.

2) Подагра явная, но неправильная, медленная, появляется въ неопредѣленное время и сопровождается лихорадкою, продолжается недѣли и мѣсяцы; подагрная боль безпрестанно перемѣняетъ свое мѣсто, бросаясь отъ сустава на суставъ, иногда съ мгновенною быстротою и на отдаленныя части. Этотъ видъ подагры появляется или самостоятельно, первоначально, или же онъ есть слѣдствіе перваго вида, несовершенно разрывшагося переломомъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи медленной подагры на суставахъ происходятъ твердыя опухоли, состоящія изъ отложившейся въ суставъ костной извести, или изъ припухлости суставныхъ головокъ костей; эти опухоли сильно мѣшаютъ подвижности въ суставахъ.

3) Подагра неправильная, скрытая, появляется, вмѣстѣ с суставами, на внутреннихъ частяхъ въ различныхъ при-



падкахъ, а именно: бросаясь на желудокъ, она причиняетъ въ немъ боли, судороги, рвоту, скопленіе слизи, кислоты; въ головѣ она производитъ боль, круженіе, пострѣль, слѣпоту, глухоту, потерю памяти, воспаленіе мозга; въ груди — боль, комотье, одышку, упорный, продолжительный кашель; сверхъ того, она же бываетъ причиною ипохондріи, судорогъ, паралича, почечулы, водянки, язвъ, упорныхъ сыпей, опухлей, отвердѣній.

Скрытная подагра изъ суставовъ, во время приступа и лихорадки, вдругъ бросается на внутренніе органы и производитъ опасное воспаленіе желудка, пострѣль, удушливый кашель, бѣшенство; приче́мъ мѣстные припадки въ суставахъ прекращаются, а появляется какая либо другая внутренняя болѣзнь. Это прекращеніе подагранныхъ приступовъ въ суставахъ наичаще производится простудою, огорченіемъ, гнѣвомъ и пр. или же подагра совсѣмъ не появляется въ суставахъ, а присоединяется къ другой внутренней болѣзни: разстройству пищеваренія, ипохондріи, нервнымъ болѣзнямъ, которыя, при появленіи подагры на своемъ мѣстѣ, нерѣдко излечиваются однимъ ея приступомъ. Такимъ же образомъ подагра бываетъ причиною язвъ, сыпей и пр., какъ сказано выше.

Узнать скрытную подагру очень трудно; впрочемъ, здѣсь нужно обратить вниманіе на то: не страдали ли подагрою родители больного; не появляются ли у него кратковременныя боли въ суставахъ въ видѣ стрѣльбы, какъ бы отъ электрическаго удара; не облегчаетъ ли этихъ болей потъ; не замѣчается ли въ мочѣ больного известковая осадка; не имѣютъ ли вліянія на больного время года, погода (предъ перемѣною которой у подагриковъ появляется стрѣльба въ рукахъ, ногахъ), быстрое опаденіе ртути въ барометръ. Скрытная подагра иногда причиняетъ ноющія, шемящія, какъ бы раздрающія боли, по направленію нервовъ вдоль спины, рукъ, ногъ, временное (какъ бы отъ прижатія, пересѣзанія) онѣмѣніе, одеревенѣніе рукъ, ногъ, чувство жесткости, шероховатости въ кожѣ, особенно въ голеняхъ, рукахъ какъ бы послѣ чирья, мушки, или какъ бы на этихъ мѣстахъ лежалъ мѣхъ, вата, шершавая кожа, и по временамъ нестер-



пимый зудъ, который принуждаетъ больного зудящія мѣста расчесывать до крови.

Причины. Сущность подагры состоитъ въ разстройство плототворенія, т. е. пищеваренія, кровотворенія, питанія и отдѣленія, слѣдствіемъ чего бываетъ особое худосочіе, отличающееся наклономъ крови и соковъ къ густотѣ, отложенію и отложенію костной извести въ суставы и къ испражненію ея чрезъ мочу. Когда это худосочіе достигнетъ известной степени, тѣлительно несовмѣстной съ здоровьемъ, то цѣлительная сила больного—его внутренній врачъ, старается исправить соки и возбуждаетъ для этого подагранный приступъ съ лихорадкою, посредствомъ котораго, чрезъ отложеніе костной извести въ суставахъ и чрезъ выведеніе ея изъ тѣла въ густой осадочной мочѣ, подагрная острота въ крови уменьшается и здоровье больного восстанавливается на нѣкоторое время, до новой порчи крови и соковъ: это есть значеніе правильной, явной подагры. Но въ скрытной, неправильной подагрѣ, эти цѣлебныя дѣйствія внутренняго нашего врача принимаютъ опасное направленіе и подагрную остроту, такъ сказать, бросаютъ на важныя органы, особенно на желудокъ, легкія и мозгъ. Эта подагрная острота медленно развивается въ тѣлѣ, а потому и самая подагра обыкновенно появляется въ пожилыхъ лѣтахъ, за 40 лѣтъ; прежде этого возраста она встрѣчается у людей, коихъ родители были подвержены подагрѣ, которой остроту они сообщили и своимъ дѣтямъ.

Подагра чаще бываетъ послѣдственная; случайно же она развивается отъ невозддержности въ пищу и питье: пища соленая, копченая, пряная, вообще не свѣжая; вино крѣпкое, кислѣе (особенно венгерское), слишкомъ напрягаютъ желудокъ, истомляютъ его силы, доставляютъ пріятный, кислый, соленый, питательный сокъ, худо претворяющійся въ кровь, особенно при бездѣйственной, сидячей жизни, въ душныхъ квартирахъ, многочисленныхъ, несприятныхъ домахъ, въ большихъ городахъ. Поэтому подагра есть городская болѣзнь и притомъ людей богатыхъ, роскошныхъ, но бѣдные сельскіе жители ее не знаютъ. Далѣе, подагра развивается отъ строгой воздержности послѣ неумѣ-



ренности, отъ излишняго плотскаго совокупленія, отъ остановившагося почечуя, прекратившихся мѣсячныхъ кровей, медленнаго задержанія испарины въ низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ сырой, холодной квартирѣ, отъ любострастной болѣзни и ея течения рлутью; словомъ: подагра можетъ быть слѣдствіемъ всего того, что разстроиваетъ пищевареніе, препятствуетъ отдѣленіямъ и испражненіямъ, что доставляетъ несвѣжій питательный сокъ, производитъ худосочіе, порчу и остроту крови, а потому она замѣчается у людей, страдавшихъ разными худосочіями послѣдственными или приобретенными, у невоздержныхъ, развратныхъ, пьяницъ, у албитаевъ, у женщинъ въ періодѣ прекращенія мѣсячныхъ кровей.

Отсюда явствуется различіе ревматизма отъ подагры, наружно сходствующихъ между собою тѣмъ, что въ обоихъ замѣчаются боли: ревматизмъ есть случайная, наружная болѣзнь, зависящая чаще отъ простуды, гнѣздящаяся въ мышечныхъ оболочкахъ, а не въ суставахъ, окончательно рѣшающаяся потомъ, густою, осадочною мочою; напротивъ того, подагрѣ предшествуетъ долговременная, медленная порча соковъ, крови, внутреннее неизбѣжное расположеніе, которыя наконецъ раздражаются въ подагрные приступы, которыми однако болѣзнь окончательно не разрѣшается и которые опять повторяются впоследствии въ томъ же, или въ другомъ видѣ, и перѣдко съ новою силою. После продолжительнаго ревматизма происходятъ иногда мягкія опухоли въ разныхъ мѣстахъ, но въ подагрѣ появляются опухоли плотныя, костные наросты около суставовъ или на самыхъ костяхъ и густой известковый осадокъ въ мочѣ.

Леченіе подагры бываетъ различно, смотря по ея видамъ. Леченіе подагры острой, правильной, вовремя приступа: здѣсь нужно считать приступъ за переломъ, рѣшеніе болѣзни, способствовать его появленію и удалить все то, что можетъ препятствовать его развитію. Если приступъ не жестокій, лихорадка умѣренная, боли въ суставахъ сносныя, то все дѣло нужно предоставить природѣ, которой способствовать умѣренно теплымъ содержаніемъ больного, употребленіемъ потогонныхъ лекарствъ и покрытіемъ подаг-



ренного члена фланелью, вощанкою, а еще лучше хлопчатой бумагою; но холодныя свинцовыя примочки вредны тѣмъ, что могутъ скрыть, вогнать подагру во внутреннія части; притомъ онѣ препятствуютъ полному развитію подагренного перелома и острую подагру превращаютъ въ продолжительную. То же разумѣется о пиявкахъ и кровососныхъ банкахъ, которыя хотя и унимаютъ боль и воспаленіе въ суставѣ, но не излечиваютъ подагры и превращаютъ ее также въ медленную, упорную и оставляютъ въ суставахъ слабость, отъ чего подагренная матерія или остается въ суставахъ въ видѣ опухолей и наростовъ, причиняетъ неподвижность въ сочлененіяхъ, или бросается на внутреннія части, или, наконецъ, остается склонность къ частымъ возвратамъ подагренныхъ приступовъ. Теплыя смягчительныя припарки хотя также унимаютъ боль, но также и производятъ слабость, рыхлость, отекъ, выпотѣніе пасоки и нагноеніе въ суставахъ рукъ. Не должно также давать подагрикамъ во время приступа рвотнаго или сильнаго слабительнаго: то и другое хотя и унимаютъ приступъ, но подагра или также бросается на внутреннія части, или же она скоро опять ожесточается и дѣлается медленною, скрытною.

Это леченіе подагренного приступа измѣняется въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) страждущее подагрою мѣсто (суставъ) сильно воспалено: припухло, горячо, красно, напряжено, больной полнокровенъ, крѣпокъ, имѣетъ сильную (воспалительную) лихорадку; здѣсь полезны внутрь селитра или нашатырь съ рвотнымъ камнемъ (№ 17), а при полномъ, твердомъ пульсѣ — кровопусканіе, или припускъ пиявицъ вокругъ сустава. 2) У больного замѣчается явное разстройство пищеваренія (см. эту болѣзнь); здѣсь полезны вѣнская смѣсь, нашатырь съ сѣрникою магнезіею. 3) Боль очень жестока въ суставѣ, но безъ жара, красноты и опухоли; здѣсь помогаетъ втираніе въ суставъ деревяннаго или коноплянаго масла, настояннаго на листьяхъ бѣлены; въ это же масло обмакивается суконка, фланель, и кладется на больной суставъ; если и это не помогаетъ, то, съ совѣта врача, можно дать больному на ночь опій (1 грань) съ камforoю (2 грана), или приемъ Доверова порошка (№ 50). 4) Лихорадка пре-



кратилась, но боль, краснота и опухоль продолжаются; это означает, что подагрный приступ несовершенно разрѣшился переломомъ; здѣсь назначаются и противуподагрныя средства, особенно баккаутъ (*guajacum*), который усиливаетъ всѣ отдѣленія — мочи, кала, испарины; баккаутъ можно давать въ микстуру (№ 66) такъ, чтобы больного слабило два раза въ сутки; также полезны камфора (по 1—2 гран, 2—3 раза въ сутки), миндереровъ спиртъ по столовой ложкѣ, старымъ людямъ — спиртъ оленьяго рога, янтарный (*liquor cornu cervi succinatus*) по 20—30 капель чрезъ 2—4 часа, и если все это не помогаетъ, то лечить какъ медленную подагру.

Лечение подагры медленной, неправильной, нужно предоставить врачу, или по крайней мѣрѣ производить подъ его надзоромъ; это тѣмъ удобнѣе, что медленность и продолжительность болѣзни позволяютъ снестись и съ отдаленнымъ врачомъ. Впрочемъ, это леченіе состоитъ: 1) въ употребленіи противуподагрныхъ средствъ съ горькими: натра (№ 67), известковой воды, тѣлаго амміака, простаго и оленьяго рога, сѣры въ порошокъ и ваннахъ, баккаута; послѣдній, вмѣстѣ съ сассaparелемъ настаивается на спиртѣ, ромѣ, водкѣ, и принимается по рюмкѣ утромъ и вечеромъ; безвременникъ (*semen colchici autumnalis*), настоянный на винѣ и принимаемый 2—3 раза въ день по 20—30—60 капель. Весьма дѣйствительны въ подагру минеральныя воды: карльсбадскія, тѣплицкія, висбаденскія, ахенскія, пендорфскія, кавказскія сѣрныя и щелочныя, сергіевскія, сакскія грязи; также ванны съ муравьинымъ спиртомъ, солью, винными дрожжами, бардою.

2) Въ усиленіи отдѣленій и испраженій: пота, мочи, кала, посредствомъ мушки. Потъ производится: движеніемъ, работою на открытомъ мѣстѣ, плотнымъ пеленаніемъ больного, положеніемъ больного въ песокъ, на солнцѣ или въ печкѣ послѣ выпеченія хлѣба, растираніемъ тѣла суконками, простыми и паровыми ваннами, пареніемъ и потѣніемъ въ банѣ; испраженіе низомъ производится слабительными, а мочи — мочегонными средствами; мушечный пластырь кладется сначала по близости больного сустава, потомъ, по мѣрѣ



заживленія кожи, послѣ перваго пластыря кладется другой пластырь, третій и болѣе, все одинъ подлѣ другаго.

3) Въ укрѣпленіи пищеварительныхъ органовъ горькими средствами, особенно квасцѣю.

4) Въ возобновленіи, оживленіи соковъ свѣжею, хорошею пищею, особенно молокомъ, сывороткою, липами, чистымъ, сельскимъ воздухомъ.

5) Въ мѣстномъ леченіи больнаго сустава. Здѣсь полезны: при боли и опухоли — пиявны, кровососныя банки, а потомъ мушка, горчичники, припарки смягчительныя изъ свѣжаго, согрѣтаго березоваго листа, на ночь покрытіе сустава вощанкою, клеенкою, шерстью, фланелью, мѣхомъ, смолянымъ пластыремъ (*emplastrum gummi resinosum*), кожей, еще теплою свѣже-убитаго животнаго, его кишками. Это же леченіе нужно продолжать и при неподвижности въ суставахъ отъ подагры, при сведеніи рукъ, ногъ, при окрѣпостяхъ и отвердѣніяхъ около суставовъ.

Леченіе скрывающейся подагры состоитъ въ томъ, чтобы вызвать, возвратитъ ее на то мѣсто, съ котораго она исчезла и бросилась на важныя внутренніе органы. Здѣсь приглашеніе врача, и притомъ немедленное, необходимо. Впрочемъ, подагра скрывается двоякимъ образомъ: 1) все припадки вдругъ прекращаются въ подагреномъ мѣстѣ и въ слѣдъ за тѣмъ появляются признаки страданія желудка, легкихъ, мозга съ явною лихорадкою. Это скрытіе подагры очень опасно и угрожаетъ смертельнымъ воспаленіемъ, для предотвращенія котораго больному нужно пустить кровь, приставить противъ страждущаго мѣста пиявны, а потомъ мушку, а на прежнее мѣсто подагры поставить горчичники, припарки, сдѣлать ножныя или ручныя (смотря потому, съ рукъ или съ ногъ исчезла подагра) ванны съ горчицею, золою. 2) По мѣрѣ того, какъ подагреныя припадки въ суставъ прекращаются постепенно, появляются признаки страданія головы, легкихъ, желудка; здѣсь также необходимо прибѣгнуть къ совѣту опытнаго врача.

Наконецъ мы рекомендуемъ подагрикамъ употреблять какой мѣсяцъ, въ теченіе шести дней, стру съ баккаутомъ (№ 68) въ такомъ количествѣ, чтобы ежедневно 2—3 раза



слабило низомъ: этимъ очень удачно предотвращаются приступы явной и умиряются припадки скрытной подагры.

§ 128. Любострастная, венерическая, сифилистическая болѣзнь (\*). Любострастная болѣзнь обнаруживается въ различныхъ видахъ: какъ мѣстная или первоначальная, общая или наследственная и скрытная; каждая изъ этихъ болѣзней принимаетъ еще различныя формы.

1) Мѣстная, первоначальная любострастная болѣзнь обнаруживается сначала раздраженіемъ, а потомъ и воспаленіемъ на томъ мѣстѣ, на которое первоначально попалъ любострастный ядъ; она появляется въ двухъ формахъ: какъ любострастный перелой и такія же язвы.

а) Перелой, слізетечение у мужчинъ изъ мочевого канала, а у женщинъ— изъ мошоночнаго рукава или предматочника. Послѣ совокупленія съ зараженною особою, чрезъ 12—6—3 дня и даже чрезъ 12 часовъ въ мочевомъ каналѣ у мужчинъ, сейчасъ за головкою снизу, а у женщинъ у самаго отверстія предматочника кверху чувствуется зудъ, жаръ, жженіе при и послѣ испусканія мочи, а потомъ появляется изъ канала слізъ сначала бѣлая, послѣ желтая, темная, зеленая, даже съ полосками крови. Рѣзь усиливается до нестерпимой боли, особенно при напряженіи ствола и послѣ испражненія мочи, а отдѣленіе слизи увеличивается до того, что вся передняя часть рубашки бываетъ ею залита; въ высшей степени перелой даже совсѣмъ прекращается отдѣленіе слизи, стволъ краснѣетъ, распухаетъ, крайняя плоть или не заворачивается за головку (незалупа *phymosis*), или же, завернувшись, не можетъ быть отвернута (удавка, *paraphymosis*), и головка ствола представляется какъ бы ущемленною краемъ плоти. Въ это же время раздраженіе перелой можетъ сообщиться на животъ (бобонъ) или яичкамъ (опухоль яичекъ). Этотъ періодъ перелоя называется воспалительнымъ и продолжается отъ двухъ до трехъ недѣль; потомъ рѣзь дѣлается тише, слізъ отдѣляется въ

(\*) У насъ простой народъ называетъ ее французскою, Французы—голландскою, Голландцы—итальянскою, испанскою, Испанцы—американскою, обозначая тѣмъ пути этой болѣзни.



большемъ количествѣ, дѣлаясь изъ зеленой желтою, потомъ бѣлою, наконецъ свѣтлою и совсѣмъ прекращается. Этотъ второй періодъ продолжителенъ: отъ трехъ мѣсяцевъ даже до цѣлаго года. Впрочемъ, перелой есть мѣстная болѣзнь и рѣдко послѣ его дѣлается общая любострастная, и то чаще въ видѣ сыпи, выпаденія волосъ, пятенъ.

б) Любострастныя язвы, шанкры появляются презъ 3—14 дней послѣ совокупленія съ зараженною особою. Въ разныхъ мѣстахъ ствола, наичае однако въ бороздкѣ между головкою и крайнею плотію, на головкѣ, на плоти, даже на стволѣ, появляется краснота, потомъ прыщикъ, превращающійся въ пузырекъ, который, лопнувъ, представляетъ круглую, нечистую, бѣлую, желтую ямочку съ глубокою жирною поверхностью, съ возвышенными, твердыми, отворотившимися краями; къ этимъ язвамъ, какъ и къ перелой, можетъ присоединиться удавка, незалупа, но чаще бобоны; послѣдніе встрѣчаются очень часто при сихъ язвахъ и доказываютъ, что любострастный ядъ проникъ въ лаховыя желѣзны и что мѣстная болѣзнь сдѣлалась общею. Язвы продолжаются отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ и болѣе. При невоздержности и неосторожности больного (когда онъ, имѣя язвы, посѣщаетъ женщинъ, пьетъ вино, водку, раздражаетъ, ушибаетъ стволъ и проч.) эти язвы легко помертвѣваютъ и причиняютъ знатную потерю ствола. Иногда послѣ совокупленія съ незараженною, но неопратною женщиною, у корня головки ствола появляются ссадины и трещины, которыя проходятъ скоро при опрятномъ содержаніи ствола и частомъ его обмываніи.

в) Общая любострастная болѣзнь бываетъ слѣдствіемъ мѣстной, и особенно язвъ, рѣже перелоя; она развивается тогда, когда любострастный ядъ изъ поверхности язвы или перелоя всасывается и поступаетъ въ массу крови, съ которою протекая по всему тѣлу, отлагается чаще всего на извѣстныхъ частяхъ и производитъ воспаленіе и язвы на щекахъ, губахъ, языкѣ, и особенно на небной занавѣскѣ и языкѣ и въ носу; припухлость вокругъ отверстія въ ротѣ евстахіевой трубы, а чрезъ то шумъ въ ушахъ, воспаленіе глазъ, лишайную сыпь и красно-



багровыя пятна на губах и других частях тѣла, красныя мясистыя, похожіе на шелковицу-ягоду, наросты около задняго прохода, въ срамной промежности, вокруг головки ствола, у болѣвшихъ женскихъ губъ, опухоли и язвы паховыхъ (бобонъ) и миндалярныхъ желѣзъ. Любострастный ядъ, долго гниздившійся въ тѣлѣ, бросается на кости, особенно на непокрытыя толстымъ слоемъ мышцею, какъ то на губы, носъ, грудь и суставы, и причиняетъ жестокия боли, особенно по ночамъ въ постель, опухоли и наросты, а потомъ нарывы, язвы и костоду.

Скрытная, неявная, общая любострастная болѣзнь. Любострастный ядъ можетъ долго оставаться въ тѣлѣ скрытымъ, какъ бы въ дремотѣ, и потомъ начинаетъ дѣйствовать съ особенною жестокостію, подъ видомъ множества медленныхъ хроническихъ болѣзней, которыхъ распознаваніе, и особенно опредѣленіе ихъ любострастного свойства, очень трудно, и потому должно быть предоставлено врачу. Впрочемъ, при распознаваніи этихъ болѣзней нужно обращать вниманіе на слѣдующія обстоятельства: 1) болѣпой за 10—15 лѣтъ былъ зараженъ любострастною болѣзнію, отъ которой онъ или совсѣмъ не лечился, или же лечился недостаточно, невѣрно—у фелдшера, цирюльника, во время леченія не соблюдалъ діеты; 2) послѣ излеченія этой болѣзни, онъ началъ страдать то болью въ горлѣ, то сыпью на тѣлѣ, ломотою и опухолью въ костяхъ, наростами у задняго прохода; послѣ длиннаго ряда этихъ болѣзней, болѣпой началъ чувствовать сильныя головныя боли и потомъ у него появились судороги, падучая, слабое зрѣніе, глухота, шумъ въ ушахъ, началъ кашлять; у него развились чахотка, водянка, и проч.; разстройство пищеваренія, завалы внутренностей; 3) все, какъ прежніе, такъ и настоящіе припадки отъ употребленія ртути уменьшаются.

Любострастная болѣзнь есть настоящій бичъ рода человеческого, физическое наказаніе за нравственныя проступки; сама по себѣ она отвратительна, въ корнѣ подрываетъ самое крѣпкое, цвѣтущее здоровье молодыхъ людей, дѣлаетъ ихъ преждевременными дряхлыми стариками—слабозрящими, без-



намятными, глухими, гаусивыми, безносыми, блѣдными, щедушными, чахотными, безобразными, живыми движущимися муміями. Она очень упорна, трудно излечивается и легко воз-  
раждается подъ другимъ видомъ. Эта ея упорность зависитъ  
особенно отъ того, что въ началѣ она повидимому не опас-  
на, легко уступаетъ леченію и больной ею пренебрегаетъ; но  
въ послѣдствіи все тѣло, все соки проникаются, напиваются  
любострастнымъ ядомъ, который съ ними такъ тѣсно  
сливается, что его никакими средствами нельзя ни отбѣлить  
изъ соковъ и крови, ни уничтожить въ тѣлѣ. Притомъ са-  
мый опытный врачъ, совершенно повидимому излечившій  
больнаго отъ этой болѣзни, никогда не можетъ быть увѣ-  
ренъ, что онъ окончательно истребилъ и любострастный  
ядъ до послѣдняго его начала. Гибельное дѣйствіе этой бо-  
лѣзни отъ родителей переходитъ и на дѣтей, которыя имен-  
но отъ сей болѣзни рождаются золотушными, получаютъ  
разныя сыпи, сухотку, чахотку, завалы внутренностей, су-  
дороги и расположеніе ко всякимъ болѣзнямъ.

**Причины.** Причина любострастной болѣзни есть особен-  
ный ядъ, который входитъ въ здоровое тѣло и его зара-  
жаетъ. Этотъ ядъ есть произведеніе недавнее, и въ Европѣ  
онъ сталъ извѣстенъ съ пятнадцатаго столѣтія. Онъ сооб-  
щается только непосредственнымъ прикосновеніемъ, подобно  
чесоточному, водоболзненному яду, т. е. здоровый человекъ  
заражается любострастнымъ ядомъ, когда послѣдній отъ  
больнаго или зараженныхъ имъ вещей, сообщается здоро-  
вому, касается его тѣла. Наше и легче всего ядъ сооб-  
щается чрезъ мѣста, покрытыя тонкою кожею, какъ то:  
чрезъ дѣтородныя части, задній проходъ, губы, ротъ, глот-  
ку, грудные соски, глаза, носовую полость; еще удобнѣе  
ядъ сообщается чрезъ мѣста, покрытыя кожею — чрезъ  
раны, язвы, ссадину. Кромѣ совокупленія съ зараженною  
особою, невинно можно заразиться чрезъ поцалуй, посуду,  
одежду, особенно бѣлье, чрезъ стульчакъ или судно, въ ба-  
нѣ мочалкою, въ ваннѣ, чрезъ куреніе сигаръ и трубки,  
особенно изъ деревяннаго, костянаго мундштука и проч.  
О времени между зараженіемъ любострастной болѣзни сказано  
выше. Дѣйствіе любострастнаго яда состоитъ въ томъ,



что онъ на мѣстѣ зараженія производитъ раздраженіе, воспаленіе и нагноеніе; при последнемъ въ гноѣ и слизи зараждается такой же точно ядъ, какъ, какъ изъ одного зерна вырастаетъ множество подобныхъ же зеренъ. Впрочемъ, это зарожденіе новаго яда происходитъ скорѣе и обильнѣе при язвахъ надътородныхъ частяхъ, на губахъ, языкѣ, при переломѣ, медленнѣе при язвахъ въ горлѣ при мокрыхъ шишкахъ у задняго прохода, при бобонахъ; любострастныя язвы на прочихъ частяхъ тѣла и костода почти незаразительны. Притомъ кажется, что зараженіе требуетъ и особеннаго расположенія, по крайней мѣрѣ дознано опытами, что изъ нѣсколькихъ людей, при явномъ поводѣ къ зараженію, одни заразились, а другіе остались здоровыми.

У заразившагося челоѣка, послѣ перелома, рѣже происходитъ общая любострастная болѣзнь и бываетъ притомъ не такъ опасна и упорна, какъ послѣ язвъ; ибо переломный ядъ слабѣе язвеннаго потому, что онъ въ мочевоомъ каналѣ обволакивается слизью, разжижается мочою и извергается съ нею; напротивъ того, въ язвенномъ зараженіи, ядъ разрушаетъ части, язва отдѣляетъ острый, ядовитый, заразительный гной какъ для больнаго, такъ и для другихъ людей.

Какъ скоро любострастный ядъ отъ мѣста зараженія переходитъ въ массу крови и соковъ, и какъ скоро изъ мѣстной болѣзни развивается общая—вообще опредѣлить нельзя: иногда это случается чрезъ нѣсколько дней (бобоны, язвы въ горлѣ), иногда по прошествіи нѣсколькихъ недѣль, мѣсяцевъ (момота, сыпи, выпаденіе волосъ, наросты въ заднемъ проходѣ), а иногда и чрезъ нѣсколько лѣтъ (костные наросты и опухоли, язвы); у женщинъ переломъ и шанкры долго остаются мѣстными болѣзнями, и заражая мужчинъ, не переходятъ въ общую любострастную болѣзнь у женщинъ, особенно публичныхъ, у которыхъ поверхность предматочника, отъ частаго тренія, отолстѣла, затвердѣла, сдѣлалась какъ бы мозолистою и мало чувствительною. Впрочемъ, развитіе общей любострастной болѣзни изъ мѣстной, — переломъ или язвъ, — много зависитъ: 1) отъ особеннаго устройства тѣла и дѣятельности всасыванія: скорѣе этотъ переходъ бываетъ



у дѣтей, юношей, чѣмъ у взрослыхъ; 2) отъ мѣста начальнаго зараженія: скорѣе общая болѣзнь происходитъ послѣ язвъ на дѣтородныхъ частяхъ и 3) отъ леченія: скорое, залеченіе язвъ, или перелоя, бываетъ причиною и скорого появленія любострастной болѣзни. Здѣсь ядъ, не ослабѣвъ на мѣстѣ зараженія, какъ бы цѣликомъ поглощается и дѣйствуетъ въ тѣлѣ сильно и скоро. Входятъ же ядъ въ соки и кровь нашего тѣла, какъ и все другое, чрезъ всасывающіе сосуды, въ которыхъ онъ, проходя чрезъ ближайшія желѣзы, задерживается въ послѣднихъ, воспаляется ихъ и производитъ бобы, какъ первый знакъ общаго зараженія; потомъ ядъ бросается на части во рту и на другія отверстія (ушей, носа, задняго прохода), на кожу, и наконецъ на кости.

Врачи не знаютъ сущности любострастнаго яда; имъ только извѣстно, что этотъ ядъ не летучій (не растворяется въ воздухѣ), а потому заражаетъ только чрезъ прикосновеніе, что онъ многократно можетъ заражать одну и ту же особу, даже уже зараженную, что онъ любитъ пасочную всасывающую систему нашего тѣла, слизистыя оболочки около отверстій, кожу и кости, портитъ соки и кровь, производитъ язвы, сыпи, опухоли, наросты, роднится, такъ сказать, съ частями нашего тѣла и предательски ихъ разстроиваетъ; вообще, дѣйствуетъ медленно, но за то вѣрно; по временамъ какъ бы дремлетъ, молчитъ, скрывается, и потомъ опять пробуждается, слабѣя все болѣе и болѣе, особенно если больной часто прибѣгаетъ къ врачебному пособию, но не доканчиваетъ леченія. Дремлющій въ тѣлѣ любострастный ядъ, подобно другимъ худосочнымъ болѣзнямъ, наичаше пробуждается къ веснѣ.

Общее леченіе любострастной болѣзни состоитъ въ совершенномъ истребленіи ея яда и въ уничтоженіи припадковъ; ибо ядъ, несовершенно истребленный, опять возраждается, дѣйствуетъ съ новою силою и болѣзнь вновь появляется въ прежнемъ или другомъ видѣ. Ядъ истребляется и уничтожаются припадки любострастной болѣзни всего надежнѣе ртутью, или меркуріемъ, которую однако нужно употреблять съ осторожностью, ибо она, истребляя любостраст-



ный ядъ, есть вѣсть и сама сильный ядъ, и зараждаетъ въ тѣлѣ нашемъ новую, ртутную болѣзнь, не менѣе опасную, какъ и любострастная. Посему назначеніе больному ртути нужно предоставить врачу, который избересть какъ составъ (препаратъ) ртути, такъ и способъ его употребленія: чрезъ ротъ, чрезъ кожу въ видѣ втираній, ваннъ, чрезъ задній проходъ въ клистирахъ.

Успѣшное дѣйствіе ртути зависитъ отъ двухъ условій: надобно, чтобы она проникла въ тѣло больного, въ достаточномъ количествѣ, и чтобы произвела въ немъ особое противудѣйствіе, необходимое для истребленія яда. Ртуть дѣйствуетъ преимущественно на всасывающую (посочную) систему, гдѣ она находитъ любострастный ядъ и его истребляетъ, разлагаетъ, разрушаетъ, что дѣлается не прежде, какъ когда ртуть напитаетъ собою, проникнетъ всю посочную систему, и это узнается дѣйствіемъ ртути на десна и слинныя желѣзы, изъ коихъ первыя начинаютъ рыхлѣть, пухнуть, тонить кровь какъ въ цынгѣ, а послѣднія отдѣлять въ излишество густую, вязкую слину, причеиъ, какъ у цынготныхъ, появляется и неприятный изо рта запахъ.

Частное, мѣстное леченіе любострастной болѣзни состоитъ въ утѣшеніи, уничтоженіи ея припадковъ: воспаления и опухоли при язвахъ, рѣзы и теченія слизи при переломѣ, ломоты, разрывѣн опуходѣй, истребленіи наростовъ, сыпей и проч. Впрочемъ, вѣкогда не должно забывать, что, съ уничтоженіемъ припадковъ, еще не всегда уничтожено и внутреннее зараженіе; напротивъ, нерѣдко случается, что ядъ какъ бы нарочно скрывается внутри тѣла и въ немъ таится; наружныя припадки временно исчезаютъ, а между тѣмъ, по прошествіи нѣсколькихъ недѣль или мѣсяцевъ, любострастный ядъ опять появляется гдѣ-либо подъ видомъ новой болѣзни.

Посему не должно торопиться заживленіемъ, мѣстными средствами, наружныхъ припадковъ, которые, напротивъ, должны служить указаніемъ, маякомъ, какъ бы компасомъ, съ которымъ надобно соображаться при внутреннемъ леченіи болѣзни ртутью. Впрочемъ, какъ при началѣ любострастной болѣзни, такъ и въ продолженіе ея леченія надобно прибѣгать къ совѣту врача.



Въ особенности леченіе любострастной болѣзни можно раздѣлять на леченіе первоначальной, или мѣстной, леченіе общей и леченіе застарѣлой любострастной болѣзни.

1) Леченіе свѣжей, первоначальной любострастной болѣзни. Перелой и шанкры долго могутъ оставаться мѣстною болѣзью, т. е. не заражая всего тѣла; если въ это время истребить язвы и прекратить перелой, то больной и безъ внутренняго леченія ртутью можетъ быть безопасенъ отъ послѣдствій заразы. Но какъ, съ одной стороны, нѣтъ возможности опредѣлить, послѣдовало ли уже зараженіе тѣла, т. е. всосаніе яда прежде, чѣмъ появятся послѣдственные припадки (язвы во рту, въ горлѣ, наросты у задняго прохода), а съ другой, внутреннее употребленіе ртути столько же губительно, какъ и ядъ, а въ послѣдствіи, при старости лѣтъ, даже убійственнѣе яда, то при свѣжемъ зараженіи, продолжавшемся не болѣе 2—6 дней, можно лечить шанкры безъ ртути, одними наружными средствами, но притомъ помнить, что какъ только, по мѣрѣ заживленія язвъ, появится опухоль въ пахахъ, боль и язвы въ горлѣ, наросты у задняго прохода, сыпь на тѣлѣ, по вечерамъ ломота въ костяхъ, то непременно прибѣгнуть къ врачу, и подъ его надзоромъ начать внутреннее леченіе ртутью. Больной, нисколько не употреблявшій ртути при шанкрахъ, имѣетъ то преимущество въ своемъ положеніи, что онъ во всякое время готовъ подвергнуться полному ртутному леченію; напротивъ, принявшій уже ртуть въ маломъ количествѣ при язвахъ, когда у него откроется послѣдственная, общая зараза, часто долженъ уничтожить дѣйствіе прежняго леченія ртутью, иначе у него послѣ приѣма нѣсколькихъ гранъ ртути появится ртутная болѣзнь и леченіе должно будетъ прекратить.

Леченіе перелоя вообще производится безъ ртути. Въ началѣ перелоя т. е. въ первыя 4—12 дней, и у человека, въ первый разъ подвергшагося этой болѣзни, нужно стараться унять раздраженіе и воспаленіе и предотвратить опухоль крайней плоти (незалупу, удавку), кровотеченіе изъ чреваго ствола. Лучшія для этого средства суть: соверш



ное спокойствіе, подвязываіе яичекъ, которыя для сего помѣщаются въ мѣшечкѣ, привязываемомъ боковыми тесемками чрезъ пахи вокругъ таза; строго воздержаться отъ вина, водки, кофе, кислой, пряной, соленой пищи, отъ мяса, жирной рыбы, а напротивъ, употреблять жидкій супъ съ кореньями, кашу, молоко; пить чистую воду, слизистый отваръ изъ ячменныхъ, овсяныхъ крупъ, изъ корня просвиры, листьевъ мальвы, льняныхъ сѣмянъ, аравійской, вишневой камеди, молоко изъ коноплянаго, маковаго сѣмени, изъ миндальныхъ (оржандъ), лѣсныхъ орѣховъ. Это молоко нужно пить часто по полчашкѣ, такъ, чтобы въ сутки выпить 2—3 бутылки, селитра въ порошокъ по 5—10 гранъ 3—4 раза въ сутки; омовеніе ствола теплою водою, молокомъ; при сильныхъ боляхъ и нестерпимой рѣзи, при жарѣ и опухоли—пѣявицы къ стволу снизу и позади головки; сильныя и болыныя напряженія ствола унимаются припускомъ пѣявицъ къ корню ствола и втираніемъ въ промежность масла бѣлены. При опухоли крайнеі плоти съ незалупою, или удавкою, также полезны пѣявицы вокругъ опухоли, и потомъ мягчительныя припарки изъ мякиша бѣлаго хлѣба съ молокомъ или свиновоею водою, изъ маковыхъ головокъ, льнянаго сѣмени; при сильной удавкѣ, угрожающей помертвѣніемъ, когда стволъ начинаетъ багровѣть и темнѣть, пособіе врача необходимо; при незалупѣ между крайнею плотію и головкою ствола, для омовенія скопляющейся слизи и гноя, нужно впрыскивать подъ крайнюю плотъ теплое молоко, отваръ просвиры.

Если жаръ, рѣзь и напряженія уменьшились, что обыкновенно послѣдуетъ на 6—12 день, если притомъ не было ни незалупы, ни удавки, то нужно употреблять настоящія противъ перелоя средства: копаевъ бальзамъ, перецъ кубебы, скипидарное масло; бальзамъ дается самъ по себѣ на сахаръ, по 20—30 капель три раза въ день или въ микстуру скипидаръ (масло) также самъ по себѣ по 10—20—30 капель три раза въ день съ коноплянымъ, коровьимъ молокомъ; кубеба дается въ порошокъ по  $\frac{1}{2}$ —1—2 драхмы 2—3 раза въ день; также полезенъ рообъ, приготовляемый изъ можжевельныхъ ягодъ, которыя для сего толкутся и съ водою увариваются, прожимаются сквозь сито; выжа-



тый густой сокъ смѣшивается съ сахаромъ, или медомъ, и дается въ день по 1—2 унціи, раздѣленные на 3—4 приѣма, или, просто, по столовой ложкѣ. Если при употребленіи сихъ средствъ въ теченіе 2—3 недѣль боль и рѣзы прекратятся, но остается еще теченіе бѣлой, свѣтлой слизи, то можно прибѣгнуть къ впрыскиваніямъ въ мочевою каналъ известковой воды, раствора въ водѣ квасцовъ, бѣлаго, зеленого купороса и даже адскаго камня; но составъ этихъ впрыскиваній и ихъ производство мы предоставляемъ врачу.

Леченіе язвъ, шанкровъ. Всякій свѣжій шанкръ нужно пока считать мѣстною болѣзнію и лечить его мѣстными средствами; причина этого поступка изъяснена выше; но такого больного послѣ леченія не должно выпускать изъ виду; и если у него появятся признаки общей любострастной болѣзни (бобоны, язвы во рту, въ горлѣ, наросты у задняго прохода, ломота въ костяхъ), то, подъ надзоромъ врача, надобно приступить къ внутреннему леченію ртути. Безопаснѣе всего употреблять внутрь при свѣжихъ язвахъ Ганцеманову ртуть въ пилюляхъ, давать ее больному сначала по полграну разъ на ночь въ день, ежедневно или чрезъ день увеличивать  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  грана, а потомъ, при появленіи непріятнаго запаха изо рта и чувства полноты между зубами, уменьшать (что обыкновенно послѣдуетъ чрезъ 2—3 недѣли, когда больной дойдетъ до приѣма 3—4 гранъ ежедневно ртути), 1—2—3 пилюлями ежедневно; для истребленія яда въ тѣлѣ нужно употребить отъ половины до цѣлой драхмы этой ртути, во время приѣма которой больной долженъ содержать строгую діету и безвыходно оставаться въ теплой комнатѣ (см. ниже). Свѣжіе шанкры лучше всего прижигать адскимъ камнемъ, котораго палочка оправляется для сего въ гусиное перо и кончикомъ камня слегка дотрогиваться до язвы, такъ, чтобы вся ея гнойная поверхность покрылась струпомъ, послѣ чего язва покрывается сверткомъ корпіи, намоченной въ свѣжемъ деревянномъ маслѣ. По спадепіи струпа, что послѣдуетъ въ тотъ же, или на другой день, прижиганіе повторяется, особенно гнойныхъ, желтыхъ или бѣлыхъ мѣстъ. Прижигать надобно до тѣхъ поръ, пока язва не заживетъ, или по крайней мѣрѣ не очистится и



не представить чистой, красной поверхности, которая до заживленія перевязывается тѣмъ же масломъ.

Если послѣ прижиганія появится сильная боль и опухоль или не скоро упадетъ струпъ, то на язву надобно положить нѣсколько припарокъ изъ мякиша хлѣба съ масломъ.

Паховики, или бубоны, бываютъ при перелотѣ и шанкрахъ: при первомъ они зависятъ отъ перелотнаго раздраженія, проходятъ вмѣстѣ съ перелотомъ, разрѣшаясь и рѣдко переходя въ нагноеніе; перелотные паховики уступаютъ употребленію теплыхъ магнительныхъ припарокъ. Паховики при шанкрахъ зависятъ отъ всосанія яда, который, проходя чрезъ паховыя желѣзы, въ нихъ останавливается и причиняетъ опухоль сначала маленькую, подвижную, безъ измѣненія цвѣта кожи надъ нею; но потомъ опухоль увеличивается, дѣлается неподвижною, глухоболѣющею, твердою, кожа въ цвѣтѣ измѣняется надъ опухолью—краснѣетъ, темнѣетъ, на верхушкѣ желтѣетъ; послѣ чего опухоль прорывается, истекаетъ гной, происходитъ язва, иногда очень глубокая съ твердою окружностью.

При язвенныхъ паховикахъ, т. е. зависящихъ отъ шанкровъ, внутреннее употребленіе ртути необходимо. Наружное леченіе паховиковъ бываетъ различное, смотря по состоянію паховика: вначалѣ, когда онъ еще подвиженъ, небольшой, безъ измѣненія надъ нимъ кожи въ цвѣтѣ, въ окружности его нужно приставить пиявицы (12—20 штукъ) и потомъ дѣлать холодныя примочки, чтобы разогнать паховикъ; при внутреннемъ леченіи ртутью, смѣло можно разрѣшить паховикъ, не опасаясь отъ сего никакихъ послѣдствій, ибо ртуть разложить и уничтожить въ тѣлѣ весь любострастный ядъ. Если паховикъ увеличивается, твердѣетъ, измѣняется въ кожѣ, или же останавливается безъ переменъ и дѣлается притомъ нечувствительнымъ отъ его прижатія, хочетъ перейти въ отвердѣніе, то надобно стараться привести его въ нагноеніе припарками изъ льнянаго сѣмени съ листьями бѣлены, изъ сынной трухи, отрубей, крутой каши, горячаго хлѣба и пр., а на ночь класть на паховикъ медовую лепешку, печеную, горячую рѣпу, кар-



тофель и проч., словомъ, поступать такъ, какъ и при всякомъ другомъ нарывѣ. Вскрывать паховикъ не нужно, а пусть онъ самъ прорвется; иначе легко остаются по его окружности мозолистые отвердѣнія, для смягченія концы припарки нужно продолжать и послѣ вскрытія паховика. Присемъ надобно замѣтить, что при прорвавшемся паховикѣ, особенно у людей толстобрюхихъ, тучныхъ, гной скопится внизу язвы, къ бедру, и производить ходы, а потомъ новые нарывы на бедра, язвы. Для предотвращения сихъ нарывовъ, къ нижней части паховика нужно прикладывать градусные клистиры, или какъ иначе мѣшать скопленію тутъ гноя, выжимая его оттуда, при каждой перевязкѣ, давленіемъ въ направленіи отъ низу къверху; лечить же вскрытый паховикъ какъ и всякій нарывъ и язву; прижиганіе краевъ язвы адскимъ камнемъ сильно способствуетъ уничтоженію отвердѣлыхъ ея краевъ и заживленію.

О мѣстномъ или наружномъ леченіи язвъ въ горлѣ, воспалениямъ личекъ, губчатыхъ наростовъ, какъ первыхъ слѣдствій всосавшагося любострастнаго яда, сказано въ отдѣлѣ «О наружныхъ болѣзняхъ въ особенности». Внутреннее леченіе сихъ слѣдствій состоитъ въ употребленіи ртути, особенно Ганнеманова препарата въ томъ же видѣ и приемахъ, какъ и при любострастныхъ язвахъ на стволѣ.

Леченіе общей, послѣдственной любострастной болѣзни, когда она обнаруживается подъ видомъ язвъ въ горлѣ, на губахъ, языкѣ, паховиковъ, достаточно то же, что и при начальныхъ язвахъ т. е. Ганнемановою ртутью; но здѣсь надобно еще поддерживать ртутное леченіе питіемъ кровочистительныхъ сборовъ (№ 29—62), больного безвыходно держать въ теплой, почти жаркой комнатѣ (15° 16° Реом.), запретить ему употребленіе всякой кислой, соленой, копченой пищи, фруктовъ, зелени, кислаго питья, а давать ему свѣжую, мясную пищу, молоко, уху изъ окуней, ершей, судаковъ; пить чистую водою, жидкимъ чаемъ, также изъ листа черной смородины, калины, воложскаго орѣха, и вообще не выпускать изъ виду, что обильное питье много способствуетъ успѣшному дѣйствию ртути, разжижая



кровь, усиливая испарину и испражнение мочи, и такъ облегчая проходъ ртути чрезъ всю кровь и изверженіе ея изъ тѣла. Съ послѣднею целью, по окончаніи ртутнаго леченія, больной долженъ принимать ванны, сначала стріяы, а потомъ простыя, потѣть въ банѣ по 2—3 раза въ недѣлю и ходить пѣшкомъ, работать до вспотѣнія и усталости.

Если послѣ заживленія на дѣтородныхъ частяхъ любовнаго страстныхъ язвъ прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ; если послѣдственная болѣзнь появляется подъ видомъ сыпи на лбу, комоты въ костяхъ, усиливающейся къ ночи, въ постель, красныхъ мясныхъ наростовъ около задняго прохода, на корнѣ языка, вокругъ головки ствола или на крайней плоти, на женскихъ дѣтородныхъ губахъ, опухоли и наростовъ на костяхъ грудной, ключичной, черепныхъ, голенихъ и пр.; то непременно нужно прибѣгнуть къ врачу, которому притомъ разсказать со всею подробностью о бывшей любовнаго страстной болѣзни и ея леченіи. Въ этихъ случаяхъ врачи назначаютъ для внутренняго употребленія сулему, особенно если больные уже принимали сладкую или Ганнеманову ртуть и вмыли отъ того слизетеченіе. Сулема прописывается въ пилюляхъ (№ 70), изъ которыхъ каждая содержитъ  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{12}$  часть грана; больной начинаетъ принимать разъ въ день на ночь по двѣ пилюли, потомъ чрезъ день прибавляетъ по одной пилюль, и когда дойдетъ до 8—12 пилюль, т. е. когда въ пріемъ будетъ содержаться 1 гранъ сулемы, то не увеличиваетъ болѣе пріемовъ, а напротивъ, начинаетъ уменьшать въ такой же пропорціи, какъ увеличивалъ. Но если припадки болѣзни не уменьшаются, то дневной пріемъ только (8—12) нужно раздѣлить на два раза поутру и въ вечеру; для излеченія болѣзни бываетъ нужно употребить отъ 8 до 20 гранъ сулемы. При леченіи сулемою больной также безвыходно долженъ оставаться въ теплой комнатѣ, держать строгую діету, пить отваръ сассапарели (№ 29), принимать чрезъ 2—3 дня теплую ванну. Нужно помнить, что сулема вредно дѣйствуетъ на лѣгкія, особенно у людей, расположенныхъ къ чахоткѣ, и причиняетъ сухость и перхоту въ горлѣ, сжатіе, колотье въ груди, кашель, кровохарканіе, и



потому повторяемъ, что всякое леченіе ртутью, а тѣмъ болѣе суземаю, должно предоставить врачу.

Если при употребленіи ртути, до появленія признаковъ ея дѣйствія на ротъ (красноты и припухлости десенъ, чувства полноты и шаткости зубовъ, непріятнаго изо рта запаха, молочницы во рту и слинотеченія), не проходятъ любострастные припадки, то нужно остановить дальнѣйшіе приемы ртути, и сначала назначить противуртутное леченіе, а потомъ употребленіе кровочистительныхъ отваровъ Поллина (№ 62); въ теплыхъ климатахъ и у насъ въ лѣтнее время эти отвары не только уничтожаютъ вредное дѣйствіе ртути, но излечиваютъ припадки и любострастной болѣзни, очищая соки и кровь отъ яда. Пріостанавливать и вовсе прекращать ртутное леченіе при появленіи ртутной болѣзни необходимо еще и потому, что мы никакъ не можемъ знать навѣрное: достаточно ли принялъ больной ртути для истребленія яда; ибо въ однихъ случаяхъ любострастные припадки проходятъ скоро, а между тѣмъ яды въ крови еще не уничтожены ртутью; въ другихъ случаяхъ, напротивъ, любострастная сыпь, опухоль костей, язвы на ногахъ еще не прошли, хотя уже и истребленъ любострастный ядъ; слѣдственно въ обоихъ случаяхъ нѣтъ вѣрнаго указанія: достаточно ли больной принялъ ртути. Притомъ неумѣренна употребленная ртуть производитъ припадки, подобно любострастнымъ, особенно язвы во рту, такъ что язва ртутная сливается съ любострастною и нѣтъ возможности разрѣшить: любострастную ли, или ртутную болѣзнь мы имѣемъ предъ глазами. Во всѣхъ такихъ случаяхъ нужно прекратить употребленіе ртути и прибѣгнуть къ кровочистительнымъ отварамъ, простымъ и сѣрнымъ ваннамъ, бань, свѣжей, молочной пищѣ, къ чистому деревенскому воздуху, и если въ послѣдствіи, особенно къ веснѣ, осени, появятся вновь любострастные припадки, то, съ совѣта врача, опять начать ртутное леченіе.

Леченіе застарѣлой любострастной болѣзни. Если эта болѣзнь продолжалась нѣсколько лѣтъ (8—10—15); если въ то время она то пропадала вовсе послѣ леченія ртутью, отварами, то опять появлялась, особенно къ веснѣ; если



послѣ ломоты появились опухоли костей, язвы, свищи, костоѣда: то назначается особенное ртутное леченіе, при которомъ ртуть вносится въ тѣло больного чрезъ кожу, изъ которой поглощается всасывающими сосудами и разносится по всему тѣлу. Это ртутное леченіе есть самое сильное, но зато и самое дѣйствительное! Мы его предоставляемъ исключительно врачу. Оно производится ваннами изъ сулемы, втираніемъ ртутной мази въ разныя части тѣла (плечи, ляшки, якры и пр.), куреніемъ посредствомъ киновари, голодомъ и отварами Поллина, Цитмана; мы не описываемъ этихъ способовъ леченія потому, что предоставляемъ ихъ врачамъ.

Здѣсь мы не можемъ не замѣтить въ предостереженіе неопытныхъ и неведущихъ больныхъ, что простонародныя знахарки и лекаря, при леченіи любострастной болѣзни, чаще употребляютъ самыя сильныя средства: сулему внутрь (съ виномъ или водкою) и снаружи въ ваннахъ, куреніе киноварью, прижиганіе купоросомъ и даже мышьякъ. Эти простонародныя леченія, особенно сулемою и окуриваніе киноварью, не одному больному стоили жизни, и нередко случалось, что больной въ ваннѣ съ сулемою или во время окуриванья киноварью падалъ мертвымъ, или же получалъ признаки отравленія и скоро потомъ умиралъ отъ изнуренія. Посему мы советуемъ остерегаться такихъ леченій, какъ огня.

Леченіе скрытной, потаенной любострастной болѣзни. Эта болѣзнь проявляется въ различныхъ видахъ: жестокія боли головы, разныя сыпи на тѣлѣ, особенно на лицѣ, воспаленія глазъ и слѣзота, шумъ въ ушахъ и глухота, мясные наросты во рту, въ носу, костоѣда въ носу и въ небѣ, несвободное жеваніе, косноязычіе, гнусивость рѣчи, трудное глотаніе и дыханіе; далѣе, гортанная и легочная чахотка, мокротный кашель, грудная и брюшная водянка, удушье, завалы въ брюхѣ, расстройство пищеваренія, ипохондрія, истерія, запоры на низѣ, задержаніе и недержаніе мочи, мочезнуреніе, мочевые свищи, параличи, судороги: словомъ: всякая упорная болѣзнь, появившаяся безъ всякой причины у городскихъ жителей, у старыхъ



холостяковъ, у людей распутныхъ, можетъ и должна возбудить подозрѣніе, не былъ ли больной прежде зараженъ любово-страстнымъ ядомъ и не страдалъ ли онъ послѣ того, въ теченіе 5—10 лѣтъ разными припадками, которые въ послѣдовательномъ порядкѣ смѣнялись одни другими. Во всѣхъ такихъ случаяхъ необходимо приглашеніе врача, которому надобно предоставить и все леченіе такого больного.

§ 129. Ртутная болѣзнь. Признаки: чувство полноты въ деснахъ и какъ бы засѣваго мяса между зубами, припухшія, сначала красныя, а потомъ темныя десна, отъ прижатія которыхъ, особенно ногтемъ,ковырянія между зубами, показывается кровь; непріятный запахъ изо рта, трудность и даже невозможность жевать твердую пищу, шаткость зубовъ, которые притомъ теряютъ свой бѣлый цвѣтъ, блестящій видъ и дѣлаются желтыми, тусклыми, а потомъ и черными; невольное стремленіе часто плевать, припухлость подъязычныхъ венъ и желѣзъ, околоушныхъ желѣзъ и наконецъ слинотеченіе, при которомъ больной выплевываетъ или пѣнящуюся, или же чаще вязкую, клейкую какъ слизь, слину, которая тянется длинною нитью, съ трудомъ отъ рта отрываемою; жаръ во рту и жажда; на внутренней поверхности щекъ, на деснахъ, на концѣ, по краямъ языка появляется множество отдѣльныхъ мелкихъ язвъ, которыя потомъ сливаются, сначала походятъ на молочницу, а потомъ на любово-страстныя язвы, отъ которыхъ ихъ трудно отличить, особенно если первыя бымы въ горлѣ и во рту и не зажили до появленія ртутныхъ язвъ; сверхъ того, у больного замѣчается микорадка (ртутная), расстройство пищеваренія, нечистый, бѣлый, желтый языкъ, водянистый поносъ, морщиноватая кожа, слабость во всемъ тѣлѣ.

Причины. Ртутная болѣзнь есть медленное отравленіе ртутью, ртутное худосочіе, при которомъ кровь и соки напитались, проникнуты ртутью; она походитъ въ своемъ дѣйствіи на цынгу и появляется у людей, которые при своихъ занятіяхъ подвергаются вліянію ртутныхъ паровъ: на зеркальныхъ фабрикахъ, на ртутныхъ заводахъ, у золотарей, серебрянниковъ, паяльщиковъ. Гораздо чаще ртутная болѣзнь есть слѣдствіе употребленія ртути, внутри въ порош-







дѣйствіе ртути ; посему нужно оставить ртутную работу (золоченіе, серебреніе, добываніе ртути на заводы), ртутное леченіе, притиранія, порошками и мазями, умыванья жидкостями, содержащими въ себѣ ртуть. Если ртутная болѣзнь оказывается въ легкой степени (припухлостью десенъ и шаткостью зубовъ безъ боли и жара, непріятнымъ запахомъ и частымъ плеваніемъ, то достаточны: ежедневное слабительное изъ сѣры (по 10—20 гранъ, или № 42) въ теченіе недѣли, теплая ванна съ сѣрною печенкою, или баня, и натираніе въ ней тѣла сѣрною мазью (№ 26), и противуцынготное полосканье изъ отвара дубовой, ивовой, хинной коры съ квасцами и хрѣновою водкою, либо спиртомъ ложечной травы или березовыхъ шишекъ (№ 42). Если ртуть (сулема, куренія кинноварью) подѣйствовала на грудь, то полезны натиранія груди свинымъ саломъ, масломъ деревяннымъ, льнянымъ, внутрь молоко коровье, маковое, конопляное, отваръ просвинокъ, рисовыхъ, овсяныхъ, ячневыхъ крупъ съ медомъ и сѣрная ванна или баня и растираніе въ ней всего тѣла сѣрною мазью. Если при такомъ леченіи боль въ груди не проходитъ въ теченіе недѣли, то нужно посоветоваться съ врачомъ. Если десна очень распухли, зубы шатаются, подъязычныя и подчелюстные желѣзы распухли, на языкѣ, зубахъ, щекахъ, во рту показались язвинки, изо рта безпрестанно течетъ густая, мутная, вязкая слюна, то кромѣ теплой ванны, внутрь дать сѣрную печенку (по 5—10 гранъ), а снаружи назначить полосканье теплое изъ ромашки съ молокомъ, отвара просвинокъ съ медомъ, во рту почаще мазать медомъ съ бурою, беречься простуды и вѣтра, а потому сидѣть въ теплой комнатѣ, и также пригласить врача.

По прошествіи главныхъ припадковъ ртутной болѣзни, полезно употребить минеральныя сѣрныя воды, кровочистительный отваръ въ теченіе двухъ недѣль, имѣть движеніе до появленія легкаго пота, потомъ употреблять свѣжую пищу: рыбу, мясо, масло, яицъ, зелень и пользоваться деревенскимъ, горнымъ, сухимъ воздухомъ, солнечнымъ свѣтомъ и вообще дѣлать все то, что сказано при леченіи худосочія вообще и цынги въ особенности.

§ 130. Глисты. Почти въ каждой внутренности зараж-



даются червячки или глисты, какъ то въ печени, легкихъ, почкахъ, мочевомъ пузырь, даже въ мозгу и глазахъ; чаще однако они происходятъ и достигаютъ значительной величины въ кишкахъ, откуда, съ одной стороны, заходятъ въ желудокъ, а съ другой—въ предматочникъ. Кишечныя глисты бываютъ трехъ родовъ: 1) маленькія, собственно червячки, длиною въ 2—3 линіи, водящіяся исключительно въ прямой кишкѣ; 2) среднія или круглыя, длиною въ  $\frac{1}{4}$  аршина и болѣе и толщиною въ гусиное перо; онѣ водятся въ тонкихъ кишкахъ, и 3) плоская, ленточная глѣста (solitaire) съ широкими или длинными колѣбцами, шириною въ  $1\frac{1}{2}$  линіи (въ узкую ленту), а длиною въ нѣсколько десятковъ аршинъ; она или свивается въ клубокъ, или свертывается въ видѣ ленточнаго пучка и обитаетъ въ толстыхъ кишкахъ.

Признаки: золотушное, бѣлокурое тѣлосложеніе, блѣдный, быстросмѣняющійся цвѣтъ лица, синіе кружки подъ глазами, расширенныя зрачки, зудъ въ носу, частое чиханіе, кровотеченіе изъ носа, по утрамъ наташакъ быстрое накопленіе во рту слюны, которая вдругъ изливается струею, непріятный запахъ изо рта, вязкій, слизистый вкусъ, неправильный позывъ на ѣду—то голодъ, то отвращеніе отъ пищи, полный, но мягкій животъ, боль около пупка и подъ ложечкою, вздрагиваніе и скрежетаніе зубами во снѣ, головокруженіе, дурнота и даже обморокъ, стараніе больного спать на животъ, рѣзкія грезы во снѣ, снохожденіе, исхуданіе тѣла, ожесточеніе всѣхъ этихъ припадковъ отъ продолжительнаго употребленія постной пищи (въ Великій Постъ). Впрочемъ, всѣ эти признаки не вѣрны, и только одно выходженіе глиствъ есть вѣрный признакъ ихъ нахожденія въ кишкахъ.

Особенныя признаки: маленькія глисты причиняютъ: несносный зудъ въ заднемъ проходѣ, чаще въ вечеру, рѣзь, шемленіе и натугъ при испражненіи низомъ, трудное испражненіе мочи (особенно у дѣвочекъ, у которыхъ они заползаютъ въ предматочникъ), теченіе слизи изъ задняго прохода, мочеваго канала, предматочника, грусть и печаль. Круглыя глисты производятъ, кромѣ общихъ припадковъ, частую боль и чувство ползанія около пупка; при



плоской глисты замѣчаются: чувство восхожденія дошей и потомъ опаденія чего-то, какого-то движенія, сосанія въ разной части живота, ползанія мурашекъ, головокруженіе, оцѣпенѣніе пальцевъ на рукахъ и ногахъ; скорое успокоеніе брюшныхъ припадковъ послѣ выпитія рюмки горькой водки, особенно полынной.

Глисты, раздражая кишки, имѣютъ вліяніе на весь тѣло: пожирая питательный сокъ, производятъ исхуданіе тѣла, а раздражая нервы, бываютъ поводомъ къ разнымъ нервнымъ болѣзнямъ, особенно у дѣтей, у которыхъ разныя судороги, какъ то: родимецъ, надучая болѣзнь, пляска св. Вита, смыканіе челюстей, часто зависятъ отъ глистъ, съ испражненіемъ которыхъ проходятъ и судороги, даже не причиняя никакихъ явныхъ припадковъ ни въ животѣ, ни въ головѣ; глисты могутъ причинить нервную, душевную болѣзнь.

**Причины.** Глисты зараждаются въ самомъ тѣлѣ, и особенно въ кишкахъ дѣтей, золотушныхъ людей, у которыхъ кишки изобилуютъ слизью, сладкимъ, нѣжнымъ сокомъ; молочная, мучная, мясная пища, сладкіе плоды и овощи, сахаръ, медъ, низменное мѣстоположеніе страны сильно располагаютъ къ зарожденію глистъ, которыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бываютъ общею болѣзнію въ народѣ. — Глисты, при употребленіи сочной, пріятной для нихъ пищи, спокойны, и рѣдко причиняютъ слабыя припадки; но когда больной воздерживается отъ пищи, или ѣсть постную, кислую, соленую, острую, горькую пищу (въ постъ), то глисты, голодая, дѣлаются беспокойными и причиняютъ мучительные, даже опасные припадки.

Кромѣ исхуданія тѣла, глисты вредны тѣмъ, что онѣ скопляютъ слизь въ кишкахъ, умирая, гниютъ и тѣмъ причиняютъ желудочно-гнилостныя лихорадки, а раздражая кишки производятъ: боли, колику, судороги, натугъ, поносъ, воспаление и завитіе, переплетеніе кишекъ, нарывы, чрезъ которые глисты выпадаютъ изъ тѣла, — судороги, надучую болѣзнь, пляску св. Вита, снохожденіе, періодическое онемѣніе, умопомѣшательство, бѣшенство, накопленіе крови и кровотеченіе, сыпи, истеченіе слизи.

Повторяемъ, что глисты долго могутъ таиться въ тѣлѣ,



не разстроивая нашего здоровья, и потомъ вдругъ причинить мучительные, даже опасные припадки; последнее зависитъ или отъ умноженія числа глисть, отъ принятія противной имъ пищи, или отъ увеличившейся раздражительности кишокъ, напр. въ лихорадкѣ.

Лечение двойное: припадочное и коренное. Припадочное лечение нужно для унятія боли, рѣзы въ животъ, при дурнотѣ, тошнотѣ, головокруженіи, поносѣ, воспаленіи въ брюхѣ, глистной лихорадкѣ. Полезныя въ сихъ случаяхъ средства частію уже приведены въ своемъ мѣстѣ (смотри головокруженіе, тошноту и пр.), частію они суть: молоко коровье, миндальное, конопляное, маковое (при поносѣ), употребленное въ видѣ питья, клистировъ, съ припарками къ животу, по утрамъ натошакъ дурнота, тошнота и слинотеченіе скоро проходятъ отъ стакана холодной воды; припадки отъ плоской глисты прекращаются рюмкою полынной водки.

Коренное лечение состоитъ въ изгнаніи глисть изъ тѣла и въ предотвращеніи ихъ новаго зарожденія. Глисты можно выгнать изъ тѣла тремя способами: 1) противуглистными средствами, между которыми самое действительное противъ всѣхъ глисть есть цытварное сѣмя (semen. santonici): оно ослабляетъ, одуряетъ, умерщвляетъ глисты, которыя потомъ мертвыя испражняются слабительными лекарствами; 2) совмѣстнымъ употребленіемъ противуглистныхъ и слабительныхъ средствъ; 3) сильными пропосными, которыя, возбуждая въ кишкахъ сильное червообразное движеніе, извергаютъ глисты живыми или мертвыми. Первый способъ есть безопаснѣйшій, хотя и не всегда успѣшный, но за то, при неоднократномъ повтореніи его, имъ также можно достигнуть цѣли; второй способъ не такъ безопасенъ, а третій можетъ употребить только врачъ. Къ несчастію, однако, шарлатаны, лекарки и знахари наичаще употребляютъ именно этотъ опасный способъ изгнанія глисть. Впрочемъ, всѣ эти три способа изгнанія глисть легче удаются въ исходѣ луны, т. е. въ третью и послѣднюю ея четверть: въ это время глисты бываютъ слабѣе и не такъ плотно присасываются къ кишкамъ; далѣе глисты легче вы-



гонять въ постное время, когда онъ отъ постной пищи также изнемогають и слабують, возбуждая притомъ сильныя припадки.

Маленькія глисты, червячки, истребляются клистиромъ изъ отвара табаку съ мыломъ, солью, изъ наливки холодной квасси, пижмы или рябинки (*tanacetum vulgare*) и внутреннимъ употребленіемъ каши изъ пытварнаго съмени № 71). Пытварное же съмя въ видѣ каши есть лучшее средство и противъ круглыхъ глистъ. Кромѣ каши, дѣтямъ можно давать по утрамъ натошакъ въ теченіе двухъ недѣль это съмя обсахареннымъ въ видѣ конфетовъ и потомъ слабительную кашку (№ 12), или касторовое масло; далѣе, круглыя глисты пропадаютъ отъ пижмы, полыни, зеленой корки волошкихъ орѣховъ, корня мауна, моркови; первыя средства даются по утрамъ натошакъ въ видѣ порошка по 10—20—30 гранъ съ сахаромъ, или наливки, изъ полдрахмы на чашку горячей воды, тертый корень моркови дается въ видѣ каши съ сахаромъ, по утрамъ натошакъ.

Плоская, ленточная глеста изгоняется труднѣе другихъ глистъ. Для этого употребляютъ два способа: первымъ стараются изнурить, ослабить, умертвить глесту, и потомъ ея выгнать, а вторымъ она выгоняется вдругъ сильными проносными средствами. Первый способъ, какъ безопасный, мы исключительно совѣтуемъ употреблять, особенно у людей иѣжныхъ, слабыхъ женщинъ. Онъ состоитъ въ продолжительномъ употребленіи противуглистныхъ средствъ: нашатыря, главберовой, горькой соли, и особенно папоротника въ порошокъ, или въ видѣ каши съ медомъ.

Лучшій, надежнѣйшій и притомъ безопасный способъ изгнать ленточную глесту есть слѣдующій: прежде всего въ теченіе 1—2 недѣль надобно держать противуглистную діету (о которой будетъ сказано ниже), потомъ на ночь принять 1—2 драхмы папоротника въ порошокъ съ 5—10 гранами нашатыря; по утру выпить 1—2 стакана холодной воды, а чрезъ часъ 1—2 ложки столовая англійской или горькой соли, или ложку кастороваго мёсла, теперь же поставить клистиръ изъ молока и втирать въ животъ горное масло (*oleum petroleum*), если оно есть. Если чрезъ 2—3 часа не прослабитъ, больна-



го, или хотя и послабитъ, но глиста не покажется, то надобно повторить лечение: ввечеру папоротникъ, а поутру на слѣдующій день—горькую соль или масло касторовое, и это лечение продолжать 3—4 дни, увеличивая приемы соли и масла, если больного легко слабило (2—3 раза). Но если и послѣ трехкратнаго повторенія папоротника, соли или масла, не покажется низомъ глиста, то надобно дать больному отдохнуть 2—3 дня, и потомъ опять начать прежнее лечение, не прерывая впрочемъ противуглистной діеты. Если же появится глиста и будетъ выходить не вдругъ, клубкомъ, или пучкомъ, но потянется длинною лентою, то не надобно ее отрывать, а наматывать на палочку, и больного посадить на судно, изъ котораго выходятъ молочные пары, и въ такомъ положеніи его оставить, пока не выйдетъ вся глиста, или она сама не оторвется. Если въ вышедшей глистѣ одинъ ея конецъ бываетъ узокъ (головка глисты), то можно надѣяться, что потомъ выйдетъ и вся глиста при повтореніи леченія, или и при одной противуглистной діетѣ.

Противуглистная діета состоитъ въ употребленіи всего того, что непріятно, вредно для глистъ, и въ избѣжаніи того, что питаетъ, крѣпитъ глисту. Поэтому больные глистами должны ѣсть и пить соленое, горькое, кислое, острое и избѣгать сладкаго, прѣснаго, молочнаго, мяснаго, а именно: ѣсть щи съ квашеною капустою, бураками, селедку, солонину, соленую рыбу, соленые огурцы, хрѣнь, рѣдьку, горчицу, пить квасъ, сыровецъ, пиво, кисляя щи, сокъ лимонный, клюквенный, брусничный, холодную воду по утрамъ натощакъ, горькую воду, особенно полынную; не ѣсть мяса, свѣжей дичи, яицъ, молока, меду, сахару. Эту же діету нужно продолжать и по выходе глистъ, для разрѣшенія и истребленія въ кишкахъ слизи, какъ гнѣзда глистаго; но теперь діету нужно поддерживать мясною пищею, хорошимъ виномъ, горькою водкою, движеніемъ, употребленіемъ желѣзныхъ водъ (пирмонтскихъ, кавказскихъ), желѣзнаго купороса (1—3 грана на приемъ, 2—3 раза въ день). Дѣтямъ, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, давать при ущербѣ луны, цытварное сѣмя въ кашкѣ, а потомъ слабительное изъ ялпцы, 5—10 гранъ на приемъ, или слабительную кашку (№ 72).



## ЖЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Здѣсь будутъ кратко описаны тѣ женскія болѣзни, которыя исключительно свойственны только женщинамъ и потому гнѣздятся въ женскихъ органахъ: маткѣ, яичкахъ, предматочникѣ и грудяхъ. Впрочемъ, особенность устройства женскаго тѣла, приспособленнаго къ главному назначенію женщины—рожденію и кормленію дѣтей, — имѣетъ также вліяніе и на другія болѣзни женщинъ, свойственныя имъ обще съ мужчинами. Важнѣйшія свойства женскаго тѣла суть слѣдующія: 1) Рыхлость, слабость, какъ бы губчатость волоконъ и тканей; отъ этого болѣзни у женщинъ, никогда не выражаются такими сильными, энергическими, бурными припадками, какъ у мужчинъ. 2) Раздражительность мышцъ и чувствительность нервовъ; поэтому женщины болѣе мужчинъ расположены къ судорогамъ и нервнымъ болѣзнямъ, которыя у нихъ часто возникаютъ отъ вліяній, дѣйствующихъ на чувства, душу: отъ взгляда, какого-либо разсказа, испуга и проч. 3) Обильное кровотоеніе, вырабатывающее запасъ крови, достаточный не только для женщины, но и для младенца; поэтому женщины, сравнительно, полнокровнѣе мужчинъ, болѣе расположены къ приливамъ крови и кровотечениямъ, въ числѣ которыхъ мѣсячное кровотеченіе принадлежитъ даже къ натуральнымъ дѣйствіямъ женскаго тѣла. 4) Сочность или плототворительность; по этой причинѣ женское тѣло скоро худѣетъ, но скоро и полнѣетъ; въ немъ легко зараждаются болѣзни матеріальныя, органическія, но также легко исчезаютъ наросты, нарывы, опухоли посредствомъ усиленнаго всасыванія; тѣло женское въ этомъ отношеніи подобно рыхлому, сочному растенію, которое въ сырое, дождливое время года, въ долину, растетъ быстро, въ засуху и на горѣ скоро увядаетъ, и потомъ опять тучнѣетъ при новомъ вліяніи на него сырости. 5) Половые органы имѣютъ главное вліяніе на все женское тѣло; отсюда истерика, какъ болѣзнь сихъ органовъ, легко происходитъ у женщинъ самостоятельно и присоединяется къ другимъ болѣзнямъ. 6) Светливость, подвижность, такъ сказать, вертлявость, что



вмѣстѣ и слабость, внутреннее безсиліе; отъ этого женщина легка, воспріимчива къ впечатлѣніямъ, но скоро устаетъ, теряетъ вкусъ къ любимымъ вещамъ и нарядамъ, и женскія дѣятельныя болѣзни скоро теряютъ свою силу и переходятъ въ слабость. 7) Вообще женское тѣло во многомъ сходствуетъ съ дѣтскимъ, которое также вырабатываетъ соки и кровь вавойнѣ т. е. для питанія самого себя, какъ мужское, и для рашенія, какъ женское для будущаго младенца.

§ 131. Мѣсячное кровоочищеніе. Мѣсячное кровоочищеніе, какъ главное явленіе полнаго развитія женскаго тѣла, имѣетъ важнѣйшее вліяніе на здоровье и болѣзни женщины. О натуральномъ значеніи этого кровоочищенія, его первоначальномъ появленіи у взрослыхъ дѣвицъ и прекращенія у женщинъ, какъ необходимомъ явленіи развитія силы и увяданія женскаго тѣла, было сказано въ гигиеническомъ отдѣлѣ Народной Медицины. Здѣсь мы разсмотримъ кровоочищеніе въ его болѣзненномъ отношеніи.

§ 132. Остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія. Мѣсячное кровоочищеніе дѣлается болѣзненнымъ, когда оно вдругъ, во время теченія крови, прекращается, или же медленно, постепенно останавливается у небеременной женщины; когда очищеніе бываетъ такъ сильно, что превращается въ кровотеченіе, или же и умѣренное, но соединяется съ нарочитыми болями.

Быстрое и внезапное остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія, во время его теченія, происходитъ чаще отъ простуды, особенно живота, промоченія ногъ, отъ физическаго разгоряченія, а потомъ охлажденія тѣла, на пр. если молодыя дамы послѣ танцовъ выходятъ на свѣжій воздухъ, пьютъ холодную воду, легко одѣтыя послѣ бала, долго стоятъ на крыльцѣ, ожидая экипажа, также послѣ бани, теплой ванны, тяжелой работы до усталости и пота; отъ душевнаго потрясенія — испуга, страха, радости, сильной и внезапной горести; отъ погрѣшности въ діетѣ обремененіемъ желудка жирною, трудноваримою пищею, разгоряченіе его виномъ, крѣпкимъ, горячимъ чаемъ.

Признаки. Предшествовавшая причина, послѣ которой



вдругъ приостановилось теченіе мѣсячныхъ кровей, не смотря на то, что оно не продолжалось и половины обыкновеннаго срока (3—6 дней); вслѣдъ за прекращеніемъ мѣсячныхъ кровей, появляются: тяжесть, жаръ и боли въ нижней части живота, полный, скорый, твердый пульсъ, жаръ во всемъ тѣлѣ, жажда, словомъ: лихорадка. Если притомъ остановившаяся мѣсячная кровь бросается къ другимъ органамъ, то появляется колюще, головная боль, тошнота и рвота.

Быстрое остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія есть опасная болѣзнь и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ моложе, крѣпче и полнокровнѣе болѣзная, еще не раждавшая дѣтей, чѣмъ болѣе она расположена къ пострѣлу, чахоткѣ, кровохарканію; у слабыхъ, малокровныхъ, раждавшихъ женщинъ оно не такъ опасно и удобно приходитъ въ прежній порядокъ.

Лѣченіе быстроостановившагося мѣсячнаго очищенія должно быть противовоспалительное. Если болѣзная неполнокровна, уже раждала дѣтей, чувствуетъ только жаръ, легкую боль въ животѣ, то достаточны теплыя припарки къ нижней части живота, впрыскиваніе въ предматочникъ теплаго отвара просвирокъ, льнянаго сѣмени, ячменныхъ крупъ съ молокомъ, мягчительные же клистиры, теплыя обіція и ножныя ванны съ отрубями, сѣнною трухою, внутрь селитра съ бурою (№ 2) или шишучіе порошки (№ 3). Но если женщина полнокровна, еще не раждала дѣтей, имѣетъ сильный жаръ, боль въ животѣ, или трудное, скорое дыханіе, твердый, скорый пульсъ, то надобно прежде пустить кровь и притомъ изъ ноги, или по крайней мѣрѣ поставить около отверстія предматочника 10—20—30 пиявицъ, смотря потому, какъ обильно бываетъ у болѣзной мѣсячное очищеніе, и потомъ употреблять сказанныя средства; во всякомъ случаѣ болѣзная должна оставаться въ постель, или хотя въ теплой комнатѣ, держать ноги въ теплѣ, и не употреблять ничего горячительнаго — крѣпкаго чаю, кофе, вина, пива, мяса, но легкій супъ, молоко, воду, квасъ.

Тихое, медленное остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія, или неоявленіе его въ свое время; здѣсь надобно обращать вниманіе на причину болѣзни и помнить,



что молодыя, незамужнія женщины, бывъ беременными, часто стараются увѣрить, что у нихъ не появляются крови будто бы отъ простуды, испуга и пр. Открыть подобный обманъ очень трудно, и потому въ такомъ случаѣ вообще нужно поступать такъ: пока отъ остановленія мѣсячнаго очищенія не замѣчается никакихъ явныхъ припадковъ, не надобно употреблять никакихъ средствъ для возстановленія мѣсячнаго очищенія по крайней мѣрѣ въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцовъ, со времени его прекращенія. Если же по прошествіи 3—4 мѣсяцовъ, не замѣчается увеличенія брюха, то нужно пригласить повивальную бабку для осмотра больной, а потомъ пригласить и врача, или акушера, которому предоставить и все леченіе болѣзни, но ни въ какомъ случаѣ мы не советуемъ употреблять кровогонныхъ средствъ: сабура, мирры, бальзамовъ, шафрана, можжевельоваго, янтарнаго масла и пр.; эти средства рѣдко возстановляютъ мѣсячное очищеніе, но очень часто разстроиваютъ здоровье, причиняя воспаленіе, боли, поносъ и пр.

§ 133. Кровотеченіе изъ матки. Мѣсячное очищеніе, продолжающееся долго съ испражненіемъ въ значительномъ количествѣ крови, можетъ превратиться въ настоящее кровотеченіе изъ матки, которое, съ другой стороны, можетъ произойти и независимо отъ мѣсячнаго очищенія. Впрочемъ, теченіе крови изъ матки въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе опредѣляется не количествомъ истекшей крови, которое, будучи въ сущности незначительно, можетъ казаться обильнымъ, особенно на чистомъ бѣлѣ женщины, но послѣдствіями потери крови; посему если при мѣсячномъ очищеніи, или при другомъ кровотеченіи изъ матки, больная чувствуетъ общую слабость въ тѣлѣ, шумъ и звонъ въ ушахъ, потемнѣніе въ глазахъ, головокруженіе, наклонность къ обмороку, или и падаетъ въ обморокъ при поднятіи головы; если у больной замѣчается блѣдное, осунувшееся лице, холодныя руки и ноги, холодный, клейкій потъ, слабое медленное дыханіе, біеніе сердца при движеніи, слабый, скорый, прерывистый, перемежный пульсъ, недостатокъ аппетита, грустное, унылое состояніе духа, къ вечеру отекаютъ ноги; если мѣсячное очищеніе продолжается 7—8 дней и болѣе,



или же возвращается очень часто, чрезъ 1—2 недѣли, или, наконецъ, появляется чрезъ двѣ недѣли, или дѣлается даже непрерывнымъ, съ небольшими только перемежками, кровотеченіе останавливается только на 3—7 дней, но потомъ опять возвращается,—то во всѣхъ этихъ случаяхъ кровотеченіе изъ матки есть болѣзнь, которая требуетъ врачебнаго пособія.

Слѣдствіе излишняго маточнаго кровотеченія есть общій слабость, особенно нервовъ, мышцъ, истерика, разныя судороги, худосочіе, дѣвичья блѣдность, наклонность къ водянкѣ, заваламъ внутренностей, сухотка, чахотка.

Причины: тучное, рыхлое, полнокровное тѣлосложеніе, сидячая жизнь, сочная, пріятная, горячительная пища и питье (мясо, дичь, шоколадъ, кофе, вино, водка, пряности), разгоряченное воображеніе романами, картинами, театрами, вольное обращеніе половъ, страстная любовь, частое плотское соитіе, особенно во время теченія мѣсячныхъ кровей, рукоблудіе или онанизмъ, частые роды, грубые пріемы при родахъ бабки, когда она преждевременно отрываетъ послѣдъ руками, танцы до усталости во время мѣсячнаго очищенія, цынготный растворъ крови, ракъ и полипы матки, механическія насилія, дѣйствовавшія на животъ, ушибы, толчки при паденіи, приганьи, верховой ѣзды и пр.

Леченіе. Спокойствіе души и тѣла, положеніе на спинѣ въ постель, удаленіе всѣхъ вышесказанныхъ причинъ; холодныя примочки къ нижней части живота, холодныя ножныя и теплыя ручныя ванны, умѣренная перевязка ногъ на бедрахъ поясомъ, которымъ сжимались бы подкожныя вены, отъ чего замедлится приливъ крови къ брюху; выпрыскиваніе въ предматочникъ отвара ивовой, дубовой, хинной корки, съ квасцами, желѣзнымъ купоросомъ (1—2 драхмы на фунтъ отвара), вкладываніе въ предматочникъ половинокъ сочнаго лимона, губки, напитанной дубовымъ отваромъ съ квасцами; внутрь давать квасцы съ сывороткою (*M* 74), чай съ корицею (золотникъ корицы на чашку чаю), желѣзный купоросъ по 1—2 грана при полнокровіи и волненіи крови (при жарѣ, твердомъ скоромъ пульсѣ, послѣ разгоряченія тѣла, что впрочемъ, встрѣчается рѣдко), кровопусканіе изъ



руки; внутри селитра, кремортартаръ, горькая соль; при цынготномъ расположеніи — противуцынготныя средства. Сильное и тѣмъ болѣе продолжительное кровотеченіе изъ матки, неуступающее сказаннымъ средствамъ въ теченіе 1—2 дней, требуетъ приглашенія врача.

§ 134. Мѣсячное кровоочищеніе съ болью. Признаки: при появленіи мѣсячнаго кровоочищенія появляются и разные припадки: боль головы или зубовъ; стѣсненіе въ груди, обморокъ, тяжесть въ поясницѣ, подъ ложечкою, надъ лобкомъ, тошнота, рвота, поносъ, даже подобіе холеры, судороги, падучая болѣзнь, меланхолія, бредъ, бѣшенство. Припадки сіи бывають чаще предъ появленіемъ мѣсячныхъ кровей и прекращаются, когда покажется кровь на рубашкѣ, но иногда они продолжаются во все теченіе мѣсячнаго очищенія. Слѣдствіемъ этого страданія женщины, ежемѣсячно въ теченіе 8 — 14 дней, бываетъ извуреніе и безплодіе.

Причины. Излишняя чувствительность всего тѣла, или одной матки, изнѣженность и модное воспитаніе, воспрепятствованное развитіе тѣла корсетами, плотнымъ шнурованіемъ; порочное развитіе яичниковъ, матки, особенно зараженіе отверстія матки, раздраженіе и расслабленіе матки рукоблудіемъ, излишество или недостатокъ удовлетворенія плотской похоти, истерика, отвердѣніе и ракъ матки, глисты, завалы брюшныхъ внутренностей, запоры на-низъ и проч.

Леченіе, при первыхъ появленіяхъ труднаго и болѣзненнаго мѣсячнаго кровоочищенія, нужно предоставить врачу, или акушеру, изслѣдовать его причину и назначить приличное леченіе. Особенно же полезны, дѣятельная деревенская жизнь, растиранія живота, купанья въ рѣкѣ и простыя ванны; при запорѣ на-низъ или при испражненіи катышками, промывательныя или слабительное изъ горькой воды, англійской соли, вѣнскаго питья; при наступленіи самыхъ болей — припарки къ животу изъ льнянаго сѣмени съ блѣною, сынной трухи, отрубей, половины, впрыскиванія въ предматочникъ теплаго отвара изъ маковыхъ головокъ, теплаго молока, втираніе въ животъ, въ пахи и въ отверстіе



предматочника деревяннаго, льнянаго масла, настояннаго на листьях бѣлены (№ 32), смягчительные пары изъ молока, отвара просвирокъ, льнянаго сѣмени, направляемые на дѣтородныя части; желѣзныя минеральныя воды: кавказскія, пирмонтскія, дрибургскія.

§ 135. Беременность. О беременности въ ея натуральномъ теченіи, о содержаніи беременныхъ женщинъ и надлежащемъ за ними присмотрѣ, о родахъ, пособіи при родахъ и кормленіи дѣтей, сказано въ «Сохраненіи здоровья»; здѣсь же будутъ рассмотрѣны важнѣйшіе припадки болѣзненной беременности. Эти припадки беременности происходятъ: 1) отъ временнаго, проходящаго полнокрovia беременной женщины; они случаются только въ первые три — четыре мѣсяца, когда оставленная въ тѣлѣ женщины мѣсячная кровь не издерживается еще вся для рашенія зародыша. Малокровныя особы въ эти мѣсяцы беременности не только не страдаютъ отъ полнокрovia, но чувствуютъ себя даже здоровѣе и полнѣе. 2) Отъ раздраженія беременной матки, сообщающагося всѣму тѣлу; 3) отъ расстройства пищеваренія и 4) отъ прижатія, въ послѣдніе мѣсяцы беременности, расширившеюся маткою желудка, кишекъ, печени и даже груди, а также отъ давленія матки на сосуды; отъ послѣдней причины происходятъ запоры на-низъ, безпрестанное побужденіе къ испражненію, или задержаніе мочи, почечуивыя шишки въ заднемъ проходѣ, отѣкъ ногъ и дѣтородныхъ наружныхъ частей и расширение венъ на ногахъ.

Важнѣйшіе и обыкновеннѣйшіе припадки болѣзненной беременности суть слѣдующіе:

1) Полнокровіе. Оно замѣчается въ первые три мѣсяца беременности: беременная чувствуетъ тяжесть и постоянный, либо летучій жаръ въ тѣлѣ, боль въ головѣ, стѣсненіе въ груди, одышку, скорую усталость послѣ движенія, лѣнь и отвращеніе отъ работы; имѣетъ полное, красное, какъ бы припухшее лицо, скорый, полный, твердый пульсъ; мѣсячная крови у нее текла въ большомъ количествѣ въ продолженіе 4—8 дней. Всѣ эти припадки проходятъ сами по себѣ на 4—5 мѣсяцъ беременности. Но если они значи-



тельны, то беременной женщинѣ надобно назначить противувоспалительную діету, много ходить, мало лежать и спать, не есть мяса, не пить кофе, вина, купаться въ рѣкѣ, или принимать холодныя ванны; внутрь принимать селитру съ кремортартаромъ (№ 138), слабительное изъ горькой воды, англійской соли, сыворотки, огуречнаго рассола; пускать кровь, особенно въ первый разъ беременнымъ женщинамъ, нужно только въ крайности, по совѣту врача и притомъ всегда изъ руки и въ лежачемъ положеніи, съ полусогнутыми ногами дабы, предотвратить обморокъ, который очень вредно дѣйствуетъ на зародышъ и располагаетъ къ выкидышу.

2) Боль головы зависитъ отъ прилива къ ней крови; и потому замѣчается при полнокровіи въ первые мѣсяцы беременности и требуетъ того же противувоспалительнаго леченія; особенно полезны: холодныя примочки къ головѣ, горчичники между лопатокъ, или къ затылку, и припускъ пиявицъ къ вискамъ, затылку. Ножныя теплыя ванны и горчичники къ икрамъ вредны: они могутъ причинить выкидышъ.

3) Зубная боль, самый обыкновенный припадокъ, особенно у пѣжныхъ городскихъ женщинъ. Нерѣдко эта боль оканчивается порчею одного зуба, такъ-что женщина съ каждою беременностію лишается одного зуба. Здѣсь полезно то же леченіе, что и при головной боли, особенно припускъ пиявицъ къ деснѣ больного зуба, горчичникъ за ухо, хрѣновникъ на руку, мушку за ухо или на затылокъ и полосканье изъ ромашки съ молокомъ.

4) Тошнота и рвота, самый тягостный припадокъ. Та и другая появляются также въ первую половину беременности, но иногда продолжаются и во всю беременность. Они встрѣчаются у изнѣженныхъ, слабыхъ женщинъ, появляются наичаще по утрамъ и до обѣда, но иногда продолжаются и цѣлый день, и бывають такъ сильны, что всякая съѣденная пища и даже простая вода сейчасъ извергаются рвотою. Легкая тошнота и рѣдкая рвота не опасны, особенно въ первые два мѣсяца; но сильная и частая рвота изнуряетъ беременную и угрожаетъ выкидышемъ осо-



бенно въ 3—4 мѣсяцѣ беременности. Впрочемъ, тошнота и рвота составляютъ первый, хотя и невѣрный признакъ беременности.

Тошнота и рвота зависятъ отъ раздраженія желудка и отъ прилива къ нему мѣсячной крови; поэтому онѣ и прекращаются, когда матка потребуетъ болѣе крови для развивающагося зародыша; но до того времени ихъ излечить невозможно и все леченіе такихъ беременныхъ состоитъ въ успокоеніи сихъ припадковъ и въ сокращеніи ихъ времени продолженія. Если беременная полнокровна, имѣла обильное кровоочищеніе, а теперь имѣетъ полный, твердый пульсъ, головную боль, жаръ и тягость въ тѣлѣ, то, по совѣту врача, нужно ей пустить кровь изъ руки, или приставить къ ложечкѣ нѣсколько пиявицъ (15—20); если она подвержена запорамъ на-низъ, имѣетъ нечистый языкъ, то дать ей легкое слабительное изъ горькой воды, англійской соли и проч. Собственно унимаютъ тошноту и рвоту: пипучіе порошки (№ 3), риверіева смѣсь (№ 2), отваръ кремортарара (кристалльная вода № 1), миндальное, конопляное, маковое молоко съ селитрою (драхма на 4—6 унцій, чрезъ два часа по столовой ложкѣ), сухарь, намоченный въ красномъ винѣ и съѣденный поутру натошакъ съ сахаромъ и порошкомъ корицы, либо мушкатнаго орѣха, втираніе въ ложечку ромашечнаго спирту, мятнаго масла, припарки къ животу съ бѣленою, простые клистиры, ставимые ежедневно 2—3 раза въ день и продолжаемые въ теченіе недѣли и болѣе. Эти клистиры особенно полезны во второй половинѣ беременности, когда въ толстыхъ кишкахъ скопляются нечистоты, поддерживающія рвоту и трудно выводимыя слабительными.

5) Изгага, странный аппетитъ, странное обоняніе. Изгага происходитъ отъ скопленія въ желудкѣ кислоты, и унимается магнезіею, мѣломъ, древеснымъ углемъ, глиною, къ которымъ беременныя, по внутреннему побужденію ихъ натуры, имѣютъ особенный вкусъ, для постороннихъ кажущейся страннымъ; также беременныя часто не могутъ терпѣть обыкновенныхъ пріятныхъ запаховъ и любятъ дурные запахи; это надобно замѣчать и удовлетво-



рять желанію беременной, которая иначе может подвергнуться истерикѣ, обмороку, судорогамъ.

6) Выкидышъ, — когда зародышъ выходитъ изъ матки прежде чѣмъ онъ начнетъ оказывать движеніе. Выкидышъ наичаще происходитъ въ третьемъ мѣсяцѣ беременности; онъ возбъщается болью въ спинѣ, крестцѣ, нижней части живота, опаденіемъ и слабостію грудей, дрожью въ спинѣ и ознобомъ въ всемъ тѣлѣ, чувствомъ напора, давленія въ нижнюю часть живота и въ дѣтородныя части, частымъ позывомъ къ испражненію мочи и кала, истеченіемъ слизи изъ предматочника, кровотеченіемъ изъ матки и наконецъ выходомъ самаго зародыша. Если же беременность уже перешла за вторую половину, то будущій выкидышъ прежде всего начинается прекращеніемъ движеній зародыша.

Выкидышъ происходитъ отъ всего того, что сильно потрясаетъ душу или тѣло беременной и приводитъ кровь въ волненіе; какъ то: отъ испуга, страха, огорченія, неожиданной радости, отъ упаденія, удара или толчка въ животъ, отъ поднятія тяжести, напряженія тѣла при доставаніи чего либо высоко лежащаго, отъ разгоряченія тѣла бѣгомъ, танцами, усиленною ходьбою, особенно по горамъ, отъ простуды, наипаче ногъ, холодныхъ обливаній, частаго сонтія, лихорадки, воспаленія, невоздержности въ пищу, запора на-низъ. Слѣдствіемъ выкидыша, кромѣ смерти зародыша, бываютъ: опасное кровотеченіе изъ матки, воспаленіе матки, ея слабость и расположеніе въ послѣдствіи къ новымъ выкидышамъ. Если въ первый разъ беременная женщина выкинетъ зародышъ, то часто случается, что въ послѣдствіи она, не смотря на всѣ предосторожности, все-таки выкидываетъ его и притомъ въ одинъ и тотъ же мѣсяцъ.

Предупрежденіе выкидыша требуетъ совершеннаго спокойствія душевнаго и тѣлеснаго. Женщина, уже выкидывавшая, при появленіи сказанныхъ припадковъ, должна лежать въ постелѣ на спинѣ до тѣхъ поръ, пока не прекратятся припадки, т. е. 1—2—4 недѣли. Если женщина полнокровна, то кровопусканіе изъ руки, или припущеніе



пйавиць 10 — 20 къ грудямъ, внутрь кремортартаръ съ селитрою (№ 5); при обремененіи желудка и запорахъ — слабительное изъ англійской соли, горькой воды, деревяннаго, льнянаго масла; клистиры; омовеніе живота и крестца ромашечнымъ спиртомъ, а при боляхъ — легкое втираніе въ животъ масла бѣлены.

Женщины, неоднократно выкидывавшія и получившія болѣзненное къ тому расположеніе и слабость матки, могутъ иногда избавиться отъ этого несчастія и благополучно раждать, если онѣ, небеременные, будутъ употреблять внутрь и снаружы пирмонтскія, кавказскія желѣзныя воды, и потомъ, во время беременности, соблюдать строжайшее спокойствіе духа и тѣла.

7) Судороги беременныхъ происходятъ или въ послѣдніе два мѣсяца беременности, или при появленіи родовыхъ потугъ, т. е. въ началѣ самыхъ родовъ, и сопровождаются безпамятствомъ, сонливостью и потому легко переходятъ въ настоящій пострѣлъ. Эти судороги случаются у полнокровныхъ, молодыхъ женщинъ, и зависятъ отъ прилива крови къ мозгу, отъ пренебреженнаго кровоупусканія, отъ сильнаго потрясенія тѣла, или духа беременной, отъ тяжелыхъ родовъ, неправильнаго положенія младенца въ маткѣ.

Леченіе. Немедленно нужно пригласить акушера, или врача, или по крайней мѣрѣ ученую повивальную бабку, при недостаткѣ которыхъ, женщинъ полнокровной нужно пустить изъ руки кровь, дать слабительное изъ горькой соли, дѣлать къ головѣ холодныя примочки, поставить горчичники къ затылку, плечамъ. Если судороги съ безпамятствомъ произошли при родахъ, то пособіе акушера необходимо, для исправленія неправильнаго положенія младенца въ маткѣ и ускоренія родовъ.

§ 136. Роды и родильница. О натуральномъ ходѣ и родовъ и попеченіи о родильницѣ сказано въ «Сохраненіи здоровья». Здѣсь мы упомянемъ только объ условіяхъ родильницы, подвергающихъ ее болѣзнямъ, и предложимъ простыя противъ того мѣры.

Нигдѣ такъ могущественно и явно не оказывается благо-



дѣтельное вліяніе цѣлительной силы женскаго тѣла на сохраненіе его отъ множества болѣзней и на возстановленіе прежняго порядка въ женскомъ тѣлѣ, какъ послѣ родовъ: всѣ перевороты, происходяшіе теперь въ тѣлѣ, производятся мудрою природою съ удивительнымъ искусствомъ и точностію. Не смотря однако на то, роженицы подвергаются болѣзнямъ, возникающимъ изъ особеннаго ихъ положенія отъ слѣдующихъ причинъ:

1) Отъ полнокрovia въ брюхѣ: беременная матка требовала много крови для питанія зародыша; съ рожденіемъ дитяти этотъ запасъ крови остается безъ употребленія, а между тѣмъ кровь продолжаетъ пока еще притекать къ маткѣ и брюшнымъ внутренностямъ въ большомъ количествѣ, потому что опорожнившаяся матка, не прижимаетъ болѣе брюшныхъ кровяныхъ сосудовъ и не удерживаетъ напора крови.

2) Отъ избытка пластической, плототворной, растящей силы и матеріи въ крови, которая у беременной женщины находится въ высшей степени собственно для успешнаго рашенія и развитія зародыша; эта сочность, питательность крови беременной женщины, по рожденіи дитяти, также вдругъ дѣлается ненужною и располагаетъ женщину къ воспаленію.

3) Отъ измѣненія кровообращенія: кровь у беременной женщины въ большомъ количествѣ приливалась книзу, къ брюху; но послѣ родовъ она устремляется кверху, къ грудямъ для приготовленія молока.

4) Отъ скопленія нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ: въ первые мѣсяцы разстройство пищеваренія, а въ послѣдніе увеличившаяся въ объемъ матка, скопляютъ нечистоты, мѣшая свободному ихъ испражненію; съ рожденіемъ младенца, внутренности приходятъ въ прежній свой порядокъ и выгоняютъ эти нечистоты, или они остаются въ кишкахъ, ослабѣвшихъ отъ продолжительнаго и сильнаго прижатія ихъ маткою; и наконецъ,

5) Отъ насильственнаго, ушибеннаго состоянія матки, которая, послѣ сильныхъ и продолжительныхъ сжатій, бываетъ какъ бы избитою, смятою, раненною, словомъ, по-



терпѣвшею насиліе, и потому, подобно всякой ушибенной части, расположена къ воспаленію, которое, при пластичности крови, легко и скоро оканчивается выпотѣніемъ пластической пасоки, водянистымъ нагноеніемъ.

Не смотря однако на такое опасное, сложное и сомнительное состояніе роженицы, мудрая природа приводитъ тѣло ея въ прежнее небеременное состояніе двумя простыми, но вѣрными средствами: отдѣленіемъ послѣродоваго очищенія и молока; первое выводитъ изъ больной сочной матки излишество соковъ, отчего она постепенно уменьшается до груши—плода и дѣлается по прежнему твердою, а на отдѣленіе молока издерживаются мѣсячныя крови, которыя во все время кормленія младенца грудью приливаются уже не къ маткѣ, но къ женскимъ грудямъ. За тѣмъ помня, что положеніе роженицы есть неболезненное, но естественное состояніе, кромѣ сказаннаго объ этомъ въ другомъ мѣстѣ, нужно наблюдать слѣдующее:

- 1) Первые шесть недѣль, нѣжныя женщины, особенно городскія, должны быть очень осторожны въ образѣ жизни; зимою не выходить на дворъ, а первые девять дней оставаться въ постель: во всѣ эти шесть недѣль роженица легко подвергается болѣзнямъ, ибо ея матка и груди, да и все тѣло еще не пришло въ то состояніе, въ какомъ они были до беременности.
- 2) Первые трое сутокъ надобно строго смотрѣть за роженицею, чтобы у ней не появилось кровотеченіе изъ матки, особенно во снѣ, въ которомъ женщина, утомленная родовыми потугами, проводитъ большую часть времени, первыхъ 2 — 3 дней.
- 3) Въ первые двѣ недѣли роженица должна избѣгать простуды, обремененія желудка, возмущенія духа, тѣлеснаго безпокойства; она должна оставаться въ постель для предотвращенія выпаденія матки, задержанія мочи, кровотеченія изъ матки, родильной лихорадки.
- 4) Легкая, малопитательная пища, особенно въ первые семь дней послѣ родовъ: овсяный супъ, уха, каша, легкій мясной бульонъ.
- 5) Умѣренная теплота комнаты, постель не мягкая, чистый воздухъ, опрятность, тишина, полутемнота въ комнату.
- 6) Очищеніе желудка и кишокъ нужно для каждой



роженицы: это вѣриѣе всего предотвращаетъ родильную лихорадку. Это очищеніе въ первые три дня послѣ родовъ нужно производить клистирами, а на 4—5 день дать слабительное изъ кастороваго масла, или изъ отвара тамариндъ съ манною (№ 6). 7) Но если роженица не можетъ или не хотѣтъ сама кормить младенца грудью, то строгую діету нужно продолжать, пока совсѣмъ не опадутъ груди т. е. 1 — 2 недѣли, и почаще принимать слабительное. Эти же мѣры еще необходимы для роженицы, начавшей и потомъ скоро принужденной отказаться отъ кормленія дитяти, дабы предотвратить скопленіе молока, опухоль, воспаленіе и нарывы въ грудяхъ.

Если роженица сама не можетъ или не хотѣтъ кормить, то нужно стараться уменьшить отдѣленіе молока. Конечно, здѣсь вѣрнѣйшее средство состоятъ въ поступкѣ самой роженицы, которая, не давая дитяти сосать грудь, тѣмъ самымъ останавливаетъ и отдѣленіе молока въ грудяхъ. Но если молоко продолжаетъ отдѣляться, то оно скопывается въ грудяхъ, ссыдается, производитъ опухоли и нарывы, часто очень большіе; такія груди, по заживленіи нарывовъ, часто навсегда теряютъ способность отдѣлять молоко и питать младенца, ибо съ зарощеніемъ язвъ послѣ нарывовъ, зарастаютъ и млечные каналы, чрезъ которые истекало молоко изъ грудей. Для прекращенія отдѣленія молока въ грудяхъ нужно уменьшить приливъ крови къ грудямъ, отвлекать ее къ другимъ частямъ и разрѣшать скопившееся въ грудяхъ молоко. Для этого лучшія средства суть: покрытіе грудей хлопчатой бумагою, окуренною янтарею, или смолою, легкое прижатіе грудей широкою повязкою, косынкою, полотенцемъ, высасываніе скопившагося въ грудяхъ молока, тощая, почти голодная діета, частое употребленіе слабительныхъ изъ горькой воды, англійской соли, огуречнаго разсола, и особенно сѣрниокислый поташъ (*tartarus vitriolatus* по полуунціи въ сутки въ 3—4 приѣма).

Но если, не смотря на все это, груди пухнуть, крѣпнуть, рдѣютъ, болятъ (грудница), то къ окружности ихъ нужно припустить 15 — 20 — 30 пиявицъ, и потомъ днемъ употреблять смягчительныя припарки изъ бѣлаго хлѣба съ мо-



локомъ, льнянаго сѣмени, гречневой каши, свѣжаго, теплаго коровьяго кала (для крестьянокъ); а на ночь покрывать ихъ спускомъ, медовою лепешкою, денниковымъ (мелиотнымъ) пластыремъ; почаще высасывать молоко, особенно послѣ припуска къ грудямъ паровъ изъ молока.

Въ началѣ кормленія грудью, особенно у первородившихъ женщинъ, грудные соски саднѣютъ, трескаются при каждомъ кормленіи дитяти грудью, причиняютъ жестокія боли; такіе соски нужно намазывать чистымъ спускомъ, густыми сливками, миндальнымъ, кокосовымъ масломъ чистымъ, или съ цинковыми цвѣтами известковою мазью (№ 143), порошкомъ изъ аравійской, вишневой камеди съ водою.

§ 137. Родильная лихорадка. У роженицъ, какъ у всѣхъ людей, могутъ появляться разныя болѣзни—лихорадка, воспаленія; но у нихъ, сверхъ того, встрѣчается особенная, имъ только свойственная, родильная лихорадка, которая начинается сильною болью и вздутіемъ живота; оба эти припадка возрастаютъ до того, что больная не терпитъ ни малѣйшаго прикосновенія къ животу, напряженному какъ барабанъ; но еще до появленія боли, у роженицы замѣчается усталость, уныніе духа, грусть, жаръ въ тѣлѣ, сильная жажда, очень скорый пульсъ, поносъ съ частымъ жиленіемъ или натугами, тошнота, рвота, нечистый языкъ, головная боль и проч.

Ходъ болѣзни очень быстрый: чрезъ 2—4 дня можетъ послѣдовать смерть. Болѣзнь оканчивается выздоровленіемъ, или же бросается на другія части и производитъ просовидную сыпь, воспаленіе въ мозгъ, молочные нарывы, блѣдный отекъ. Въ трупахъ роженицъ находятъ воспаленіе и помертвѣніе брюшины, кишекъ, матки, обильное изліяніе въ брюхъ бѣлой жидкости, похожей на молоко.

Причины. Болѣзнь состоитъ въ воспаленіи то брюшины, матки, кишекъ, то всѣхъ ихъ вмѣстѣ. Это воспаленіе имѣетъ особенную склонность производить скорое и обильное отдѣленіе молочной жидкости въ брюшной полости; оно исключительно свойственно роженицамъ и зависитъ отъ сочнаго, пластическаго, молочнаго состоянія ихъ крови, отъ полнокровія въ брюхъ, ослабленія брюшныхъ внутренностей



чрезъ продолжительное прижатіе ихъ беременною маткою, отъ сжатій матки во время родовъ, и ушибеннаго, какъ бы избитаго, насильственного ея состоянія послѣ родовъ. Происхожденію сего воспаления способствуютъ: прекращеніе отдѣленія молока въ грудяхъ, или послѣродового очищенія матки, гнѣвъ, испугъ, радость, тяжелые мучительные роды, неосторожные приемы бабки, искусственные роды, поворотомъ младенца, — шипцами, насильственное отдѣленіе дѣтскаго мѣста или послѣда руками, обремененіе желудка пищею, разгоряченіе тѣла напитками — виномъ для мнимаго укрѣпленія роженицы, кофе; запоры на-низъ и скопленіе въ кишкахъ нечистотъ. Иногда оно появляется повально разомъ у многихъ роженицъ, и въ родильныхъ домахъ можетъ сдѣлаться даже заразительнымъ.

Лечение двойное: предохранительное и настоящее; первое очень важно и дѣйствительно. Оно состоитъ: 1) въ достаточномъ движеніи женщины въ послѣдніе мѣсяцы беременности; 2) въ ежедневномъ испражненіи низомъ посредствомъ слабительной каши (electuar lenitivum № 72 по чайной ложкѣ), или клистировъ; 3) для молодыхъ и полнокровныхъ женщинъ въ кровопусканіи, по совѣту врача; 4) въ кормленіи грудью младенца, по крайней мѣрѣ первыя двѣ-три недѣли; 5) въ положеніи роженицы въ постель въ теченіе первыхъ 9 — 14 дней послѣ родовъ; 6) въ употребленіи легкой, жидкой, растительной пищи, въ остороженіи отъ простуды, разгоряченія тѣла, волненія духа и наконецъ, если роженица сама не кормитъ дитяти; 7) въ ежедневномъ приѣмѣ сѣрнокислаго поташа, такъ, чтобы каждый день роженица имѣла 1 — 2 жидкія испражненія низомъ.

Настоящее, коренное лечение родильной лихорадки нужно предоставить врачу или акушеру; но если нѣтъ ни того, ни другаго, то, при первомъ появленіи боли въ животѣ и лихорадки въ тѣлѣ роженицы, нужно стараться о свободномъ испражненіи низомъ и объ усиленномъ отдѣленіи молока въ грудяхъ, и для того роженицъ надобно давать слабительное изъ англійской соли, ставить клистиры, заставлять ее почаще кормить дитя грудью, прикладывать къ



грудямъ мягчительныя припарки, прикладывать сухіе рожки. Если уменьшилось или совсѣмъ остановилось послѣродовое очищеніе, то впрыскиванье въ предматочникъ теплой воды, молока, отвара просвинокъ или льняныхъ сѣмянъ; при явныхъ признакахъ обремененія желудка и нечистотъ въ кишкахъ — дать рвотное изъ рвотнаго камня (№ 10 б). Если боли въ животѣ усиливаются, животъ напрягается и не терпитъ никакого прикосновенія, то пустить кровь, приставить къ животу пиявицы, поставить на него кровесосныя банки, прикладывать къ животу мягчительныя припарки съ листьями бѣлены, маковыми головками, втирать въ животъ масло, настоящее на листьяхъ бѣлены и съ камforoю (3 унц. камфоры на унцію масла), вообще поступать какъ при воспаленіи брюшины и кишекъ. Если гдѣ либо снаружи послѣдуетъ переносъ молока, т. е. появится блѣдная обширная опухоль, то нужно способствовать ея прорыву мягчительными горячими припарками, медовою лепешкою, даже горчичниками на опухоль.

§ 138. Бѣлая опухоль роженицъ. Признаки: блѣдная, бѣлая, обширная, неограниченная опухоль, похожая какъ бы на отѣкъ; занимаетъ верхнюю часть бедра, сильно болить, простирается до дѣтородныхъ частей, возбуждаетъ въ роженицъ лихорадку, появляется въ первыя двѣ недѣли послѣ родовъ, продолжается 7 — 14 дней и оканчивается помертвѣніемъ, или молочнымъ нарывомъ—переносомъ молока.

Эта опухоль въ сущности сходствуетъ съ родильною лихорадкою, съ тою только разностию, что при лихорадкѣ воспаление поражаетъ брюшныя внутреннія, а при опухоли — наружныя части т. е. кромѣ бедра, — плечи, груди, голень, шею и проч. Впрочемъ, воспаление при бѣлой опухоли поражаетъ клетчатку, пасочные (всасывающіе) сосуды, причиняетъ выпотѣніе пасоки, отложеніе въ клетчатку молока. Это опухоль происходитъ почти отъ тѣхъ же причинъ, что и родильная лихорадка, а именно отъ давленія беременной матки на бедра, отъ прекращенія отдѣленія молока въ грудяхъ, или послѣродоваго очищенія изъ матки, отъ простуды, душевнаго и тѣлеснаго безпокойства, скопленія не-



чистотѣ въ кишкахъ, обремененія желудка. Смерть происходитъ отъ распространенія воспаленія на внутреннія части отъ помертвѣнія, изнуренія чрезъ обширное нагноеніе и нарывы.

Леченіе состоитъ въ скоромъ разрѣшеніи воспаленія припускомъ пѣвицъ къ бедрамъ и пахамъ, положеніемъ на опухоль испанской мушки, ароматныхъ травяныхъ мѣшечковъ съ камforoю, а при сильныхъ боляхъ—мягчительныхъ припарокъ съ бѣленою и свинцовою водою; при опасности болѣзни приглашеніе врача необходимо.

§ 139. Теченіе молока изъ груди. Остановленіе отдѣленія, или переносъ молока на другое мѣсто, бываетъ причиною, какъ сказано уже, разныхъ болѣзней, какъ-то: грудницы, нарывовъ въ грудяхъ и неспособности груди въ послѣдствіи къ кормленію младенца, родильной лихорадки, или воспаленія въ брюхѣ, либо мозга, бѣлой опухоли или переноса молока на части наружныя и воспаленія ихъ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ положеніе роженицы опасно и приглашеніе врача и даже акушера необходимо.

Но случается иногда, что молоко или отдѣляется въ большомъ количествѣ во время кормленія дитяти грудью, или же оно продолжаетъ отдѣляться и по отлученіи младенца отъ груди. Первый случай замѣчается у роженицъ-кормилицъ молодыхъ, здоровыхъ, полнокровныхъ, въ первыя недѣли кормленія дитяти грудью и потомъ самъ по себѣ проходитъ. Впрочемъ, здѣсь полезны: умѣренная діета для кормилицы, движеніе или работа, изрѣдка слабительное изъ горькой, либо англійской соли, подкладываніи подъ груди губки, полотенца, салфетки, опрятное содержаніе груди, чтобы онѣ не попрѣли отъ текущаго по нимъ молока.

Второй случай: теченіе молока изъ груди по отлученіи младенца, кромѣ неопытности, можетъ причинить слабость и изнуреніе тѣла; оно замѣчается послѣ продолжительнаго кормленія дитяти грудью, которая отъ того слишкомъ привыкаетъ къ отдѣленію молока, или отъ запоздлагаго появленія мѣсячнаго очищенія. Здѣсь полезны: умѣренное прижатіе груди приличною повязкою, ношеніе на



грудяхъ и подъ мышками толченой моркови и наконецъ возстановленіе мѣсячнаго кровоочищенія по совѣту врача.

§ 140. Скудное, недостаточное отдѣленіе молока. Признаки: небольшія, неполныя, слабкія груди, ненаполняющіяся даже и тогда, когда младенецъ не сосалъ ихъ въ теченіе 4—8 часовъ; малые, морщиноватые, въ груди погружившіеся соски; отъ давленія грудей въ направленіи къ соскамъ или совсѣмъ не показывается молоко, или же только въ маломъ количествѣ, не смотря на то, что младенецъ не сосалъ груди уже 3—6 часовъ; дитя такой кормилицы часто плачетъ, шевелить губками, худѣетъ, съ жадностію сосетъ молочный рожокъ, глотаетъ молоко.

Причины. Слабое, тощее, малосочное тѣлосложеніе, чахотное расположеніе роженицы, значительная потеря крови во время и послѣ родовъ, обильное послѣродовое очищеніе, появленіе мѣсячныхъ кровей, или соитіе во время кормленія грудью и новая беременность, болѣзни роженицы, особенно кровохарканіе, чахотка, водянка, завалы внутренностей, скудная, недостаточная пища, сырая, тѣсная, неопрятная квартира, тяжкая работа, душевныя огорченія и безпокойство, дряблыя, малыя груди, отвердѣнія грудей и рубцы въ нихъ послѣ бывшихъ нарывовъ, ракъ матки и пр. Вообще недостаточное отдѣленіе молока замѣчается у женщинъ городскихъ, богатыхъ, изнѣженныхъ моднымъ воспитаніемъ, у которыхъ развитіе тѣла и грудей было остановлено корсетами, тѣснымъ шнурованьемъ.

Леченіе. Здѣсь необходимо приглашеніе врача или акушера, для опредѣленія причины скуднаго отдѣленія молока и принятія нужныхъ противъ онаго мѣръ. При недостаткѣ врача и настоятельномъ желаніи матери — самой кормить своего младенца, — нужно доставить ей свѣжую, сочную, питательную пищу: яйца, молоко, говядину, дичь, хорошее вино, горькое пиво, портеръ, чистую, просторную квартиру, пріятныя занятія, движеніе на воздухѣ, ванны, купанье; ежедневно по нѣсколько разъ слегка мять и растирать груди, покрывать ихъ ароматными мѣшечками, заячьимъ, кроличьимъ мѣхомъ, хлопчатой бумагою, окуривать ладаномъ, простою смолою, и въ видѣ порошка или чая употреблять



ежедневно съмена укропа (*semen foeniculi*) по 10—20 гранъ 2—3 раза въ день, или же укропное масло съ сахаромъ по 1—2 капли.

§ 141. Бѣли. Признаки: истеченіе изъ предматочника слизи бѣлой, желтой, зеленой, водяной, жидкой или густой, гнойной, мягкой, жирной, какъ бы масляной, или острой, ѣдкой; оно или постоянно продолжается, или же только нѣсколько дней предъ появленіемъ и послѣ прекращенія мѣсячнаго кровоочищенія. Количество истекающей слизи различно: въ теченіе сутокъ замѣчается на рубашкѣ то нѣсколько небольшихъ пятенъ, то весь подолъ рубашки бываетъ въ обширныхъ пятнахъ и даже промокаетъ верхнее платье; въ послѣднемъ случаѣ, особенно если притомъ бѣли продолжительны, онѣ вредно дѣйствуютъ на все тѣло, уничтожаютъ свѣжесть и причиняютъ блѣдность лица, исхуданіе тѣла, слабость, лѣнь, усталость, истерику, расстройство пищеваренія. Посему у слабыхъ, блѣдныхъ, застенчивыхъ женщинъ, и особенно дѣвицъ, нужно обращать вниманіе на бѣли, которыя онѣ часто утаиваютъ; изслѣдованіе повивальной бабкою и даже акушеромъ бѣлья, предматочника и матки еще необходимѣе, когда бѣли ѣдки, зеленны, водянисты, вонючи, кровянисты, когда въ жидкости замѣчаются какъ бы маковыя зернышки или горошины, а въ нижней части живота—сильныя, колющія, жгущія, стреляющія боли: такія бѣли часто означаютъ ракъ въ маткѣ.

Причины. Бѣли чаще замѣчаются между изнѣженными, богатыми, городскими женщинами и зависятъ отъ образа жизни и воспитанія; у крестьянокъ онѣ рѣдко встрѣчаются. Бѣли зависятъ отъ раздраженія и слабости предматочника или и матки; раздраженіе же и слабость происходятъ отъ сядячей жизни, роскошной, жирной, сочной, пряной, горячительной пищи и напитковъ, мяса, дичи, рыбы, молока, яицъ, масла, сыра, кофе, шеколада, особенно съ ванилью, теплаго чая; далѣе располагаютъ къ бѣлямъ: влажный климатъ, болотистая мѣстность, сырая, холодная квартира, легкое одѣяніе въ холодное время; частые, особенно трудные роды, дурная привычка у торговыхъ держать между ногами горшокъ съ горячими углями,



частое соитіе, возбужденіе плотской похоти романами, вольнымъ обращеніемъ съ мужчинами, танцами, театральными зрѣлищами, безнравственными картинами, рукоблудіемъ; острота крови любострастная, ревматическая, чесоточная, золотушная, почечуйная; неправильное появленіе или и совершенное прекращеніе мѣсячныхъ кровей, нечистоты въ кишкахъ, глисты; отвердѣнія, наклоненіе матки въ сторону или ея выпаденіе, наросты, ракъ въ маткѣ; дряблѣе, рыхлѣе, тучное тѣлосложеніе. Бѣли чаще встрѣчаются у бѣлокурыхъ, чѣмъ у темноволосыхъ женщинъ.

Бѣли вообще излечиваются трудно и продолжаются долго; но тѣ изъ нихъ, кои предшествуютъ первому появленію мѣсячныхъ кровей, съ появленіемъ послѣднихъ проходятъ. Упорныя и опасныя бѣли, появляющіяся у малолѣтнихъ, еще неполнѣе развившихся дѣвицъ, наследственныя, зависящія отъ образа жизни, воспитанія, тѣлосложенія, сопровождающія каждое мѣсячное очищеніе, — такія бѣли почти неизлечимы, причиняютъ изнуреніе тѣла и располагаютъ къ раку матки.

Леченіе. Прежде всего надобно удалить причины, или ограничить ихъ дѣйствіе. Умѣреннѣе теплое одѣяніе, движеніе; дѣятельная жизнь, своевременный, непродолжительный сонъ; строгое наблюденіе за дѣвицами въ физическомъ и нравственномъ отношеніи; приличная, нежирная, свѣжая, умѣренная пища; запрещеніе теплаго, горячительнаго питья (чаю, кофе, шоколада); сухая квартира, на гористомъ, песчаномъ мѣстѣ, вдали отъ болотъ; принятіе врачебныхъ мѣръ противъ сказанныхъ болѣзненныхъ остротъ крови, удаленіе кишечныхъ нечистотъ, глистъ, восстановленіе правильного мѣсячнаго кровоочищенія, изслѣдованіе предматочника и матки. Посему предъ началомъ леченія къ одержимымъ бѣлями нужно пригласить бабу, лекаря или акушера.

Внутри полезны при бѣляхъ ревенъ съ магнезіею или раковыми жерновками, желѣзный купоросъ по 2 — 3 грана по утру и ввечеру, или желѣзная минеральная вода: кавказская, пирмонтская, эгерская, дрибургская, долго употребляемая ежедневно по стакану и болѣе по утрамъ. Снаружи



ежедневное обмываніе и впрыскиваніе въ предматочникъ холодной, известковой, чайной воды, раствора квасцовъ, желѣзнаго купороса, также вкладываніе на ночь въ предматочникъ куска губки, намоченной въ крѣпкомъ чайномъ настое, отваръ дубовой, хинной коры, корня аира; окуриваніе предматочника простою смолою, ладаномъ, можжевельными ягодами, сосновыми молодыми шишками; купанье въ холодной водѣ, въ морѣ, холодныя ванны съ желѣзнымъ купоросомъ (2—3 унціи на ванну) отваромъ дубовой коры.

§ 142. Выпаденіе матки. Признаки: въ нижней и передней части живота поющая, стрѣляющая по временамъ боль, которая отзывается въ ляшкахъ и заднемъ проходѣ; чувство давленія и тяжести какъ бы чего-то посторонняго въ животѣ и въ предматочникѣ; частое побужденіе къ испражненію мочи, которая истекаетъ съ рѣзью и прерывисто; чувство давленія въ заднемъ проходѣ съ запоромъ на низъ; шаткая, нетвердая походка, раздвинувшіяся ноги и невозможность ихъ сблизить между собою; введеннымъ въ предматочникъ пальцемъ ошупывается опухоль (опустившаяся книзу матка), которая, при положеніи больной на спину и давленіи ея пальцемъ, подается кверху, причемъ и всѣ припадки уменьшаются.—Иногда матка опускается такъ низко, что, при раздвинутыхъ ляшкахъ, ее можно видѣть глазами; отъ прикосновенія воздуха поверхность матки высыхаетъ и превращается какъ бы въ кожу. Выпаденіе матки хотя и не опасно, но безпокойно, легко возвращается при малѣйшемъ къ тому поводѣ, разстраиваетъ правильное появленіе мѣсячныхъ кровей и можетъ быть причиною бѣлей, отвердѣнія и рака матки.

Причины. Выпаденіе матки происходитъ, когда ея боковыя связки растянутся, удлиннятся, ослабѣютъ, и притомъ вдругъ отъ всякаго сильнаго сотрясенія и напряженія тѣла: при паденіи, прыжкѣ, бѣгѣ, танцахъ, ударѣ въ животъ, отъ напряженія тѣла, сильнаго сжатія брюшныхъ мышцъ для поднятія чего-либо высоколежащаго, отъ наклоненія кпереди и перегиба тѣла кзади, отъ поднятія и ношенія большихъ тяжестей: во всѣхъ этихъ случаяхъ матка вдругъ



опускается книзу или наклоняется въ сторону, причемъ женщина чувствуетъ боль и что-то опустившееся въ брюхъ. Или же матка опускается и выпадаетъ медленно отъ частаго повторенія этихъ же причинъ, но не такъ сильно дѣйствовавшихъ, отъ ослабленія матки послѣ родовъ, особенно трудныхъ, разрывившихся двойнями, тройнями, отъ продолжительныхъ бѣлей, скопленія нечистотъ въ кишкахъ, отъ запоровъ на-низъ, задержанія мочи, рукоблудія, держанія между ногами горшковъ съ горящими угольями, также у женщинъ блондинокъ, рыхлыхъ, полнокровныхъ, тучныхъ, одержимыхъ водяною въ животѣ.

Леченіе. Главное дѣло состоитъ въ возвращеніи, поднятіи матки на ея мѣсто и въ удержаніи ея въ семъ положеніи; а лучшее для этого средство есть приличное положеніе: женщина должна лечь въ постель на спинъ, подложивъ подъ крестецъ подушку, такъ, чтобы онъ лежалъ нѣсколько выше спины, а ноги были согнуты въ коленныхъ и немного раздвинуты; въ такомъ положеніи матка часто сама по себѣ поднимается кверху на свое мѣсто; если же этого не бываетъ, то нужно пригласить бабу, или акушера, при недостаткѣ которыхъ, женщина съ длинными и тонкими пальцами, или сама больная, вводитъ въ предматочникъ указательный и средній пальцы и кверху и кзади отталкиваетъ ими опустившуюся матку; причемъ припадки опаденія матки вдругъ уменьшаются или и совсѣмъ проходятъ; послѣ сего животъ довольно плотно подвязывается широкимъ бинтомъ или полотенцемъ такъ, чтобы давленіе бинта происходило снизу кверху, больной ставится простой клистирь и она остается въ постель на спинъ 1—3 недѣли и потомъ, вставъ съ постели, еще долго повязываетъ животъ широкимъ поясомъ и остерегается всего того, что можетъ возобновить выпаденіе матки (см. выше причины). Увиваніе бинтомъ живота и лежаніе въ постель на спинъ должно продолжаться еще долѣе, когда опустившейся матки нельзя было вернуть пальцами въ ея мѣсто въ первые дни. Для предотвращенія новаго выпаденія матки употребляются маточныя кольца, которыхъ введеніе и положеніе въ предматочникъ нужно предоставить врачу, акушеру,



или по крайней мѣрѣ ученой бабкѣ. Если, при быстромъ выпаденіи матки, появится сильная боль и жаръ въ предматочникѣ, то нужно къ пахамъ прилечь нѣсколько пивуцъ (10—20), животъ натереть льнянымъ, деревяннымъ масломъ и даже приложить нѣсколько мягчительныхъ припарокъ.

§ 143. Бесплодіе бываетъ двоякое: натуральное и болѣзненное. Первое наступаетъ въ критическомъ періодѣ женщины между 45 и 50 годами, когда у нея прекращается мѣсячное кровоочищеніе и когда она, такъ сказать, уже выплодилась и сама увядаетъ; впрочемъ, у насъ и 60 лѣтнія женщины иногда рождаютъ. Болѣзненное бесплодіе можетъ постигнуть женщину взрослую съ перваго появленія и до прекращенія мѣсячныхъ кровей. Мѣстныхъ физическіхъ причины этого бесплодія заключаются найчае въ маткѣ; но общее, нравственное бесплодіе можетъ завистъ отъ жены или мужа. Физическія причины суть: отвердѣніе женскихъ яичниковъ; заросеніе трубокъ, чрезъ которыя сѣменная жидкость изъ яичниковъ протекаетъ въ матку; недостатокъ мѣсячнаго кровоочищенія, или же непомѣрное теченіе онаго; отвердѣніе, ракъ матки, судорожное сжатіе, узкость предматочника, несоответствующаго величинѣ мужскаго ствола, грубое, слишкомъ частое совокупленіе: публичныя женщины вообще бываютъ бесплодны; холодное, флегматическое, или страстное, раздражительное тѣлосложеніе: холодныя или очень страстные молодые супруги, рѣдко рождаютъ дѣтей. Последнія причины бываютъ временны, относительны и потому проходятъ: публичныя женщины, вышедшія за-мужъ, страстные супруги, охладѣвшія со временемъ, а холодныя, сдружившіяся въ послѣдствіи, дѣлаются плодородными. Душевно или тѣлесно разстроенная женщина, сдѣлавшись спокойною тѣломъ и духомъ, дѣлается и плодородною.

Леченіе требуетъ предварительнаго открытія и удаленія причины бесплодія, и какъ то и другое соединено съ значительною трудностью и можетъ быть исполнено только опытнымъ и внимательнымъ врачомъ, то бесплодныя женщины должны искать пособія только у извѣстныхъ акушеровъ



или медиковъ. Мужъ, исполняющій свою обязанность супру-  
га, безъ сомнѣнія, способенъ и къ плодородію; о муж-  
скомъ безсиліи сказано уже прежде; слѣдственно при доб-  
ромъ согласіи супруговъ, легко определить, кто изъ нихъ  
бесплоденъ. Если у женщины нельзя открыть никакой яв-  
ной причины безплодія, то послѣднее можетъ зависеть отъ  
слабости и бездѣйствія матки, и въ семъ отношеніи дѣйст-  
вительнѣйшее средство есть желѣзо и желѣзныя минераль-  
ныя воды: кавказскія, собственно желѣзныя и нардзанъ,  
пирмонтскія, элерскія, а для пожилыхъ, слабыхъ женщинъ  
эмскія воды; эти, по совету врачей, можно употреблять  
внутри въ видѣ питья стаканами, и снаружи въ ваннахъ.



## ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Лечение дѣтскихъ болѣзней имѣетъ въ себѣ много особеннаго и соединено съ чрезвычайною трудностью; это зависитъ отъ особенности дѣтскаго тѣла и трудности распознаванія дѣтскихъ болѣзней.

1.) Особенности дѣтскаго тѣла состоятъ въ несовершенствѣ его и продолжающемся развитіи, наипаче въ первый годъ по роженіи: въ это время одни органы увядаютъ (пуповина, шейная желѣза въ груди), другіе развиваются, усовершенствуются, третьи вновь происходятъ (зубы) и начинаются дыханіе и новое кровообращеніе, зрѣніе, слухъ, отдѣленія, испражненія.

2) Отдѣлившійся отъ матери младенецъ, первый годъ своей вѣматочной жизни, питается молокомъ матери, котораго недостатокъ, совершенно и безъ вреда для младенца, ни чѣмъ не можетъ быть замѣненъ.

3) Жизнь младенца течетъ быстрее, чѣмъ взрослога: кровообращеніе, питаніе, рашеніе тѣла происходятъ скоро, отдѣленія и испражненія совершаются часто; сообразно сему и теченіе болѣзней бызаетъ быстрое: младенецъ выздоравливаетъ и умираетъ скорѣе взрослога.

4) Новыя вліянія: свѣтъ, холодъ, воздухъ, сухость, которымъ подвергается младенецъ послѣ рожденія, перемѣна въ дыханіи и кровообращеніи, нѣжность, слабость, чувствительность дѣтскаго тѣла суть причины, что младенцы легче и чаще взрослыхъ подвергаются болѣзнямъ, которыя у нихъ чаще оканчиваются смертію, чѣмъ у взрослыхъ: дѣтскій возрастъ отличается вообще бѣльшею смертностью. Кромѣ того, у дѣтей появляются особыя, имъ только свойственныя болѣзни—оспа, корь, скарлатина, коклюшь.

5) Такъ какъ въ дѣтскомъ тѣлѣ кровообращеніе и дыханіе совершаются быстро, особенно сильно происходитъ питаніе и рашеніе тѣла; нѣжное дѣтское тѣло очень слабо, не подверглось еще никакой порчѣ отъ времени и случаевъ, какъ тѣло взрослога человека, то дѣтскія болѣзни бывають наичаще острыя, воспалительныя, гнѣзятся въ органахъ пищеваренія; всасыванія и питанія соединяются съ судо-



рогами, рѣшаются во снѣ, въ которомъ и здоровое дитя проводитъ, въ первый годъ отъ рожденія, много времени.

6) Періоды прорѣзыванія зубовъ, ращеніе тѣла и возрастъ до 7-ми лѣтъ особенно располагаютъ къ болѣзнямъ.

7) Дѣтскій возрастъ раздѣляютъ на три періода: первый, отъ рожденія до прорѣзанія молочныхъ зубовъ; въ это время дитя сильно растетъ и особенно легко подвергается болѣзнямъ; второй, отъ прорѣзанія молочныхъ зубовъ до выпаденія ихъ и вырашенія постоянныхъ зубовъ, т. е. до 9 лѣтъ; въ этомъ періодѣ ращеніе тѣла бываетъ тише, чувствительность крѣпче, но за то болѣе склонности къ воспаленію, особенно въ шеѣ и мозгѣ; третій періодъ есть отъ 9 до 15 лѣтъ; онъ менѣе другихъ расположенъ къ болѣзнямъ.

Распознаваніе дѣтскихъ болѣзней весьма трудно, потому, что 1) дѣти еще не въ состояніи изъяснить своихъ чувствованій словами: дѣти 1—5 лѣтъ, бывъ больны, выражаютъ свое страданіе плачемъ, крикомъ, капризами; 2) пульсъ, надежнѣйшее средство въ распознаваніи болѣзней, по причинѣ быстрого кровообращенія и раздражительности сердца, не такъ вѣрный признакъ болѣзни у дѣтей, какъ у взрослыхъ; 3) по безпрестанному измѣненію самаго тѣла быстрымъ питаніемъ его и ращеніемъ и дѣтскія болѣзни измѣнчивы, не ясны и не опредѣлительны.

Впрочемъ, вѣрнѣйшіе признаки распознаванія дѣтскихъ болѣзней суть: 1) возвышенная температура тѣла: жаръ, особенно въ головѣ, есть вѣрный признакъ лихорадки, а при мѣстной гдѣ либо боли—и воспаления. 2) Дыханіе у дѣтей измѣняется, какъ и у взрослыхъ (см. «Дыханіе» въ отд. «О болѣзни вообще»). 3) Пульсъ. Въ первыя пять лѣтъ пульсъ у дѣтей бьетъ въ минуту 80—90 разъ; скорѣйшій пульсъ заставляетъ предполагать у дитяти лихорадку, воспаленіе; Впрочемъ, опредѣленіе пульса у дѣтей очень трудно, даже и для врача, и требуетъ особеннаго навыка. 4) Жаръ и жажда, сухость во рту, языка, губъ. 5) Потеря аппетита есть вѣрнѣйшій признакъ дѣтской болѣзни; ибо у дѣтей аппетитъ очень силенъ и дѣятеленъ; Впрочемъ, потеря его



показываетъ скопленіе нечистотъ въ желудкѣ, лихорадку, и бываетъ вмѣстѣ съ бѣлымъ, желтымъ, нечистымъ языкомъ. 6) Испражнения мочи и кала: ихъ цвѣтъ, запахъ, густота или жидкость, количество, частое или рѣдкое испражнение, совершенное задержаніе, вѣтры, урчаніе въ животѣ, отрыжка, рвота, сухость или влажность кожи, сыпь. 7) черты лица особенно скоро измѣняются у больныхъ дѣтей, но распознать это измѣненіе очень трудно, хотя оно для опытнаго дѣтскаго врача есть очень хорошій указатель страданія дитяти. 8) Затруднительное сосаніе и глотаніе указываютъ на болѣзни во рту, въ горлѣ, мозгѣ. 9) Измѣненіе голоса: осиплость, охриплость, перхота означаютъ страданіе въ горлѣ, лёгкихъ, головѣ. 10) Крикъ и плачъ есть общій признакъ больныхъ дѣтей. Продолжительный крикъ и безпокойство показываютъ общую болѣзнь и нездоровье: лихорадку, воспаленіе, острую сыпь (корь, оспу); крикъ съ притягиваніемъ ножекъ къ животу, означаетъ боли въ животѣ, рѣзь, колику; крикъ съ вложеніемъ пальцевъ въ ротъ показываетъ трудное прорѣзываніе зубовъ, а крикъ съ кашлемъ—боль въ груди. 11) Сонъ продолжительный и прерывистый, спокойный и безпокойный, съ судорогами, вздрагиваніями, скрежетаніемъ зубами, означаетъ страданіе въ головѣ, глисты и проч.

Леченіе дѣтскихъ болѣзней. 1) Святѣе правило: не употреблять никакихъ лекарствъ, особенно сильнѣйствующихъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы не увѣрены въ точномъ распознаніи болѣзни. Это правило еще необходимѣе нужно соблюдать при леченіи дѣтскихъ болѣзней по причинѣ ихъ труднаго распознанія и важности, слабости дѣтскаго тѣла и потому, что у дѣтей, при быстрой перемѣнѣ матеріи ихъ тѣла, излечивается болѣзнь ихъ дѣятельная натура удачнѣе и скорѣе чѣмъ у взрослыхъ. Чѣмъ проще леченіе дитяти, чѣмъ болѣе мы ограничиваемся однимъ строгимъ за нимъ присмотромъ, тѣмъ лучше и тѣмъ менѣе мы помѣшаемъ цѣлительной его натурѣ. Надобно быть осторожнымъ, но не слишкомъ дѣятельнымъ: неумѣстная дѣятельность, при чувствительности и слабости дѣтскаго тѣла, легко можетъ быть вредною. Правило: же-



для пособить, не повреди больному. Особенно важно при назначении лекарств больнымъ дѣтямъ, для которыхъ малые приемы простыхъ лекарствъ—самые лучшіе: у нихъ, малое, даже очень малое, почти гомеопатическое лекарство можетъ сдѣлать очень много. У дѣтей слабая причина можетъ возбудить опасныя припадки, напр. кислота въ желудкѣ, вѣтры въ кишкахъ причиняють сильныя боли, судороги, которыя уничтожаются нѣсколькими грамами магнезіи. У больныхъ дѣтей надобно всего опасаться, но и никогда не терять надежды: первое потому, что внезапно могутъ появиться опасныя припадки и болѣзнь приметъ несчастное направленіе, а второе потому, что при дѣятельности цѣлительной силы дѣтскаго тѣла и при быстротѣ кровообращенія и перемѣны матеріи, такъ же скоро опасная болѣзнь приметъ счастливый оборотъ и послѣдуетъ чудесное исцѣленіе. 2) Въ первомъ возрастѣ дитяти постоянно нужно обращать вниманіе на желудокъ и кишки, въ которыхъ найчаще скрывается причина дѣтской болѣзни: обремененіе желудка, испорченная пища (молоко), слизь, кислота, желчь, скопленіе нечистотъ, глисты, вѣтры, суть обыкновенныя причины болѣзней въ первые 3—5 лѣтъ. Посему въ эти лѣта больнымъ дѣтямъ скоро помогаютъ: магнезія, раковыя жерновки (при кислотѣ), ревенъ (при слизи, запорѣ, нечистотахъ), съмена укропа (№ 75,—при вѣтрахъ) простые клистиры; эти средства, данныя въ началѣ болѣзни, часто предотвращають опасныя припадки. Ревенъ съ магнезіею есть главное лекарство для больныхъ дѣтей: они притупляютъ кислоту, разбиваютъ вязкую слизь, легко слабятъ низомъ, способствуютъ отдѣленію желчи и мочи, не ослабляютъ, но еще укрѣпляютъ тѣло дитяти. 2) Послѣ брюшныхъ болѣзней, обыкновеннѣйшіе у дѣтей недуги зависятъ отъ раздраженія ихъ слабыхъ нервовъ, которые посему нужно успокоить и тѣмъ предотвратить судороги. Лучшій для этого средства: тоже магнезія, раковыя жерновки, маунъ въ малыхъ приѣмахъ (№ 76), клистиръ изъ молока, постнаго масла, съ ромашкою, крахмаломъ, льнянымъ семенемъ. 4) Далѣе, у дѣтей часто случаются приливы крови къ головъ, которые у нихъ легко и



скоро могут сдѣлаться опасными; на это надобно обращать особенное вниманіе. Эти приливы узнаются по жару головы, краснотѣ лица и глазъ, сонливости, судорогамъ. Здѣсь полезны: возвышенное положеніе головы на кожаной, жесткой подушкѣ, прохлада комнаты, обмываніе головы холодною водою съ уксусомъ, припускъ пѣявицы позади ушей, слабительное, клистирь, горчичникъ къ плечамъ, икрамъ. 5) Надобно быть очень осторожнымъ при назначеніи дѣтямъ ослабляющихъ, противувоспалительныхъ лекарствъ, рвотныхъ, слабительныхъ солей, кремортартара, рвотнаго камня, селитры и пр.: эти средства у слабого дитяти могутъ причинить смертельное изнеможеніе. 6) Еще съ большею осторожностію нужно употреблять въ детскихъ болѣзняхъ средства возбуждающія, крѣпительныя (см. «Возбуждающій способъ леченія»); наркотическихъ же, одуряющихъ средствъ, особенно опія, безъ совѣта врача, никогда не должно давать дѣтямъ. Эти средства въ послѣдствіи очень вредно дѣйствуютъ на дѣтское тѣло, хотя и скоро уничтожаютъ болѣзнь (напр. опій—поносъ). 7) За то употребленіе накожныхъ средствъ у дѣтей очень дѣйствительно: растиранія, горчичники, мушка, ванны, приварки—скоро и вѣрно дѣйствуютъ чрезъ нѣжную кожу дитяти. 8) Такъ какъ дѣтское тѣло не только должно питаться, но и расти, то дѣти, даже и больныя, болѣе взрослыхъ имѣютъ потребность въ пищѣ и снѣ; еще необходимѣе для больныхъ дѣтей свѣжій, чистый воздухъ, который, при движеніи и при помощи цѣлительной силы дѣтскаго тѣла, черѣдко излечиваетъ самыя упорныя болѣзни, неуступавшія леченію искусныхъ врачей. 9) Въ дѣтскомъ тѣлѣ особенно сильно бываетъ сочувствіе органовъ, вайчаще желудка съ мозгомъ; боль и жаръ въ головѣ, сонливость, бредъ и даже судороги часто зависать отъ желудка, и скоро уступаютъ отводящему леченію: горчичниками къ икрамъ, слабительными, клистирами, припарками къ животу; по этой же причинѣ въ дѣтскихъ болѣзняхъ прекрасно дѣйствуетъ и рвотное; притомъ у нихъ легко происходитъ и рвота, особенно возбужденная лекарствомъ (№ 77). 10) Общее замѣчаніе: не всякій припадокъ считать бо-



лѣзнію, имѣетъ свое мѣсто особенно въ дѣтскихъ болѣзняхъ. У дѣтей, во все время ихъ развитія и рращенія, могутъ возникать разные болѣзненные припадки, которые однако проходятъ съ періодомъ развитія, особенно у дѣвочекъ, безъ всякаго леченія.

Впрочемъ, дѣтямъ сочнымъ, полнымъ, какъ говорятъ, сырымъ, съ хорошимъ аппетитомъ, имѣющимъ притомъ твердое и рѣдкое испражненіе низомъ, ежемѣсячно разъ можно давать слабительное изъ ревеня, слабительной кашки, или вѣнскаго пия: это предотвращаетъ скопленіе нечистотъ изъ остатковъ непереваарившейся пищи и, предотвращаетъ зарожденіе глистъ, завалы брыжеечныхъ желѣзъ, дѣтскую сухотку, приливы крови къ головѣ, воспаленія, разные сыпи, вереда, даже имѣетъ вліяніе на нравственность ребенка, дѣлал его кроткимъ, послушнымъ; ибо брюхо имѣетъ большое вліяніе на голову, а слѣдственно и на характеръ человѣка.

О содержаніи и физическомъ воспитаніи дѣтей сказано въ 3-й части Н. М.

## **БОЛѢЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХЪ И ГРУДНЫХЪ МЛАДЕНЦОВЪ ВООБЩЕ.**

§ 144. Перемена, которой подвергается новорожденный, вышедъ изъ теплаго, мягкаго, нѣжнаго, мокраго и темнаго ложа матери на свѣтъ, гдѣ его встрѣчаетъ холодъ, жесткіе покровы, сухой воздухъ и яркій свѣтъ, такъ важна и быстра, что надобно удивляться, не частымъ болѣзнями новорожденнаго, а тому, отъ чего не каждый новорожденный имъ подвергается, особенно если еще вспомнимъ перемены, которыя происходятъ въ немъ самомъ по рожденіи: начавшееся дыханіе, измѣненіе кровообращенія, дѣйствіе чувствъ, испарину въ кожѣ, отдѣленіе кала, мочи.

Благодѣтельная и мудрая природа всѣ эти перемены производитъ сама и притомъ такъ искусно и непримѣтно, что съ нашей стороны неужно никакого пособія, кромѣ перевязки пуповины, обмытія и согрѣтія дитяти, матерняго мо-



лока и—если испражнение низомъ замедляется—употребленія въ первые дни по рожденіи ревеннаго сиропа (№ 78) до тѣхъ поръ, пока не испражнится первородный калъ и кишечныя испражненія изъ черныхъ не сдѣлаются зелеными, а потомъ желтыми. Если дитя плачетъ и прижимаетъ ножки къ животу, показывая тѣмъ боль въ брюхѣ, то лучше всего помогаетъ дѣтскій порошокъ (№ 256) и клистиръ изъ отвара ромашки, либо овсяныхъ крупъ съ малостию деревяннаго или льнянаго масла; клистирная жидкость должна составлять не болѣе 2—3 столовыхъ ложекъ.

§ 145. Главнѣйшія болѣзни новорожденнаго суть слѣдующія:

1) Обморокъ. Признаки тѣ же, что и у взрослого: не замѣтно ни дыханія, ни кровообращенія, ни движенія въ ручкахъ, ножкахъ, ни голоса: дитя лежитъ какъ мертвое.

Причины: слабость младенца природная или случайная отъ трудныхъ родовъ, насилія, употребленнаго при родахъ для вывода младенца изъ матки, обвитіе пуповины вокругъ шейки дитяти, скопленіе слизи во рту. Раннее и скорое отдѣленіе дитяти отъ матери перевязываніемъ пуповины, слишкомъ жаркая или холодная комната роженницы.

Дѣтскій обморокъ бываетъ двоякій: истинный, отъ слабости, изнеможенія, и ложный, отъ полицеміи. Истинный обморокъ отличается: блѣдностью кожи, слабымъ, морщининоватымъ, холоднымъ тѣломъ и совершеннымъ отсутствіемъ признаковъ жизни. Здѣсь полезны: теплая ванна съ виномъ, водкою, легкое растираніе тѣла, подъ ложечкою, брюшка, ножекъ, ручекъ, висковъ, вдунаніе воздуха въ ротъ, носъ, въ задній проходъ, капаніе на головку, на ложечку холодною водою, виномъ.

Въ ложномъ обморокѣ, зависящемъ отъ скопленія крови въ сердцѣ и легкихъ, лице бываетъ красное, синее, вздутое, кожа красная, подкожныя вены и пуповина вздутыя и полныя, дитя сочное и полное. Этотъ обморокъ замѣчается послѣ трудныхъ и продолжительныхъ родовъ, при обвитіи пуповины вокругъ шеи, при скоромъ перевязываніи пуповины. Здѣсь главное дѣло состоитъ въ выпускѣ 1—2 унцій крови изъ перерѣзанной пуповины.



При скопленіи слизи во рту дитя хочетъ кричать, но не можетъ, силится глотать и какъ бы давится, голосъ хриплый и слабый. Здѣсь нужно ввести палецъ въ ротъ и очистить его отъ слизи, пощекотать въ поздыхъ перышкомъ, отъ чего младенца вырветъ или онъ чихнетъ и прѣзъ то извергнетъ слизь; если же этого не послѣдуетъ, то надобно дать рвотное (№ 77). Вообще же при всякомъ обморокѣ нужно нагрѣвать младенца, лучше всего положеніемъ его на грудь матери, которой теплота для него живительнѣе всякъ лекарствъ и оживленій.

2) Желтуха. Признаки желтухи тѣ же, что и у взрослыхъ (см. выше). Желтуха у новорожденныхъ происходитъ отъ пренебреженнаго испражненія первороднаго кала, отъ остановленія испарины въ кожѣ, непривычнаго вліянія на кожу остраго, сухаго воздуха, купанья младенца въ водѣ съ водкою. Впрочемъ, желтуха у новорожденныхъ не опасна и проходитъ скоро при употребленіи ревеннаго сиропа (№ 78).

3) Попрълость у дѣтей, въ первыя недѣли по рожденіи, происходитъ найчаще въ пахахъ, около дѣтородныхъ частей, у задняго прохода, подъ мышками, за ушами и вообще между складками, сгибами кожи; она зависитъ отъ неопытнаго содержанія дитяти, когда оно долго лежитъ въ замаранномъ, мокромъ бѣльѣ, и проходитъ при строгомъ присмотрѣ за чистотою младенца, при обмываніи—когда онъ замарается, замочится—замаранныхъ, мокрыхъ и попрытыхъ частей тѣла холодною водою; послѣ чего попрылыя мѣста, сухо обтираются мягкою холстинкою, посыпаются просѣяною мукою, крахмаломъ, а еще лучше плауинымъ порошкомъ *licopodium*. Если отъ этого попрылость не проходитъ, а напротивъ, проникаетъ глубже и шире, производитъ язвы, то, вѣроятно, она поддерживается золотушнымъ, любострастнымъ худосочиємъ, изъ коихъ послѣднее дитяти можетъ быть сообщено кормилицею, нянькою, которыхъ по-сему и нужно осмотрѣть, и для того пригласить врача.

4) Молочница. Признаки: бѣлыя, поверхнія, маленькія язвы на губахъ, языкѣ, во рту, на щекахъ, въ горлѣ и даже въ заднемъ проходѣ, точно такія, какъ у взрослыхъ



людей; притомъ дитя неохотно беретъ грудь и часто ее выпускаетъ изъ рта. Молочница появляется въ первыя недѣли по рожденіи и зависитъ отъ неопрытнаго содержанія; она проходитъ отъ частаго обмыванія рта простою, известковою водою, отъ натиранія, въ началѣ молочницы, язвинокъ мелкимъ порошкомъ сахара, намазыванія бурою съ медомъ (№ 79) и отъ легкаго слабительнаго изъ чайной ложки кастороваго масла съ магнезіею (№ 80).

5) Твердость, окръплость кожи и клѣтчатой плевы. Признаки: въ первыя шесть—восемь недѣль у младенца замѣчается лихорадка, жаръ, жажда, краснота лица, красныя пятна сначала на рукахъ и ногахъ, потомъ на животѣ, дѣтородныхъ частяхъ; во всѣхъ этихъ мѣстахъ замѣчается твердость, жесткость, глубокопростирающаяся подъ кожу на мышцы; дитя не можетъ кричать, но глухо стонетъ, по причинѣ неподвижности личныхъ и шейныхъ, окръпшихъ мышцъ; наконецъ кожа отвердѣваетъ какъ дерево. Болѣзнь продолжается 4—7—14 дней и оканчивается выздоровленіемъ, или смертію отъ помертвѣнія, либо задушенія; она происходитъ отъ простуды, особенно когда замаравшееся мокрое дитя лежитъ долго въ грязныхъ пеленкахъ и продрогнетъ; также отъ недостаточнаго испражненія низомъ, отъ купанья въ холодной водѣ, отъ худосочія матери, трудныхъ родовъ, наипаче помощію инструментовъ.

Леченіе. Слабительное изъ кастороваго масла съ магнезіею, или ревеннымъ сиропомъ, обыкновенные клистиры, теплыя ванны съ отрубями, смягчительныя припарки, порошокъ изъ крахмала, бобовъ съ бузинымъ, розовымъ цвѣтомъ. Если красный цвѣтъ начнетъ темнѣть, то нужно пригласить врача, буде это прежде не было сдѣлано.

6) Любострастная болѣзнь. Признаки: язвы любострастныя на губахъ, дѣтородныхъ частяхъ, мясные наросты около задняго прохода, сыпь на разныхъ частяхъ тѣла; слѣды бывшей, или еще и теперь имѣющейся любострастной болѣзни у родителей, кормилицы, няньки. Дѣти или раждаются съ любострастною болѣзнію, или же ею заражаются по рожденіи.

Леченіе нужно предоставить врачу: при недостаткѣ ко-



тораго нужно поступать такъ: если больна мать или кормилица, то нужно имъ давать ртуть, какъ сказано выше; дитяти же ничего не давать, а только язвы или наросты слегка прижечь адскимъ камнемъ. Но если младенца надобно лечить прямо, т. е. когда больная мать не кормит дитяти, или зараженная кормилица удалена, то нужно ребенку давать разъ въ день по  $1\frac{1}{2}$  — 1 грану минеральнаго эѳіопа, (*ethiops mineralis*) и ежедневно купать въ теплой ваннѣ.

7) Рвота у дѣтей чаще есть слѣдствіе обремененія желудка, который излишекъ пищи извергаетъ рвотою. Если рвота происходитъ слабо, т. е. дитя вырветъ разъ, а потомъ его только тошнить, то ему нужно дать рвотное для испражненія изъ кишекъ излишней пищи, или же поставить простой клистирь.

Впрочемъ, надобно помнить, что рвота у дѣтей можетъ происходить и отъ другихъ причинъ; посему если при рвотѣ дитя имѣетъ жаръ, жажду, не терпитъ прижатія подъ ложечкою, тоскуетъ и плачетъ (воспаленіе желудка), то противъ мѣста боли, къ желудочной сторонѣ нужно приставить пиявицы, столько, сколько лѣтъ дитяти, а одному-двумъ младенцу 1—2 пиявицы, и поить его молокомъ матери или коровимъ, дать слабительное изъ кастороваго масла съ магнезіею. Рвота зависитъ отъ воспаления мозга, если притомъ дитя безпрестанно дремлетъ или находится въ полубытіи и рвота у него появляется при поднятіи головки, при поворотѣ на бокъ. Упорная и продолжительная часто возвращающаяся рвота, вѣроятно, зависитъ отъ размягченія желудка, глисть, молока кормилицы: здѣсь нужно пригласить врача (см. «Рвоту у взрослыхъ; воспаленіе мозга у дѣтей»).

8) Поносъ есть самая обыкновенная болѣзнь у дѣтей; если онъ съ болью и рѣзью въ животѣ, то дитя плачетъ, сучитъ ножками и притягиваетъ ихъ къ животу. Дѣтскій поносъ вообще не опасенъ, даже полезенъ, и потому его должно останавливать только тогда, когда онъ дѣлается очень частымъ, изнурительнымъ; самыя испражненія низомъ



бываютъ наичаще зелены, желты и бѣлы, какъ свернувшійся яичный блокъ.

**Причины.** У грудныхъ дѣтей поносъ происходитъ отъ кислоты въ желудкѣ и кишкахъ (зеленые испражненія), отъ простуды, прорѣзыванія зубовъ, обремененія желудка, жирнаго молока кормилицы, грубой пищи, глисть; продолжительный или часто возвращающійся поносъ изнуряетъ дитя и разстроиваетъ его пищевареніе; самый опасный поносъ при дѣтской сухоткѣ.

**Лечение.** Здѣсь нужно смотрѣть на причины поноса, и противъ нихъ направлять леченіе. 1) Поносъ отъ кислоты узнается по боли и рѣзи въ животѣ, по сученію и прижатію къ животу ножекъ, по крику дитяти, по зеленымъ испражненіямъ низомъ, похожимъ на свернувшееся искрошенное яйцо, по кислому запаху изверженій рвотою и изо рта дитяти. Здѣсь нужно давать дитяти ревенъ съ магнезіею (№ 75), или порошокъ изъ раковыхъ жернововъ (№ 264); при боли въ животѣ, поставить клистиръ изъ наливки ромашки, отвара овсяныхъ крупъ съ ложкою масла. Если дитя грудное, то кормилица должна употреблять мясную пищу, пить пиво и принимать порошокъ № 81. Поносъ отъ кислоты наичаще замѣчается у дѣтей при искусственномъ ихъ кормленіи и зависитъ отъ грубой пищи, окисшаго молока, нечистаго рожка.

2) Поносъ отъ прорѣзыванія зубовъ узнается по водянистымъ испражненіямъ и по припадкамъ прорѣзыванія зубовъ (см. ниже); будучи умѣренъ, т. е. когда дитя въ теченіе сутокъ марается 6—8 разъ и притомъ по немного, этотъ поносъ скорѣе полезенъ, чѣмъ вреденъ и не требуетъ леченія; но когда онъ усиливается, то надобно давать дѣтямъ магнезію, раковыя жерновки, противусудорожный порошокъ (№ 76), слізъ съ укропною водою, маковое молоко, ставить клистиры изъ крахмала; но отнюдь безъ совѣта врача не давать дѣтямъ сонныхъ капель (опія), которыя хотя и скоро останавливаютъ поносъ, но зато вмѣстѣ съ тѣмъ причиняютъ запоръ и скорую смерть отъ пострѣла; во всякомъ случаѣ, при упорномъ поносѣ отъ прорѣзыванія зубовъ нужно посоветоваться съ врачомъ.



3) Поносъ отъ простуды, когда дитя не довольно тепло одѣваютъ, содержатъ его въ сырой, холодной комнатѣ, выносятъ на дворъ въ сырую погоду, скоро послѣ выздоровленія отъ кори, тоспы, скарлатины, когда ребенокъ долго лежитъ въ мокромъ, замаранномъ бѣльѣ, ночью раскрытый отъ спаденія одѣяла. Особенно убійственъ бываетъ поносъ послѣ кори и скарлатины между деревенскими дѣтьми, страдавшими этими болѣзнями весною или лѣтомъ: въ эти времена года крестьяне, по невѣжеству, выносятъ дѣтей на воздухъ прежде 6 недѣль, т. е. прежде снушенія старой или укрѣпленія новой (кожицы; по этой причинѣ крестьянскія дѣти ежегодно сотнями умираютъ отъ поноса, который обыкновенно свирѣпствуетъ повально, подобно кори и скарлатинѣ.) Этотъ поносъ соединяется съ отѣкомъ ручекъ, ножекъ, мошонки, спины, лица. Здѣсь надежнѣйшее средство отъ поноса: опрятное и теплое содержаніе больныхъ дѣтей, теплый чай изъ бузины, липоваго цвѣта, клистиры изъ крахмала и средства упомянутыя при упорномъ поносѣ отъ прорѣзыванія зубовъ; а также теплое одѣваніе брюшка фланелью, суконкою, натираніе живота масломъ съ бѣленою и розмариновыми каплями (№ 82).

4) Поносъ продолжительный, одлеко возвращающійся при всякомъ къ нему поводѣ, проходитъ отъ постоянного употребленія каскарильной или хинной вытяжки (№ 83), отъ теплыхъ, ароматныхъ ваннъ, ношенія на тѣло шерстяной, фланелевой рубашки, отъ мяснаго супа съ крупною, желудинаго кофе съ молокомъ.

§ 146. Лихорадка. Признаки: жаръ во всемъ тѣлѣ, жажда, сухой, нечистый языкъ, горячее, скорое дыханіе, горячая голова, особенно лобъ, красное лице, блестящія глаза, скорый пульсъ. Причины: разстройство и обремененіе желудка, простуда, глисты, прорѣзываніе зубовъ, разныя сыпи, оспа, корь, скарлатина, коклюшъ, разныя воспаленія, особенно въ горлѣ, горль.

Леченіе. Въ обыкновенныхъ случаяхъ достаточны: нѣсколько приѣмовъ дѣтскаго порошка и теплая постель. Если



отъ сего лихорадка не проходить скоро, то нужно обратить вниманіе на ея причины:

1) Желудочная лихорадка, самая обыкновенная у дѣтей; ея признаки: слабый аппетитъ или и отвращеніе отъ пищи, тошнота, даже рвота, отрыжка, непріятный запахъ изъ рта, печистый, бѣлый, желтый языкъ, вздутый, полный животъ, поносъ съ желтыми, зелеными испражненіями, мутная моча, скорое, хрипливое дыханіе, вздрагиваніе во снѣ. Здѣсь полезны: рвотное (№ 77), потомъ, если не подействуетъ оно вмѣстѣ и на-низъ, — клистирь или слабительная смѣсь (№ 84). Воздержаніе отъ пищи, особенно жирной, мяснаго супа, шей, яицъ, мяса, рыбы. — Во всѣхъ дѣтскихъ лихорадкахъ, съ отвращеніемъ отъ пищи, сначала полезно дѣтямъ рвотное (№ 77), которое очень часто уничтожаетъ болѣзнь въ самомъ ея началѣ, или по крайней мѣрѣ даетъ хорошее ей направленіе.

2) Простудная лихорадка; ея признаки: насморкъ, чиханіе, теченіе слизи изъ носа и слезъ изъ глазъ, кашель, перхота, осиплый, охрипый голосъ, скорое, несвободное дыханіе съ хрипѣніемъ, вздрагиваніе, то блѣдное, то красное лице. Эта лихорадка проходитъ отъ теплаго содержанія, теплой ванны, чаю изъ липоваго, бузиннаго цвѣта. Если послѣ пота не проходитъ лихорадка, дыханіе не свободное, хрипливое, но безъ особой боли въ груди (дѣтя не кричатъ при поворотѣ на бокъ), то нужно дать и здѣсь рвотное (№ 77), которое выводитъ изъ желудка нечистоты, а изъ лёгкихъ и горла слизь, и тѣмъ предотвращаетъ крупъ. Послѣ рвотнаго назначается дѣтяти потогонная смѣсь (№ 85), теплая ванна, клистирь и чай изъ липоваго цвѣта.

3) Глистная лихорадка бываетъ у дѣтей не моложе трехъ лѣтъ. Признаки: лихорадка съ припадками — глисть, которыя иногда выходятъ и низомъ, боль въ брюхѣ, животъ полонъ, но мягокъ. Лечение общее противулихорадочное съ противуглистными средствами, молоко внутрь и въ клистирахъ.

4) Воспалительная лихорадка. Признаки: воспаленія въ груди, головѣ. При воспаленіи въ груди: корот-



кое, частое, хрипливое дыханіе съ выраженіемъ боли въ лицѣ, непрерывное побужденіе къ кашлю, непрестанный плачь; при воспаленіи въ головѣ: дитя находится въ забытіи, всё спитъ, или дремлетъ; его часто рветъ, а въ лицѣ и рукахъ замѣчаются судороги. Воспаленіе въ печени узнается по припухлости, жару и боли въ правой верхней сторонѣ живота, подъ ребрами и около мочежки. —

Эта лихорадка требуетъ приглашенія врача, за недостаткомъ котораго, къ головѣ, груди, животу нужно припустить столько пиявицъ, сколько ребенку отъ роду лѣтъ; внутрь дать ему вышесказанную смѣсь съ полдрахмою селитры (№ 85 1.), ставить клистиры; при воспаленіи въ головѣ—холодные къ ней примочки, горчичники къ ногамъ; а при воспаленіи въ груди и брюхѣ—припарка, теплая ванны и мушка на бокъ.

5) Сыпная лихорадка, см. оспу, корь, скарлатину.

6) Лихорадка отъ прорѣзыванія зубовъ, см. ниже.

§ 147. Трудное прорѣзываніе зубовъ. — Признаки: у дитяти 5 — 10—14 мѣсячнаго течетъ изо рта слюна по подбородку, груди; оно часто вноситъ ручки въ ротъ, равно и вещи теревитъ въ ротъ и грызетъ, не любитъ, когда другіе хотятъ ему раскрыть ротъ и пощупать десны, которыя притомъ краснѣютъ и припухаютъ. Всѣ эти припадки не опасны. При трудномъ и опасномъ прорѣзываніи зубовъ, кромѣ мѣстныхъ припадковъ во рту, бываютъ; поносъ, или, что еще хуже, запоръ на-низъ, лихорадка, какая-либо сыпь на тѣлѣ, жаръ въ головѣ, кашель, хрипѣніе въ груди, судороги и особенно опасныя воспаленія въ головѣ и груди. Всѣ эти припадки по мѣрѣ выхода однихъ зубовъ ослабѣваютъ, а при прорѣзываніи другихъ, новыхъ зубовъ, опять ожесточаются, такъ-что у иного младенца они возвращаются отъ 5-ти до 10 разъ. Лучшій изъ всѣхъ этихъ припадковъ есть поносъ: онъ умѣряетъ лихорадку, приливъ крови къ головѣ, судороги и облегчаетъ прорѣзываніе зубовъ.

Теченіе. Зарожденіе зубовъ въ челюстныхъ костяхъ начинается на пятомъ мѣсяцѣ; но это зарожденіе, какъ развитіе зерна въ землѣ, непримѣтно; въ это время зубъ



растетъ, распираетъ кости челюсти, потомъ напираетъ въ десна, ихъ прорѣзываетъ и бываетъ видимъ. Зубы прорѣзываются въ такомъ порядкѣ: сперва два нижніе передніе, или рѣзцы, потомъ два верхніе, опять два нижніе и два верхніе, далѣе выходятъ глазные, или клыки, потомъ, по очереди, коренные. Первые зубы появляются надъ деснами послѣ 7 — 12 мѣсяцевъ, а послѣдніе выходятъ на 15 — 24 мѣсяцъ; всѣхъ же млечныхъ зубовъ 20. Чѣмъ позже прорѣзываются зубы, тѣмъ лучше, особенно для слабыхъ младенцевъ.

Причины. Трудное прорѣзываніе зубовъ зависитъ: 1) отъ тѣлосложенія младенца: большеголовая, сырая дѣти, дѣлаютъ зубы очень трудно; 2) отъ вида прорѣзывающагося зуба: труднѣе прорѣзываются глазные зубы; 3) отъ числа разомъ выходящихъ зубовъ: чѣмъ болѣе зубовъ выходитъ въ одно время, тѣмъ опаснѣе; 4) отъ сопряженія выхода зубовъ съ другими болѣзнями: воспаленіемъ, лихорадкою, оспою, корью, скарлатиною, коклюшемъ; особенно опасно воспаленіе мозга, которое можетъ быть и причиною и припадкомъ т. е. слѣдствіемъ труднаго прорѣзыванія зубовъ.

Лѣчение можетъ состоять только въ облегченіи припадковъ чрезъ отводящія средства, изъ которыхъ надежнѣйшее употребляетъ сама природа, возбуждающая поносъ, при недостаткѣ котораго, нужно способствовать свободному испражненію низомъ — слабительнымъ изъ кастороваго масла съ магнезіею, клистирами, припускомъ 1 — 2 пиявицъ къ вискамъ, горчичниками къ ножкамъ, теплыми ваннами. При сильномъ поносѣ, лихорадкѣ, воспаленіи въ головѣ, или груди, и при другихъ болѣзняхъ необходимо пригласить врача. Къ сожалѣнію, однако, надобно замѣтить, что трудное прорѣзываніе зубовъ часто оканчивается смертію отъ воспаленія въ головѣ, и что въ иныхъ семействахъ всѣ дѣти умираютъ отъ него.

§ 148. Нервные припадки, судороги, родимецъ. Эти припадки у дѣтей выражаются судорожнымъ движеніемъ только во снѣ, или и наяву, временно или постоянно судорожными движеніями, подергиваніемъ въ лицѣ, ру-



кахъ и ногахъ, всхлипываніемъ, стономъ, вздыманіемъ живота. Они наичаще зависятъ отъ брюха и происходятъ отъ кислоты, обремененія желудка, кишечныхъ нечистотъ, запора на-низъ, вѣтровъ; а потому лучшія противъ нихъ средства суть: слабительное изъ кастороваго масла съ магнезією, раковыя жерновки, мѣлъ, дѣтскій порошокъ (№ 76), клистиры, втираніе въ животъ зеленого масла бѣлены съ мятною эссенцією. Если судороги не проходятъ отъ этихъ средствъ, то надобно посоветоваться съ врачомъ.

§ 149. Сжатіе, смыканіе челюстей, столбнякъ. Признаки. Сжатіе челюстей и столбнякъ, которыхъ припадки описаны выше, при нервныхъ болѣзняхъ, у дѣтей случаются въ первые двѣ недѣли по рожденіи: дитя кричитъ, хочетъ сосать грудь, но не можетъ глотать, захлебывается или пускаетъ изо рта молоко; при ошупываніи, можно замѣтить твердость въ щекахъ и неподвижность нижней челюсти, нельзя растворить рта, даже съ нарочитымъ усиліемъ; шея деревенеетъ, голова дѣлается неподвижною, дыханіе затрудняется, животъ вздувается и твердеетъ, лице синѣетъ, глаза дико вращаются и закатываются подъ лобъ, и дитя умираетъ отъ пострѣла мозга или задушенія. Болѣзнь продолжается два-четыре дня и по большей части неизлечима.

Причины: простуда, худое молоко кормилицы, скопленіе въ кишкахъ первороднаго кала, нечистый, спертый воздухъ, напитанный животными испареніями, близкое перевязаніе пуповины.

Леченіе. Прежде всего надобно позаботиться о скорѣйшемъ приглашеніи врача, при недостаткѣ котораго, дать дитяти рвотное (№ 77), переменить кормилицу, посадить дитя въ теплую ванну, поставить клистиръ, въ щеки, въ шею и въ спину втирать масло бѣлены съ сонными каплями (№ 86), и если дитя еще можетъ глотать, то давать ему цвѣты цинка (№ 87); всѣ эти средства повторять чрезъ каждые 2—3 часа.

§ 150. Молочный струпь. — Признаки: на щекахъ, подбородкѣ, около губъ, ушей, на лбу появляются маленькіе, желтые или прозрачные прыщики, которые, лопнувъ,



отдѣляютъ желтоватую пасоку, на воздухѣ затвердѣвающую и превращающуюся въ плотный желтоватый струпъ, покрывающій иногда все лице какъ бы корью.

Эта болѣзнь свойственна только дѣтямъ, особенно груднымъ, плотнымъ, сочнымъ; она часто есть слѣдствіе жирнаго питательнаго молока, сочной, мясной, либо острой, раздражающей пищи, также неопрятности, сырости, теплоты въ комнатѣ, золотухи, и въ народѣ обыкновенно почитается за золотуху.

Лечение требуетъ прежде всего удаленія сказанныхъ причинъ. Для этого дитяти нужно порѣже давать сосать грудь и вовсе не давать ему мясной, острой, соленой пищи, а кормить его супомъ съ кореньями, молочною кашкою, ухю изъ мелкой рыбы, содержать дитя и его комнату опрятно, не жарко, освѣжать почаще въ комнатѣ воздухъ и перемѣнять дѣтское бѣлье, ежедневно купать ребенка въ теплой ваннѣ съ отрубями; внутрь давать ему чрезъ день ревенъ съ магнезією, дѣтскій порошокъ (№ 75) и ежедневно въ теченіе 2—3 недѣль, по утру и ввечеру, поить его чаемъ изъ трехцвѣтной фіалки (анютины глазки; *viola tricolor*, *jasea*). Если при молочномъ струпѣ замѣчаются признаки и золотухи (особенно опухоли шейныхъ желѣзъ), то болѣзнь лечится какъ золотуха. Кромѣ сего, при всѣхъ упорныхъ дѣтскихъ сыпяхъ, нужно обращать вниманіе на кормилицу и няньку: не имѣютъ ли онѣ любовстрастной болѣзни.

§ 151. Крупъ, воспаленіе горла у дѣтей. — Признаки: осиплый голосъ, короткое, трудное дыханіе съ хрипѣніемъ и свистомъ, кашель съ рѣзкимъ, толстымъ, пронзительнымъ звукомъ; съ усиленіемъ болѣзни, по мѣрѣ большаго затрудненія дыханія, дѣти вытягиваютъ шею и наклоняютъ голову кзади; лихорадка, забывчивость, сонливость.

Крупъ можно смѣшать съ двумя болѣзнями: съ обыкновеннымъ простуднымъ воспаленіемъ горла и съ мильяровою одышкою. Отъ перваго крупъ отличается своимъ короткимъ, свистящимъ дыханіемъ, котораго не бываетъ въ простудномъ воспаленіи горла, а только осиплый голосъ и сильный глухой кашель. Впрочемъ, эти обѣ болѣзни, какъ воспалительныя, мало разнятся въ леченіи. Гораздо



важныѣ отличить крупъ отъ мильяровой одышки, которой леченіе противоположно леченію крупа. Эта одышка отличается отъ крупа тѣмъ, что она появляется вдругъ, а крупу предшествуютъ простудные припадки; въ одышкѣ не замѣчается лихорадки, которая, напротивъ, всегда бываетъ въ крупѣ и притомъ очень сильная; одышка появляется припадками, бываетъ то сильнѣе, то слабѣе, и на нѣкоторое время прекращается вовсе; но припадки крупа продолжаются безпрерывно, въ равной степени, усиливаются до смерти, или же постепенно уменьшаются; въ одышкѣ, какъ нервной болѣзни, моча бываетъ блѣдная, а въ крупѣ, какъ воспаленіи, красная.

Теченіе крупа, какъ воспаленія, очень быстро: онъ оканчивается въ 3—6 дней выздоровленіемъ или смертію. Последняя происходитъ отъ задушенія скопившеюся въ дыхательномъ горлѣ вязкою, перепончатою мокротою, или отъ кровянаго пострѣла, какъ слѣдствія воспященнаго теченія крови отъ мозга въ грудь.

Причины. Крупъ состоитъ въ воспаленіи перепонокъ, выстилающихъ гортань и дыхательное горло; но это воспаленіе отличается тѣмъ, что бываетъ только у дѣтей до 12 лѣтняго возраста, и скоро производитъ выпотѣніе густой, творожной пасоки, которая, отъ доступа воздуха, превращается въ плотныя перепонки и сrostки, суживающіе и даже совсѣмъ запирающіе полость гортани и дыхательнаго горла. — Крупъ часто свирѣпствуетъ повально между дѣтьми и потому кажется какъ бы заразительнымъ. Зимнее время года, сырая погода, холодный вѣтеръ, простуда, также часто у дѣтей производятъ его.

Леченіе. Если въ сосѣдствѣ свирѣпствуетъ крупъ, или дитя, послѣ припадковъ обыкновенной простуды (катарра), кашляетъ съ пронзительнымъ, хриплымъ визгомъ, похожимъ на пѣніе молодого пѣтушка, или на лай собачки, то немедленно надобно пригласить врача и ему предоставить полное леченіе дитяти. При недостаткѣ врача, нужно дитяти прежде всего дать рвотное (№ 77) и заставить его вдыхать чрезъ воронку, или трубку, смягчительные пары изъ молока; шею натирать миндальнымъ, льнянымъ масломъ или свѣ-



жимъ свинымъ жиромъ; если это не поможетъ въ теченіе 6—12 часовъ, то дитяти моложе года поставить къ гортани 1—2—3 пиявицы, двухлѣтнему—4, трехлѣтнему—5 пиявицъ и т. д., смотря по лѣтамъ дитяти, увеличивая число пиявицъ по одной;—шесть пиявицъ могутъ умертвить полугодовалое дитя;—далѣе, давать дѣтямъ смѣсь изъ селитры (№ 88) черезъ часъ по чайной ложкѣ, продолжать вдыханіе смягчительныхъ паровъ, растираніе шеи масломъ, поставить клистиръ съ одною столовою ложкою уксуса и повторить его, если отъ перваго клистира не прослабитъ дитя. Въ этой болѣзни почитается весьма дѣйствительнымъ средствомъ мѣдный купоросъ, который стирается въ порошокъ и дается, смотря по возрасту дитяти, по 1—4 грана съ водою или сиропомъ, для произведенія рвоты, послѣ которой купоросъ дается чрезъ два часа по  $\frac{1}{4}$  грана, а когда припадки задушенія начнутъ усиливаться, то купоросъ опять дается въ большемъ пріемѣ для произведенія тошноты и рвоты; впрочемъ, мѣдный купоросъ мы совѣтуемъ давать дѣтямъ только подъ надзоромъ врача. Далѣе, послѣ припуска пиявицъ, нужно къ шеѣ спереди приставить мушку величиною въ рубль серебромъ; къ затылку, ногамъ и рукамъ ставить горчичники. При хрипѣніи, для освобожденія гортани отъ мокроты, нужно повторить рвотное, а при сонливости, забывчивости, красномъ лицѣ, поставить пиявицы къ затылку, или вискамъ. Всѣ эти средства надобно употреблять настоятельно; при бездѣйствіи ихъ, иногда спасало больного обливаніе головы холодною водою.

Впрочемъ, не всякую осиплость голоса съ пронзительнымъ кашлемъ у дѣтей нужно принимать за крупъ и употреблять эти сильныя средства. Крупъ часто начинается катарромъ и проходитъ отъ одного рвотнаго, которое не повредитъ и даже принесетъ пользу и въ мильяровой одышкѣ.

§ 152. Мильярова одышка.—Признаки: дитя, совершенно повидимому здоровое, вдругъ получаетъ одышку, особенно ночью, во снѣ; дыханіе у него дѣлается труднымъ, свистящимъ, даже съ опасностію задушенія; присемъ замѣчается непрерывная перхота, сильная тоска, безпокойство, глубокій кашель, какъ бы изъ брюха, и вовсе нѣтъ лихо-



радки. Эти припадки продолжаются 3 — 8 часовъ, потомъ совершенно прекращаются, а днемъ дитя совсѣмъ здорово. Въ слѣдующую ночь опять появляются тѣ же припадки и даже въ сильнѣйшей степени и опять прекращаются по прежнему; но въ третью ночь, если не были взяты мѣры, дитя умираетъ отъ задушенія, и въ такомъ случаѣ болѣзнь, начавшись ночью, не прекращается уже и днемъ. О различіи мильяровой одышки отъ крупа сказано выше; происходитъ же она отъ простуды, отъ тѣсноты жилища, отъ спертаяго, нечистаго, сырого воздуха.

Лечение. Прежде всего надобно доставить дитяти чистый, свѣжій воздухъ, вывести его въ просторную комнату, а лѣтомъ и на дворъ; далѣе, дать ему рвотное, а потомъ дурной духъ въ клистирь, полагая 5—10 гранъ его на клистирь, поставить на грудь мушку, къ рукамъ горчичники и постараться немедленно пригласить врача, для предотвращенія слѣдующаго припадка ночью.

§ 153. Острая водянка въ головѣ. — Признаки: дитя съ несоразмѣрно большою головою и особенно широкимъ лбомъ; у него долго не закрываются роднички, т. е. обволакиваясь только кожею, не покрываются черепомъ и рано развиваются умственные способности, или же, напротивъ, дитя, при большой головѣ, тупоумно, молчаливо, сонливо; игры его не занимаютъ, глазные зрачки расширены, глаза косые, походка шаткая, часто болитъ голова. Въ такомъ состояніи дитя находится неопредѣленное время, а потомъ развивается водянка въ головѣ, причемъ у дитяти замѣчается лихорадка, сонливость иногда съ судорогами, похожими на падучую болѣзнь, рвота, особенно при поднятіи головы, которой оно не можетъ держать прямо, но, то опускаетъ ее къ переди, на бока, то отклоняетъ къзади, глаза мутные, стеклянные, зрачки дрожащіе или расширены, взглядъ дикій, суровый; пульсъ непостоянный; наконецъ дитя засыпаетъ глубокимъ, непробуднымъ сномъ, получаетъ онѣмѣніе въ рукахъ, ногахъ и умираетъ отъ пострѣла.

Распознать водянку въ ея началѣ довольно трудно; ее можно смѣшать съ лихорадкою отъ глисть и съ прорѣзываніемъ зубовъ, отъ которыхъ однако она отличается рво-



тою и запоромъ на-низъ, незамѣчаемымъ при послѣднихъ двухъ болѣзняхъ. Притомъ рвота при водянкѣ происходитъ легко, бываетъ непродолжительна и запоръ на-низъ очень упоренъ. Болѣзнь замѣчается у дѣтей отъ одного года до семи лѣтъ и продолжается 8—12 дней и наконецъ оканчивается смертію, отъ скопленія крови въ головныхъ сосудахъ и накопленія сыворотки въ желудочкахъ мозга, какъ слѣдствій воспаленія мозга и значительныхъ приливовъ крови къ головѣ.

Причины. Врожденное расположеніе, состоящее въ значительной величинѣ головы; отъ этого въ нѣкоторыхъ семействахъ всѣ дѣти умираютъ отъ водянки, развивающейся во время и послѣ прорѣзыванія зубовъ; всё то, что усиливаетъ приливы крови къ головѣ: вино, пряности, прорѣзываніе зубовъ, разныя лихорадки, воспаленія, удары, паденія на голову, кутанье дѣтской головки въ теплыя шапочки, яркій солнечный свѣтъ, падающій на обнаженную головку, простуда головки, обнаженіемъ ея особенно во время пота, стриженіемъ волосъ. Послѣдней причинѣ, при нынѣшней модѣ стричь у маленькихъ дѣтей волосы, особенно нужно приписать частое появленіе острой водянки, которая также происходитъ отъ скрѣпленія на головѣ паршей, прекращеннаго гноетеченія изъ уха.

Леченіе. Какъ только замѣтимъ, что дитя дѣлается скучнымъ, не веселымъ, сонливымъ, при поднятіи головы получаетъ рвоту и старается скоро опять лечь, то непременно надобно скорѣе пригласить врача, при недостаткѣ котораго пужно поступать такъ: припустить однолѣтнему дитяти 2, двухлѣтнему 4, трехлѣтнему 6, и т. д. пиявицъ къ вискамъ, за ушами, и поддерживать кровотеченіе губкою съ теплою водою до тѣхъ поръ, пока дитя не поблѣднѣетъ; внутрь дать дитяти слабительное изъ сладкой ртути съ ялапою и если слабительное подѣйствовало мало (1 — 2 раза), то поставить клистиръ съ уксусомъ (ложку на стаканъ клистирной жидкости), голову обрить, или остричь, и прикладывать къ ней холодныя примочки или пузырь со льдомъ, снѣгомъ, къ ногамъ горчичники, къ затылку мушку. Если сонливость, судороги и рвота продолжаются или



замѣчается притомъ краснота въ лицѣ и жаръ въ головѣ, то припускъ пѣявиць къ вискамъ пужно повторить и голову обливать холодною водою; обливаніе повторять чрезъ два часа, или чаще, по мѣрѣ того, какъ усиливается жаръ въ головѣ, и продолжать до тѣхъ поръ, пока дитя крикомъ не обнаружитъ своего чувства, послѣ того обливанія дѣлаются рѣже и продолжаются менѣе времени.

§ 154. Медленная, продолжительная водянка въ головѣ. Въ этой болѣзни медленно накапливается вода въ черепъ, между мозгомъ и его оболочками. Это скопленіе воды по большей части бываетъ врожденное и происходитъ безъ лихорадки: источники, или родники на тѣмени и къ затылку, по рожденіи дитяти, не суживаются, но еще расширяются, голова увеличивается въ объемъ, черепныя кости расходятся, на источникахъ появляются возвышенія, въ которыхъ примѣтно зыбленіе жидкости; въ такомъ положеніи дитя, съ огромною головою, можетъ оставаться до 14—18 лѣтъ.

Леченіе можно предоставить только врачамъ, и то опытнымъ хирургамъ.

Такое же медленное скопленіе жидкости у дѣтей происходитъ и въ нижней части спины, чрезъ трещину которой видится кнаружи упругая, зыблющаяся опухоль. Болѣзнь бываетъ также врожденная и неизлечима.

Сверхъ сихъ болѣзней, у дѣтей на головѣ появляются: мозговая грыжа, наросты, бугорки, размягченія мозга, нагноенія, свищи, и пр.; леченіе ихъ, рѣдко впрочемъ удачное, предоставляется врачамъ.

§ 155. Дѣтская брюшная сухотка. — Признаки: полный, твердый напряженный животъ, въ которомъ, при ощупываніи, можно замѣтить отвердѣнія брыжеечныхъ желѣзъ въ видѣ плотныхъ шариковъ; старообразное, морщиноватое лице (отъ чего и болѣзнь въ простонарѣчьи называется собачьею старостью); то отвращеніе отъ пищи, то ненасытный голодъ; дѣти любятъ черный хлѣбъ, вино, глину,



уголь; запоръ на-низъ, а иногда поносъ; блѣдная, морщиноватая шершавая кожа, часто покрытая прыщами; исхуданіе рукъ и особенно ногъ, на которыхъ кожа виситъ въ видѣ большихъ складокъ; слѣды золотушнаго расположенія.

Причины: болѣзнь состоитъ въ завалахъ, затвердѣніи брыжеечныхъ желѣзъ, чрезъ которыя не можетъ проходить въ кровь питательный сокъ изъ кишекъ. Происхожденію этой болѣзни способствуютъ: слабость, старость, золотуха, любострастная болѣзнь, цынга, подагра родителей, недостатокъ молока у матери, болѣзнь кормилицы, искусственное кормленіе груднаго младенца клейкою, кислую, тяжелою, жирною пищею, невыпеченнымъ, мягкимъ ржанымъ хлѣбомъ, блинами, пирогами, аладьями, клецками (галушками), лапшею, киселемъ, картофелемъ; неумѣренное (излишнее) кормленіе младенца и здоровою пищею; неопрятное содержаніе дитяти относительно его тѣла, бѣлья, комнаты; спертый, нечистый, сырой воздухъ дѣтской комнаты, тугое пеленаніе особенно живота; дурное обыкновение давать дѣтямъ вино, водку, чай изъ маковыхъ головокъ и опій для усыпленія безпокойныхъ дѣтей.

Болѣзнь чаще случается между первымъ и четвертымъ годами; замѣчается однако и у взрослыхъ, какъ припадокъ золотухи. Она излечима, если родители своевременно обратятъ вниманіе на больное дитя; но будучи запущена, причиняетъ смерть чрезъ сухотку.

Леченіе нужно предоставить врачу, потому болѣе, что болѣзнь, при медленномъ своемъ ходѣ, представляетъ къ тому полную возможность. При недостаткѣ врача, нужно поступать такъ: прежде всего надобно позаботиться о доставленіи дитяти хорошей пищи, чистаго воздуха, опрятности; по выполненіи этихъ требованій, болѣзнь часто проходитъ безъ всякаго леченія. Посему груднымъ дѣтямъ нужно доставить хорошую кормилицу, при недостаткѣ которой кормить его парнымъ козьимъ молокомъ, водою съ личнымъ желткомъ, ежедневно дѣлать теплыя ванны съ



солодомъ, по временамъ т. е. 2—3 раза въ недѣлю давать дѣтскій порошокъ (№ 75).

Когда брюхо значительно увеличится и дитя будетъ 2—3 лѣтъ, то, кромѣ питья изъ воды съ яичнымъ желткомъ, сначала однажды въ день по утрамъ, а потомъ поутру и ввечеру давать съ коровьимъ молокомъ кофе изъ дубовыхъ жолудей, который отлично хорошо размягчаетъ окръпшія желѣзы въ дѣтскомъ животѣ. Для приготовленія этого кофе, дубовыя жолуди жарятся, подобно арабскимъ кофейнымъ бобамъ, очищаются отъ шелухи и мелются въ порошокъ, котораго одна—двѣ чайныя чашки кипятятся въ 1—2 чашкахъ воды; кипятокъ отстаивается и полчашки его смѣшивается съ полчашкою парного коровьяго молока, или съ цѣльнымъ яичнымъ желткомъ. Этотъ кофе дитя кушаетъ вмѣсто завтрака съ хлѣбомъ, или сухарями (но не здобными), или грѣнками; для маленькихъ дѣтей достаточно одной, а для большихъ двухъ чашекъ желудинаго кофе. Далѣе, полезны въ сей степени сухотки тѣ же средства, кои исчислены въ ея слабой степени, особенно теплыя ванны изъ солода, или животныя ванны, т. е. покрѣпленіе дитяти еще теплыми внутренностями (кишками, желудкомъ), кожею сейчасъ зарѣзаннаго животнаго, также припарки изъ свѣжаго, жидкаго, еще теплаго коровьяго кала. Изъ лекарствъ полезны: магнезія, ревенъ, дѣтскій порошокъ, вытяжка одуванчика съ хиною. Всѣ эти средства употребляются въ теченіе 1—2 мѣсяцевъ, а потомъ, когда брюшко сдѣлается мягче и меньше, то назначается желѣзо внутрь въ видѣ цвѣтовъ желѣзнаго нашатыря (№ 65), а снаружи въ видѣ ваннъ, которыя приготовляются изъ искусственныхъ или натуральныхъ желѣзныхъ водъ: кавказскихъ, фашингскихъ, гейльнауерскихъ, а потомъ пирмонтскихъ. Если при этомъ леченіи будетъ замѣчена гдѣ либо въ брюхѣ (при ошупываніи) постоянная боль, то къ тому мѣсту припустить 2—4 пиявы, для разрѣшенія медленнаго воспаленія въ брыжеечныхъ желѣзахъ.

О другихъ дѣтскихъ болѣзняхъ упомянуто въ разныхъ мѣстахъ отдѣловъ о внутреннихъ и наружныхъ болѣзняхъ;



прочія же дѣтскія болѣзни требуютъ хирургической помощи, и потому во всякомъ случаѣ дѣлають необходимымъ приглашеніе врача, напр. затвореніе разныхъ отверстій (рта, задняго прохода, мочевого канала), искривленіе и срастеніе членовъ, грыжи и пр.



## РЕЦЕПТЫ.

### № 1. КИСЛОЕ ПИТЬЕ. СЪЕДЛАЯ. КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА.

Взять: виннаго камня (кремортартара) —  $\frac{1}{2}$  унции. рѣчной воды 5 фунтовъ, варить въ глиняномъ горшкѣ, пока не растворится порошокъ, потомъ прибавить одинъ лимонъ, срезанный въ куски, и сахару 6 унцій, процѣдить: — питье.

### № 2. РИВЕРІЕВА СМѢСЬ. МИКСТУРА ЛИМОННО-КИСЛОГО ПОТАША:

Взять: углекислаго поташа 2 драхмы, наливаетъ на него свѣжаго лимоннаго соку до тѣхъ поръ, пока онъ не перестанетъ вскипать, потомъ прилить перегнанной или отварной воды 3 унцій. Принимать чрезъ 1—2 часа по 1—2 столовыя ложки.

### № 3. ШИДУЧІЙ, ПРОТИВУРВОТНЫЙ ПОРОШОКЪ, ШИДУЧІЙ ЛИМОНАДЪ.

Взять: углекислой магнезіи или дву-углекислаго поташа 15 гранъ, лимонной кислоты и чистаго сахару по 20 гранъ, стереть въ порошокъ, который и прини-

мать въ водѣ во время шипѣнія. Для вѣрности, углекислую магнезію, или соду, и лимонную кислоту можно готовить отдѣльными порошками, изъ которыхъ каждый растворять въ полстаканъ воды; оба раствора сливать вмѣстѣ и выпивать во время вскипанія, или же выпивать порознь каждые растворы; причемъ вся углекислота отдѣляется уже въ желудкѣ. Послѣдній способъ пріема есть самый дѣйствительный.

### № 4. ПРОХЛАЖДАЮЩАЯ, СЕЛИТРЯНАЯ СМѢСЬ, МИКСТУРА.

Взять селитры 1—2 драхмы.  
— перегнанной воды 4—6 унцій.  
— уксусу  $\frac{1}{2}$  — 1 унцію.  
— малиноваго сиропу 1 унцію.

Принимать чрезъ часъ по столовой ложкѣ.

### № 5. ПРОХЛАЖДАЮЩІЙ ПОРОШОКЪ.

Взять селитры 4—6—8 гранъ  
— кремортартара 20 гранъ,  
— сахару  $\frac{1}{2}$  драхмы;



Стереть въ порошокъ, и принимать по одному чрезъ 1—2 часа.

**№ 6. ПРОХЛАЖДАЮЩАЯ СЛАБИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.**

Вз. плодовъ тамариндъ и отборной манны по полунции, Глауберовой соли унцію, сварить въ фунтѣ воды, процѣдить и прибавить малиноваго сироу унцію. Принимать чрезъ 1—2 часа по двѣ столовыя ложки.

**№ 7. СЛАБИТЕЛЬНАЯ МИКСТУРА, ВѢНСКОЕ, ЧЕРНОЕ ЦѢЛѢ.**

Вз. александрійскаго листа двѣ драхмы, отборной манны — плодовъ тамариндъ по полунции, сѣмянъ укропу драхму, рѣчной воды 10 унцій, сварить, процѣдить въ отвару въ 7—8 унцій, прибавить малиноваго сироу унцію. Принимать чрезъ 2 часа по двѣ столовыя ложки, пока не прослабитъ низомъ; или же разомъ принять половину, и, буде чрезъ 2—3 часа не послабитъ, то и другую, либо половину остатка.

**№ 8. ПОТОГОННЫЙ ЧАЙ.**

Онъ готовится изъ цвѣтовъ бузины, липы, травы

мелиссы, сухихъ ягодъ малины, даже соломы ячменной.

**№ 9. ХЛОРИНОВАЯ ВОДА.**

Вз. хлориновой воды полунции и даже унцію — перегнанной воды 7 унцій. — малиноваго сироу унцію, смѣшать и принимать чрезъ 2 часа по 1—2 столовой ложки.

**№ 10. а) РВОТНОЕ ВЪ ПОРОШКѢ.**

Вз. рвотнаго корня (ипеакауаны) 20 гранъ, рвотнаго камня 1 гранъ, стереть въ порошокъ, который принять разомъ.

**б. РВОТНОЕ ВЪ РАСТВОРѢ.**

Вз. перегнанной воды 4 унции. — рвотнаго камня 4 грана, смѣшать и принимать чрезъ 5—10 минутъ, взрослымъ по столовой, а дѣтямъ по чайной ложкѣ, до дѣйствія. Рвотное въ растворѣ, кромѣ рвоты, часто низомъ слабитъ, и можетъ замѣнить слабительное.

**№ 11. РАЗРѢШАЮЩАЯ СМѢСЬ.**

Вз. нашатыря 1 драхму.



— рвотнаго камня 1—2  
ГРАНА.

— Поташнаго камня (tartarus tartarizatus) 2—4  
ДРАХМЫ.

— перегнанной воды 4—6  
УНЦІЙ,

— малиноваго сиропу унцію, смѣшать и давать чрезъ 1—2 часа по столовой ложкѣ. При сильномъ жарѣ, можно прибавить драхму селитры.

#### № 12. РАЗРѢШАЮЩАЯ МЯГЧИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.

Вз. миндальнаго или коноплянаго молока 6 унцій  
нашатыря 1 драхму,  
просвирнаго сиропу 1 унцію, смѣшать и принимать чрезъ 1—2 часа по столовой ложкѣ.

#### № 13. СМѢСЬ КРѢПИТЕЛЬНАЯ.

Вз. наливки изъ ромашки, или трилистника, либо аира, 4—6 унцій.

— нашатыря, одну-полторы драхмы.

— Померанцоваго сиропу унцію, смѣшавъ, принимать чрезъ 2 часа по ложкѣ. Если хотимъ усилить дѣйствіе, то можно прибавить 1—2 драхмы вытяжки изъ этихъ же растеній, или, для простаго наро-

да, трилистникъ, аиръ давать въ порошокъ такъ:

№ 14. Вз. порошка  $\frac{1}{2}$  — 1  
ДРАХМУ.

— нашатыря 5—7  
ГРАНЪ,  
принимать чрезъ 2—3 часа порошокъ.

#### № 15. ПРОТИВУЛИХОРАДОЧНАЯ СМѢСЬ.

Вз. мятной или другой ароматной воды 6 унцій.

— хинной соли 12—24

ГРАНА  
— сѣрной кислоты 5—10  
КАПЕЛЬ.

Принимать чрезъ 1—2—3 часа по столовой ложкѣ.

#### № 16. СВОРЪ ДЛЯ РАЗРѢШАЮЩАГО КЛИСТИРА.

Вз. корня одуванчика,

— мыльной травы,

— цвѣтовъ медвѣжьяго ушка, (verbascum thapsus)

— ромашки, каждого по равной части (по унціи), смѣшать. Двѣ столовыя ложки сего сбора съ горстью отрубей наливается 8—12 унціями горячей воды, и къ процеженной наливкѣ, или отвару, въ случаѣ надобности, прибавляется драхма мыла и 1—2 ложки постна-



го масла. Клистирную жидкость нужно медленно вливать въ проходъ, гдѣ она должна оставаться какъ можно долѣе.

#### № 17. РАЗРѢШАЮЩАЯ И СЛАВЯЩАЯ СМѢСЬ.

Вз. перегнанной воды 4—6 унцій.

— селитры или нашатыря

1—2 драхмы,

— горькой соли унцію.

— рвотнаго камня 1—2

гранна,

смѣшать и давать по столовой ложкѣ чрезъ часъ.

#### № 18. ПОЛОСКАНЬЕ.

Вз. наливки цвѣтовъ бузины, или ромашки 1

фунтъ.

— нашатыря или селитры

1—2 драхмы.

— меду съ уксусомъ 3

унцій.

Смѣшавъ, теплымъ полоскать горло, и впрыскивать въ ротъ.

#### № 19. ДРУГОЕ ПОЛОСКАНЬЕ.

Вз. шалфея,

— цвѣтовъ бузины по полунціи.

Вскипятить въ двухъ

фунтахъ воды, про-

цѣдить и прибавить на-

стойки аниса (репрі-

nella anisi) унцію, квасцовъ 3 драхмы.

Холоднымъ полоскать горло и впрыскивать въ ротъ.

#### № 20. ПРОТИВУВОСПАМИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.

Вз. рвотнаго камня 3 гра-

на

— селитры 2 драхмы.

— рѣчной воды 4 унцій.

— сиропу просвирнаго

— солодковаго корня по

унцій.

Принимать чрезъ 2 часа по 2 столовыя ложки. Послѣ первыхъ пріемовъ больного можетъ стошнить и даже вырвать, но потомъ этого уже не бываетъ.

#### № 21. СМѢСЬ, ОТДѢЛЯЮЩАЯ ХАРКОТИНУ.

Вз. отвара просвирнаго кор-

ня 6 унцій.

— селитры и нашатыря по

драхмъ.

— соку лакричнаго 3

драхмы.

Принимать чрезъ 1—2 часа по столовой ложкѣ.

При сильномъ кашлѣ, къ сей смѣси прибавляется по полграну на пріемъ вытяжки былены, т. е. по грану на унцію жидкости.

#### № 22. МАСЛЯНОЕ, БОЛЕУТОЛИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО ИЛИ ЭМУЛЬСИЯ.

Вз. масла сладкаго миндаля



или макового свѣжаго  
ручной воды 8 унцій.  
слизи аравійской камеди,  
стереть въ молоко и приба-  
вить вытяжки бѣлены 6—8  
гранъ, или водяной вытяж-  
ки опія 3 грана.

— настойки опія 20—30  
капель,  
— просвирнаго сиропу ун-  
цію.

принимать чрезъ часть по сто-  
ловой ложкѣ.

### № 23. ПРОХЛАЖДАЮЩАЯ ПОТОГОННАЯ СМѢСЬ.

Вз. наливки бузиновыхъ или  
липовыхъ цвѣтовъ 4—6  
унцій.

селитры  $\frac{1}{2}$ —1 драхму.  
камфоры 4—6 гранъ.

миндерерова спирта 1  
унцію.

малиноваго сиропу 1  
унцію.

Смѣшавъ, давать чрезъ 1—2  
часа по столовой ложкѣ.

### № 24. МОЧЕГОВНАЯ СМѢСЬ.

Взять наливки или отвара  
петрушки или сельдерея 4—6  
унцій.

Селитры 1—2 драхмы.

Кремортартара 2—4 драх-  
мы.

Сиропу морского луку или  
моршки 1 унцію; приви-

мать чрезъ 2 часа по сто-  
вой ложкѣ. Вместо селитры  
можно брать 1—2 драхмы  
буры.

### № 25. СЪРНАЯ ВОДА.

Вз. сѣрной печенки  $\frac{1}{2}$ —1  
унцію.

— горячей воды 1—2  
фунта.

Растворивъ, процѣдить и  
обмывать чесоточныя мѣста.

### № 26. СЪРНАЯ МАЗЬ, ПРО- СТАЯ.

Вз. очищенной сѣры въ  
порошкѣ двѣ части.

— свиного сала 8 частей,  
растопить въ горшкѣ на  
огнѣ, мѣшая, пока не про-  
стынетъ. Втирать въ чесо-  
точныя мѣста, ввечеру по  
чайной ложкѣ и болѣе.

### № 27. СЪРНАЯ МАЗЬ (Англій- ская) СЛОЖНАЯ.

Вз. очищенной сѣры 3 ун-  
ции.

— корня бѣлой чемерицы  
1 унцію.

селитры  $\frac{1}{2}$  драхмы,  
стереть въ порошокъ и при-

бавить, чистаго свиного сала  
10 унцій,

растопить на огнѣ и смѣ-  
шать въ мазь.

Эта мазь употребляется въ  
застарѣлой чесоткѣ всего тѣ-



ла; ея фунтъ назначается на 4 втиранія; производится такъ: чесоточный въ вечеру обмывается мыломъ въ банѣ, и потомъ ему втирають тщательно по 3 унціи мази. Послѣ чего въ болѣе чесоточныя мѣста еще нѣсколько ночей втирается мазь; при семъ и внутрь даютъ сѣру, хотя чесотка часто проходитъ и отъ однихъ втираній. По уничтоженіи чесотки, больной опять обмывается въ банѣ съ мыломъ.

#### № 28. СѢРНОЕ МЫЛО.

Вз. очищенной сѣры—въ порошокъ и мыла поравной части; хорошо смѣшать въ каменной ступкѣ въ сплошную массу, которой дать форму мыла.

#### № 29. КРОВОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СВОРЪ.

Вз. корня сассапареля, лопушника, мыльной травы, макричника, стеблей сладкогорькаго паслена (*stipites dulcamarae*), бакаутоваго дерева, каждого по равной части, срезать ихъ въ мелкія стружки и разбить въ ступкѣ. Два лота сего сбора уваривать до половины въ 2 фунтахъ воды, затемъ

фунтъ отвара теплымъ выпивать ежедневно въ 2-3 приѣма. Въмѣсто дорогой сассапарели, можно брать корень осокли (*rad arapanae*).

#### № 30. КОСМЕТИЧЕСКОЕ УМЫВАНЬЕ.

Вз. сладкаго миндаля 2 драхмы, розовой и померанцовой воды по 8 унцій, стереть въ молоко и прибавить настойки росного ладана, буры, каждой—по 1

драхмѣ. обмывать на ночь лишайныя мѣста; если же кожа очень чувствительна, то въ умыванье не класть буры.

#### № 31. УМЫВАНЬЕ СЪ КАМ- ФОРЮ.

Вз. перегнанной воды  $1\frac{1}{2}$  фунта, сѣрнаго молока 5-ть драхмъ, камфоры—2 драхмы. Сѣрное молоко распустить въ водѣ, а потомъ камфору растворить въ малости спирта, стереть со слизью и наконецъ вылить ее въ воду. Намачивать сыпь по вечерамъ, а по утру обмывать.

#### № 32. МАСЛО ВЪЛЕНА.

Вз. улитъевъ бѣленъ 2 унцій,



деревянного масла 1 фунтъ, наливать масло на бѣлену, настоять ихъ въ легкомъ жару въ теченіе 2 часовъ, часто мѣшая лопаткою, потомъ слить и выжать. Это масло темнозеленаго цвѣта, и употребляется снаружки въ видѣ втираній для унятія разныхъ болей, судорогъ, рвиз и пр.

**№ 33. РАЗРѢШАЮЩАЯ И СЛАВИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.**

Вз. вѣскаго питья (№ 7) 6 унцій, нашатыря 1—2 драхмы, смѣшать и давать чрезъ 2 часа по 1—2 ложки столовыя.

Или, вмѣсто вѣскаго питья, взять: отвара цикорія, или одуванчика 4 унции,

— наливки ревеня 2 унции,

— нашатыря 1—2 драхмы.

— сѣрвокислаго поташа  $\frac{1}{2}$  унции,

— сиропу малиноваго или маннаго, вышневаго 1 унцію, принимать чрезъ 2 часа по 2 ложки столовыя.

**№ 34. МОЧЕГОННАЯ МИКСТУРА.**

Вз. жженныхъ источенныхъ

можжевеловыхъ ягодъ 1 унцію, налить ихъ фунтомъ горячей воды и вскипятить какъ кофе, процѣдить и прибавить уксусокислаго поташа или буры 2—3 драхмы.

принимать чрезъ 2—3 часа по двѣ столовыя ложки, или по рюмкѣ.

**№ 35. СЛАВИТЕЛЬНО-РАЗРѢШАЮЩІЯ ПИЛЮЛИ.**

Вз. порошка александрійскаго листа 2 драхмы. вытяжки одуванчика сколько нужно для приготовленія 60 пилюль, которыя принимать по 5—10 штукъ утромъ.

**№ 36. ЧАЙ СЕНЖЕРМЕНЯ.**

Вз. александрійскаго листа 4 унции.

настоять въ чистомъ спиртѣ въ тепломъ мѣстѣ, въ теченіе 24 часовъ, потомъ слить спиртъ, а листь высушить на солнцѣ, или въ тепломъ мѣстѣ, но не въ жару, и прибавить къ листу: цвѣтовъ бузины  $2\frac{1}{2}$  унции.

— сѣмянъ укропа, аниса по 1 унции,

— кремортартара 6-ть драхмъ,



смѣшать. Две унціи сего чая наливается пятью чашками горячей воды, настаиваются 10 часовъ въ тепломъ мѣстѣ; настой пьютъ по полчашкѣ 2—3 раза въ день, а при слабости желудка съ малагою. Этотъ чай слабятъ низомъ.

### № 37. ТАБАЧНЫЙ КЛИСТИРЬ.

Вз. листьевъ простого табаку 2—4 драхмы.  
— вскипятить ихъ въ 10—12 унціяхъ воды, процѣдить и влить въ клистирную трубку 7—9 унцій отвара.

### № 38. УСПОКОИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.

Вз. льняныхъ сѣмянъ  $1\frac{1}{2}$  унции,  
— наперсточной травы 20—30 гранъ,  
— настоять въ 6 унціяхъ горячей воды, процѣдить и прибавить:  
— селитры драхму,  
— маковаго сиропу унцію.  
Принимать чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ.  
Наперсточную траву съ миндальнымъ, маковымъ молокомъ можно принимать или въ вытяжкѣ, или въ порошокъ по  $1\frac{1}{2}$  — 1 грану чрезъ 2 часа.

### № 39. КВАСЦОВАЯ ВЯЖУЩАЯ СЫВОРОТКА.

Вз. коровьяго молока  $1\frac{1}{2}$  фунта.  
квасцовъ 2 драхмы,  
варить, пока створожится молоко, процѣдить и прибавить сиропу вишневаго, или коричнеаго 1 унцію.  
принимать по полчашкѣ чрезъ 1—2 часа.

### № 40. РАЗРѢШАЮЩАЯ СМѢСЬ.

Вз. мятной, перегнанной воды по 3 унции.  
вытяжки одуванчика,  
— диорея,  
— пырея,  
— потаиннаго камня (tartarus tartarisatus) по 4 драхмы,  
пить 4—6 разъ въ день по столовой ложкѣ.

### № 41. СЪРНЫЙ СЛАБИТЕЛЬНЫЙ ПОРОШОКЪ.

Вз. кремортартара 1 унцію.  
сѣрыхъ цвѣтовъ  $1\frac{1}{2}$  унции.  
магнезиі 2 драхмы.  
мятнаго елеосахара  $1\frac{1}{2}$  унции.  
смѣшать и принимать 1—2 раза въ день по чайной ложкѣ въ теченіе недѣли такъ,



чтобы въ сутки слабило 2  
раза.

**№ 42. ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ  
(№ 41) ПОРОШОКЪ.**

Вз. сѣрнаго молока, угле-  
кислой магнезии, вин-  
нокаменной кислоты  
(sal essentielle tartari),  
лимоннаго или друго-  
го елеосара, каждого  
по 2 грана.  
принимать на ночь въ чаш-  
кѣ воды.

**№ 43. МОЛОЧНО - КАМФОР-  
НАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маковаго или конопля-  
наго молока 8—12 ун-  
цій.  
— камфоры 4—6 гранъ.  
— просвирнаго сироу 1  
унцію.  
Принимать чрезъ 1—2 часа.  
по полчашкѣ.

**№ 44. КРѢПИТЕЛЬНОЕ, ВЯ-  
ЖУЩЕЕ ПОЛОСКАНЬЕ.**

Вз. отвара хинной или ду-  
бовой коры 1 фунтъ.  
— квасцовъ 2 драхмы.  
— хрънтовой водки 2—4  
унции.  
Полоскать ротъ почаще и  
держатъ въ немъ подольше  
жидкость.

**№ 45. РАЗРѢЩАЮЩАЯ, ПРО-  
ТИВУПОНОСНАЯ СМѢСЬ.**

Вз. отвара просвирокъ или  
салепа 4—6 унцій.

нашатыря 40—60 гранъ.  
— жженаго ревеня 15—20  
гранъ, или ревенной  
наливки  $\frac{1}{2}$  унции.

— просвирнаго сироу 1  
унцію.  
Принимать по столовой лож-  
кѣ чрезъ 3—4 часа.

**№ 46. МАСЛЯНАЯ, ПРОТИ-  
ВУ ПОНОСНАЯ СМѢСЬ.**

Вз. миндальнаго или дру-  
гого выжатаго масла  
1 унцію.  
— слизи аравійской каме-  
ди  $\frac{1}{2}$  унции,  
стереть въ молоко, при-  
бавляя понемногу 4  
унции перегнанной во-  
ды,  
— нашатыря 1 драхму,  
— просвирнаго сироу 1  
унцію.  
Принимать чрезъ 2—3 часа  
по 2 столовыя ложки.

**№ 47. ПРОТОВУПОНОСНЫЙ  
КЛИСТИРЪ.**

Вз. отвара крахмала 6—8  
унцій.  
— выжатаго масла 1 ун-  
цію.  
— настойки опиѣ 10—20  
капель.

Для одного клистира.

**№ 48. ПРОТИВУПОНОСНЫЙ  
ПОРОШОКЪ.**

Вз. ревеня 2 грана.



— ипекакуаны  $\frac{1}{4}$  грана.  
— раковых жерновокъ,  
или мьлу 10 гранъ.

Приготовить такихъ порошковъ 8—12; принимать чрезъ  $\frac{1}{2}$ —1 часъ по порошку. Въ-сто жерновокъ, можно брать аршенской глины по 5—10 гранъ.

#### № 49. ДОВЕРСЪ ПОРОШОКЪ.

Вз. опія, ипекакуаны по 1 драхмъ.

— сѣриокислаго паташа 1 унцію,  
стереть въ мелчайшій порошокъ. Этотъ порошокъ успокоиваетъ, возбуждаетъ, уменьшаетъ судороги, знатно производитъ испарину, и потому дается при боляхъ, ревматизмъ, кашль, простомъ и кровавомъ понось, и вообще въ простудъ, когда нужно произвести испарину. Его даютъ по 5—10—20 гранъ въ густомъ слизистомъ отваръ, и не велятъ по приѣмъ порошка пить, дабы не возбудить рвоты.

#### № 50. ПРОТИВУПОНОСНАЯ СМѢСЬ.

Вз. ревенной наливки 1 унцію или порошка жженнаго ревеня 20—30 гранъ.  
— нашатыря 1—2 драхмы.

— вишневой воды 7 унцій.

— Сиденгамовалавдана 20 канель.

— просвирнаго сиропу 1 унцію,  
принимать чрезъ 2 часа по 2 столовой ложкѣ.

#### № 51. ЧАЙ ДЛЯ ИПОХОНДРИКОВЪ И ИСТЕРИЧЕКЪ.

Вз. зеленыхъ померанцовыхъ листовъ, корни мауна (valeriana), корни гравилата (caryophyllata), травы мелиссы, каждаго по равной части. каждый вечеръ 1—2 столовые ложки этого чая наливаетъ горячею водою, настаиваетъ въ теченіе ночи, и на другой день, холоднаго, выливаетъ половину по утру и другую ввечеру.

#### № 52. ПОРОШОКЪ ПРОХЛАЖДАЮЩІЙ, УСПОКОИВАЮЩІЙ ВОЛНЕНІЕ КРОВИ.

Вз. селитры 6—10 гранъ.

— кремортартара 20 гранъ.

— наперсточной травы

$\frac{1}{2}$ —1 гранъ.  
стереть въ порошокъ и принимать чрезъ 2—3—4 часа по порошку. Этотъ порошокъ полезенъ при біеніи сердца.

#### № 53. ГРУДНОЙ ЧАЙ.

Вз. цвѣтовъ медвѣжьяго



ушка (*verbascum thapsus*),

травы подбѣла (мать-мачихи *tussilago farfara*),

цвѣтовъ бузины.

просвинокъ, каждого

по 1 унціи.

фіялки Флорентинской,

сѣмянъ укропа по 6

драхмъ.

Срѣзать, столочь и смѣшать;

взять ложку столовую сего

чая, налить горячею водою

и настоявъ, пить теплымъ съ

сахаромъ, медомъ, патокою.

#### № 54. КАПЛИ ОТЪ КАШЛЯ.

Вз. укропной воды 1 ун-

цію,

лавровишневой 1 драх-

му,

вытяжки сладкогорь-

каго паслена 20 гранъ,

кудряваго волчца (*sca-*

*dium benedictum*) 1

драхму.

принимать 4—6 разъ въ день

по 40—60 капель.

#### № 55. КАПЛИ ОТЪ КОКЛЮ- ША.

Вз. сурмянаго вина (*vi-*

*num stibiatum*) 1 драх-

му.

лавровишневой воды 2

драхмы,

дѣтямъ 2—4 лѣтъ давать по

5—10 и болѣе капель 3—4  
раза въ день.

#### № 56. ПРОТИВУРВОТНЫЙ СПИРТЪ.

Вз. ромашечнаго спирта 6

унцій,

настойки опія 2 драх-

мы,

втирать и примакивать ложеч-

ку, противъ желудка.

#### № 57. КРѢПИТЕЛЬНЫЙ ПО- РОШОКЪ.

Вз. порошка хины 30-ть

гранъ,

— желѣзнаго купороса 1

гранъ.

— корицы 2 грана,

стереть въ порошокъ, кото-

рый и принимать утромъ и

вечеромъ по одному.

#### № 58. БОЛЕУТОЛИТЕЛЬНОЕ УМЫВАНЬЕ.

Вз. воды лавровишневой,

— свинцовой Гуларда (со

спиртомъ) по 2 унціи.

— розовой 4 унціи.

Обмывать больное мѣсто

(щеку).

#### № 59. БОЛЕУТОЛИТЕЛЬНАЯ, ПРОТИВУСУДОРОЖНАЯ МАЗЬ.

Вз. летучей мази съ кам-

форною 1 унцію.

— масла каипутнаго, куд-

рявой мяты (*mentha*

*crispa*) по 10 гранъ.



Смѣшать и втирать въ больное мѣсто (шеку, ложечку).

**№ 60. ПОРОШОКЪ ПРОТИВЪ ГОЛОВОКРУЖЕНІЯ** (у пожилыхъ людей, подагриковъ).

Вз. смолы баккаута 30-ть гранъ,  
— кремортартара 60 гранъ,  
— сахара 30 гранъ.

Стереть въ порошокъ, котораго половину принимать по утру, а другую ввечеру, въ теченіе 7—14 дней.

**№ 61. СВОРЪ ДЛЯ ПОЛМОНОВА ОТВАРА.**

Вз. сассапарели 1 унцію,  
— стеблей сладкогорькаго послена  $1\frac{1}{2}$  унцій,  
— порошка сюрмы (antimonium crudum) 1 драхму,  
— рѣчной воды 3 фунта, уваривъ до  $1\frac{1}{2}$  фунта, прибавить: александрійскаго листа 30 — 60 гранъ,  
— лакричника 2 драхмы. Выпивать въ 3 приѣма въ сутки.

**№ 62. ЖЕЛѢЗНЫЙ ПОГОШОКЪ.**

Вз. желѣзнаго (зеленаго) купороса 1—2 грана, или цвѣтовъ желѣзнаго нашатыря 2—4 грана.

решенія и корицы по 2 грана, сахару 20 гранъ.

Стереть въ порошокъ, который и принимать 2—4 раза въ день.

**№ 63. ПРОТИВУЦЫНГОТНОЕ ПОЛОСКАНИЕ.**

Вз. отвара дубовой коры или корня аира 1 фунтъ,  
— квасцовъ 1—2 драхмы,  
— хрѣновой водки, или спирта ложечной травы 2—4 унцій. Полоскать почае ротъ.

**№ 64. ЖЕЛѢЗНЫЙ ПОРОШОКЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ.**

Вз. желѣза 1—2 грана,  
— раковинъ 10 гранъ,  
— корицы 1 гранъ,  
— сахару 20 гранъ. Стереть въ тончайшій порошокъ и принимать утромъ и вечеромъ по порошку.

**№ 65. СМѢСЬ ПРОТИВЪ ПОДАГРЫ, ЛОМОТЫ.**

Вз. баккаутной смолы 2 драхмы,  
— аравійской камеди столько же, перегнанной воды 6 унцій, чрезъ прибавленіе небольшого воды и рас-



тираніе въ ней смолы  
и камеди получится  
молоко, потомъ при-  
бавить селитры 1

драхму,

— сурмянаго вина 1

драхму,

— просвирнаго сиропу 1

унцію.

Принимать чрезъ 2—3 часа  
по столовой ложкѣ.

**№ 66. ДРУГАЯ СМѢСЬ ПРО-  
ТИВЪ ПОДАГРЫ.**

Вз. углекислаго натра 1

драхму.

— полынной вытяжки 2

драхмы,

— воды перечной мяты

4 унции,

— померанцоваго сиропу

1 унцію.

Принимать 4—6 разъ въ день  
по столовой ложкѣ.

Очень похвальное противъ  
подагры средство есть раст-  
воръ двухъ унцій смолы  
баккаута въ 4 фунтахъ чи-  
стѣйшаго рому (тафія); эту  
настойку принимать по сто-  
ловой ложкѣ по утру, въ  
теченіе многихъ мѣсяцевъ  
(см. Лекарственникъ).

**№ 67. ПОРОШОКЪ ПРО-  
ТИВЪ ПОДАГРЫ.**

Вз. смолы баккаута, сыр-  
наго молока по 5—10

гранъ,

— лимоннаго элеосахара  
20 гранъ,  
стереть въ порошокъ и при-  
нимать 2—3 раза въ день  
по порошоку.

**№ 68. ПИЛЮЛИ ПРОТИВЪ  
ЛЮВОСТРАСТНЫХЪ ЯЗВЪ.**

Вз. Ганнемановой ртути

(mercurius solubilis Han-  
nemani) 40 гранъ,

— камфоры 10 гранъ,

— опія 5 гранъ,

сока лакричника сколь-  
ко нужно для составле-  
нія 80 пилюль, которыя при-  
нимать, какъ сказано.

**№ 69. ПИЛЮЛИ ИЗЪ СУЛЕ-  
МЫ ПРОТИВЪ ОБЩЕЙ ЛЮВО-  
СТРАСТНОЙ БОЛЕЗНИ.**

Вз. сулемы 8 гранъ,

— камфоры 10 гранъ,

— опія 5 гранъ,

сока лакричника сколько нуж-  
но для приготовления 96  
пилюль, которыя принимать  
какъ сказано.

**№ 70. ПРОТИВУГЛИСТНАЯ  
КАШКА.**

Вз. порошка цитварнаго

сѣмени  $\frac{1}{2}$  унции.

— корня мауна (valeriana)

$1\frac{1}{2}$  драхмы.

— ялаппы 1 драхму,

— поташняго камня (tar-  
tarus tartarisatus) 2

драхмы,



— меду или малинового, либо вишневого сиропу столько, сколько нужно для составленія каши.

Ежедневно принимать

3—4 раза по чайной ложкѣ.

#### № 71. СЛАВИТЕЛЬНАЯ КАШКА.

Вз. мякоти сливъ, или тамариндъ  $1\frac{1}{2}$  унции,  
— порошка александрийскаго листа безъ стебельковъ  $1\frac{1}{2}$  драхмы,  
— кремортартара 6 драхмъ.

меду, или сиропу, сколько нужно для составленія каши. Принимать по чайной ложкѣ до послабленія низомъ.

#### № 72. ПРОХЛАЖДАЮЩИЕ, МОЧЕГОННЫЕ ПОРОШКИ.

Вз. селитры 5—8 гранъ,  
— буры 10—15 гранъ,  
— сахару 20 гранъ.  
Принимать 4—6 разъ въ день по порошку.

#### № 73. ВЯЖУЩАЯ, КРЕПИТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА.

Вз. коровьяго молока  $1\frac{1}{2}$  фунта,  
— квасцовъ 1—2 драхмы;  
вскипятить, процѣди: получишь сыворотку, къ которой прибавить коричневаго сирова 1 унцію, и прини-

мать чрезъ 1—2 часа по полчашкѣ.

#### № 74. ДѢТСКИЙ ПОРОШОКЪ СЛАВИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВУКИСЛОТНЫЙ.

Вз. углекислой магнезій  $\frac{1}{2}$  унции,  
— корня ревеня 1 драхму,

— корня мауна (valeriana) 15 гранъ,  
— укропнаго елеосахора 2 драхмы.

Давать дѣтяти столько, сколько кончикомъ ножа можно захватить, или по 5—10 гранъ.

#### № 75. ДѢТСКИЙ ПОРОШОКЪ ПРОТИВУСУДОРОЖНЫЙ.

Вз. углекислой магнезій, раковыхъ жернововъ, стружекъ оленьяго рога, корня мауна, каждаго по 1 драхмъ, стереть въ порошокъ и давать дѣтямъ, какъ прежній, (№ 74).

#### № 76. РВОТНОЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Вз. перегнанной воды 1 унцію.  
— рвотнаго камня 1 гранъ,  
— корня 10 гранъ,



— простого сиропу  $1\frac{1}{2}$  унций.

давать маленькимъ дѣтямъ по чайной ложкѣ, чрезъ 5—10 минутъ, пока не появится рвота.

#### № 77. ДѢТСКИЙ СИРОПЪ.

Вз. цикорнаго сиропа,  
реченнаго сиропа,  
укропной воды по  $\frac{1}{2}$  унции каждаго.

Давать дѣтямъ 3—4 раза въ день по чайной ложкѣ.

#### № 78. ДѢТСКАЯ МАЗЬ ДЛЯ РТА.

Вз. шелковичнаго или вишневаго сиропу 1 унцію,  
— розоваго меда  $\frac{1}{2}$  унции,  
— буры 20—30 гранъ.

Мазать губы и во рту.

#### № 79. ДѢТСКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ.

Вз. кастороваго масла 2 чайныя ложки,  
— углекислой магнезии 1 драхму,  
смѣшать и дать чайную ложку.

#### № 80. ПОРОШОКЪ ДЛЯ КОРМИЛИЦЪ.

Вз. углекислой магнезии 3 драхмы,  
— сѣмянъ укропа,  
— померанцовой корки,  
— сахара, каждаго по  $\frac{1}{2}$  драхмы,

стереть въ порошокъ, который и принимать по чайной ложкѣ поутру и въ вечеру.

#### № 81. ДѢТСКАЯ МАЗЬ ОТЪ РЫЗИ ВЪ ЖИВОТѢ.

Вз. масла бѣлены 1 унцію.  
— кудрявой мяты 10 капель.

Смѣшать и втирать въ животъ, когда дѣтя кричитъ и сучить ножками.

#### № 82. ДѢТСКАЯ ПРОТИВУПОНОСНАЯ СМѢСЬ.

Вз. вытяжки каскарильной или хинной 15 гранъ,  
— укропной воды 2 унции,  
— слизи салепа,  
— просвирнаго сиропа по  $\frac{1}{2}$  унции,  
смѣшать и давать чрезъ 2 часа по чайной ложкѣ.

#### № 83. СЛАВИТЕЛЬНАЯ СМѢСЬ.

Вз. поташнаго камня (tartarus tartarisatus)  $\frac{1}{2}$  драхмы,  
укропной воды,  
маннаго сиропу,  
реченнаго — по  $\frac{1}{2}$  унции каждаго.

Давать чрезъ 2 часа по чайной ложкѣ.

#### № 84. ПОТОГОННАЯ СМѢСЬ ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Вз. бузиновой воды 2 унции,



— миндерероваго спирта  $\frac{1}{2}$  унции,  
 — сурмянаго вина 20  
 капель,  
 — малиноваго сироу 1  
 унцію.  
 Давать дитяти чрезъ 1 — 2  
 часа по чайной ложкѣ.

**№ 85. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ МАЗЬ ДЛЯ ДѢТЕЙ.**

Вз. масла бѣлены,  
 — камфоры  
 съ теплымъ макавымъ  
 масломъ по  $\frac{1}{2}$  унции,  
 — Сиденгамова лавдана 1  
 драхму.

Втирать.  
 Мазать дитяти по чайной ложкѣ.

**№ 86. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ МАЗЬ ДЛЯ ДѢТЕЙ.**

Вз. масла бѣлены,  
 — камфоры  
 съ теплымъ макавымъ  
 масломъ по  $\frac{1}{2}$  унции,  
 — Сиденгамова лавдана 1  
 драхму.  
 Втирать.  
 Мазать дитяти по чайной ложкѣ.

**№ 87. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ МАЗЬ ДЛЯ ДѢТЕЙ.**

Вз. масла бѣлены,  
 — камфоры  
 съ теплымъ макавымъ  
 масломъ по  $\frac{1}{2}$  унции,  
 — Сиденгамова лавдана 1  
 драхму.

**№ 86. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НЫЙ ДѢТСКИЙ ПОРОШОКЪ.**

Вз. цинковыхъ цвѣтовъ 8  
 гранъ,  
 — мускуса 4 грана,  
 — Сиденгамова лавдана  
 4 капли.  
 — сахара 40 гранъ.

Раздѣлить на 8 порошокъ  
 и давать чрезъ часть по по-  
 рошку.

**№ 87. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.

Давать чрезъ часть по чай-  
 ной ложкѣ.

**№ 88. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.

**№ 89. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.

**№ 90. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.

**№ 91. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.

**№ 92. ПРОТИВУСУДОРОЖ-  
 НАЯ ДѢТСКАЯ СМѢСЬ.**

Вз. маннаго, ревеннаго си-  
 роу по 1 унции,  
 — селитры 1 драхму.



## ЗАМѢЧАНІЕ О ХОЛЕРѢ.

### ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ § 79 НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

1) Холерное повѣтріе, возникшее въ Индіи на берегахъ рѣки Ганга, оттуда чрезъ Персію проникло въ Россію, и широкою полосою быстро охватило южныя губерніи.

2) Холерное повѣтріе происхожденіемъ своимъ обязано землѣ, а не воздуху.

3) Процессъ земной, развивающій это повѣтріе, вѣроятно, есть нѣкотораго рода слѣдствіе, если можно такъ сказать, болѣзненнаго дѣйствія земли, состоящаго въ раствореніи, разложеніи, гніеніи и броженіи разныхъ органическихъ и неорганическихъ веществъ земной поверхности.

4) Результатомъ этого болѣзненнаго состоянія земной поверхности есть особое испареніе.

5) Этотъ процессъ земной поверхности, начавшись въ одномъ мѣстѣ, при извѣстныхъ условіяхъ (теплотѣ и влажноти) распространяется далѣе, точно такъ, какъ болѣзненная испарина въ животномъ организмѣ, начавшись на одномъ мѣстѣ, распространяется по всему тѣлу, особенно усиливаясь въ мѣстахъ теплыхъ, сочныхъ и мягкихъ.

6) Холерное испареніе земли, подымаясь въ воздухъ, занимаетъ нижніе слои его; развитію его благопріятствуютъ берега морей, рѣкъ, озеръ, дожди, низмыя болотистыя мѣста, черноземныя равнины, словомъ, всякая сырая, влажная поверхность земли; напротивъ, возвышенныя, песчаныя, гористыя мѣста, какъ мало удерживающія въ себѣ сырость, не благопріятствуютъ развитію холернаго повѣтрія, которое



въ такихъ мѣстахъ или вовсе не оказываетъ своего губительнаго дѣйствія на людей, или же дѣйствуетъ слабо, какъ по числу занемогавшихъ холерою больныхъ и степени болѣзни, такъ и по кратковременности холернаго повѣтрія, которое притомъ поддерживается скопленіемъ значительнаго числа людей на маломъ мѣстѣ. Посему холера свирѣпствуетъ особенно въ прибрежныхъ, низменныхъ селеніяхъ, въ болотистыхъ мѣстахъ, многолудныхъ городахъ, нижнихъ этажахъ домовъ, сырыхъ казематахъ, острогахъ и казармахъ, въ дождливую погоду, въ ночное время.

7) Все это подтвердилось какъ въ прежнюю, такъ и въ нынѣшнюю эпидемію холеры. Холера, миновавъ деревни, бывшія на ея пути, появлялась въ городахъ, и прежде всего въ прибрежныхъ домахъ, потомъ между жителями, расположенными на скатѣ горы и наконецъ между горожанами, живущими на возвышеніи.

Далѣе, холера свирѣпствуетъ сильнѣе въ тѣсныхъ, неопрятныхъ частяхъ города, въ сырыхъ, грязныхъ казармахъ и проч., какъ сказано выше. Способствуютъ заболѣванію холерою: невоздержность въ пищѣ, даже умеренное употребленіе плодовъ, овощи, зелени и всякихъ бродящихъ напитковъ: квасу, кислыхъ щей, питейнаго меду и проч.

8) Холерное повѣтріе, въ происхожденіи и въ дѣйствіи на человѣка, сходствуетъ съ эпидеміею перемежающихся лихорадокъ, но отличается отъ послѣдней своею жестокостію и обширностію, относительно поражаемыхъ ею людей.

9) Холерное повѣтріе дѣйствуетъ вообще на систему волосныхъ сосудовъ, преимущественно кожи, которую оно приводитъ въ бездѣйственное состояніе, обнаруживающееся холоднѣемъ, морщиноватостію и синевою кожи. Кровь отъ поверхности тѣла устремляется къ внутреннимъ органамъ, особенно брюха, и тамъ скопляется въ большомъ количествѣ. Кроме кожи, парализное состояніе волосныхъ сосудовъ происходитъ и въ лёгкихъ.

10) Этими патологическимъ процессомъ объясняются всѣ существенныя припадки холеры: рвота, поносъ, синева, морщиноватость и охладнѣніе кожи, сильный, гробовой голосъ, холодное дыханіе, тоска, внутренній жаръ, судороги и не-



достатокъ мочи; а именно: рвота и поносъ показываютъ усиленіе природы больного освободиться отъ брюшного полно-кровія, которое, съ своей стороны, причиняетъ тоску, жаръ, жажду. Параличное состояніе лёгкихъ обозначается бездѣйствіемъ ихъ отправленія, слѣдствіемъ чего бываетъ обугленность крови и недостатокъ отдѣленія мочи: почки выводятъ изъ крови ея окисленные и перегорѣлыя части; но въ холерѣ процессъ дыханія бездѣйствуетъ; бывшія въ крови соли извергаются вмѣстѣ съ сывороткою чрезъ рвоту и поносъ; слѣдственно дѣйствіе почекъ, за недостаткомъ нужныхъ для того матеріаловъ, должно остановиться, а потому у всѣхъ холерныхъ нѣтъ мочи ни въ пузырь, ни въ почкахъ. Судороги въ мышцахъ зависятъ отъ недостатка крови и отъ холода; а потому корчи въ холерѣ появляются прежде въ отдаленныхъ и сочныхъ мышцахъ, и притомъ въ ихъ мясистыхъ и сочныхъ частяхъ, какъ болѣе чувствующихъ этотъ недостатокъ крови и холодъ. Синевя, морщиноватость и охлажденіе кожи объясняются сами по себѣ выше сказаннымъ.

11) Онемѣніе, начальное въ волосныхъ сосудахъ, въ послѣдствіи распространяется на артеріи и даже сердце, и потому пульсъ въ холерѣ слабѣетъ и потомъ останавливается вовсе; даже бѣненіе сердца, и при жизни больного, дѣлается очень слабымъ и едва примѣтнымъ. При такомъ состояніи волосныхъ сосудовъ артерій, сердца и лёгкихъ, не можетъ быть развитія животной теплоты и полноты, и потому тѣло холерика холодно, впало и морщиновато, какъ тѣло челоуѣка, вышедшаго изъ холодной воды. За то вены въ холерѣ до чрезвычайности изобилуютъ кровью, содержа въ себѣ не только свою, венную, но и артеріальную кровь.

12) Дѣйствіе холернаго повѣтрія въ легкой степени ограничивается умѣреннымъ напоромъ крови къ брюшнымъ внутренностямъ, отчего происходитъ отрыжка, тяжесть и бурчаніе въ животѣ, одна рвота или одинъ поносъ, или же то и другое въ легкой степени.

13) Изъ выше сказаннаго явствуетъ предохраненіе отъ холеры и ея леченіе.

Предохраненіе отъ холеры состоитъ въ избѣжаніи всего



того, что раздражительно дѣйствуетъ на желудокъ и кишки, и въ поддержаніи кровообращенія въ кожѣ. Въ первомъ отношеніи нужно избѣгать пищи жирной, соленой, трудноваримой, отдѣляющей вѣтры (разные овощи, плоды), приготовляемыхъ чрезъ броженіе разныхъ напитковъ (квасъ, кислыя щи, шипучія воды); умеренное употребленіе какой-нибудь горькой водки, хорошаго вина, способствуя пищеваренію, при холерной эпидеміи можетъ быть полезно, особенно для людей, привыкшихъ къ употребленію этихъ напитковъ. Вообще, однако, и во время свирѣпствованія холеры не нужно слишкомъ измѣнять образъ жизни, къ которому мы уже привыкли.

Второе важное условіе предохраненія отъ холеры состоитъ въ поддержаніи кровообращенія въ кожѣ, въ недопущеніи, такъ сказать, отхлынуть крови отъ поверхности тѣла къ внутреннимъ органамъ; лучшее и вѣрнѣйшее для этого средство есть движеніе. При малѣйшемъ чувствѣ нездоровья, тоски, тяжести, усталости, неловкости и проч. нужно ходить до легкой усталости, или до появленія испарины, которую поддерживать теплымъ питьемъ, приличнымъ одѣяніемъ.

Третье важное условіе предохраненія отъ холеры составляетъ мѣстопробываніе возвышенное, песчаное, со всѣхъ сторонъ открытое, удаленное отъ стоячей, гнилой воды, болотъ, и проч.; поэтому же во время холеры не должно подвергаться ночнымъ испареніямъ, не выходить изъ дома въ ночное время и по утрамъ до 9—10 часовъ, пока ночныя испаренія не разложатся солнечнымъ свѣтомъ; спать во 2-мъ и 3-мъ этажѣ дома; окошки въ комнатахъ затворять по закатѣ солнца; ложась въ постель на ночь, укрываться нѣсколько теплѣе обыкновеннаго; словомъ, обратить всѣ вниманіе на то, чтобы всегда поддерживать равномерную испарину въ кожѣ и не подвергаться вліянію сырыхъ, земныхъ испареній; ибо наибольшее число больныхъ занемогаютъ холерою именно ночью, отъ того, что въ это время холерное повѣтріе бываетъ, такъ сказать, насыщеннѣе: спящій чловѣкъ находится безъ движенія, а тѣло его подвергается беззащитно вліянію эпидеміи.

14) Леченіе холеры нужно располагать по ея виду и сте-



пени. Холера, состоящая из одной рвоты, уничтожается средствами, останавливающими рвоту: шипучими порошками, ривериевымъ питьемъ, зельтерскою водою, шипучими винами, кусочками проглатываемаго льда, припарками къ животу, горчичниками къ спинѣ, теплымъ чаемъ и теплымъ же одѣяніемъ до возбужденія пота.

Холерный поносъ унимается слизистымъ питьемъ изъ риса, салепа, ячнхъ, овсяныхъ крупъ, клистиромъ изъ крахмала для малолѣтнихъ съ 5 — 8, а для взрослыхъ съ 12—15—20 каплями Сиденгамова лавдана; при поносѣ—припарки къ животу, горчичники къ спинѣ, теплое питье и одѣяніе, какъ и при рвотѣ.

При полной холерѣ, кромѣ средствъ, вычисленныхъ при поносѣ и рвотѣ, особенно дѣйствительны укусные пары, иногда съ прибавленіемъ спирта. Эти пары скорѣе всѣхъ средствъ отвлекаютъ кровь отъ внутреннихъ органовъ къ поверхности тѣла, возстановляютъ въ кожѣ кровообращеніе, развиваютъ теплоту и производятъ потъ. При томъ укусные пары весьма легко произвести во всякое время: для этого стоитъ только подъ одѣяло больного поставить тазъ, положить въ него нагрѣтую плиту, или камень, на который и наливать понемногу укусу,—отъ чего больной вмигъ охватывается парами, которые и удерживаются во-кругъ его тѣла плотнымъ его укутываніемъ. Больной содержится въ укусныхъ парахъ до тѣхъ поръ, пока не возстановится теплота въ кожѣ и не ослабѣютъ главные припадки холеры — рвота, поносъ, судорога. Еще лучше окуривать больного укусными парами на диванъ съ плетенкою; въ этомъ случаѣ голый больной ложится на плетенчатый диванъ, котораго нижняя часть до полу обводится плотно, запирается коврами, или войлоками; подъ диванъ ставятся тазы съ горячею плитою, или камнемъ, и наливается на нихъ, какъ сказано, понемногу укусу; въ этомъ случаѣ укусные пары охватываютъ больного со всѣхъ сторонъ и быстро производятъ сказанное дѣйствіе, которое поддерживается теплымъ питьемъ и укутываніемъ. Вспотѣвшаго больного обтираютъ до-суха, надѣваютъ на него сухое бѣлье и опять укутываютъ. Окуриваніе парами производится всякій



разъ, когда согрѣтый больной начинаетъ зябнуть и хладѣть, что особенно часто случается ночью. Этотъ способъ леченія, очень простой и доступный для всякаго и неврача, оказался на дѣлѣ дѣйствительнѣе всякаго леченія аптечными снадобьями: больные поправлялись отъ него скоро и, что весьма важно, безъ послѣдственнаго холернаго тифа. Знаменитый воронежскій эликсиръ оказался бесполезнымъ даже и въ самомъ Воронежѣ.



## ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

	Стран.
Болѣзнь и ея леченіе вообще.	1
Свойство, натура болѣзней.	—
Припадки.	9
Причины.	41
Распознаваніе.	47
Предсказанія.	57
Леченіе.	75
Общія правила.	101
 А. ОСТРЫЯ БОЛѢЗНИ.	 1
<i>І. Лихорадки или горячки вообще.</i>	
Воспалительная лихорадка.	7
Нервная лихорадка, Нервическая горячка, Нерв. тифъ.	14
Гнилая лихорадка, горячка.	24
Переменная, перемежающаяся лихорадка, лихоманка, тряска, тетка.	26
Простудная, катарральная лихорадка и простуда-катарръ.	35
Ревматическая ломотная лихорадка и ревматизмъ-ломота.	39
Медленная, изнурительная лихорадка.	42
 ВОСПАЛЕНІЯ.	 45
Приливъ, притиченіе крови, мѣстное полнокровіе.	49
Воспаленіе мозга.	56
Воспаленіе спинного мозга.	59
Жаба, воспаленіе въ горлѣ.	60
Воспаленіе въ груди.	62
Воспаленіе брюшныхъ внутренностей.	69
— желудка.	70
— кишекъ.	72
— печени.	74
— почекъ.	76
— мочевого пузыря.	77
— матки.	78
 НАКОЖНЫЯ БОЛѢЗНИ, ИЛИ СЫПИ.	 80
<i>А. Лихорадочныя, острые сыпи.</i>	
Оспа.	86
Ложная вѣтряная оспа, полуоспа.	94
Скарлатина, красуха.	100



	Стран.
Корь.	96
Крапивянка.	103
Проянка, просвидная сыпь.	104
Кровяныя пятна.	105
Молочница.	106

### В. Безлихорадочныя, хроническія сыпи.

Чесотка.	107
Лишай.	109
Проказа, лепра.	112
Шолуди, парши.	—
Краснота тѣла, лица.	113
Рябость лица.	—
Ковтунъ, колтунъ.	114
Плѣшивость.	115
Веснушки.	116
Родимое пятно.	—

### II. Хроническія, продолжительныя, медленныя болѣзни.

Скопленіе нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ.	118
— желчи.	121
— слизи въ желудкѣ и кишкахъ	122
— въ желудкѣ кислоты.	—
Завалы, застои въ брюхѣ.	123
Истощеніе.	124
Чихотка.	125
Гортанная, горловая чихотка.	138
Изнурительная лихорадка	139
Спинальная сухотка.	141
Водяная бокѣзнь, водянка.	142
Брюшная водянка.	143
Грудная водянка.	145
Подкожная водянка.	146
Пученіе живота, вѣтры.	148
Запоръ на-низъ.	150
Рвота съ запоромъ.	152
Кровотеченія	154
Кровотеченіе изъ носа.	155
Кровохарканіе.	156
Кровяная рвота.	160
Почечуй, геморрой	161
Неправильный почечуй.	165
Кровавая моча, кровотеченіе.	167
Болѣзненный потъ.	168
Слипотеченіе.	169



	Стран,
Недержание мочи . . . . .	170
Мочезвурение, мочевоѣ попоѣ, сахарная моча . . . . .	172
Истеченіе слизи изъ мочеваго пузыря, катарръ пузыря . . . . .	173
Теченіе мужскаго сѣмени . . . . .	174
Поноѣ простой . . . . .	176
Поноѣ кровавый патужный . . . . .	179
Холера . . . . .	183
<b>НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ.</b> . . . .	186
Болѣзни ума . . . . .	189
Ипохондрія, истерика . . . . .	194
Падучая болѣзнь, падучка . . . . .	199
Пляска св. Витта . . . . .	202
Хожденіе во снѣ, лунатизмъ . . . . .	203
Давленіе во снѣ, навалъ, кошмаръ . . . . .	204
Трясеніе тѣла . . . . .	205
Злая корча, рафанія . . . . .	206
Сжатіе, смыканіе челюстей, столбнякъ . . . . .	207
Удушье, одышка . . . . .	210
Кашель . . . . .	212
Судорожный, коклюшъ . . . . .	215
Біеніе, трепетаніе сердца . . . . .	218
Икота . . . . .	219
Жажда . . . . .	220
Недостатокъ жажды . . . . .	221
Сильный аппетитъ, обжорство . . . . .	—
Потеря аппетита . . . . .	222
Потеря вкуса, обонянія, осязанія и ощущенія . . . . .	224
Трудное глотаніе . . . . .	225
Безгласіе, нѣмота . . . . .	—
Трудное пищевареніе . . . . .	226
Изжога, изгага, печія . . . . .	228
Рвота . . . . .	—
Нервныя боли . . . . .	232
Боль головы . . . . .	233
Личная боль . . . . .	237
Боль въ желудкѣ . . . . .	238
Боль въ кишкахъ, въ жпвотѣ, колика . . . . .	240
Безсонница . . . . .	245
Сонливость, спячка . . . . .	246
Похотливость . . . . .	247
Мужское безсиліе . . . . .	249
Кровяной, апоплексическій пострѣлъ, ударъ мозга . . . . .	251
Кровяной пострѣлъ, апоплексія легкихъ . . . . .	259
Обморокъ . . . . .	260
Круженіе головы, головокруженіе . . . . .	262
Онѣмѣніе, параличъ . . . . .	263



## ХУДОСОЧІЯ . . . . .

. 268

Дѣвичья немочь, блѣдность дѣвицъ . . . . .	. 273
Цынга, скорбутъ . . . . .	. 275
Желтуха . . . . .	. 277
Золотуха . . . . .	. 279
Англійская болѣзнь . . . . .	. 283
Подагра, хирагра, ломота въ суставахъ . . . . .	. 284
Любострастная, венерическая, сифилистическая болѣзнь . . . . .	. 292
Ртутная болѣзнь . . . . .	. 307
Глисты . . . . .	. 309
Женскія болѣзни . . . . .	. 315
Дѣтскія болѣзни . . . . .	. 340
Рецепты . . . . .	. 365
Прибавленіе: о предохраненіи и леченіи отъ холеры . . . . .	. 381

16

















2024382047